

河北省第三次全国土壤普查
土壤资源评价与利用报告质控表

被检单位	石家庄师兄弟土地环境技术服务有限公司	区县/市名	成安县
质控结果	补充修改后通过	质控日期	2026.09

质控依据

文件或材料名称	简称	类型
国务院第三次全国土壤普查领导小组办公室关于印发《第三次全国土壤普查市县级成果验收工作方案》的通知（国土壤普查办发〔2026〕3号），附件《第三次全国土壤普查市县级成果验收工作方案》	《市县级验收方案》	正式文件
国务院第三次全国土壤普查领导小组办公室关于印发《第三次全国土壤普查县级成果编制及验收导引》的通知（国土壤普查办发〔2024〕19号），附件《第三次全国土壤普查县级成果编制及验收导引》	《县级成果导引》	正式文件
国务院第三次全国土壤普查领导小组办公室关于印发《第三次全国土壤普查省级成果清单及编制导引》的通知（国土壤普查办发〔2025〕16号），附件《第三次全国土壤普查省级成果清单及编制导引》	《省级成果导引》	正式文件
《第三次全国土壤普查数据库规范（修订版）》	《数据库规范》	正式技术规范
技术答疑资料：《第三次全国土壤普查常见技术问题解答手册》及《第三次全国土壤普查成果形成常见技术问题答疑手册（第二期）》	技术答疑资料	技术答疑资料（非正式规范）

问题类别一：成果名称、存在性和评分口径错误

审查标准	审查结果
成果名称采用“土壤资源评价与利用报告”。 来源：《市县级验收方案》PDF第9—11页成果清单和附件2。	☒ 符合 ☐ 存在问题

审查标准	审查结果
土壤资源评价与利用报告属于市县级成果验收内容，按《市县级验收方案》附件 2 和附件 3 评分。 来源：《市县级验收方案》PDF 第 9—11、16 页附件 1、附件 2 和附件 3 表 3。	☒ 符合 ☐ 存在问题
报告内部现行章节权重：第二章 10、第三章 20、第四章 20、第五至第九章各 10；第一章不计分但仍须完整。 来源：《市县级验收方案》PDF 第 16 页附件 3 表 3。	☒ 符合 ☐ 存在问题
未开展土特产品评价的县，第八章计 0 分，其他章节合计分除以 0.9 折算；不得虚构土特产品内容。 来源：《市县级验收方案》PDF 第 16 页附件 3 表 3 注；《县级成果导引》综合报告评分注。	☒ 符合 ☐ 存在问题
土壤资源评价与利用报告专题评分中，土壤资源综合利用建议 90 分，报告质量 10 分。 来源：《市县级验收方案》PDF 第 23 页表 3.5-7。	☐ 符合 ☒ 存在问题

问题截图及备注

序号	问题截图	备注
1	3. 不适宜区产业优化布局 土壤适宜性评价结果显示，南宁香蕉种植不适宜区域主要分布辛义乡、漳河店镇、成安镇等居民点附近，与当前种植现状分布基本一致。这些不适宜区域的寺点主要包括耕地质量较差、人为活动影像严重。土壤分析显示，这些区域的土 1. 土壤农业综合利用分区 （1）褐土类优质粮食生产区：涵盖南阳堡镇、十里铺镇以南的漳河冲积扇形地及黄河故道自然堤褐土、褐土化潮土分布区。该区域土壤熟化程度高、排水条件优越，结合全县粮食安全保障目标，重点发展小麦、玉米等主粮作物，配套建设高标准农田，打造规模化粮食生产示范基地。依托省级玉米单产提升整建制推进县建设，优化种植模式，提升粮食综合产能。 结合土壤三普调查核心指标及区域土壤特征，成安县土壤资源现状呈现三大特征：一是土壤类型分区明晰，以褐土类为主（占比91.43%）、潮土类为辅（占比 38.23%），随地形从缓岗到低平地呈现“褐土-褐土化潮土-潮土-盐化潮土”的规律性分布，土壤质地呈“沙-壤-粘”过渡特征，与黄河故道冲积演化规律高度契合；二是土壤环境质量总体良好，全域无受污染耕地，土壤安全利用率达 100%。	第九章出现“南宁香蕉”“南阳堡镇”“十里铺镇”“平固店镇”“南韩镇”等非成安县内容，土壤类型占比数据“褐土类 91.43%、潮土类 38.23%”合计 129.66%，明显错误

问题类别二：前置材料、第一章和数据源表不完整

审查标准	审查结果
------	------

审查标准	审查结果
前置材料包含前言、目录、图目录、表目录和摘要；标题、行政区和版本一致。 来源：《县级成果导引》第 1 部分综合报告体例及 PDF 第 93 页格式要求。	☐ 符合 ☒ 存在问题
第一章说明任务、范围、工作流程、实际技术路线、数据来源与处理、异常值处理及成果清单，不能只复制通用流程。 来源：《县级成果导引》第 2 部分综合报告提纲，PDF 第 25—27 页。	☐ 符合 ☒ 存在问题
数据源表至少列类型、格式、比例尺/分辨率、年份和来源；使用通过外业、内业阶段验收的数据。 来源：《县级成果导引》PDF 第 25—27 页。	☐ 符合 ☒ 存在问题
单位和小数位统一；总体土地利用原则采用 2023 年度国土变更调查。若后发专项规范要求“最新年度”，应在相应章节记录实际年份和口径差异。 来源：《县级成果导引》PDF 第 25 页；技术答疑资料第 32—33 问；《农业利用适宜性规范》第 7.2 条（相应专题后发口径）。	☐ 符合 ☒ 存在问题

问题截图及备注

序号	问题截图	备注
1		图表目录为空
2		1、异常值处理仅在第四章提及，第一章未说明

序号	问题截图	备注																								
3	表 1-1 主要数据来源概述 <table><tr><th>数据项目</th><th>类型</th><th>格式</th><th>比例尺（或分辨率）</th><th>数据时间</th><th>来源</th></tr><tr><td>土地利用现状数据</td><td>空间数据</td><td>矢量</td><td>1:1 万</td><td>2023 年度</td><td>自然资源部门</td></tr><tr><td>土壤二普土壤剖面描述</td><td>文字</td><td>—</td><td>—</td><td>1983 年</td><td>县土壤志或土种志</td></tr><tr><td>数字高程模型（DEM）</td><td>空间数据</td><td>栅格</td><td>30m</td><td>2018 年</td><td>测绘部门</td></tr></table> 注：土壤二普数据由县自然资源局提供，DEM 数据由县自然资源局提供。	数据项目	类型	格式	比例尺（或分辨率）	数据时间	来源	土地利用现状数据	空间数据	矢量	1:1 万	2023 年度	自然资源部门	土壤二普土壤剖面描述	文字	—	—	1983 年	县土壤志或土种志	数字高程模型（DEM）	空间数据	栅格	30m	2018 年	测绘部门	仅列 3 项（土地利用现状、二普土壤剖面描述、DEM），缺少气候、母质、地形、植被、水文、遥感影像、土壤属性等环境变量数据来源；未说明数据是否通过外业、内业阶段验收；
数据项目	类型	格式	比例尺（或分辨率）	数据时间	来源																					
土地利用现状数据	空间数据	矢量	1:1 万	2023 年度	自然资源部门																					
土壤二普土壤剖面描述	文字	—	—	1983 年	县土壤志或土种志																					
数字高程模型（DEM）	空间数据	栅格	30m	2018 年	测绘部门																					
	（2）非评价对象：大于阈值的图斑相邻合并，小于阈值的图斑保留（用于填补）。 表 6-2 制图综合阈值 <table><tr><th rowspan="2">要素对象</th><th rowspan="2">评价对象</th><th colspan="2">非评价对象</th></tr><tr><th>道路、沟渠等线状用地</th><th>建筑用地</th></tr><tr><td>阈值内合并</td><td>1 公顷</td><td>平均宽度 20 米</td><td>2 公顷</td></tr></table> 	要素对象	评价对象	非评价对象		道路、沟渠等线状用地	建筑用地	阈值内合并	1 公顷	平均宽度 20 米	2 公顷	报告中面积单位有“亩”“平方公里”公顷混用														
要素对象	评价对象			非评价对象																						
		道路、沟渠等线状用地	建筑用地																							
阈值内合并	1 公顷	平均宽度 20 米	2 公顷																							

问题类别三：第二章区域概况缺项或与本地脱节

审查标准	审查结果
完整分析气候、母质、地形、植被、水资源、社会经济、土地利用现状及历史变化、农业基础设施和农业生产历史现状。 来源：《县级成果导引》PDF 第 26—27 页；《市县级验收方案》PDF 第 16 页附件 3 表 3“第二章”10 分。	☐ 符合 ☒ 存在问题
土地利用至少列一级、二级地类面积和分布，历史变化追溯至二普或土地调查并分析原因。 来源：《县级成果导引》PDF 第 26—27 页。	☒ 符合 ☐ 存在问题
自然、社会和农业生产概况应与后续评价对象、限制因素和利用建议衔接；与本地无关的模板内容应删除。 来源：《市县级验收方案》PDF 第 16 页附件 3 表 3“内容完整、符合实际”；《县级成果导引》第 2 章。	☒ 符合 ☐ 存在问题

问题截图及备注

序号	问题截图	备注
1	成安县隶属河北邯郸，地处太行山东麓海冀南平原，晋冀鲁豫四省交汇，交通便捷，总面积 480 平方千米，下辖 6 个镇、3 个乡。属温带大陆性季风气候，地势平坦，西南略高、东北略低，海拔 50.5-65 米，县城境内没有河流、湖泊，存在骨干排水渠道 5 条，主要灌溉渠道 3 条。土地利用以耕地为主，同时发展园地等，人口约 46 万。2023 年生产总值 205.8 亿元，其中第二产业贡献最大，第三产业稳步提升。农业规模较大，熟制多为一年两熟或两年三熟，轮作多样，粮经饲作物比例协调，粮食、蔬菜等作物及肉类产量可观，为经济发展与民生保障奠定坚实基础。 今年以不减少地下水开采 2000 万立方米，在 2024 年已实现地下水不升不降。2023 年春灌，依托土壤湿度传感器与气象站构建的智慧灌溉系统已在 33 万多亩冬小麦应用，春灌周期预计缩短 10 天、年节水 1000 多万立方米；抗旱期间，岳城水库下泄流量阶段性提高至 60 立方米每秒，全县 46 条干支渠与 5 座大泵站协同调度，保障关键期用水安全。	数目矛盾

问题类别四：第三章土壤类型与制图内容或数据错误

审查标准	审查结果
说明分类体系、类型清单、发生分类与系统分类参比、分布与演变、制图路线、数据、模型/推理规则、验证及与二普的面积和边界变化。 来源：《县级成果导引》PDF 第 28—30 页；《市县级验收方案》PDF 第 16 页附件 3 表 3。	☐ 符合 ☒ 存在问题
类型清单、层级归属、类型数量和面积与成果数据库、土壤类型图和专题报告一致，面积统计说明口径。 来源：《县级成果导引》PDF 第 28—30 页；《数据库规范》第 7 章逻辑一致性。	☐ 符合 ☒ 存在问题
系统分类参比按第二期答疑修正后的“亚类与土种”口径，避免沿用旧表标题或缺少土种参比。 来源：技术答疑资料第二期第 71 问，PDF 第 37 页。	☐ 符合 ☒ 存在问题
关键类型缺失、较多分类错误、简单套用土地利用边界或明显偏离发生规律属于总体土壤类型成果硬风险，应在本章和专题同时处理。 来源：《市县级验收方案》PDF 第 17 页表 3.5-1 注 2。	☒ 符合 ☐ 存在问题

问题截图及备注

序号	问题截图	备注																				
1	3. 土壤类型改变斑斑更新 (五) 土壤类型空间推测 1. 训练样本准备 2. 模型构建与空间推测 3. 土壤类型未改变区图斑更新 21 (六) 土壤类型改变区提取及预判 1. 引起土壤类型改变的主要情形 2. 土壤类型可能改变斑块的提取 3. 土壤类型可能改变斑块的预判 (七) 新编土壤类型图验证与分析 1. 新编土壤类型图验证评价 2. 土壤类型分布特征与规律分析 3. 与土壤二普土壤类型图比较分析 将新编土壤三普土壤类型图与土壤二普土壤类型图进行全面系统的比较分析，包括类型差异、边界差异、面积与分布差异及原因等，具体说明类型的差异（从什么类型变成了什么类型）、变化的面积及分布位置、原因等。明确土壤普查面积量算规则及统计口径。 四、小结	此部分只有标题无具体内容																				
2	少了1个亚类、2个土属、5个土种，见表3.5。 表3.5 土壤类型统计表 <table><tr><th>普查时间</th><th>土类</th><th>亚类</th><th>土属</th><th>土种</th></tr><tr><td>二普</td><td>2</td><td>4</td><td>6</td><td>28</td></tr><tr><td>三普</td><td>3</td><td>3</td><td>4</td><td>23</td></tr><tr><td>变化</td><td>1</td><td>-1</td><td>-2</td><td>-5</td></tr></table>	普查时间	土类	亚类	土属	土种	二普	2	4	6	28	三普	3	3	4	23	变化	1	-1	-2	-5	仅表3.5列数量变化，未列面积变化。
普查时间	土类	亚类	土属	土种																		
二普	2	4	6	28																		
三普	3	3	4	23																		
变化	1	-1	-2	-5																		
3	(一) 土壤类型与分布规律 成安县成安县地处冀南平原，地势平坦，西高东低，西南部略高于东北部，高程多在50-65米之间，西南部略高于东北部，高程变化幅度较小。地形以平原为主，局部区域因河流沉积差异形成轻微岗洼相间格局，成土母质以冲积母质为主。三普涵盖3个土类、3个亚类、4个土属、23个土种。三普土壤分类如下： 等级评价技术规范>的通知》（国土土壤普查办发〔2025〕3号），成安县在农业区划上属于黄淮海区域的冀鲁豫平原农业区，这一区域是我国重要的粮食生产基地，以小麦、玉米等主要粮食作物种植为主，生产方式集约化程度较高。成安县土壤类型丰富多样，具体可分为3大土类、3个亚类、4个土属以及19个土种，土壤资源具有一定的代表性和典型性。依据国家耕地质量等级评价技术规范的标准，成安县耕地质量等级覆盖范围较广，包括二等至六等共四个等级，整体质量水平处于中等偏上，体现了成安县耕地资源在保障区域粮食安全中的重要作用。	土种数目前后矛盾																				

序号	问题截图	备注																																										
4	汪:汪意新老土种开非一一对应。 表 3-2 成安县土壤系统分类与发生分类参比对照 <table><tr><th colspan="3">系统分类</th><th colspan="2">发生分类</th><th rowspan="2">说明</th></tr><tr><th>土类</th><th>亚类</th><th>土族</th><th colspan="2">土壤三普土种（连续命名）</th></tr><tr><td rowspan="7">土类 1</td><td rowspan="3">亚类 1</td><td>土族 1</td><td colspan="2">土种 1、土种 2</td><td></td></tr><tr><td>土族 2</td><td colspan="2">土种 3、土种 4</td><td></td></tr><tr><td></td><td colspan="2"></td><td></td></tr><tr><td rowspan="4">亚类 2</td><td>土族 3</td><td colspan="2">土种 5、土种 6</td><td></td></tr><tr><td>土族 4</td><td colspan="2">土种 7、土种 8</td><td></td></tr><tr><td></td><td colspan="2"></td><td></td></tr><tr><td></td><td colspan="2"></td><td></td></tr></table> 注：系统分类参照《中国土壤系统分类检索（第三版）》。	系统分类			发生分类		说明	土类	亚类	土族	土壤三普土种（连续命名）		土类 1	亚类 1	土族 1	土种 1、土种 2			土族 2	土种 3、土种 4							亚类 2	土族 3	土种 5、土种 6			土族 4	土种 7、土种 8											未填入成安县实际土种参比信息
系统分类			发生分类		说明																																							
土类	亚类	土族	土壤三普土种（连续命名）																																									
土类 1	亚类 1	土族 1	土种 1、土种 2																																									
		土族 2	土种 3、土种 4																																									
	亚类 2	土族 3	土种 5、土种 6																																									
		土族 4	土种 7、土种 8																																									

问题类别五：第四章土壤属性与制图分析失真

审查标准	审查结果
分析关键物理、化学及必要生物学属性，按土地利用、土壤类型和分区比较，并开展可靠历史变化分析。 来源：《县级成果导引》PDF 第 30—36 页；《市县级验收方案》PDF 第 16 页附件 3 表 3。	☐ 符合 ☒ 存在问题
说明每项制图模型、参数、环境变量和验证；样点统计与制图统计异常差异须解释。 来源：《县级成果导引》PDF 第 30—36 页；《属性与专题图规范》第 6—7 节。	☐ 符合 ☒ 存在问题
报告表格、属性栅格、图件和数据库中的分级阈值、面积及结论一致；同一问题传导到不同评分项时按现行规则分别处理。 来源：《市县级验收方案》各专题评分表及表 3.5-1 注 1；《数据库规范》第 7 章。	☒ 符合 ☐ 存在问题
制图结果空间分布明显不符、环境变量严重不合理、无说明大量剔点等总体属性制图硬风险，必须在本章说明或整改，不得仅修文字。 来源：《市县级验收方案》PDF 第 18 页表 3.5-2 注。	☒ 符合 ☐ 存在问题

问题截图及备注

序号	问题截图	备注																																																																		
1		但缺少必要的生物学属性																																																																		
2	有机肥施用是核心提升因素，整体有机质水平能满足作物生长需求。 表 4-16 成安县有机质分级分布 <table><tr><th colspan="2">土壤三普分级</th><th colspan="2">样点统计</th><th colspan="2">制图统计</th></tr><tr><th>分级</th><th>值域/（g/kg）</th><th>数量/个</th><th>占比/%</th><th>面积/亩</th><th>占比/%</th></tr><tr><td>I 级</td><td>>25</td><td>7</td><td>2.13</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>II 级</td><td>20-25</td><td>53</td><td>16.16</td><td>2309</td><td>0.43</td></tr><tr><td>III 级</td><td>15-20</td><td>133</td><td>40.55</td><td>325767</td><td>60.07</td></tr><tr><td>IV 级</td><td>10-15</td><td>99</td><td>30.18</td><td>163369</td><td>30.13</td></tr><tr><td>V 级</td><td>≤10</td><td>36</td><td>10.98</td><td>50815</td><td>9.37</td></tr><tr><td>全县</td><td>-</td><td>328</td><td>100</td><td>542260</td><td>100</td></tr><tr><td colspan="2">全县均值/（g/kg）</td><td colspan="2">15.96</td><td colspan="2">13.11</td></tr><tr><td colspan="2">全县中位值/（g/kg）</td><td colspan="2">16.1</td><td colspan="2">13.58</td></tr><tr><td colspan="2">全县范围/（g/kg）</td><td colspan="2">3.55-27.2</td><td colspan="2">5.91-21.59</td></tr></table>	土壤三普分级		样点统计		制图统计		分级	值域/（g/kg）	数量/个	占比/%	面积/亩	占比/%	I 级	>25	7	2.13	0	0	II 级	20-25	53	16.16	2309	0.43	III 级	15-20	133	40.55	325767	60.07	IV 级	10-15	99	30.18	163369	30.13	V 级	≤10	36	10.98	50815	9.37	全县	-	328	100	542260	100	全县均值/（g/kg）		15.96		13.11		全县中位值/（g/kg）		16.1		13.58		全县范围/（g/kg）		3.55-27.2		5.91-21.59		第四章末节说明了 8 种模型和交叉验证结果，但大量属性制图结果与样点统计差异明显，如有机质样点均值 15.96g/kg、制图均值 13.11g/kg，有效磷样点均值 16.99mg/kg、制图均值 15.35mg/kg，速效钾样点均值 178.38mg/kg、制图均值 167.50mg/kg 等，未逐项解释异常差异
土壤三普分级		样点统计		制图统计																																																																
分级	值域/（g/kg）	数量/个	占比/%	面积/亩	占比/%																																																															
I 级	>25	7	2.13	0	0																																																															
II 级	20-25	53	16.16	2309	0.43																																																															
III 级	15-20	133	40.55	325767	60.07																																																															
IV 级	10-15	99	30.18	163369	30.13																																																															
V 级	≤10	36	10.98	50815	9.37																																																															
全县	-	328	100	542260	100																																																															
全县均值/（g/kg）		15.96		13.11																																																																
全县中位值/（g/kg）		16.1		13.58																																																																
全县范围/（g/kg）		3.55-27.2		5.91-21.59																																																																

问题类别六：第五章退化障碍与单独专题不一致

审查标准	审查结果
概述主要退化障碍类型、面积、分布、程度和成因，包含但不限于贫瘠、缺素、盐渍化、酸化、板结、压实及当地土体障碍。 来源：《县级成果导引》PDF 第 36—37 页；《市县级验收方案》PDF 第 16、19 页。	☐ 符合 ☒ 存在问题
各类型按“数据—方法—现状—历史/成因—改良”组织；不能只复制独立报告结论而无关键数据和图表。 来源：《县级成果导引》第五章；《市县级验收方案》表 3.5-3。	☒ 符合 ☐ 存在问题
本章与独立退化报告、专题栅格、统计表的面积、等级和结论一致；若综合报告简化，应保留明确引用和同口径摘要。 来源：《数据库规范》第 7 章逻辑一致性；《县级成果导引》第五章。	☒ 符合 ☐ 存在问题

问题截图及备注

序号	问题截图	备注																																																																		
1	表 4-10 成安县酸碱性分级分布 <table><tr><th colspan="2">土壤三普分级</th><th colspan="2">样点统计</th><th colspan="2">制图统计</th></tr><tr><th>分级</th><th>值域</th><th>数量/个</th><th>占比/%</th><th>面积/亩</th><th>占比/%</th></tr><tr><td>I 级</td><td>6.5-7.5</td><td>5</td><td>1.52</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>II 级</td><td>7.5-8.0,6.0-6.5</td><td>49</td><td>14.94</td><td>8684</td><td>1.6</td></tr><tr><td>III 级</td><td>8.0-8.5,5.5-6.0</td><td>267</td><td>81.4</td><td>533576</td><td>98.4</td></tr><tr><td>IV 级</td><td>8.5-9.0,5.0-5.5</td><td>7</td><td>2.13</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>V 级</td><td>>9.0,≤5.0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>全县</td><td>-</td><td>328</td><td>99.99</td><td>542260</td><td>100</td></tr><tr><td colspan="2">全县均值</td><td colspan="2">8.15</td><td colspan="2">8.16</td></tr><tr><td colspan="2">全县中位值</td><td colspan="2">8.17</td><td colspan="2">8.16</td></tr><tr><td colspan="2">全县范围</td><td colspan="2">7.22-8.7</td><td colspan="2">7.96-8.32</td></tr></table>	土壤三普分级		样点统计		制图统计		分级	值域	数量/个	占比/%	面积/亩	占比/%	I 级	6.5-7.5	5	1.52	0	0	II 级	7.5-8.0,6.0-6.5	49	14.94	8684	1.6	III 级	8.0-8.5,5.5-6.0	267	81.4	533576	98.4	IV 级	8.5-9.0,5.0-5.5	7	2.13	0	0	V 级	>9.0,≤5.0	0	0	0	0	全县	-	328	99.99	542260	100	全县均值		8.15		8.16		全县中位值		8.17		8.16		全县范围		7.22-8.7		7.96-8.32		第五章主要写“土壤酸化”，但成安县土壤 pH 均值 8.15，整体呈弱碱性，不存在酸化问题；后文又写“土壤 pH 值的全县平均最高达到 8.7，最低为 7.22，整体处于弱碱性范围”，与“酸化”结论严重矛盾
土壤三普分级		样点统计		制图统计																																																																
分级	值域	数量/个	占比/%	面积/亩	占比/%																																																															
I 级	6.5-7.5	5	1.52	0	0																																																															
II 级	7.5-8.0,6.0-6.5	49	14.94	8684	1.6																																																															
III 级	8.0-8.5,5.5-6.0	267	81.4	533576	98.4																																																															
IV 级	8.5-9.0,5.0-5.5	7	2.13	0	0																																																															
V 级	>9.0,≤5.0	0	0	0	0																																																															
全县	-	328	99.99	542260	100																																																															
全县均值		8.15		8.16																																																																
全县中位值		8.17		8.16																																																																
全县范围		7.22-8.7		7.96-8.32																																																																

问题类别七：第六至八章专题评价缺项或结论错配

审查标准	审查结果
第六章说明农业适宜性对象、单元、限制因子、指标、等级、模型及验证，分析各适宜等级、乡镇/土壤类型分布、现状用地错配和后备耕地，提出布局建议。 来源：《县级成果导引》PDF 第 38—40 页；《市县级验收方案》附件 3 表 3 及表 3.5-4。	☐ 符合 ☒ 存在问题
第七章说明耕地质量评价方法、单元、指标、权重、隶属度、综合指数和等级，统计县域/乡镇/土壤类型各等级面积，分析问题并提出针对性措施。 来源：《县级成果导引》PDF 第 40—42 页；《市县级验收方案》附件 3 表 3 及耕地质量评分表。	☒ 符合 ☐ 存在问题
第八章有专题成果时说明产品、生态土壤要求、方法、分区、限制因素、验证和利用建议；无专题成果时如实标明并按折算规则处理。 来源：《县级成果导引》PDF 第 42—43 页；《市县级验收方案》PDF 第 16 页附件 3 表 3。	☒ 符合 ☐ 存在问题
第六至八章的地图、数据库、统计和结论必须与独立专题同版，不能使用旧版数字或只改综合报告。 来源：《省市级成果导引》市级总体要求；《数据库规范》第 7 章。	☐ 符合 ☒ 存在问题

问题截图及备注

序号	问题截图	备注
1	图 6-6 评价单元和均质单元划分过程 制图综合后，成安县共有 3981 个土地利用现状图斑，叠加三普土壤类型图扣除非评价对象，利用 ArcGIS 叠加形成 1570 个评价单元，用水资源保障条件、排水能力进行聚类拆分，形成 1515 个均质单元，作为土壤农业利用适宜性评价底图。 、 体属性和经济属性基本一致个同耕地评价单元之间，既有差异性，又有可比性。 本次评价以 2023 年度国土变更调查数据中耕地图斑作为评价底图，通过与行政区划图、第三次全国土壤普查土壤类型图叠加形成评价单元，经统计，成安县共 15722 个评价单元。 1. 与遥感影像对比分析 将评价结果与遥感影像进行对比分析，可以看出适宜性评价结果在空间上整体与遥感影像图吻合，全县适宜性空间分布全部为宜耕地，中度适宜与勉强适宜呈带状/斑块状分布。	评价单元写“1515 个均质单元”，与第七章“15722 个评价单元”不一致；评价结果全部为“宜耕”，无宜园、宜林、宜草，与第二章、第三章中园地、林地、草地大量存在的实际不匹配；后备耕地资源分析中，将现状林地、园地、草地全部归入宜耕，结论过于绝对；

序号	问题截图	备注
2	（四）可耕地资源潜力分析 可耕地资源潜力分析指的是将评价结果宜耕地扣除现状耕地后，剩余的可开发为耕地的土地资源。将成安县评价结果与国土空间规划划定的“三区三线”进行对比分析，扣除城镇空间、生态空间以及现状耕地的宜耕地作为耕地资源潜力。 156 成安县可耕地资源潜力分布图	可耕地资源潜力分析仅有标题和图 6-17，无具体分析内容
3	全县耕地总面积为 4691467 亩，均为水浇地，主要集中分布于县域的中部和东部区域。根据《国务院第三次土壤普查领导小组办公室关于印发<第三次全国土壤普查耕地质量等级评价技术规范>的通知》（国土土壤普查办发〔2025〕3 号），成安县在农业区划上属于黄淮海区域的冀鲁豫平原农业区，这一区域是我国重要的粮食生产基地，以小麦、玉米等主要粮食作物种植为主，生产方式集约化程度较高。成安县土壤类型丰富多样，具体可分为 3 大土类、3 个亚类、4 个土属以及 19 个土种，土壤资源具有一定的代表性和典型性。依据国家耕地质量等级评价技术规范的标准，成安县耕地质量等级覆盖范围较广，包括二等至六等共四个等级，整体质量水平处于中等偏上，体现了成安县耕地资源 图 7.11 成安县耕地土壤酸碱度分布图 3. 确定指标权重 按照《规范》附录 A 耕地质量等级划分区域范围，成安县在农业区划上属于黄淮海区域的燕山太行山山麓平原农业区，各指标权重见下表。	农业区划写“黄淮海区域的冀鲁豫平原农业区”，后又写“黄淮海区域的燕山太行山山麓平原农业区”，两处不一致

序号	问题截图	备注																																																																										
4	要限制因素为有机质。 表 7.14 各乡镇耕地质量情况 <table><tr><th rowspan="2">序号</th><th rowspan="2">乡镇</th><th colspan="2">高等级耕地</th><th colspan="2">中等级耕地</th><th rowspan="2">合计</th></tr><tr><th>面积（亩）</th><th>占比（%）</th><th>面积（亩）</th><th>占比（%）</th></tr><tr><td>1</td><td>柏寺营乡</td><td>23469</td><td>8.49</td><td>10943</td><td>3.96</td><td>34412</td></tr><tr><td>2</td><td>成安镇</td><td>38885</td><td>14.07</td><td>57869</td><td>20.94</td><td>96754</td></tr><tr><td>3</td><td>道东堡镇</td><td>48422</td><td>17.52</td><td>19903</td><td>7.20</td><td>68325</td></tr><tr><td>4</td><td>李家町镇</td><td>27566</td><td>9.97</td><td>26224</td><td>9.49</td><td>53790</td></tr><tr><td>5</td><td>商城镇</td><td>44419</td><td>16.07</td><td>18418</td><td>6.66</td><td>62837</td></tr><tr><td>6</td><td>辛义乡</td><td>23214</td><td>8.40</td><td>40201</td><td>14.54</td><td>63414</td></tr><tr><td>7</td><td>漳河店镇</td><td>38458</td><td>13.91</td><td>14877</td><td>5.38</td><td>53336</td></tr><tr><td>8</td><td>长巷乡</td><td>31962</td><td>11.56</td><td>4316</td><td>1.56</td><td>36278</td></tr><tr><td colspan="2">合计</td><td>276395</td><td>100.00</td><td>192752</td><td>69.74</td><td>469147</td></tr></table>	序号	乡镇	高等级耕地		中等级耕地		合计	面积（亩）	占比（%）	面积（亩）	占比（%）	1	柏寺营乡	23469	8.49	10943	3.96	34412	2	成安镇	38885	14.07	57869	20.94	96754	3	道东堡镇	48422	17.52	19903	7.20	68325	4	李家町镇	27566	9.97	26224	9.49	53790	5	商城镇	44419	16.07	18418	6.66	62837	6	辛义乡	23214	8.40	40201	14.54	63414	7	漳河店镇	38458	13.91	14877	5.38	53336	8	长巷乡	31962	11.56	4316	1.56	36278	合计		276395	100.00	192752	69.74	469147	表 7.14 “各乡镇耕地质量情况” 列了 8 个乡镇，但成安县下辖 6 个镇、3 个乡共 9 个乡镇，缺少 1 个乡镇
	序号			乡镇	高等级耕地		中等级耕地		合计																																																																			
		面积（亩）	占比（%）		面积（亩）	占比（%）																																																																						
	1	柏寺营乡	23469	8.49	10943	3.96	34412																																																																					
	2	成安镇	38885	14.07	57869	20.94	96754																																																																					
	3	道东堡镇	48422	17.52	19903	7.20	68325																																																																					
	4	李家町镇	27566	9.97	26224	9.49	53790																																																																					
	5	商城镇	44419	16.07	18418	6.66	62837																																																																					
	6	辛义乡	23214	8.40	40201	14.54	63414																																																																					
	7	漳河店镇	38458	13.91	14877	5.38	53336																																																																					
8	长巷乡	31962	11.56	4316	1.56	36278																																																																						
合计		276395	100.00	192752	69.74	469147																																																																						

问题类别八：第九章综合利用建议空泛或不可实施

审查标准	审查结果
结合农业结构和产业发展，提出分区、分类、可实施的培肥、障碍治理、结构调整和资源保护利用建议。 来源：《县级成果导引》PDF 第 43 页第九章；《市县级验收方案》PDF 第 23 页表 3.5-7。	☒ 符合 ☐ 存在问题
结论和建议有前述分析支撑、符合实际、针对性强且可行；内容缺项、空洞、未结合本地或针对性弱，按现行表酌情扣分。 来源：《市县级验收方案》PDF 第 23 页表 3.5-7“土壤资源综合利用建议”90 分项。	☒ 符合 ☐ 存在问题
建议不得与前文适宜性、耕地质量、退化障碍和土特产品结论冲突；若存在政策/规划约束须明确。 来源：《县级成果导引》第九章；《市县级验收方案》表 3.5-7。	☒ 符合 ☐ 存在问题

问题截图及备注

序号	问题截图	备注
1	无	

问题类别九：章节、专题、县市成果和面积口径不一致

审查标准	审查结果
第三至八章的类型、指标、等级、面积和结论与独立专题报告、地图和数据库一致；第九章与前文不冲突。 来源：《省市级成果导引》市级总体要求，PDF 第 17—18 页；《市县级验收方案》各评分表。	☐ 符合 ☒ 存在问题
市级成果以县级成果为基础并保持同一统计口径；审核县级模型、参数、环境变量、结果和精度，开展室内外验证及上下会商。 来源：《省市级成果导引》PDF 第 17—21 页。	☒ 符合 ☐ 存在问题
数字成果原则按规范拼接/汇总；不能用制图综合后的挂图反算面积。 来源：《省市级成果导引》PDF 第 17—21 页。	☒ 符合 ☐ 存在问题

问题截图及备注

序号	问题截图	备注
1	（二）存在问题与成因 1. 存在问题 一是土壤质地不均与结构退化并存，受历史冲积影响，部分区域土壤砂粘比例失衡，加之长期集约化种植中化肥过量施用、有机肥补充不足，导致土壤团粒结构破坏，局部出现板结现象；二是土壤养分失衡风险凸显，高粱等作物连作区域存在土壤肥力下降问题，部分地块氮磷钾比例失调，影响作物产量提升；三是农业面源污染隐患未完全消除，农药包装废弃物随意丢弃等问题虽经整治明显改善，但仍存在残留污染土壤的潜在风险，且部分区域地膜残留可能影响土壤透气性。	成安县主要作物为小麦、玉米、棉花、蔬菜，高粱并非主要作物

问题类别十：报告格式、文件格式和数据库质检不足

审查标准	审查结果
报告标题、目录、图表编号、参考文献、单位和装订符合统一要求；文字报告同时提供可编辑文档和 PDF。 来源：《县级成果导引》PDF 第 75—79、93 页。	☐ 符合 ☒ 存在问题
数据库检查完整性、坐标高程投影、图层命名/类型、接边、精度、拓扑、字段结构和值域，以及图层间空间和属性一致性。 来源：《数据库规范》第 7 章。	☒ 符合 ☐ 存在问题

问题截图及备注

序号	问题截图	备注
1		仅提交 PDF 文件