

河北省土壤类型图成果质控意见模板

县（市、区）	132337 行唐县	提交单位	中地科勘察设计有限公司
--------	------------	------	-------------

第一部分 土壤分类

1、核查土壤三谱土壤类型成果图，省级分类清单无该亚类

检查完成
1. 上图类型与分类清单检查：共发现 13 个问题
2. 图斑 483：省级分类清单无该亚类
3. 图斑 484：省级分类清单无该亚类
4. 图斑 486：省级分类清单无该亚类
5. 图斑 489：省级分类清单无该亚类
6. 图斑 490：省级分类清单无该亚类
7. 图斑 493：省级分类清单无该亚类
剖面类型与分类清单检查

2、核查三普土壤剖面样点，省级分类清单无该土属/土种，请全部核查

剖面类型与分类清单检查
1. 剖面类型与分类清单检查：共发现 18 个问题
2. 剖面 1：省级分类清单无该土属
3. 剖面 2：省级分类清单无该土种
4. 剖面 3：省级分类清单无该土种
5. 剖面 4：省级分类清单无该土种
6. 剖面 5：省级分类清单无该土种
7. 剖面 6：省级分类清单无该土种
上图类型与剖面类型检查

3、核查土壤三普土壤类型成果图，坡度检查中，图斑存疑：草甸土、潮土的坡度大于 6 度，请核查

✓ 地形地貌一致性检查

检查完成

高程检查：共检查500个图斑，未发现问题

坡度检查：共检查500个图斑，发现4个问题

1. 图斑 4：存疑：草甸土、潮土的坡度大于 6 度
2. 图斑 11：存疑：草甸土、潮土的坡度大于 6 度
3. 图斑 12：存疑：草甸土、潮土的坡度大于 6 度
4. 图斑 17：存疑：草甸土、潮土的坡度大于 6 度

坡向检查：共检查500个图斑，未发现问题


4、未采用最新的 5 级分类

(1) 表层质地。行唐县二普命名分为 6 级，即砂土、沙壤土、轻壤质、中壤质、重壤质和黏质。三普土种命名时，土壤质地划分为 5 级，即砂土、砂壤土、壤土、黏壤土、黏土；二普的砂土依然对应砂土，沙壤质对应砂壤土；轻壤质和中壤质对应壤土；重壤质对应黏壤土；黏土对应黏土。

(2) 砾石含量。行唐县二普命名时，仅耕种褐土性土命名时，砾石含量参

第二部分 制图过程

1、layout 包不规范（请将出图文件的所有图层设定好样式后导出成一个 layout 包）



2、未明确给出虚点的选择原则，也未提供虚点对土壤类型代表性的证明示例。

行唐县典型虚点数量为 4776 个，二普、三普以及野外校核点位数量为 149 个，渔网点位数量为 3198 个，由此得出行唐县推测制图点位数量共计 8123 个。

基于土壤样点和成土环境变量数据（包括降水、DEM、坡度、地类图斑、成土母质、坡向、曲率、归一化植被指数等），建立土壤类型与环境条件的定量模型，进行土壤类型空间推测，识别各土种在县域内的空间分布及土种之间的边界。土壤样点主要包括三普土壤剖面样点、二普土壤剖面点、二普土壤图野外校核检查点、补充性土壤类型典型虚拟点，形成初版推测制图与不确定性分布图。

行唐县属于太行山东麓浅山区与华北平原交接地带，县境西北部为太行山浅山区，东南部为华北平原西缘，呈现低山、丘陵、平原三种地貌，境内最高海拔 960 米，最低海拔 75 米，在构建土壤景观模型进行土壤类型空间推测时，这些因素对行唐县土壤类型分布起着关键作用。

3、仅给出环境变量重要性排序表，未对排序结果的合理性进行评述

因素对行唐县土壤类型形成起有人类作用。

初次环境变量得出的推测制图与实际情况相差较大，因此获取 12.5-m 的 DEM 数据及其衍生的环境变量数据，哨兵 2 多光谱数据衍生的归一化植被指数变量数据，卡帕系数由原本的 0.51 提升至 0.668，由此得出行唐县最终推测制图。

将以上点位数据与环境变量数据进行三普土壤的推测制图工作。



4、对推测图的效果进行评述，但未突出最优和最劣情况，仅给出系数变化情况

因素对土壤类型产生不利影响。因此，在土壤类型图编制过程中，应充分考虑上述因素。

初次环境变量得出的推测制图与实际情况相差较大，因此获取 12.5m 的 DEM 数据及其衍生的环境变量数据，将光谱数据衍生的归一化植被指数变量数据，将帕系数由原本的 0.51 提升至 0.668，由此得出行唐县最终推测制图。将以上点位数据与环境变量数据进行三普土壤的推测制图工作。

表 4.15 行唐县入模环境变量贡献度

环境变量	贡献率 (%)
降雨	30.94
DEM	24.85
坡度	11.27
地类图斑	6.23
成土母质	5.99

5、图片两处命名不统一，请完整规范统一命名




图 4.40 行唐县不确定性图

多边形图斑边界线进行间化与平滑,同时消除失真化产生的细碎图斑(与邻近面积大的图斑合并),生成基于土壤推测制图的行政村二种类型分布图。




图 4.39 行唐县三普土壤推测制图。

6、未详述了土壤推测制图结果在土壤类型制图中的具体应用情况

森林预测制图结果作为确定土壤类型边界线的直接依据。

4.6.4 推测结果分析应用。

结合以上土壤类型推测制图成果,修正二普土壤图,最终得出三普图斑共 493 个,其中 124 个图斑应用推测制图结果,占全县面积的 25.15%。

7、表格与文字描述对照结果：部分不符合，存在大面积数据不一致，请核实全部

序号 _u	土类 _u	面积(亩) _u	亚类 _u	面积(亩) _u	土属 _u	面积(亩) _u	土种 _u	面积(亩) _u
1 _u	草甸土 _u	17906 _u	典型草甸土 _u	14264 _u	壤质草甸土 _u	7317 _u	均壤质草甸土 _u	6030 _u
2 _u					砂质草甸土 _u	6947 _u	壤底砂草甸土 _u	1286 _u
3 _u							均砂质草甸土 _u	6947 _u
4 _u			石灰性草甸土 _u	3641 _u	壤质石灰性草甸土 _u	3085 _u	均壤质石灰性草甸土 _u	2643 _u
5 _u					砂质石灰性草甸土 _u	556 _u	壤体砂石灰性草甸土 _u	441 _u
6 _u							均砂壤石灰性草甸土 _u	556 _u
7 _u	潮土 _u	94441 _u	典型潮土 _u	94441 _u	壤质潮土 _u	25165 _u	均壤质潮土 _u	19634 _u
8 _u					壤质石灰性潮土 _u	1568 _u	壤体砂潮土 _u	5531 _u
9 _u							均壤质石灰性潮土 _u	368 _u
10 _u					砂质潮土 _u	59456 _u	壤底砂石灰性潮土 _u	1200 _u
11 _u							均砂壤潮土 _u	17944 _u
12 _u							均砂质潮土 _u	41511 _u
13 _u	褐土 _u	1327956 _u	潮褐土 _u	515615 _u	泥砂质潮褐土 _u	515615 _u	均壤质泥砂质潮褐土 _u	371144 _u
14 _u							均砂壤泥砂质潮褐土 _u	99032 _u
15 _u							均砂质泥砂质潮褐土 _u	409 _u
16 _u							壤底黏泥砂质潮褐土 _u	4114 _u
17 _u							壤底砂泥砂质潮褐土 _u	32415 _u
18 _u							壤夹黏泥砂质潮褐土 _u	381 _u
19 _u							壤体黏泥砂质潮褐土 _u	1488 _u
20 _u							壤体砂泥砂质潮褐土 _u	6629 _u
21 _u							壤质厚层麻砂质褐土 _u	29178 _u
22 _u			典型褐土 _u	177355 _u	麻砂质褐土 _u	177355 _u		

(4) 石灰性褐土：面积为 14860944_u 亩，主要分布在城寨乡、翟营乡、口头镇，除微弱的腐殖质积累过程、微弱的黏化过程外，脱钙过程处于初始阶段_u。

4.7.2.2 潮土_u

潮土是河流沉积物上受地下水周期性升降影响、经长期旱耕形成的半水成土_u。

壤。成土过程为(1)潜育化过程。地下水位较浅，水位周期性升降，氧化还原交替，在土壤结构面、孔隙间形成棕色锈纹锈斑、灰蓝色铁锰斑、锥形铁锰结核。

(2)旱耕熟化过程。受长期旱耕影响，表土形成疏松的耕作层或机具挤压出的紧实亚耕层，表土有机质、养分等在熟化过程中有所提高。潮土面积为 2668336_u 亩，主要分布在独羊岗乡、南桥镇、只里乡_u。

(1)典型潮土：面积为 2269350_u 亩，主要分布在独羊岗乡、南桥镇、只里乡，成土过程同土类_u。

(2)石灰性潮土：面积为 398986_u 亩，主要分布在南桥镇、独羊岗乡、玉亭乡_u。

4.7.2.3 草甸土_u

A.草甸化过程。具有腐殖质累积与氧化还原交替特征。草甸土区的植被生长繁茂，根系密集且能深扎；草甸土地区地下水埋藏较浅，土壤受地下水浸润，升降频繁，氧化还原交替形成锈色斑纹。个别土壤还附加有白浆化过程、潜育化过程、盐化过程和碱化过程等。面积为 413519_u 亩，主要分布在城寨乡、九口子乡、口头镇_u。


典型草甸土：面积为 413519_u 亩，主要分布在九口子乡、口头镇、上阎庄乡，成土过程同土类_u。

4.7.2.4 人工土_u


受农业、工矿、建筑、居住、交通等人为活动影响，土壤物质组成和形态特征发生显著改变的土壤。主要有扰动、填充、堆垫、压实等人为成土过程。面积为 347700_u 亩，主要分布在北河乡、玉亭乡、上阎庄乡_u。

扰动土：面积为 347700_u 亩，主要分布在北河乡、玉亭乡、上阎庄乡，主要为机械挖掘、扰动、压实等物理成土过程_u。

8、数据矛盾。技术报告：“124 个图斑应用推测制图结果，占全县面积的 25.15%”。工作报告：“共修正 124 个图斑，修正面积占行唐县三普土壤图总面积的 52.33%”，请核实是否正确



9、问题图斑数量不一致。技术报告问题图斑 12 个，工作报告问题图斑 10 个。请核实是否正确



10、坐标系不符合 CGCS2000 高斯克吕格 3 度或 6 度分带要求


不符合要求的文件列表

序号	文件类型	文件路径	不符合原因
1	栅格	1.第三次全国土壤普查成果库预测结果不确定性分布图.tif	非 CGCS2000 坐标系（unknown）
2	栅格	2.基础数据2.成土壤数据\环境因素过程数据-Geotiff\时序影像\2016\T50SKH_20160821T030542_B01.jp2	坐标系为 WGS 84 / UTM zone 50N (EPSG:32650)，不符合 CGCS2000 高斯克吕格 3 度或 6 度分带要求
3	栅格	2.基础数据2.成土壤数据\环境因素过程数据-Geotiff\时序影像\2016\T50SKH_20160821T030542_B02.jp2	坐标系为 WGS 84 / UTM zone 50N (EPSG:32650)，不符合 CGCS2000 高斯克吕格 3 度或 6 度分带要求
4	栅格	2.基础数据2.成土壤数据\环境因素过程数据-Geotiff\时序影像\2016\T50SKH_20160821T030542_B03.jp2	坐标系为 WGS 84 / UTM zone 50N (EPSG:32650)，不符合 CGCS2000 高斯克吕格 3 度或 6 度分带要求
5	栅格	2.基础数据2.成土壤数据\环境因素过程数据-Geotiff\时序影像\2016\T50SKH_20160821T030542_B04.jp2	坐标系为 WGS 84 / UTM zone 50N (EPSG:32650)，不符合 CGCS2000 高斯克吕格 3 度或 6 度分带要求
6	栅格	2.基础数据2.成土壤数据\环境因素过程数据-Geotiff\时序影像\2016\T50SKH_20160821T030542_B05.jp2	坐标系为 WGS 84 / UTM zone 50N (EPSG:32650)，不符合 CGCS2000 高斯克吕格 3 度或 6 度分带要求
7	栅格	2.基础数据2.成土壤数据\环境因素过程数据-Geotiff\时序影像\2016\T50SKH_20160821T030542_B06.jp2	坐标系为 WGS 84 / UTM zone 50N (EPSG:32650)，不符合 CGCS2000 高斯克吕格 3 度或 6 度分带要求
8	栅格	2.基础数据2.成土壤数据\环境因素过程数据-Geotiff\时序影像\2016\T50SKH_20160821T030542_B07.jp2	坐标系为 WGS 84 / UTM zone 50N (EPSG:32650)，不符合 CGCS2000 高斯克吕格 3 度或 6 度分带要求

11、三普土壤表层样点缺少相关土类亚类土属土种

FID *	Shape *	YDBH	YPBH	YYPBH	YPPC	YPLX	TDLYX	SYSNBH	SYSDM	S * SMC	
1	点	1301250201000085	231214098716b36	130125020100008510	231214098716b	1	0201	8716b36	13JZ0003	河北华清环境科技集团股	2023/
2	点	1301250201000086	231214098716b37	130125020100008610	231214098716b	1	0103	5244b38	13JZ0003	河北华清环境科技集团股	2023/
3	点	1301250201000087	231214098716b38	130125020100008710	231214098716b	1	0201	5244b38	13JZ0003	河北华清环境科技集团股	2023/
4	点	1301250103000032	231212095244b35	130125010300003210	231212095244b	1	0103	5244b35	13JZ0003	河北华清环境科技集团股	2023/
5	点	1301250103000047	231212095244b41	130125010300004710	231212095244b	1	0103	5244b41	13JZ0003	河北华清环境科技集团股	2023/
6	点	1301250103000022	231212095244b22	130125010300002210	231212095244b	1	0103	5244b22	13JZ0003	河北华清环境科技集团股	2023/
7	点	1301250103000021	231212095244b37	130125010300002110	231212095244b	1	0103	5244b37	13JZ0003	河北华清环境科技集团股	2023/
8	点	1301250102000539	231212095244b01	130125010200053910	231212095244b	1	0102	5244b01	13JZ0003	河北华清环境科技集团股	2023/
9	点	1301250102000452	231212095244b07	130125010200045210	231212095244b	1	0102	5244b07	13JZ0003	河北华清环境科技集团股	2023/
10	点	1301250201000690	231212095244b36	130125020100069011	231212095244b	1	0201	5244b36	13JZ0003	河北华清环境科技集团股	2023/
11	点	1301250102000067	231212095244b05	130125010200006710	231212095244b	1	0102	5244b05	13JZ0003	河北华清环境科技集团股	2023/
12	点	1301250201000690	231212095244b17	130125020100069011	231212095244b	1	0201	5244b17	13JZ0003	河北华清环境科技集团股	2023/
13	点	1301250102000034	231212095244b03	130125010200003410	231212095244b	1	0102	5244b03	13JZ0003	河北华清环境科技集团股	2023/
14	点	1301250102000853	231212095244b09	130125010200085310	231212095244b	1	0102	5244b09	13JZ0003	河北华清环境科技集团股	2023/
15	点	1301250102000439	231214098808b08	130125010200043910	231214098808b	1	0102	8808b08	13JZ0003	河北华清环境科技集团股	2023/
16	点	1301250103100005	240815238765b12	130125010310000530	240815238765b	3	0103	240815238765b12	13JZ0017	河北木本水源环保科技有	2024/
17	点	1301250102000647	231212095244b30	130125010200064710	231212095244b	1	0102	5244b30	13JZ0003	河北华清环境科技集团股	2023/
18	点	1301250102000652	231218105848b42	130125010200065211	231218105848b	1	0102	5848b42	13JZ0003	河北华清环境科技集团股	2023/
19	点	1301250102000649	231218106074b28	130125010200064930	231218106074b	3	0102	6074b28	13JZ0003	河北华清环境科技集团股	2023/
20	点	1301250102000688	231218105998b05	130125010200068830	231218105998b	3	0102	5998b05	13JZ0003	河北华清环境科技集团股	2023/
21	点	1301250102000707	231218105998b09	130125010200070730	231218105998b	3	0102	5998b09	13JZ0003	河北华清环境科技集团股	2023/
22	点	1301250102000226	231214098716b30	130125010200022610	231214098716b	1	0102	8716b30	13JZ0003	河北华清环境科技集团股	2023/
23	点	13012502010000214	231212094901b39	1301250201000021410	231212094901b	1	0201	4901b39	13JZ0003	河北华清环境科技集团股	2023/
24	点	1301250102000458	231218105848b17	130125010200045811	231218105848b	1	0102	4901b17	13JZ0003	河北华清环境科技集团股	2023/

12、地理配准偏差较大



13、

第三部分 制图结果

1、核查土壤三谱土壤类型成果图。图斑 ID427：空间自相交，关键点的空间坐标是[38535252.1204 4261064.0446]。图斑 ID454：空间自相交，关键点的空间坐标是[38544703.7292 4277904.8517]

检查完成


几何有效性检查：共检查500个图斑，发现2个问题

- 1. 图斑ID427：空间自相交，关键点的空间坐标是[38535252.1204 4261064.0446]
- 2. 图斑ID454：空间自相交，关键点的空间坐标是[38544703.7292 4277904.8517]

碎屑多边形检查：共检查500个图斑，未发现碎屑多边形

第四部分 图面表达

1、比例尺未以图形比例尺表示



2、图面表达无地形信息（等高线），请补充



3、图面表达，建成区未进行扣除，请在成果图矢量数据中进行扣除。




4、乡级行政界线不规范，请核查。请参考如下图



未定国界	3.0 (2.0) 4.8 (3.2) 0.6 (0.4) 1.2 (1.0) 0.4	R0 G0 B0 C0M0Y0K100
省、自治区、 直辖市界	4.0 (2.4) 5.0 (3.0) 0.5 (0.3) 0.3	R0 G0 B0 C0M0Y0K100
特别行政区界	5.0 (3.0) 1.0 (0.6) 2.5 (1.5) 0.5 (0.3) 0.3	R0 G0 B0 C0M0Y0K100
地级界	1.2 (0.75) 4.0 (2.5) 0.4 (0.25) 0.25	R0 G0 B0 C0M0Y0K100
县级界	1.2 (0.75) 4.0 (2.5) 0.4 (0.25) 0.25	R0 G0 B0 C0M0Y0K100
乡、镇、 街道界	2.7 (1.8) 3.0 (2.0) 0.3 (0.2) 0.2	R77G73B72 C0M0Y0K80

5、部分接触别的市，正确表示市界部分的境界线



6、缺少面积汇总

壤质中层黄土质石灰性褐土	6266	5643	90.06%	98	1.57%	133	2.12%	81	1.29%	141	2.24%	170	2.71%
壤质中层灰泥质石灰性褐土	65121	17347	26.64%	28621	43.95%	1329	2.04%	2659	4.08%	8189	12.57%	6976	10.71%
壤质中层麻砂质褐土	42208	11471	27.18%	15978	37.86%	2016	4.78%	4831	11.45%	3609	8.55%	4303	10.19%
砂壤中层麻砂质褐土	25016	198	0.79%			1764	7.05%	7532	30.11%	14879	59.48%	642	2.57%
砂壤厚层麻砂质褐土	78347	23862	30.46%	16073	20.52%	4102	5.24%	17061	21.78%	10104	12.90%	7144	9.12%
砂壤中层灰泥质石灰性褐土	161	37	22.79%	123	76.02%							2	1.19%
砂壤中层麻砂质褐土	691	253	36.60%	48	6.94%	309	44.67%	1	0.20%	26	3.74%	54	7.85%
砂质厚层麻砂质褐土	1916	374	19.53%	162	8.45%	219	11.41%	565	29.50%	86	4.50%	510	26.61%
运移扰动土	10767	8591	79.79%	850	7.89%	124	1.15%	279	2.59%	445	4.13%	478	4.44%
重砾壤质薄层灰泥质褐土性土	27335	2643	9.67%	5179	18.95%	467	1.71%	2538	9.28%	14231	52.06%	2277	8.33%
重砾砂质薄层麻砂质褐土性土	99999	19945	9.55%	19544	6.95%	19919	94.16%	51298	95.49%	59959	94.54%	19994	9.54%
重砾砂质薄层麻砂质褐土性土	49108	5045	10.27%	3149	6.41%	24165	49.21%	4207	8.57%	9102	18.53%	3440	7.01%

编制单位：石家庄市农业农村局

第五部分 报告质量

1、单位为万亩单位未保留两位小数，请通篇核查

图 3.1.0

1.2.5 土地利用现状

⋮

根据行唐县 2024 年国民经济和社会发展统计公报，全县粮食播种面积 80.79 万亩，蔬菜播种面积 8.4 万亩，油料播种面积 6.2 万亩，这表明行唐县有相当规模的耕地用于农业生产。此外，全年人工造林面积 1500 亩，说明存在一定面积的林地用于林业发展。

.....分页符.....

2、存在重复表格，表 2.1《行唐县土壤发生分类》与表 3.1《行唐县三普信息表》内容完全一致，属于重复制表。

图 3.1.0

图 3.1.0

图 3.1.0

图 3.1.0

图 3.1 行唐县三普土壤图

表 3.1 行唐县三普信息表

序号	土类	亚类	土属	土种
1	草甸土	典型草甸土	壤质草甸土	均壤质草甸土
2				壤底砂草甸土
3			砂质草甸土	均砂质草甸土
4		石灰性草甸土	壤质石灰性草甸土	均壤质石灰性草甸土
5				壤体砂石灰性草甸土
6			砂质石灰性草甸土	均砂壤石灰性草甸土

12

序号	土类	亚类	土属	土种
7	潮土	典型潮土	壤质潮土	均壤质潮土
8				壤体砂潮土
9			壤质石灰性潮土	均壤质石灰性潮土
10				壤底砂石灰性潮土
11			砂质潮土	均砂壤潮土
12				均砂质潮土
13	潮褐土	泥砂质潮褐土	砂质石灰性潮土	均砂壤石灰性潮土
14			泥砂质潮褐土	均壤质泥砂质潮褐土
15				均砂壤泥砂质潮褐土
16				均砂质泥砂质潮褐土
17				壤底黏泥砂质潮褐土
18				壤底砂泥砂质潮褐土
19				壤夹黏泥砂质潮褐土

表。

表 2.1 行唐县土壤发生分类

序号	土类	亚类	土属	土种
1	草甸土	典型草甸土	壤质草甸土	均壤质草甸土
2				壤底砂草甸土
3			砂质草甸土	均砂质草甸土
4		石灰性草甸土	壤质石灰性草甸土	均壤质石灰性草甸土
5				壤体砂石灰性草甸土
6			砂质石灰性草甸土	均砂壤石灰性草甸土
7	潮土	典型潮土	壤质潮土	均壤质潮土
8				壤体砂潮土

4

序号	土类	亚类	土属	土种
9			壤质石灰性潮土	均壤质石灰性潮土
10				壤底砂石灰性潮土
11			砂质潮土	均砂壤潮土
12				均砂质潮土
13			砂质石灰性潮土	均砂壤石灰性潮土
14				均壤质泥砂质潮褐土
15				均砂壤泥砂质潮褐土
16				均砂质泥砂质潮褐土

- 3、工作报告没有图、表目录
- 4、工作报告请核对章节标题以及各个级别标题。例如，章节标题为小二号宋体加粗，居中。一级标题为三号黑体，标题 段前 段后 是否各 0.5 倍行距。正文是否为单倍行距。通篇核查

一、前言

（一）土壤类型与制图工作背景

自第二次全国土壤普查（1979—1994 年）以来，时隔 40 年，土壤数据已不能准确反映当前耕地质量实况。随着经济社会快速发展，耕地占用刚性增加，土壤酸化、重金属污染、生物多样性下降等问题日益突出，直接影响农产品质量和农业可持续发展。同时，在第三次全国国土调查查清耕地数量的基础上，进一步掌握土壤质量状况，成为优化农业生产布局、推动农业高质量发展的关键支撑。

第三次全国土壤普查是在新的历史背景下，为了全面了解和掌握我国土壤资源现状，提升土壤资源保护和利用水平，保障国家粮食安全，推进生态文明建设

- 5、土地面积计量单位不统一：全文同时出现万亩等多种土地面积单位，未实现全文计量单位统一。请统一为亩或者万亩

山区，东南部为华北平原西缘，呈现低山、丘陵、平原三种地貌，境内最高海拔 960m，最低海拔 75m。低山区：团山-黄龙港-秦台-北城寨一线西北部为低山区，面积 37.7km²，包括上阎庄乡、九口子乡全部及口头镇部分村庄。区内有山峰 39 座，海拔在 960-225m 之间，山体近东西走向，呈向东倾斜逐步平缓收敛的阶梯状态。丘陵区：北龙岗-赵阳关-上碑-南翟营一线西北部为丘陵区，面积 224km²，包括北河乡全部及玉亭、上方、上碑、翟营、城寨各乡大部 and 南桥镇一部分村庄。区内有山峰 6 座，海拔 150-225m 之间。地势平缓，土层 20-50cm，沟谷埋深 2-3m。土层薄，质地粘重，蓄水能力较差。平原区：北龙岗-赵阳关-上碑-南翟营一线东南部属平原区，面积 422km²，为新生界第四系太行山前洪积冲积扇黄土平原。海拔 75-150m 之间，质地适中。

.....分页符.....

1.2.5 土地利用现状

根据行唐县 2024 年国民经济和社会发展统计公报，全县粮食播种面积 80.79 万亩，蔬菜播种面积 8.4 万亩，油料播种面积 6.2 万亩，这表明行唐县有相当规模的耕地用于农业生产。此外，全年人工造林面积 1500 亩，说明存在一定面积的林地用于林业发展。

.....分页符.....

6、目录格式不规范，例如应该为土壤类型特征及改良利用建议再写下面的潮土土类等等

4.1.3 与土壤类型图比较分析 86

第五章 结论与建议 92

5.1 结论 92

5.2 潮土土类 92

5.2.1 潮土土类 92

5.3.1 潮褐土的特征和利用性能 92

5.3.2 典型褐土的特征和利用性能 93

5.3.3 褐土性土的特征和利用性能 93

5.3.4 石灰性褐土的特征和利用性能 93

5.4 草甸土 93

5.5 人工土 94

.....分页符.....

第六部分 其他


1、缺少自查表扫描件(pdf)

1.第三次全国土壤普查成果库	2026/5/29 15:43	文件3
2.基础数据	2026/5/29 15:45	文件3
3.过程数据	2026/5/29 15:46	文件3
4.成果数据	2026/5/29 15:46	文件3
5.地图文档	2026/5/29 15:46	文件3
6.汇报PPT	2026/5/29 15:46	文件3


2、HISTORY 数据集内容中缺少二普土壤样点数据



3、PROCESS 数据中，推测的土壤三谱图和预测不确定性分布图位置应位于 process 数据集，位置存放错误。缺少三普调查样点。PROCESS 数据中土壤二普土壤图室内校核前后图斑不规范，分别给出土壤二普土壤图室内校核前、后图斑



4、母岩母质栅格数据，土地利用数据，新增耕地格式不符合要求。例如：提供的是母质岩性.gdb，属于矢量数据，要求的是栅格格式的母岩母质数据。



5、缺少土壤类型改变区土壤类型转换规则

行唐县二普-三普命名对应记录表.xls

行唐县土种类型支撑剖面梳理.xls

6、请仔细检查各个过程、成果数据的属性表是否包含所需字段、字段命名是否规范、字段类型是否符合要求、字段内容是否被截断

第七部分 质控意见

质控意见	整改后通过	质控日期	2026 年 6 月 28 日
------	-------	------	-----------------