



沧县耕地质量等级评价质控反馈

数据、图件和文字成果


一、图件成果

1.所有图件地图投影的坐标系不符合规范，缺失高程系统。



3. 各指标因子的图件缺失因子统计表格，补充统计表格。

沧县耕地质地构型分布图





5. 耕地质量等级图.jpg 这个图统计表格错误，只用统计存成的耕地等级面积及占比，并且统计单位是万亩，而不是公顷。

2. 《规范》主要内容

耕地质量等级

使用评价单元图来呈现耕地质量等级结果，并插入汇总表格。





二、数据成果

未提交数据库

三、文字成果

- 1.缺少各指标插图以及其空间分布特征的简要分析（请每个因子一个单独图+图名+对应的空间分布特征文字描述）

⋮ (四) 评价指标体系建立

根据《规范》，耕地质量评价分为立地条件、理化性状、养分状况和农田管理四个准则层构成，评价指标由基础性指标和区域补充性指标组成，其中，基础性指标包括：地耕层质地、质地构型、有机质、地形部位、排水能力、有效磷、速效钾、有效土层厚、土壤容重等指标。区域补充性指标包括:盐渍化程度、耕层厚度 2 个指标。耕地质量等级评价指标体系见下表。

表 2 耕地质量等级评价指标体系

目标层		耕地质量			
准则层		立地条件	理化性状	养分状况	农田管理
指标层	基础指标	地形部位	耕层质地	有机质含量	水资源条件
		有效土层厚度	土壤容重	有效磷含量	排水能力
		质地构型		速效钾含量	

44

目标层		耕地质量			
	区域指标		盐渍化程度		
		耕层厚度			

2.评价结果验证缺少具体量化信息支撑，以及对比表格。文本验证内容并未显示具体的产量验

证法、专家验证法、实地验证法。”

云 的分布规律，为分析耕地质量空间分异格局提供了直观依据。

⋮ (五) 评价结果验证

为保证评价结果的准确性与可靠性，沧县土壤普查办依据《工作方案》中“（五）开展评价结果验证”的要求，采用了多种方法对初步评价结果进行了交叉验证。

产量验证：收集了沧县近三年主要农作物的典型地块产量调查数据。将各等级耕地质量对应的农作物调查产量进行对比统计，通过产量差异判断评价结果是否合理。初步分析表明，高等地对应的平均产量显著高于中、低等地，趋势吻合良好。

对比验证：通过对比不同质量等级耕地的指标值差异，分析评价结果是否符合实际。例如，对比一等地与十等地的有机质平均含量、有效土层厚度等，发现存在显著梯度差异，符合理论认知。

耕地粮食生产潜力评估验证：将本次评估得到的各等级耕地粮食生产潜力，与沧县统计局发布的地方农业统计年鉴中的近五年平均粮食单产数据进行比对验证，两者在趋势和量级上基本一致，证明了潜力评估模型的可靠性。

3.耕地年度粮食生产潜力计算结果需要写出具体的校准系数，以及公布数据中的粮食总产。



$$Q_i = \begin{cases} \frac{Q_{\min}}{b} & u \leq u_1 \\ \frac{Q_{\min}}{[1 + a(u - c)^2]} & u_1 < u < u_2 \\ \frac{Q_{\max}}{b} & u \geq u_2 \end{cases}$$

式中：
 Q_i ：某一评价单元全年耕地粮食生产潜力水平（单位：公斤/亩）；
 $Q_{\min}$ ：最低等级地综合指数平均值对应的产能水平；
 $Q_{\max}$ ：最高等级地综合指数平均值对应的产能水平；
 u ：该评价单元的综合指数得分；
 u_1 ：最低等级地综合指数平均值；
 u_2 ：最高等级地综合指数平均值；
 a, b ：系数；
 c ：标准值。

2.某一评价单元耕地单季粮食生产潜力水平

$$D_i = \frac{Q_i}{m}$$

式中：
 D_i ：某一评价单元单季耕地粮食生产潜力水平（单位：公斤/亩）；
 Q_i ：该评价单元年度耕地粮食生产潜力水平；
 m ：代表当地熟制的常数（例如：一年一熟， $m = 1$ ；一年两熟， $m = 2$ ）。

3.某一区域耕地年度粮食生产潜力

$$Y = \sum_{i=1}^n (Q_i \times s_i) \cdot k$$