

土壤属性图质控问题反馈—石家庄市藁城区

一、成果组织形式反馈

1、成果组织形式、目录结构应按规范要求进行组织。

文件夹	——基础数据
文件夹	——环境变量
文件	DEM.tif
文件	……//其他环境变量
文件夹	——训练集及验证集
文件	xx因子训练集.shp
文件	xx因子测试集.shp
文件	——元数据.xlsx
文件	……

130109藁城区 > 02土壤属性图 > 基础数据 > 在 基础数据 中搜索			
排序 查看 ...			
名称	修改日期	类型	大小
环境变量	2026/8/17 20:10	文件夹	
入模数据	2026/8/17 20:10	文件夹	
训练集及验证集	2026/9/4 15:37	文件夹	
土壤属性制图元数据	2026/7/29 14:23	XLSX 工作表	15 KB

文件夹	——成果数据
文件夹	——土壤属性专题数据集
文件夹	——含量图
文件夹	——分级图
文件夹	——数字化图件成果
文件夹	——文字成果

土壤属性图 > 成果数据 > 土壤属性专题数据集 >			在 土壤属
🗑️ 🔼 排序 ☰ 查看 ⋮			
名称	修改日期	类型	
📁 分级图	2026/9/4 15:37	文件夹	
📁 耕地地块图	2026/9/4 15:41	文件夹	
📁 含量图	2026/9/4 15:39	文件夹	
📁 县域图	2026/9/4 15:38	文件夹	


2、成果组织形式、目录结构应按规范要求进行命名。

130109藁城区 > 02土壤属性图 >			在 02土壤属
🗑️ 🔼 排序 ☰ 查看 ⋮			
名称	修改日期	类型	
📁 成果数据	2026/9/4 15:42	文件夹	
📁 第三次全国土壤普查成果库.gdb	2026/8/17 20:13	文件夹	
📁 基础数据	2026/9/4 15:37	文件夹	


类型	目录结构和名称
文件夹	——行政区划代码6位+县级行政区名称//如“110108北京市海淀区”

二、数据与数据库成果反馈

1、数据库中道路 DL 未按行政区进行切割。



2、对于土壤属性值要明确其异常值范围是否合理，样点值在总体均值五倍标准差之内，且大于或小于临近点均值三倍标准差，请核对所有样点值是否合理。




2、制图过程（历史样点）——提交数据中无历史样点数据，要求土壤二普、测土配方施肥（采集时间应为 2008-2010 年）、耕地地力监测样点数据，三者至少有一个；


要求提交的历史样点数据应转化为矢量（shp）格式并生成相应的栅格数据（Geotiff）；

主要包含土壤 pH、有机质、全氮、有效磷、速效钾的历史样点和栅格数据。

3、环境变量按行政区划切分且保证覆盖行政区划全域。



4、环境变量数据的四至并未一一对齐，如浅灰色为平均年积温，深灰色为 DEM 数据。



5、基础数据（元数据）——元数据目录与专题成果编制要求不一致。


	A	B	C	D	E	
1	县代码	县名	土壤属性名称	入模样本数量	环境变量名称	入模环
2	130109	藁城区	速效钾	568	8	辐射、积温、dem、降水、土地
3	130109	藁城区	有效磷	567	8	积温、辐射、土类、dem、降
4	130109	藁城区	阳离子交换量	568	8	土地利用、辐射、降水量、NDVI、土
5	130109	藁城区	耕层厚度	504	8	
6	130109	藁城区	有机质	569	8	土地利用、辐射、积温、nd
7	130109	藁城区	pH	569	8	积温、辐射、dem、土类、相对坡
8	130109	藁城区	全氮	569	8	土地利用、辐射、ndvi、积温
9	130109	藁城区	全磷	569	8	土地利用、积温、辐射、降水、
10	130109	藁城区	全钾	569	8	辐射、积温、dem、土地利用、地形湿
11	130109	藁城区	土壤容重	569	8	地形湿度指数、坡度、LS因子、总集水
12	130109	藁城区	土壤质地	273	8	辐射、积温、dem、土地利用、
13	130109	藁城区	有效硫	553	8	坡度、地形湿度指数、总集水区面积、L
14	130109	藁城区	有效铁	553	8	积温、辐射、dem、地形湿度指数、
15	130109	藁城区	有效锰	550	8	坡度、地形湿度指数、总集水区面积、L
16	130109	藁城区	有效铜	552	8	土地利用、辐射、相对坡位、de
17	130109	藁城区	有效锌	553	8	地形湿度指数、坡度、相对坡位、LS因

(3) **元数据**。记录栅格数据成果编制过程的说明信息，字段包括国土三调县名及县代码、土壤属性、制图模型、决定系数、均方根误差、验证方法及相关参数、元素形态、计量单位、采样时间、入模样本数量、入模环境变量数量、入模环境变量名称、遥感数据源、制图时间、坐标系、投影方式、栅格分辨率、制图单位。采用 xls 文件格式。

三、图件成果反馈

1、面积统计结果与三调面积统计结果不一致，请核查数据。

各地类土壤PH分级面积统计表 单位： 万亩						
土地利用类型	PH					总计
	1级	2级	3级	4级	5级	
耕地	0.01	0.97	10.92	47.39	0.03	59.32
园地	0	0.01	0.17	7.40	0.38	7.95
林地	0	0.11	1.71	11.43	0.02	13.27
草地	0	0	0.14	2.35	0.03	2.52
其他土地	0	0.01	0.32	2.12	0.01	2.45
总计	0.01	1.10	13.25	70.68	0.46	85.51



2、数字化图件成果的分级图中缺少注记。





图 B.3 土壤全磷含量分布图样图示例


3、图件存在部分不规范，如标注的坐标系按规范修改为中文，图件存在被遮盖现象。





114°18'0"东		114°24'0"东			
38°20'0"北		各地类土壤速效钾分级面积统计表 单位: 万亩			
土地利用类型	速效钾				总计
	1级	2级	3级	4级	
耕地	0.74	7.70	39.62	11.26	59.32
园地	1.12	3.46	2.73	0.64	7.95
林地	0.01	0.40	9.74	3.12	13.27
草地	0	0.03	1.35	1.14	2.52
其他土地	0.02	0.21	1.67	0.55	2.45
总计	1.89	11.80	55.10	16.72	85.51


1、图件中缺少面积统计表，或部分图件的面积统计表不规范，规范要求两个统计表: ①各乡镇耕地土壤 xx 分级面积统计表; ②各地类土壤 xx 分级面积统计表。




各乡镇耕地土壤有机质分级面积统计表 单位：万亩						
乡镇	有机质分级 (g/kg)					总计
	>25	20-25	15-20	10-15	≤10	
安峪镇	0.04	0.11	2.89	1.05	0.00	4.09
陈村镇	0.01	0.02	1.20	0.12	0.00	1.34
大交镇	0.09	0.82	1.56	0.32	0.00	2.78
古驿镇	0.00	0.03	4.27	6.29	0.00	10.59
郝庄乡	0.00	0.03	0.98	4.68	0.00	5.68
横水镇	0.02	0.33	2.80	3.37	0.00	6.52
冷口乡	0.02	0.20	1.16	0.68	0.00	2.06
磨里镇	0.13	0.04	1.03	0.29	0.00	1.49
南樊镇	0.00	0.01	1.15	1.23	0.00	2.39
卫庄镇	0.07	0.01	1.57	0.43	0.00	2.09
总计	0.38	1.59	18.61	18.45	0.01	39.03


各地类土壤有机质分级面积统计表 单位：万亩						
土地利用类型	有机质分级 (g/kg)					总计
	>25	20-25	15-20	10-15	≤10	
耕地	0.38	1.59	18.61	18.45	0.01	39.03
园地	0.05	0.19	6.20	3.33	0.00	9.77
林地	52.25	8.18	9.90	5.70	0.01	76.04
草地	0.92	1.42	3.38	3.42	0.01	9.15
其他土地	0.02	0.02	0.16	0.10	0.00	0.31
总计	53.62	11.40	38.25	31.00	0.02	134.30

4、图件的县级行政区边界未显示晕线，如土壤全钾含量分布图中无晕线，标准晕线画法如下图。





5、图面表达（图件缺失）——土壤属性图件成果要求包括栅格图（Geotiff 格式）和专题图（jpg 格式）两种类型，但现提交的只有 jpg 格式。



四、文字成果反馈

1、报告整体撰写不规范，如缺少图表目录。

目录	
一、土壤属性分布与历史变化	3
(一) 土壤物理性质	3
(二) 土壤化学性质	21
(三) 土壤生物和生态属性	22

2、报告中所有环境变量数据均需提供具体年份，来源，分辨率/精度。

1:500 地形图为基础。对于土地利用类型、土壤类型等矢量数据，根据建库要求
进行数值化转换；对于连续型变量，统一栅格分辨率和数据格式，形成数字土壤
制图环境变量数据库。各环境变量的数据来源、评价参数及处理方法见表4.88。

表4.114环境变量处理方法

环境 变量	数据来源	评价参数	处理方法
气候 变量	气象部门提供的近25年 (2001~2025)气象数据， 包括年降水、大于0℃或 10℃积温以及年平均太 阳辐射射量	年降水量 (mm)、 积温 (℃) 等	根据制图比例尺选用合适分辨率 数据，利用气象站点数据生成相应 像素分辨率的气象因子栅格数据。 对不同来源和分辨率的气象数据 进行标准化处理，消除量纲影响， 如采用归一化处理，将数据映射到 [0, 1]区间，标准值=(原始值-最小 值)/(最大值-最小值)
母	地质图或地貌图，也可 以从比例尺较大的地形图		对于以地质图或地貌图表示的母 质数据，可将其转换为栅格数据，