

# FONCTIONS USUELLES

## 1 Fonctions logarithme, exponentielle et puissances

### 1.1 Fonction logarithme et exponentielle

#### Définition 1.1 Logarithme

La fonction  $\ln$  est l'unique primitive de  $x \mapsto \frac{1}{x}$  sur  $\mathbb{R}_+^*$  s'annulant en 0.

#### Proposition 1.1 Propriétés algébriques du logarithme

Le logarithme transforme les produits en sommes :

$$\forall (x, y) \in (\mathbb{R}_+^*)^2, \ln xy = \ln x + \ln y$$

et donc les quotients en différences :

$$\forall (x, y) \in (\mathbb{R}_+^*)^2, \ln \frac{x}{y} = \ln x - \ln y$$

et les puissances en multiples :

$$\forall (x, n) \in \mathbb{R}_+^* \times \mathbb{Z}, \ln x^n = n \ln x$$



**ATTENTION !** Le produit  $xy$  peut être strictement positif sans que  $x$  et  $y$  le soient (ils peuvent être aussi tous deux strictement négatifs). Il ne faut donc surtout pas écrire  $\ln xy = \ln x + \ln y$  si on n'est pas sûr que  $x$  et  $y$  sont strictement positifs. Si  $xy$  est strictement positif, c'est que  $xy = |xy|$  et on peut écrire sans prendre de risque

$$\ln xy = \ln |x| + \ln |y|$$

#### Proposition 1.2

La fonction  $\ln$  est dérivable sur  $\mathbb{R}_+^*$  et pour tout  $x \in \mathbb{R}_+^*$ ,  $\ln'(x) = \frac{1}{x}$ .

#### Définition 1.2 Exponentielle

$\ln$  est une bijection strictement croissante de  $\mathbb{R}_+^*$  sur  $\mathbb{R}$ . On note  $\exp$  sa bijection réciproque.

**REMARQUE.** Le fait que  $\ln$  et  $\exp$  soient des bijections réciproques l'une de l'autre signifie que  $\ln(\exp(x)) = x$  pour tout  $x \in \mathbb{R}$  et  $\exp(\ln(x)) = x$  pour tout  $x \in \mathbb{R}_+^*$ . ■

**Proposition 1.3 Propriétés algébriques de l'exponentielle**

L'exponentielle transforme les sommes en produits :

$$\forall (x, y) \in \mathbb{R}^2, \exp(x + y) = \exp(x) \exp(y)$$

et donc les différences en quotients :

$$\forall (x, y) \in \mathbb{R}^2, \exp(x - y) = \frac{\exp(x)}{\exp(y)}$$

et les multiples en puissances :

$$\forall (x, n) \in \mathbb{R} \times \mathbb{Z}, \exp(nx) = \exp(x)^n$$


**Proposition 1.4**

La fonction  $\exp$  est dérivable sur  $\mathbb{R}$  et pour tout  $x \in \mathbb{R}$ ,  $\exp'(x) = \exp x$ .

**Variations de  $\ln$  et  $\exp$** 

$x$	$-\infty$	$+\infty$
$\exp'(x)$	+	
$\exp(x)$	0	$+\infty$

$x$	0	$+\infty$
$\ln'(x)$	+	
$\ln(x)$	$-\infty$	$+\infty$

**Graphes des fonctions  $\ln$  et  $\exp$** **1.2 Fonctions puissances****Définition 1.3 Puissances entières**

- Si  $a \in \mathbb{R}$  et  $n \in \mathbb{N}^*$ , on pose  $a^n = \underbrace{a \times a \times \cdots \times a}_{n \text{ fois}}$ .
- Si  $a \in \mathbb{R}^*$  et  $n \in \mathbb{Z}_-$ , on pose  $a^n = \frac{1}{a^{-n}}$ .
- Si  $a \in \mathbb{R}^*$ , on convient que  $a^0 = 1$ .

**REMARQUE.** Ainsi, si  $a \in \mathbb{R}^*$ ,  $a^n$  est défini pour tout  $n \in \mathbb{Z}$ . ■

**Définition 1.4 Puissances quelconques**

Si  $a \in \mathbb{R}_+^*$  et  $b \in \mathbb{R}$ , on pose  $a^b = \exp(b \ln a)$ .



**ATTENTION!** Si  $a$  est négatif, on ne peut pas définir de puissances *non entières* de  $a$ .

**REMARQUE.** Il est important de remarquer que les deux définitions des puissances coïncident.

Autrement dit, si  $a \in \mathbb{R}_+^*$  et  $n \in \mathbb{Z}$ ,  $a^n = \exp(n \ln a)$ . ■

On peut alors étendre les propriétés des logarithmes et des exponentielles à des puissances non entières.

**Proposition 1.5**

- $\forall (x, \alpha) \in \mathbb{R}_+^* \times \mathbb{R}, \ln(x^\alpha) = \alpha \ln(x)$
- $\forall (x, \alpha) \in \mathbb{R}^2, \exp(x)^\alpha = \exp(\alpha x)$ .

**Le nombre  $e$** 

On note  $e = \exp(1)$  ou, de manière équivalente, on note  $e$  l'unique antécédent de 1 par  $\ln$ . Pour tout  $x \in \mathbb{R}$ ,  $e^x = \exp(x \ln e) = \exp(x)$ . C'est pourquoi dorénavant, on notera  $e^x$  et non  $\exp(x)$  l'exponentielle d'un réel  $x$ .

**Proposition 1.6 Propriétés algébriques**

Lorsque les expressions suivantes *ont un sens*

$$\begin{aligned} x^{a+b} &= x^a x^b & x^{ab} &= (x^a)^b = (x^b)^a \\ (xy)^a &= x^a y^a & x^{-a} &= \frac{1}{x^a} = \left(\frac{1}{x}\right)^a \end{aligned}$$

**Exemple 1.1**

Pour tout  $n \in \mathbb{Z}$ ,  $(2^{2^n})^2 = 2^{2^{n+1}}$ .

**Définition 1.5 Fonction puissance**

On appelle *fonction puissance* toute fonction du type  $x \mapsto x^\alpha$  où  $\alpha \in \mathbb{R}$ .

**Proposition 1.7 Ensemble de définition**

- Si  $\alpha \in \mathbb{N}^*$ ,  $x \mapsto x^\alpha$  est définie sur  $\mathbb{R}$ .
- Si  $\alpha \in \mathbb{Z}_-$ ,  $x \mapsto x^\alpha$  est définie sur  $\mathbb{R}^*$ .
- Si  $\alpha \in \mathbb{R} \setminus \mathbb{Z}$ ,  $x \mapsto x^\alpha$  est définie sur  $\mathbb{R}_+^*$ .

**REMARQUE.** Si  $\alpha > 0$ , on peut prolonger par continuité la fonction  $x \mapsto x^\alpha$  par 0 en 0.

Si  $\alpha = 0$ , on peut prolonger par continuité la fonction  $x \mapsto x^\alpha$  par 1 en 0. ■

**Proposition 1.8 Parité**

Soit  $n \in \mathbb{Z}$ . La fonction  $x \mapsto x^n$  a la parité de  $n$ .

**REMARQUE.** Si  $\alpha \in \mathbb{R} \setminus \mathbb{Z}$ , la fonction  $x \mapsto x^\alpha$  n'est ni paire ni impaire puisque son domaine de définition n'est pas symétrique par rapport à 0. ■

### Proposition 1.9 Dérivabilité

- Si  $\alpha \in \mathbb{N} \setminus \{0, 1\}$ ,  $x \mapsto x^\alpha$  est dérivable sur  $\mathbb{R}$  de dérivée  $x \mapsto \alpha x^{\alpha-1}$ .
- Si  $\alpha \in \mathbb{Z}_-$ ,  $x \mapsto x^\alpha$  est dérivable sur  $\mathbb{R}^*$  de dérivée  $x \mapsto \alpha x^{\alpha-1}$ .
- Si  $\alpha \in \mathbb{R} \setminus \mathbb{Z}$ ,  $x \mapsto x^\alpha$  est dérivable sur  $\mathbb{R}_+^*$  de dérivée  $x \mapsto \alpha x^{\alpha-1}$ .

**REMARQUE.** Si  $\alpha > 1$ , on peut prolonger  $x \mapsto x^\alpha$  par 0 en 0 et ce prolongement est dérivable en 0 de dérivée nulle. ■



**ATTENTION!** Si l'exposant est une fonction, il ne faut pas dériver n'importe comment. En clair, la dérivée de  $x \mapsto x^{f(x)}$  n'est pas  $x \mapsto f(x)x^{f(x)-1}$ .

### Méthode Dériver des fonctions de la forme $x \mapsto f(x)^{g(x)}$

L'idée est de se ramener à la forme exponentielle  $f(x)^{g(x)} = \exp(g(x) \ln f(x))$ . On dérive alors comme une composée.

### Exercice 1.1

Déterminer le domaine de dérivabilité et la dérivée de  $x \mapsto x^x$ .

#### Variations et limites : cas des puissances entières

$x$	$-\infty$	$0$	$+\infty$
$nx^{n-1}$	$-$	$0$	$+$
$x^n$	$+\infty$	$0$	$+\infty$

$n$  entier pair strictement positif

$x$	$+\infty$	$0$	$+\infty$
$nx^{n-1}$	$+$	$0$	$+$
$x^n$	$-\infty$	$0$	$+\infty$

$n$  entier impair strictement positif

$x$	$-\infty$	$0$	$+\infty$
$nx^{n-1}$	$+$	$-$	
$x^n$	$0 \rightarrow +\infty$	$+\infty \rightarrow 0$	

$n$  entier pair strictement négatif

$x$	$+\infty$	$0$	$+\infty$
$nx^{n-1}$	$-$	$+$	
$x^n$	$0 \rightarrow -\infty$	$+\infty \rightarrow 0$	

$n$  entier impair strictement négatif

**REMARQUE.** Vous m'épargnez le cas  $n = 0$ ... ■

**REMARQUE.**

- Si  $n$  est pair strictement positif,  $x \mapsto x^n$  réalise une bijection de  $\mathbb{R}_+$  sur  $\mathbb{R}_+$ .
- Si  $n$  est impair strictement positif,  $x \mapsto x^n$  est une bijection de  $\mathbb{R}$  sur  $\mathbb{R}$ .
- Si  $n$  est pair strictement négatif,  $x \mapsto x^n$  réalise une bijection de  $\mathbb{R}_+^*$  sur  $\mathbb{R}_+^*$ .
- Si  $n$  est impair strictement négatif,  $x \mapsto x^n$  est une bijection de  $\mathbb{R}^*$  sur  $\mathbb{R}^*$ .


**Variations et limites : cas des puissances non entières**

$x$	0	$+\infty$
$\alpha x^{\alpha-1}$		+
$x^\alpha$	0	$+\infty$

$\alpha > 0$


$x$	0	$+\infty$
$\alpha x^{\alpha-1}$		-
$x^\alpha$	$+\infty$	0


$\alpha < 0$

**REMARQUE.** Pour  $\alpha \neq 0$ , la fonction  $x \mapsto x^\alpha$  réalise une bijection de  $\mathbb{R}_+^*$  sur  $\mathbb{R}_+^*$ . Sa bijection réciproque est la fonction  $x \mapsto x^{\frac{1}{\alpha}}$ . ■

**Graphes : cas des puissances entières**

Graphes de  $x \mapsto x^n$  suivant les valeurs de  $n$



**Graphes : cas des puissances non entières**Graphes de  $x \mapsto x^\alpha$  suivant les valeurs de  $\alpha$ **Racines  $n^{\text{èmes}}$** 

Si  $n$  est un entier naturel impair,  $x \mapsto x^n$  est une bijection de  $\mathbb{R}$  sur  $\mathbb{R}$ . Sa bijection réciproque est notée  $\sqrt[n]{\phantom{x}}$  et elle est définie sur  $\mathbb{R}$ .

Si  $n$  est un entier naturel pair non nul,  $x \mapsto x^n$  induit une bijection de  $\mathbb{R}_+$  sur  $\mathbb{R}_+$ . Sa bijection réciproque est encore notée  $\sqrt[n]{\phantom{x}}$  et elle est définie sur  $\mathbb{R}_+$ .

De plus, pour tout  $n \in \mathbb{N}^*$  et tout  $x \in \mathbb{R}_+$ ,  $\sqrt[n]{x} = x^{\frac{1}{n}}$ .



**ATTENTION !** Soit  $n \in \mathbb{N} \setminus \{0, 1\}$ .

La notation  $x^{\frac{1}{n}}$  n'a aucun sens pour  $x \leq 0$ .

La notation  $\sqrt[n]{x}$  n'a de sens pour  $x \leq 0$  que si  $n$  est impair.



**ATTENTION !** Les racines  $n^{\text{èmes}}$  notées  $\sqrt[n]{\phantom{x}}$  n'ont pas grand-chose à voir avec les racines  $n^{\text{èmes}}$  d'un complexe.

Un nombre complexe – fût-il réel – admet  $n$  racines  $n^{\text{èmes}}$  complexes (sauf s'il est nul, bien entendu) tandis qu'un nombre réel admet au plus une racine  $n^{\text{ème}}$  dans le sens  $\sqrt[n]{\phantom{x}}$ .

Des notations du style  $\sqrt[n]{z}$  ou  $z^{\frac{1}{n}}$  avec  $z$  complexe non réel n'ont *AUCUN SENS*.

**REMARQUE.** Pour tout  $n \in \mathbb{N} \setminus \{0, 1\}$ , la fonction  $x \mapsto \sqrt[n]{x}$  est dérivable sur son ensemble de définition privé de 0. ■

**1.3 Croissances comparées****Lemme 1.1**

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln x}{x} = 0$$

L'idée à retenir est, qu'en  $+\infty$ , l'exponentielle l'emporte sur la puissance, qui elle-même l'emporte sur le logarithme.

**Proposition 1.10 Croissances comparées**

Soit  $(a, b) \in (\mathbb{R}_+^*)^2$ .

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{(\ln x)^b}{x^a} = 0$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^{ax}}{x^b} = +\infty$$

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} x^a |\ln x|^b = 0$$

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} |x|^b |e^{ax}| = 0$$

**Exercice 1.2**

Déterminer  $\lim_{x \rightarrow 0^+} x^x$ .

**2 Fonctions circulaires directes et réciproques****2.1 Fonctions circulaires directes**

On appelle *fonctions circulaires* ou *trigonométriques directes* les fonctions sin, cos et tan. On se reportera au chapitre *Trigonométrie* pour les définitions et les différentes formules.

**Rappel****Fonctions trigonométriques**

La fonction sin est définie sur  $\mathbb{R}$ ,  $2\pi$ -périodique et impaire.  
 La fonction cos est définie sur  $\mathbb{R}$ ,  $2\pi$ -périodique et paire.  
 La fonction tan est définie sur  $\mathbb{R} \setminus \left(\frac{\pi}{2} + \pi\mathbb{Z}\right)$ ,  $\pi$ -périodique et impaire.

**Lemme 2.1**

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} = 1$$

**Proposition 2.1 Dérivabilité**

Les fonctions cos, sin et tan sont dérivables sur leur ensemble de définition et

$$\sin' = \cos$$

$$\cos' = -\sin$$

$$\tan' = 1 + \tan^2 = \frac{1}{\cos^2}$$

**Exercice 2.1**

Calculer les dérivées successives de sin et cos

## Variations et limites

$x$	$-\pi$	$-\pi/2$	$0$	$\pi/2$	$\pi$
$\sin'(x)$		$-$	$0$	$+$	$0$
$\sin(x)$	$0$		$-1$	$1$	$0$


$x$	$-\pi$	$-\pi/2$	$0$	$\pi/2$	$\pi$
$\cos'(x)$	$0$	$+$	$0$	$-$	$0$
$\cos(x)$	$-1$	$0$	$1$	$0$	$-1$

$x$	$-\pi/2$	$0$	$\pi/2$
$\tan'(x)$		$+$	
$\tan(x)$	$-\infty$	$0$	$+\infty$




## Graphes


Graphe de sin



Graphe de cos



Graphe de tan



## 2.2 Fonctions circulaires réciproques

### Définition 2.1

- La fonction  $\sin$  induit une bijection strictement croissante de  $\left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right]$  sur  $[-1; 1]$ . On appelle fonction *arcsinus* sa bijection réciproque notée  $\arcsin$ .
- La fonction  $\cos$  induit une bijection strictement décroissante de  $[0, \pi]$  sur  $[-1, 1]$ . On appelle fonction *arccosinus* sa bijection réciproque notée  $\arccos$ .
- La fonction  $\tan$  induit une bijection strictement croissante de  $\left]-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right[$  sur  $\mathbb{R}$ . On appelle fonction *arctangente* sa bijection réciproque notée  $\arctan$ .

### REMARQUE.

- La fonction  $\arcsin$  est donc une bijection de  $[-1, 1]$  sur  $\left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right]$ . Pour  $x \in [-1, 1]$ ,  $\arcsin x$  est l'unique réel de  $\left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right]$  dont le sinus vaut  $x$ .
- La fonction  $\arccos$  est donc une bijection de  $[-1, 1]$  sur  $[0, \pi]$ . Pour  $x \in [-1, 1]$ ,  $\arccos x$  est l'unique réel de  $[0, \pi]$  dont le cosinus vaut  $x$ .
- La fonction  $\arctan$  est donc une bijection de  $\mathbb{R}$  sur  $\left]-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right[$ . Pour  $x \in \mathbb{R}$ ,  $\arctan x$  est l'unique réel de  $\left]-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right[$  dont la tangente vaut  $x$ .



### Proposition 2.2

Soit  $(x, \theta) \in \mathbb{R}^2$ .

- $\theta = \arcsin(x) \iff x = \sin(\theta) \text{ ET } \theta \in \left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right]$
- $\theta = \arccos(x) \iff x = \cos(\theta) \text{ ET } \theta \in [0, \pi]$
- $\theta = \arctan(x) \iff x = \tan(\theta) \text{ ET } \theta \in \left]-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right[$

### Angles usuels

$x$	$-1$	$-\frac{\sqrt{3}}{2}$	$-\frac{\sqrt{2}}{2}$	$-\frac{1}{2}$	$0$	$\frac{1}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$1$
$\arcsin x$	$-\frac{\pi}{2}$	$-\frac{\pi}{3}$	$-\frac{\pi}{4}$	$-\frac{\pi}{6}$	$0$	$\frac{\pi}{6}$	$\frac{\pi}{4}$	$\frac{\pi}{3}$	$\frac{\pi}{2}$
$\arccos x$	$\pi$	$\frac{5\pi}{6}$	$\frac{3\pi}{4}$	$\frac{2\pi}{3}$	$\frac{\pi}{2}$	$\frac{\pi}{3}$	$\frac{\pi}{4}$	$\frac{\pi}{6}$	$0$

$x$	$-\sqrt{3}$	$-1$	$-\frac{\sqrt{3}}{3}$	$0$	$\frac{\sqrt{3}}{3}$	$1$	$\sqrt{3}$
$\arctan x$	$-\frac{\pi}{3}$	$-\frac{\pi}{4}$	$-\frac{\pi}{6}$	$0$	$\frac{\pi}{6}$	$\frac{\pi}{4}$	$\frac{\pi}{3}$

### Ensemble de définition et image

Les fonctions  $\arcsin$  et  $\arccos$  sont définies sur  $[-1, 1]$  et la fonction  $\arctan$  est définie sur  $\mathbb{R}$ .

L'image des fonctions  $\arcsin$ ,  $\arccos$  et  $\arctan$  sont respectivement  $\left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right]$ ,  $[0, \pi]$  et  $\left]-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right[$ .

## Variations et limites

$x$	$-1$	$0$	$1$
$\arcsin(x)$	$-\frac{\pi}{2}$	$0$	$\frac{\pi}{2}$

$x$	$-1$	$0$	$1$
$\arccos(x)$	$\pi$	$\frac{\pi}{2}$	$0$




$x$	$-\infty$	$0$	$\infty$
$\arctan(x)$	$-\frac{\pi}{2}$	$0$	$\frac{\pi}{2}$

**Proposition 2.3 Parité**

Les fonctions arcsin et arctan sont impaires. La fonction arccos n'est ni paire ni impaire.

**REMARQUE.** On a néanmoins pour  $x \in [-1, 1]$ ,  $\arccos(-x) = \pi - \arccos x$ . ■

## Graphes



**Proposition 2.4**

$$\forall x \in [-1, 1], \sin(\arcsin x) = x$$

$$\forall x \in [-1, 1], \cos(\arccos x) = x$$

$$\forall x \in \mathbb{R}, \tan(\arctan x) = x$$

$$\forall x \in \mathbb{R}, \arcsin(\sin x) = x \iff x \in \left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right]$$

$$\forall x \in \mathbb{R}, \arccos(\cos x) = x \iff x \in [0, \pi]$$

$$\forall x \in \mathbb{R} \setminus \left(\frac{\pi}{2} + \pi\mathbb{Z}\right), \arctan(\tan x) = x \iff x \in \left]-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right[$$



**ATTENTION !**  $\arcsin \circ \sin \neq \text{Id}$ ,  $\arccos \circ \cos \neq \text{Id}$  et  $\arctan \circ \tan \neq \text{Id}$ . En effet,  $\arcsin$ ,  $\arccos$  et  $\arctan$  sont des bijections réciproques de restrictions de  $\sin$ ,  $\cos$  et  $\tan$ .

**Exemple 2.1**

► On a  $\sin \frac{5\pi}{6} = \frac{1}{2}$  mais  $\arcsin \frac{1}{2} = \frac{\pi}{6} \neq \frac{5\pi}{6}$  car  $\frac{5\pi}{6} \notin \left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right]$ .

► On a  $\cos -\frac{\pi}{3} = \frac{1}{2}$  mais  $\arccos \frac{1}{2} = \frac{\pi}{3} \neq -\frac{\pi}{3}$  car  $-\frac{\pi}{3} \notin [0, \pi]$ .

► On a  $\tan \frac{5\pi}{4} = 1$  mais  $\arctan 1 = \frac{\pi}{4} \neq \frac{5\pi}{4}$  car  $\frac{5\pi}{4} \notin \left]-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right[$ .

**Exercice 2.2**

Construire les courbes représentatives des fonctions  $\arcsin \circ \sin$ ,  $\arccos \circ \cos$  et  $\arctan \circ \tan$ .

**Proposition 2.5**

$$\forall x \in [-1, 1], \sin(\arccos x) = \cos(\arcsin x) = \sqrt{1 - x^2}$$

**Exercice 2.3** ★**Une somme d'arcsinus**

Prouver l'égalité suivante :

$$\arcsin\left(\frac{5}{13}\right) + \arcsin\left(\frac{3}{5}\right) = \arcsin\left(\frac{56}{65}\right).$$

**Exercice 2.4**

Résoudre l'équation  $\arcsin(x) = \arccos(2x)$ .

**Proposition 2.6 Dérivabilité**

Les fonctions  $\arcsin$  et  $\arccos$  sont dérivables sur  $] -1, 1[$  et la fonction  $\arctan$  est dérivable sur  $\mathbb{R}$ .

$$\forall x \in ] -1, 1[, \arcsin'(x) = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}} \quad \forall x \in ] -1, 1[, \arccos'(x) = -\frac{1}{\sqrt{1-x^2}} \quad \forall x \in \mathbb{R}, \arctan'(x) = \frac{1}{1+x^2}$$



**ATTENTION !** Les fonctions  $\arcsin$  et  $\arccos$  ne sont pas dérivables en  $-1$  et  $1$ .

**Proposition 2.7**

$$\forall x \in [-1, 1], \quad \arcsin x + \arccos x = \frac{\pi}{2}$$

$$\forall x \in \mathbb{R}^*, \quad \arctan x + \arctan \frac{1}{x} = \text{signe}(x) \frac{\pi}{2}$$

**3 Fonctions hyperboliques****Définition 3.1 Fonctions hyperboliques**

On appelle *sinus hyperbolique*, *cosinus hyperbolique* et *tangente hyperbolique* les trois fonctions notées respectivement  $\text{ch}$ ,  $\text{sh}$  et  $\text{th}$  telles que pour tout  $x \in \mathbb{R}$  :

$$\text{sh } x = \frac{e^x - e^{-x}}{2} \qquad \text{ch } x = \frac{e^x + e^{-x}}{2} \qquad \text{th } x = \frac{\text{sh } x}{\text{ch } x}$$

**REMARQUE.** Les formules définissant  $\text{sh } x$  et  $\text{ch } x$  sont les analogues des relations d'Euler permettant de définir  $\sin$  et  $\cos$  à partir de l'exponentielle complexe. La seule différence est qu'ici, les exponentielles sont réelles. ■

**Formulaire de trigonométrie hyperbolique**

► Formule fondamentale :

$$\text{ch}^2 x - \text{sh}^2 x = 1$$

► Formules d'addition :

$$\begin{aligned} \text{ch}(a+b) &= \text{ch } a \text{ch } b + \text{sh } a \text{sh } b & \text{ch}(a-b) &= \text{ch } a \text{ch } b - \text{sh } a \text{sh } b \\ \text{sh}(a+b) &= \text{sh } a \text{ch } b + \text{ch } a \text{sh } b & \text{sh}(a-b) &= \text{sh } a \text{ch } b - \text{ch } a \text{sh } b \\ \text{th}(a+b) &= \frac{\text{th } a + \text{th } b}{1 + \text{th } a \text{th } b} & \text{th}(a-b) &= \frac{\text{th } a - \text{th } b}{1 - \text{th } a \text{th } b} \end{aligned}$$

► Formules de duplication

$$\begin{aligned} \text{ch } 2a &= \text{ch}^2 a + \text{sh}^2 a = 2 \text{ch}^2 a - 1 = 2 \text{sh}^2 a + 1 \\ \text{sh } 2a &= 2 \text{sh } a \text{ch } a \\ \text{th } 2a &= \frac{2 \text{th } a}{1 + \text{th}^2 a} \end{aligned}$$

**REMARQUE.** Seule la première formule est explicitement au programme. On doit néanmoins être capable de retrouver les autres formules facilement.

Les formules de trigonométrie hyperbolique sont évidemment très analogues aux formules de trigonométrie usuelle. Il suffit en fait de se rappeler quand les signes  $-$  se transforment en signe  $+$  et réciproquement. ■

**Proposition 3.1 Parité**

Les fonctions  $\text{sh}$  et  $\text{th}$  sont impaires et la fonction  $\text{ch}$  est paire.

**Proposition 3.2 Dérivabilité**

Les fonctions  $\text{sh}$ ,  $\text{ch}$  et  $\text{th}$  sont dérivables sur  $\mathbb{R}$  et

$$\text{sh}' = \text{ch} \qquad \text{ch}' = \text{sh} \qquad \text{th}' = 1 - \text{th}^2 = \frac{1}{\text{ch}^2}$$

**Exercice 3.1**

Calculer les dérivées successives de sh et ch.

**Variations et limites**

$x$	$-\infty$	$0$	$+\infty$
$\text{sh}'(x)$		+	
$\text{sh}(x)$	$-\infty$	<div style="text-align: center;"> <math>\downarrow</math>  <math>0</math> </div>	$+\infty$

$x$	$-\infty$	$0$	$+\infty$
$\text{ch}'(x)$		0	
$\text{ch}(x)$	$+\infty$	1	$+\infty$

$x$	$-\infty$	$0$	$+\infty$
$\text{th}'(x)$		+	
$\text{th}(x)$	-1	0	+1

**Graphes**