

NOM :

Prénom :

Note :

1. Soit  $f_n : x \mapsto e^{-nx}$ . La suite  $(f_n)$  converge-t-elle uniformément sur  $]0, +\infty[$  ? Justifier.

**Première méthode.** Supposons que  $(f_n)$  converge uniformément sur  $\mathbb{R}_+^*$ . D'après le théorème de la double limite, on aurait alors

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \lim_{x \rightarrow 0^+} f_n(x) = \lim_{x \rightarrow 1^-} \lim_{n \rightarrow +\infty} f_n(x)$$

et donc  $1 = 0$ . Ainsi  $(f_n)$  ne converge pas uniformément sur  $\mathbb{R}_+^*$ .

**Deuxième méthode.** On montre que  $(f_n)$  converge simplement vers la fonction nulle sur  $\mathbb{R}_+^*$ . Mais  $\|f_n\|_{\infty, \mathbb{R}_+^*} = 1$  donc  $(f_n)$  ne converge pas uniformément vers la fonction nulle. ■

2. On pose  $f_n : x \mapsto x^n(1-x)$ . La suite de fonctions  $(f_n)$  converge-t-elle simplement sur  $[0, 1]$  ? uniformément sur  $[0, 1]$  ? Justifier.

Remarquons que  $f_n(1) = 0$  et que pour  $x \in [0, 1[$ , la suite géométrique  $(f_n(x))$  converge vers 0. Ainsi  $(f_n)$  converge simplement vers la fonction nulle sur  $[0, 1]$ . Une étude de fonctions montre que  $f_n$  est positive et atteint son maximum en  $\frac{n}{n+1}$ . Par conséquent,

$$\|f_n\|_{\infty, [0, 1]} = f_n\left(\frac{n}{n+1}\right) \leq \frac{1}{n+1}$$

Ainsi  $\lim_{n \rightarrow +\infty} \|f_n\|_{\infty, [0, 1]} = 0$  i.e.  $(f_n)$  converge uniformément vers la fonction nulle sur  $[0, 1]$ . ■

3. On pose  $\zeta : x \mapsto \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n^x}$ . Montrer que  $\zeta$  est continue sur  $]1, +\infty[$ .

On pose  $f_n : x \mapsto \frac{1}{n^x}$ . Les fonctions  $f_n$  sont bien continues sur  $]1, +\infty[$ . Fixons  $a > 1$ . Alors  $\|f_n\|_{\infty, [a, +\infty[} = \frac{1}{n^a}$ . Or  $\sum \frac{1}{n^a}$  converge donc  $\sum f_n$  converge normalement sur  $[a, +\infty[$ . On en déduit que  $\zeta$  est continue sur  $[a, +\infty[$  pour tout  $a > 1$ . Finalement,  $\zeta$  est continue sur  $]1, +\infty[$ . ■

4. On pose  $f(x) = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{1}{1+n^2x}$ . Déterminer la limite de  $f$  en  $+\infty$ .

Posons  $f_n : x \mapsto \frac{1}{n^2+x}$ . Il est clair que  $\|f_n\|_{\infty, [1, +\infty[} = \frac{1}{n^2+1} \leq \frac{1}{n^2}$ . On en déduit que  $\sum f_n$  converge normalement et donc uniformément sur  $[1, +\infty[$ . De plus, pour tout  $n \in \mathbb{N}$ ,  $\lim_{+\infty} f_n = \delta_{0,n}$ . D'après le théorème d'interversion série/limite,  $\lim_{+\infty} f = 1$ . ■

5. On pose  $f(x) = \sum_{n=1}^{+\infty} (-1)^n \frac{e^{-nx}}{n^2}$ . Montrer que  $f$  est de classe  $\mathcal{C}^1$  sur  $\mathbb{R}_+$ .

Posons  $f_n : x \mapsto \frac{(-1)^n e^{-nx}}{n^2}$ . Fixons  $x \in \mathbb{R}_+$ . Alors  $|f_n(x)| \leq \frac{1}{n^2}$  donc  $\sum f_n(x)$  converge (absolument). Ainsi  $\sum f_n$  converge simplement sur  $\mathbb{R}_+$ .

Les fonctions  $f_n$  sont de classe  $\mathcal{C}^1$  sur  $\mathbb{R}_+$  et pour tout  $x \in \mathbb{R}_+$ ,  $f'_n(x) = \frac{(-1)^{n+1} e^{-nx}}{n}$ . Fixons  $x \in \mathbb{R}_+$ . La suite de terme général  $\frac{e^{-nx}}{n}$  est décroissante de limite nulle donc la série  $\sum f'_n(x)$  vérifie le critère spécial des séries alternées. Notamment  $\sum f'_n$  converge simplement sur  $\mathbb{R}_+$ . Notons  $R_n = \sum_{k=n+1}^{+\infty} f'_k$ . D'après le critère spécial des séries alternées,

$$\forall x \in \mathbb{R}_+, |R_n(x)| \leq |f'_{n+1}(x)| = \frac{e^{-(n+1)x}}{n+1} \leq \frac{1}{n+1}$$

de sorte que  $(R_n)$  converge uniformément vers la fonction nulle. On en déduit que  $\sum f'_n$  converge uniformément sur  $\mathbb{R}_+$ . On en conclut que  $f$  est de classe  $\mathcal{C}^1$  sur  $\mathbb{R}_+$ . ■