

DÉRIVATION ET INTÉGRATION

Opérations et dérivation

$$(u + v)' = u' + v'$$

$$(uv)' = u'v + uv'$$

$$(\lambda u)' = \lambda u'$$

$$(u \circ v)' = (u' \circ v)v'$$

$$(u^{-1})' = \frac{1}{u' \circ u^{-1}}$$

$$\left(\frac{u}{v}\right)' = \frac{u'v - uv'}{v^2}$$

$$\left(\frac{1}{u}\right)' = -\frac{u'}{u^2}$$

$$(u^\alpha)' = \alpha u' u^{\alpha-1}$$

$$\text{Formule de Leibniz : } (uv)^{(n)} = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} u^{(k)} v^{(n-k)}$$

Dérivées usuelles

$$\ln x \mapsto \frac{1}{x}$$

$$e^{ax} \mapsto ae^{ax}$$

$$x^\alpha \mapsto \alpha x^{\alpha-1}$$

$$\sin x \mapsto \cos x$$

$$\cos x \mapsto -\sin x$$

$$\tan x \mapsto 1 + \tan^2 x = \frac{1}{\cos^2 x}$$

$$\arcsin x \mapsto \frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$$

$$\arccos x \mapsto -\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$$

$$\arctan x \mapsto \frac{1}{1+x^2}$$

$$\operatorname{sh} x \mapsto \operatorname{ch} x$$

$$\operatorname{ch} x \mapsto \operatorname{sh} x$$

$$\operatorname{th} x \mapsto 1 - \operatorname{th}^2 x = \frac{1}{\operatorname{ch}^2 x}$$

Primitives usuelles

$$\ln x \mapsto x \ln x - x$$

$$e^{ax} \mapsto \frac{e^{ax}}{a} \quad (a \neq 0)$$

$$x^\alpha \mapsto \begin{cases} \frac{x^{\alpha+1}}{\alpha+1} & \text{si } \alpha \neq -1 \\ \ln |x| & \text{si } \alpha = -1 \end{cases}$$

$$\sin x \mapsto -\cos x$$

$$\cos x \mapsto \sin x$$

$$\tan x \mapsto -\ln |\cos x|$$

$$\frac{1}{\sqrt{1-x^2}} \mapsto \arcsin x$$

$$-\frac{1}{\sqrt{1-x^2}} \mapsto \arccos x \text{ ou } -\arcsin x$$

$$\frac{1}{1+x^2} \mapsto \arctan x$$

$$\operatorname{sh} x \mapsto \operatorname{ch} x$$

$$\operatorname{ch} x \mapsto \operatorname{sh} x$$

$$\operatorname{th} x \mapsto \ln(\operatorname{ch} x)$$

Formules de Taylor

Formule de Taylor avec reste intégral : Si f est une fonction de classe \mathcal{C}^{n+1} sur un intervalle I , alors

$$\forall (a, b) \in I^2, f(b) = \sum_{k=0}^n \frac{f^{(k)}(a)}{k!} (b-a)^k + \int_a^b \frac{(b-t)^n}{n!} f^{(n+1)}(t) dt$$

Inégalité de Taylor-Lagrange : Si f est une fonction de classe \mathcal{C}^{n+1} sur un intervalle I et si $|f^{(n+1)}| \leq M$ sur I , alors

$$\forall (a, b) \in I^2, \left| f(b) - \sum_{k=0}^n \frac{f^{(k)}(a)}{k!} (b-a)^k \right| \leq M \frac{|b-a|^{n+1}}{(n+1)!}$$

Formule de Taylor-Young : Si f est une fonction de classe \mathcal{C}^n sur un intervalle I et $a \in I$, alors

$$\forall x \in I, f(x) = \sum_{k=0}^n \frac{f^{(k)}(a)}{k!} (x-a)^k + o((x-a)^n)$$