# Semaine du 24/04 au 01/05

### 1 Cours

## Séries numériques

Généralités Définition, sommes partielles. Nature d'une série, somme. Si  $\sum u_n$  converge, alors  $(u_n)$  converge vers 0. Divergence grossière. Nature et somme d'une série géométrique. Reste d'une série convergente. Opérations sur les séries.

Comparaison à une intégrale Encadrement de  $\sum f(n)$  où f est monotone. Nature d'une série de Riemann.

Séries à termes positifs Une série à terme positif converge ou diverge vers  $+\infty$ . Si  $0 \le u_n \le v_n$ , lien entre la convergence ou la divergence des séries  $\sum u_n$  et  $\sum v_n$ . Absolue convergence. La convergence absolue implique la convergence. Relations de comparaison : lien entre domination/négligeabilité/équivalence et convergence/divergence des séries.

**Développement décimal** Existence et unicité d'un développement décimal propre.

## 2 Méthodes à maîtriser

- ▶ Établir la convergence d'une série et calculer sa somme par télescopage.
- ▶ Utiliser une décomposition en éléments simples pour déterminer par télescopage la somme d'une série  $\sum F(n)$  où F est une fraction rationnelle.
- ▶ Comparer la somme partielle ou le reste d'une série à une intégrale.
- ▶ Déterminer un équivalent de la somme partielle d'une série divergente ou du reste d'une série convergente par comparaison à une intégrale.
- ► Comparer à une série de Riemann ou une série géométrique pour déterminer la nature d'une série.

## 3 Questions de cours

### **▶** BCCP 05

- 1. On considère la série de terme général  $u_n = \frac{1}{n(\ln n)^{\alpha}}$  où  $n \ge 2$  et  $\alpha \in \mathbb{R}$ .
  - (a) Cas  $\alpha \ge 0$ .

En utilisant une minoration très simple de  $u_n$ , démontrer que la série diverge.

(b) Cas  $\alpha > 0$ .

Étudier la nature de la série. Indication : on pourra utiliser la fonction  $f: x \mapsto \frac{1}{x(\ln x)^{\alpha}}$ .

2. Déterminer la nature de la série

$$\sum_{n \ge 2} \frac{\left(e - \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n\right) e^{\frac{1}{n}}}{(\ln(n^2 + n))^2}$$

**Remarque.** Dans le corrigé «officiel», le cas  $\alpha > 0$  est traité à l'aide d'un théorème qui n'est pas au programme de première année. Mais ce cas a été traité en classe «à la main» via la méthode des rectangles lors de l'étude des séries de Bertrand (horsprogramme, je le rappelle).

#### **▶** BCCP 07

- 1. Soient  $(u_n)$  et  $(v_n)$  deux suites de nombres réels positifs. On suppose que  $(u_n)$  et  $(v_n)$  sont non nulles à partir d'un certain rang. Montrer que si  $u_n \underset{n \to +\infty}{\sim} v_n$ , alors  $\sum u_n$  et  $\sum v_n$  sont de même nature.
- 2. Etudier la convergence de la série

$$\sum_{n \ge 2} \frac{((-1)^n + i)\ln(n)\sin(1/n)}{\sqrt{n+3} - 1}$$

#### ightharpoonup Constante $\gamma$ d'Euler

- 1. Montrer que la série  $\sum_{n \ge 2} \frac{1}{n} \ln(n) + \ln(n-1)$  converge.
- 2. En déduire qu'il existe  $\gamma \in \mathbb{R}$  tel que

$$\sum_{k=1}^{n} \frac{1}{k} = \ln(n) + \gamma + o(1)$$

- ▶ Série exponentielle Soit  $x \in \mathbb{R}$ . Montrer que la série  $\sum_{n \in \mathbb{N}} \frac{x^n}{n!}$  converge et que sa somme vaut  $e^x$  à l'aide de l'inégalité de Taylor-Lagrange.
- ▶ Equivalent d'une somme partielle A l'aide d'une comparaison série/ntégrale, déterminer un équivalent de la somme partielle de la série  $\sum_{n\in\mathbb{N}^*} \frac{1}{\sqrt{n}}$ .
- ► Equivalent d'un reste A l'aide d'une comparaison série/intégrale, déterminer un équivalent du reste de la série  $\sum_{n \in \mathbb{N}^*} \frac{1}{n\sqrt{n}}$ .

  REMARQUE. J'autorise les étudiants à utiliser des intégrales impropres (i.e. à borne infinie).
- ▶ Série alternée Soit  $(u_n)_{n\in\mathbb{N}}$  une suite décroissante de limite nulle. Montrer que la série  $\sum_{n\in\mathbb{N}} (-1)^n u_n$  converge.