

# DEVOIR À LA MAISON N°15 : CORRIGÉ

## Problème 1 – Equation intégrale

### Partie I –

1. Remarquons tout d'abord que la relation (1) peut s'écrire

$$\forall x \in \mathbb{R}, f(x) - x \int_0^x f(t) dt + \int_0^x t f(t) dt = g(x)$$

On a donc  $f(x) = g(x) + x \int_0^x f(t) dt - \int_0^x t f(t) dt$  pour tout  $x \in \mathbb{R}$ . Les fonctions  $x \mapsto \int_0^x f(t) dt$  et  $x \mapsto \int_0^x t f(t) dt$  sont de classe  $\mathcal{C}^1$  comme primitives de fonctions continues. Puisque  $x \mapsto x$  et  $g$  sont également de classe  $\mathcal{C}^1$ ,  $f$  est de classe  $\mathcal{C}^1$ . Les fonctions  $x \mapsto \int_0^x f(t) dt$  et  $x \mapsto \int_0^x t f(t) dt$  sont donc de classe  $\mathcal{C}^2$  comme primitives de fonctions de classe  $\mathcal{C}^1$ . Puisque  $x \mapsto x$  et  $g$  sont également de classe  $\mathcal{C}^2$ ,  $f$  de classe  $\mathcal{C}^2$ .

En dérivant une première fois la relation (1), on obtient pour tout  $x \in \mathbb{R}$  :

$$f'(x) - \int_0^x f(t) dt = g'(x)$$

En dérivant cette relation une seconde fois, on obtient pour tout  $x \in \mathbb{R}$  :

$$f''(x) - f(x) = g''(x)$$

2. Dans les trois cas qui suivent,  $g''$  est nulle. Si  $f$  est solution de (1), elle est solution de (2) et il existe donc  $A, B \in \mathbb{R}$  tels que  $f(x) = Ae^x + Be^{-x}$  pour tout  $x \in \mathbb{R}$ . En reportant dans (1), on voit que  $f$  est solution de (1) *si et seulement si*

$$\forall x \in \mathbb{R}, (A - B)x + (A + B) = g(x)$$

On rappelle que la famille  $(x \mapsto 1, x \mapsto x)$  est une famille libre de  $\mathbb{R}^{\mathbb{R}}$ .

- a. Si  $g$  est nulle,  $f$  est solution de (1) *si et seulement si*  $\begin{cases} A - B = 0 \\ A + B = 0 \end{cases}$  i.e.  $A = B = 0$ . L'unique solution de (1) est donc la solution nulle.

- b. Si  $g$  est constante, notons  $C$  cette constante.  $f$  est solution de (1) *si et seulement si*  $\begin{cases} A - B = 0 \\ A + B = C \end{cases}$  i.e.  $A = B = \frac{C}{2}$ . L'unique solution est donc  $x \mapsto C \cosh x$ .

- c. Si  $g$  est affine, il existe  $\lambda, \mu \in \mathbb{R}$  tels que  $g(x) = \lambda x + \mu$  pour tout  $x \in \mathbb{R}$ .  $f$  est solution de (1) *si et seulement si*  $\begin{cases} A - B = \lambda \\ A + B = \mu \end{cases}$  i.e.  $A = \frac{\lambda + \mu}{2}$  et  $B = \frac{\mu - \lambda}{2}$ . L'unique solution est donc  $x \mapsto \lambda \sinh x + \mu \cosh x$ .

3. Soient  $f_1$  et  $f_2$  deux solutions éventuelles de (1). Par linéarité de l'intégrale,  $f_1 - f_2$  est solution d'une équation du type (1) avec un second membre nul. La question I.2.a montre que  $f_1 - f_2 = 0$  i.e.  $f_1 = f_2$ . Ainsi (1) admet au plus une solution.
4. Soit  $f$  une fonction de la forme donnée par l'énoncé.  $f$  est bien dérivable puisque  $x \mapsto \int_0^x e^{-t} g''(t) dt$  et  $x \mapsto \int_0^x e^t g''(t) dt$  sont des primitives des fonctions  $x \mapsto e^{-x} g''(x)$  et  $x \mapsto e^x g''(x)$  en vertu du théorème fondamental de l'analyse : ce sont donc des fonctions dérivables. On a de plus pour tout  $x \in \mathbb{R}$  :

$$f'(x) = \frac{e^x}{2} \left[ \int_0^x e^{-t} g''(t) dt + k_A \right] + \frac{e^{-x}}{2} \left[ \int_0^x e^t g''(t) dt + k_B \right]$$

On en déduit que  $f'$  est à nouveau dérivable et que pour tout  $x \in \mathbb{R}$  :

$$f''(x) = \frac{e^x}{2} \left[ \int_0^x e^{-t} g''(t) dt + k_A \right] - \frac{e^{-x}}{2} \left[ \int_0^x e^t g''(t) dt + k_B \right] + g''(x) = f(x) + g''(x)$$

Autrement dit,  $f$  est solution de (2).

5. Soit  $f$  une solution de (2) vérifiant  $f(0) = g(0)$  et  $f'(0) = g'(0)$ . En intégrant la relation  $f''(t) - f(t) = g''(t)$  entre 0 et  $x$ , on obtient  $f'(x) - f'(0) - F(x) = g'(x) - g'(0)$  où  $F$  désigne la primitive de  $f$  nulle en 0. Puisque  $f'(0) = g'(0)$ , on a donc  $f'(t) - F(t) = g'(t)$ . En intégrant à nouveau entre 0 et  $x$ , on obtient  $f(x) - f(0) - \int_0^x F(t) dt = g(x) - g(0)$ . Or  $f(0) = g(0)$  et en intégrant par parties

$$\int_0^x F(t) dt = [(t-x)F(t)]_0^x - \int_0^x (t-x)F'(t) dt = \int_0^x (x-t)f(t) dt$$

Ainsi  $f(x) - \int_0^x (x-t)f(t) dt = g(x)$  pour tout  $x \in \mathbb{R}$  i.e.  $f$  est solution de (1).

6. D'après la question I.4 et en utilisant le fait que  $g'' = \exp$ , on a

$$\forall x \in \mathbb{R}, f(x) = \frac{e^x}{2}(x + k_A) - \frac{e^{-x}}{2} \left( \frac{e^{2x}}{2} + k_B \right)$$

Les conditions  $f(0) = g(0)$  et  $f'(0) = g'(0)$  de la question I.5, fournissent  $\frac{k_A}{2} - \frac{k_B}{2} = 1$  et  $\frac{k_A}{2} + \frac{k_B}{2} = 1$  i.e.  $k_A = 2$  et  $k_B = 0$ . L'unique solution de (1) est donc  $x \mapsto e^x \left( \frac{x}{2} + 1 \right)$ .

## Partie II –

- On raisonne comme à la question I.1 pour montrer que  $A(f)$  est de classe  $\mathcal{C}^1$ . De plus  $A(f)'(x) = \int_0^x f(t) dt$  pour tout  $x \in \mathbb{R}$ .  $A(f)'$  est donc elle-même de classe  $\mathcal{C}^1$  i.e.  $A(f)$  est de classe  $\mathcal{C}^2$  et  $A(f)'' = f$ .
- Pour tout  $f \in E$ ,  $A(f)$  est également continue puisqu'elle est de classe  $\mathcal{C}^2$  d'après la question précédente. Ainsi  $A(E) \subset E$ . De plus,  $A$  est linéaire par linéarité de l'intégrale. Ainsi  $A$  est un endomorphisme de  $E$ . Soit  $f \in \text{Ker } A$ . On a donc  $A(f) = 0$  et a fortiori  $A(f)'' = 0$ . Or  $A(f)'' = f$  donc  $f = 0$ , d'où  $\text{Ker } A = \{0_E\}$  et  $A$  est injectif.
- Soient  $f \in E$  et  $x \in \mathbb{R}$ . On procède à nouveau par intégration par parties :

$$\begin{aligned} U \circ A(f)(x) &= \int_0^x \text{sh}(x-t)A(f)(t) dt = -[\text{ch}(x-t)A(f)(t)]_{t=0}^{t=x} + \int_0^x \text{ch}(x-t)A(f)'(t) dt \\ &= -A(f)(x) - [\text{sh}(x-t)A(f)'(t)]_{t=0}^{t=x} + \int_0^x \text{sh}(x-t)A(f)''(t) dt \\ &= -A(f)(x) + \int_0^x \text{sh}(x-t)f(t) dt = -A(f)(x) + U(f)(x) \end{aligned}$$

en utilisant le fait que  $A(f)(0) = A(f)'(0) = 0$  et  $A(f)'' = f$ . Les intégrations par parties sont légitimes car  $A(f)$  est de classe  $\mathcal{C}^2$ . L'égalité précédente étant vraie pour tout réel  $x$ , on a  $U \circ A(f) = U(f) - A(f)$ . Ceci étant maintenant vrai pour tout  $f \in E$ , on en déduit  $U \circ A = U - A$ .

- Faisons l'hypothèse de récurrence  $\text{HR}(n)$  suivante

$$\forall f \in E, \forall x \in \mathbb{R}, A^n(f)(x) = \int_0^x \frac{(x-t)^{2n-1}}{(2n-1)!} f(t) dt$$

$\text{HR}(1)$  est vraie par définition de  $A$ . Supposons  $\text{HR}(n)$  vraie pour un certain  $n \in \mathbb{N}^*$ . On se donne  $f \in E$  et  $x \in \mathbb{R}$ .

$$A^{n+1}(f)(x) = A^n(A(f))(x) = \int_0^x \frac{(x-t)^{2n-1}}{(2n-1)!} A(f)(t) dt$$

En intégrant une première fois par parties :

$$A^{n+1}(f)(x) = - \left[ \frac{(x-t)^{2n}}{(2n)!} A(f)(t) \right]_{t=0}^{t=x} + \int_0^x \frac{(x-t)^{2n}}{(2n)!} A(f)'(t) dt = \int_0^x \frac{(x-t)^{2n}}{(2n)!} A(f)'(t) dt$$

car  $A(f)(0) = 0$ . En intégrant à nouveau par parties :

$$A^{n+1}(f)(x) = - \left[ \frac{(x-t)^{2n+1}}{(2n+1)!} A(f)'(t) \right]_{t=0}^{t=x} + \int_0^x \frac{(x-t)^{2n+1}}{(2n+1)!} A(f)''(t) dt = \int_0^x \frac{(x-t)^{2n+1}}{(2n+1)!} f(t) dt$$

car  $A(f)'(0) = 0$  et  $A(f)'' = f$ .

5. a. Puisque  $\text{sh}$  est de classe  $\mathcal{C}^\infty$  sur  $\mathbb{R}$ , on peut appliquer l'inégalité de Taylor-Lagrange à la fonction  $\text{sh}$  entre 0 et  $u$  à l'ordre  $2n$  :

$$\left| \text{sh } u - \sum_{p=0}^{2n} \frac{\text{sh}^{(p)}(0)}{p!} u^p \right| \leq M \frac{|u|^{2n+1}}{(2n+1)!}$$

où  $M$  désigne le maximum de  $|\text{sh}^{(2n+1)}|$  sur  $[0, u]$  ou  $[u, 0]$  suivant le signe de  $u$ .

Or pour  $p$  pair,  $\text{sh}^{(p)} = \text{sh}$  et donc  $\text{sh}^{(p)}(0) = 0$  et pour  $p$  impair  $\text{sh}^{(p)} = \text{ch}$  et donc  $\text{sh}^{(p)}(0) = 1$ . Ainsi

$$\sum_{p=0}^{2n} \frac{\text{sh}^{(p)}(0)}{p!} u^p = \sum_{k=1}^n \frac{u^{2k-1}}{(2k-1)!}.$$

On a donc également  $\text{sh}^{(2n+1)} = \text{ch}$ . Puisque  $\text{ch}$  est paire et croissante sur  $\mathbb{R}_+$ , on a donc  $M = \text{ch } u$  en distinguant les cas  $u \geq 0$  et  $u \leq 0$ . On en déduit donc la formule demandée.

- b. En utilisant l'expression de  $A_n(f)(x)$  trouvée en II.4, on peut écrire :

$$U(f)(x) - U_n(f)(x) = \int_0^x \left( \text{sh}(x-t) - \sum_{k=1}^n \frac{(x-t)^{2k-1}}{(2k-1)!} \right) f(t) dt$$

Par conséquent

$$|U(f)(x) - U_n(f)(x)| \leq \left| \int_0^x \left| \text{sh}(x-t) - \sum_{k=1}^n \frac{(x-t)^{2k-1}}{(2k-1)!} \right| |f(t)| dt \right|$$

Mais grâce à la majoration de la question II.5.a, on a donc

$$|U(f)(x) - U_n(f)(x)| \leq \left| \int_0^x \frac{\text{ch}(x-t)|x-t|^{2n+1}}{(2n+1)!} |f(t)| dt \right|$$

On en déduit par inégalité de la moyenne

$$|U(f)(x) - U_n(f)(x)| \leq M \left| \int_0^x |f(t)| dt \right|$$

où  $M$  désigne le maximum de  $t \mapsto \frac{\text{ch}(x-t)|x-t|^{2n+1}}{(2n+1)!}$  sur l'intervalle  $[0, x]$  ou  $[x, 0]$ . Par changement de variables,  $M$  est aussi le maximum de  $t \mapsto \frac{\text{ch}(t)|t|^{2n+1}}{(2n+1)!}$  sur l'intervalle  $[0, x]$  ou  $[x, 0]$ . Cette fonction étant paire et croissante sur  $\mathbb{R}_+$ , on trouve  $M = \frac{\text{ch}(x)|x|^{2n+1}}{(2n+1)!}$  en distinguant les cas  $x \geq 0$  et  $x \leq 0$ .

Les théorèmes de comparaison sur les suites usuelles donnent  $|x|^{2n+1} = o((2n+1)!)$  quand  $n \rightarrow +\infty$ . Par conséquent,

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{\text{ch}(x)|x|^{2n+1}}{(2n+1)!} \left| \int_0^x |f(t)| dt \right| = 0$$

Par encadrement,  $\lim_{n \rightarrow +\infty} U(f)(x) - U_n(f)(x) = 0$ .

- c. Remarquons que  $A \circ U_n = U_n \circ A = U_{n+1} - A$ .

On peut donc écrire

$$U \circ A = (U - U_n) \circ A + U_n \circ A = (U - U_n) \circ A + U_{n+1} - A = (U - U_n) \circ A + (U_{n+1} - U) + (U - A)$$

Soient  $f \in E$ ,  $x \in \mathbb{R}$  et  $n \in \mathbb{N}^*$ . On a donc

$$U \circ A(f)(x) = (U - U_n) \circ A(f)(x) + (U_{n+1} - U)(f)(x) + (U - A)(f)(x)$$

En appliquant la question précédente, on a  $(U_{n+1} - U)(f)(x) \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0$ . On peut également appliquer la question précédente à  $A(f)$  qui est bien une fonction de  $E$  de sorte que  $(U - U_n) \circ A(f)(x) \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0$ . Par unicité de la limite, on a donc  $U \circ A(f)(x) = (U - A)(f)(x)$ . Ceci étant valable pour tout  $x \in \mathbb{R}$ , on a donc  $U \circ A(f) = (U - A)(f)$ . Ceci étant valable pour tout  $f \in E$ , on a finalement  $U \circ A = U - A$ .

6. a. On a  $(I - A) \circ (I + U) = I - A + U - A \circ U = I$  d'après la question II.5.c. De même,  $(I + U) \circ (I - A) = I - A + U + U \circ A = I$  d'après la question II.3. Ainsi  $I - A$  et  $I + U$  sont inversibles et inverses l'une de l'autre.

- b. Une fonction  $f$  de  $E$  est solution de (1) si et seulement si  $(I-A)(f) = g$  i.e.  $f = (I+U)(g)$ . L'unique solution  $f$  de (1) est donc définie par

$$\forall x \in \mathbb{R}, f(x) = g(x) + \int_0^x \operatorname{sh}(x-t)g(t) dt$$

- c.  $g$  est bien continue mais n'est pas de classe  $\mathcal{C}^2$  : on ne peut plus utiliser les résultats de la première partie. Tout d'abord, remarquons que  $f$  est paire. En effet, en utilisant la parité de  $g$  :

$$f(-x) = g(-x) + \int_0^{-x} \operatorname{sh}(-x-t)g(t) dt = g(x) + \int_0^{-x} \operatorname{sh}(-x-t)g(-t) dt$$

Effectuons le changement de variables  $u = -t$  et utilisons l'imparité de  $\operatorname{sh}$  :

$$f(-x) = g(x) - \int_0^x \operatorname{sh}(-x+u)g(u) du = g(x) + \int_0^x \operatorname{sh}(x-u)g(u) du = f(x)$$

Déterminons maintenant  $f$  sur  $\mathbb{R}_+$  en distinguant des cas.

- Si  $x \in [0, 1[$ ,

$$f(x) = x + \int_0^x t \operatorname{sh}(x-t) dt = x - [t \operatorname{ch}(x-t)]_{t=0}^{t=x} + \int_0^x \operatorname{ch}(x-t) dt = -[\operatorname{sh}(x-t)]_{t=0}^{t=x} = \operatorname{sh}(x)$$

- Si  $x \in [0, 2[$ ,

$$\begin{aligned} f(x) &= 2 - x + \int_0^x \operatorname{sh}(x-t)g(t) dt = 2 - x + \int_0^1 t \operatorname{sh}(x-t) dt + \int_1^x (2-t) \operatorname{sh}(x-t) dt \\ &= 2 - x - [t \operatorname{ch}(x-t)]_{t=0}^{t=1} + \int_0^1 \operatorname{ch}(x-t) dt - [(2-t) \operatorname{ch}(x-t)]_{t=1}^{t=x} - \int_1^x \operatorname{ch}(x-t) dt \\ &= -[\operatorname{sh}(x-t)]_{t=0}^{t=1} + [\operatorname{sh}(x-t)]_{t=1}^{t=x} \\ &= \operatorname{sh}(x) - 2 \operatorname{sh}(x-1) \end{aligned}$$

- Si  $x \geq 2$ ,

$$\begin{aligned} f(x) &= \int_0^x \operatorname{sh}(x-t)g(t) dt = \int_0^1 t \operatorname{sh}(x-t) dt + \int_1^2 (2-t) \operatorname{sh}(x-t) dt \\ &= -[t \operatorname{ch}(x-t)]_{t=0}^{t=1} + \int_0^1 \operatorname{ch}(x-t) dt - [(2-t) \operatorname{ch}(x-t)]_{t=1}^{t=2} - \int_1^2 \operatorname{ch}(x-t) dt \\ &= -[\operatorname{sh}(x-t)]_{t=0}^{t=1} + [\operatorname{sh}(x-t)]_{t=1}^{t=2} \\ &= \operatorname{sh}(x) - 2 \operatorname{sh}(x-1) + \operatorname{sh}(x-2) \end{aligned}$$