

DEVOIR À LA MAISON N° 1 : CORRIGÉ

Problème 1 — D'après Bac C 1993

Partie I – Étude et courbe représentative de f

1. a. f est dérivable sur \mathbb{R}_+^* car \ln et $x \mapsto \sqrt{x}$ le sont et car $x \mapsto \sqrt{x}$ ne s'annule pas sur \mathbb{R}_+^* .
- b. Un calcul rapide fournit

$$\forall x \in \mathbb{R}_+^*, f'(x) = \frac{2 - \ln x}{2x\sqrt{x}}$$

On en déduit que f est strictement croissante sur $]0, e^2]$ et strictement décroissante sur $[e^2, +\infty[$.

- c. On sait que $\lim_{x \rightarrow 0^+} \ln x = -\infty$ et $\lim_{x \rightarrow 0^+} \sqrt{x} = 0^+$ donc, par opérations,

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = -\infty$$

Pour tout $x \in \mathbb{R}_+^*$,

$$f(x) = \frac{2 \ln(\sqrt{x})}{\sqrt{x}}$$

Puisque $X = \sqrt{x} \xrightarrow{x \rightarrow +\infty} +\infty$ et que $\frac{\ln X}{X} \xrightarrow{X \rightarrow +\infty} 0$,

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 0$$

2. a. Puisque $f(1) = 0$ et $f'(1) = 1$, \mathcal{T} admet pour équation $y = x - 1$.
- b. Tout d'abord, g est dérivable sur \mathbb{R}_+^* comme différence de deux fonctions dérivables sur cet intervalle. De plus,

$$\forall x \in \mathbb{R}_+^*, g'(x) = \frac{2 - \ln x - 2x\sqrt{x}}{2x\sqrt{x}}$$


En particulier, pour tout $x \in \mathbb{R}_+^*$, $g'(x)$ est du signe de $2 - \ln x - 2x\sqrt{x}$. Or $x \mapsto 2 - \ln x - 2x\sqrt{x}$ est strictement décroissante sur \mathbb{R}_+^* et s'annule en 1 donc, g' est strictement positive sur $]0, 1]$ et strictement négative sur $[1, +\infty[$.

- c. Il s'ensuit que g est strictement croissante sur $]0, 1]$ et strictement décroissante sur $[1, +\infty[$. Puisque $g(1) = 0$, g est négative sur \mathbb{R}_+^* et ne s'annule qu'en 1.

On en déduit que \mathcal{C} est au-dessous de \mathcal{T} et que \mathcal{C} et \mathcal{T} ne s'intersectent qu'au point de coordonnées $(1, 0)$.

3. Puisque $f'(e^2) = 0$, \mathcal{C} admet une tangente horizontale en le point de coordonnées $(e^2, \frac{2}{e})$.

La question I.1.c montre que \mathcal{C} admet pour asymptotes les axes de coordonnées.



Partie II – Étude de deux suites

1. a. On a vu à la question **I.1.b** que f était décroissante sur $[e^2, +\infty[$. Or $e^2 \leq 8$ donc f est décroissante sur $[8, +\infty[$. En particulier, f est décroissante sur $[k, k+1]$ puisque $k \geq 8$. On en déduit que

$$\forall t \in [k, k+1], f(k+1) \leq f(t) \leq f(k)$$

En intégrant sur $[k, k+1]$, on obtient par croissance de l'intégrale :

$$f(k+1) \leq \int_k^{k+1} f(t) dt \leq f(k)$$

- b. Soit n un entier supérieur ou égal à 8. D'après la question précédente

$$\sum_{k=8}^n f(k+1) \leq \sum_{k=8}^n \int_k^{k+1} f(t) dt \leq \sum_{k=8}^n f(k)$$

La relation de Chasles pour les intégrales montre que

$$\sum_{k=8}^n \int_k^{k+1} f(t) dt = \int_8^{n+1} f(t) dt$$

et un changement d'indice montre que

$$\sum_{k=8}^n f(k+1) = \sum_{k=9}^{n+1} f(k) = u_{n+1} - f(8)$$

On obtient donc bien :

$$u_{n+1} - f(8) \leq \int_8^{n+1} f(t) dt \leq u_n$$

- c. Soit n un entier supérieur ou égal à 8. Puisque \ln et $t \mapsto \sqrt{t}$ sont de classe \mathcal{C}^1 sur $[8, n+1]$, une intégration par parties fournit

$$\begin{aligned} I_n &= \int_8^{n+1} f(t) dt \\ &= \left[2 \ln t \sqrt{t} \right]_8^{n+1} - \int_8^{n+1} \frac{2\sqrt{t}}{t} dt \\ &= 2 \ln(n+1) \sqrt{n+1} - 12 \ln(2) \sqrt{2} - \int_8^{n+1} \frac{2}{\sqrt{t}} dt \\ &= 2 \ln(n+1) \sqrt{n+1} - 12 \ln(2) \sqrt{2} - \left[4\sqrt{t} \right]_8^{n+1} dt \\ &= 2 \ln(n+1) \sqrt{n+1} - 4\sqrt{n+1} - 12 \ln(2) \sqrt{2} + 8\sqrt{2} \end{aligned}$$

- d. Remarquons que

$$I_n = \sqrt{n+1} (2 \ln(n+1) - 4) + 8\sqrt{2} - 12 \ln(2) \sqrt{2}$$

Par opérations, on en déduit que $\lim_{n \rightarrow +\infty} I_n = +\infty$. Puisque $I_n \leq u_n$ pour tout entier $n \geq 8$, le théorème de minoration permet d'affirmer que $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = +\infty$.

2. a. Les variations de f montrent que f est positive sur $[1, +\infty[$. Ainsi pour tout entier $n \geq 8$, $u_{n+1} - u_n = f(n+1) \geq 0$, ce qui prouve que (u_n) est croissante.
- b. On a vu à la question **II.1.b** que pour tout entier $n \geq 8$

$$u_{n+1} - f(8) \leq I_n \leq u_n$$

Puisque (u_n) est croissante, on a a fortiori pour tout entier $n \geq 8$

$$u_n - f(8) \leq I_n \leq u_n$$

ce qui équivaut à

$$0 \leq v_n \leq f(8)$$

La suite (v_n) est donc bien bornée.

c. Pour tout entier $n \geq 8$,

$$v_{n+1} - v_n = (u_{n+1} - u_n) - (I_{n+1} - I_n) = f(n+1) - \int_n^{n+1} f(t) dt$$

Or on a vu à la question **II.1.a** que pour tout entier $n \geq 8$

$$f(n+1) \leq \int_n^{n+1} f(t) dt \leq f(n)$$

donc $v_{n+1} - v_n \leq 0$, ce qui prouve que la suite (v_n) est décroissante. Puisqu'elle est bornée donc minorée d'après la question **II.2.b**, la suite (v_n) converge d'après le théorème de la limite monotone vers une limite $l \in \mathbb{R}$.

De plus, pour tout entier $n \geq 8$, $0 \leq v_n \leq f(8)$ donc $0 \leq l \leq f(8)$ par passage à la limite. On trouve que 0,735 est une valeur approchée de l à 10^{-3} près. A fortiori, $f(8) \leq 0,74$ et donc $0 \leq l \leq 0,74$.

SOLUTION 1.

1. Il existe $\binom{6}{2}$ issues possibles à ce tirage. La variable aléatoire X est à valeurs dans $\{0, 1, 2\}$.

► L'événement $X = 0$ correspond à tirer les deux boules parmi les quatre rouges. On en déduit que

$$P(X = 0) = \frac{\binom{4}{2}}{\binom{6}{2}} = \frac{2}{5}$$

► L'événement $X = 1$ correspond à tirer une boule parmi les deux noires et une boule parmi les quatre rouges. On en déduit que

$$P(X = 1) = \frac{\binom{2}{1} \binom{4}{1}}{\binom{6}{2}} = \frac{8}{15}$$

► L'événement $X = 2$ correspond à tirer les deux boules parmi les deux noires. On en déduit que

$$P(X = 2) = \frac{\binom{2}{2}}{\binom{6}{2}} = \frac{1}{15}$$

2. La variable aléatoire Y est encore à valeurs dans $\{0, 1, 2\}$. D'après la formule des probabilités totales,

$$P(Y = 0) = P(Y = 0|X = 0)P(X = 0) + P(Y = 0|X = 1)P(X = 1) + P(Y = 0|X = 2)P(X = 2)$$

$$\begin{aligned} &= \frac{\binom{2}{2}}{\binom{4}{2}} \times \frac{2}{5} + \frac{\binom{3}{2}}{\binom{4}{2}} \times \frac{8}{15} + 1 \times \frac{1}{15} \\ &= \frac{2}{5} \end{aligned}$$

$$P(Y = 1) = P(Y = 1|X = 0)P(X = 0) + P(Y = 1|X = 1)P(X = 1) + P(Y = 1|X = 2)P(X = 2)$$

$$\begin{aligned} &= \frac{\binom{2}{1} \binom{2}{1}}{\binom{4}{2}} \times \frac{2}{5} + \frac{\binom{3}{1} \binom{1}{1}}{\binom{4}{2}} \times \frac{8}{15} + 0 \times \frac{1}{15} \\ &= \frac{8}{15} \end{aligned}$$

$$P(Y = 2) = P(Y = 2|X = 0)P(X = 0) + P(Y = 2|X = 1)P(X = 1) + P(Y = 2|X = 2)P(X = 2)$$

$$\begin{aligned} &= \frac{\binom{2}{2}}{\binom{4}{2}} \times \frac{2}{5} + 0 \times \frac{8}{15} + 0 \times \frac{1}{15} \\ &= \frac{1}{15} \end{aligned}$$

3. On utilise la formule de Bayes

$$P(X = 1|Y = 1) = \frac{P(Y = 1|X = 1)P(X = 1)}{P(Y = 1)}$$

Or $P(Y = 1) = P(X = 1)$ et on a vu à la question précédente que

$$P(Y = 1|X = 1) = \frac{\binom{3}{1}\binom{1}{1}}{\binom{4}{2}} = \frac{1}{2}$$

Ainsi la probabilité d'avoir obtenu une seule boule noire au premier tirage sachant que l'on a tiré une seule boule noire au second tirage est $\frac{1}{5}$.

4. La probabilité recherchée est :

$$P(X = 1, Y = 1) + P(X = 0, Y = 2) = P(Y = 1|X = 1)P(X = 1) + P(Y = 2|X = 0)P(X = 0) = \frac{\binom{3}{1}\binom{1}{1}}{\binom{4}{2}} \times \frac{8}{15} + \frac{\binom{2}{2}}{\binom{4}{2}} \times \frac{2}{5} = \frac{1}{3}$$

SOLUTION 2.

1. Le discriminant de cette équation est $-\frac{9}{25} = \left(\frac{3i}{5}\right)^2$. On en déduit que les racines de l'équation sont

$$z_1 = \frac{1+3i}{10} \quad \text{et} \quad z_2 = \frac{1-3i}{10}$$

2. La fonction \tan est strictement croissante et continue sur $\left[0, \frac{\pi}{2}\right[$. De plus, $\tan(0) = 0$ et $\lim_{\frac{\pi}{2}-} = +\infty$ donc le théorème des valeurs intermédiaires justifie l'existence d'un unique réel $\theta \in \left[0, \frac{\pi}{2}\right[$ tel que $\tan \theta = 3$.

3.

$$\begin{aligned} \frac{\cos \theta + i \sin \theta}{10 \cos \theta} &= \frac{1}{10} + \frac{i \tan \theta}{10} = z_1 \\ \frac{\cos \theta - i \sin \theta}{10 \cos \theta} &= \frac{1}{10} - \frac{i \tan \theta}{10} = z_2 \end{aligned}$$

4. On peut aussi écrire

$$z_1 = \frac{e^{i\theta}}{10 \cos \theta} \quad \text{et} \quad z_2 = \frac{e^{-i\theta}}{10 \cos \theta}$$

de sorte que pour tout $n \in \mathbb{N}$

$$v_n = \frac{e^{in\theta}}{10^n \cos^n \theta} + \frac{e^{-in\theta}}{10^n \cos^n \theta} = \frac{2 \cos(n\theta)}{10^n \cos^n \theta}$$

en utilisant une relation d'Euler. Ceci prouve bien que v_n est un nombre réel.

5. On sait que $\frac{1}{\cos^2 \theta} = 1 + \tan^2 \theta = 10$ donc $\cos^2 \theta = \frac{1}{10}$. Puisque $\theta \in \left[0, \frac{\pi}{2}\right[$, $\cos \theta \geq 0$ de sorte que $\cos \theta = \frac{1}{\sqrt{10}}$ ou encore $10 \cos \theta = \sqrt{10}$. On en déduit que pour tout $n \in \mathbb{N}$

$$v_n = \frac{2 \cos(n\theta)}{\sqrt{10}^n}$$

Par conséquent, pour tout $n \in \mathbb{N}$.

$$|v_n| \leq \frac{2}{\sqrt{10}^n}$$

Puisque $\sqrt{10} > 1$, $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{2}{\sqrt{10}^n} = 0$. Le théorème des gendarmes garantit alors la convergence de la suite (v_n) vers 0.