

RÉDUCTION GÉOMÉTRIQUE

Dans tout ce chapitre, \mathbb{K} désigne un corps qui en pratique sera \mathbb{R} ou \mathbb{C} .

1 Rappels

1.1 Matrices semblables

Définition 1.1 Matrices semblables

Soient A et B deux matrices de $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$. On dit que B est **semblable** à A si et seulement si il existe $P \in GL_n(\mathbb{K})$ telle que $B = P^{-1}AP$.

Proposition 1.1

La relation de similitude («être semblable à») est une relation d'équivalence.

REMARQUE. Si deux matrices sont semblables, l'une est inversible si et seulement si l'autre l'est.

REMARQUE. Si A et B sont semblables, alors A^n et B^n sont semblables pour tout $n \in \mathbb{N}$ (pour tout $n \in \mathbb{Z}$ si A est inversible). Plus précisément, s'il existe une matrice inversible P telle que $B = P^{-1}AP$, alors $B^n = P^{-1}A^nP$ pour tout $n \in \mathbb{N}$ (pour tout $n \in \mathbb{Z}$ si A est inversible).

1.2 Sous-espaces stables

Définition 1.2 Sous-espace stable

Soient u un endomorphisme d'un \mathbb{K} -espace vectoriel E et F un sous-espace vectoriel de E . On dit que F est stable par u si $u(F) \subset F$.

REMARQUE. Si F est un sous-espace stable par $u \in \mathcal{L}(E)$, alors u induit un endomorphisme de F .

Exercice 1.1

Soient u et v deux endomorphismes d'un \mathbb{K} -espace vectoriel E qui commutent i.e. $u \circ v = v \circ u$. Montrer que si F est un sous-espace vectoriel de E stable par u , alors $v(F)$ est également stable par u .

Définition 1.3 Base adaptée à un sous-espace vectoriel

Soient E un espace vectoriel de dimension finie et F un sous-espace vectoriel de E . On dit qu'une base de E est adaptée à F si ses premiers éléments forment une base de F .

Proposition 1.2 Matrice et stabilité

Soient u un endomorphisme d'un \mathbb{K} -espace vectoriel de dimension finie et F un sous-espace vectoriel de E . Une base \mathcal{B} de E est adaptée à F si et seulement si la matrice de u dans \mathcal{B} est triangulaire par blocs. Plus précisément, en notant $n = \dim E$ et $p = \dim F$, il existe $A \in \mathcal{M}_p(\mathbb{K})$, $B \in \mathcal{M}_{p, n-p}(\mathbb{K})$ et $C \in \mathcal{M}_{n-p}(\mathbb{K})$ telles que $\text{mat}_{\mathcal{B}}(u) = \left(\begin{array}{c|c} A & B \\ \hline 0 & C \end{array} \right)$.

1.3 Endomorphismes nilpotents et matrices nilpotentes**Définition 1.4 Endomorphisme nilpotent**

Soit u un endomorphisme d'un espace vectoriel. On dit que u est **nilpotent** s'il existe $p \in \mathbb{N}^*$ tel que $u^p = 0$. Le plus petit entier $p \in \mathbb{N}^*$ tel que $u^p = 0$ est appelé l'**indice de nilpotence** de u .

Définition 1.5 Matrice nilpotente

Soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$. On dit que A est **nilpotente** s'il existe $p \in \mathbb{N}^*$ tel que $A^p = 0$. Le plus petit entier $p \in \mathbb{N}^*$ tel que $A^p = 0$ est appelé l'**indice de nilpotence** de A .

Exemple 1.1

Toute matrice triangulaire stricte est nilpotente d'indice de nilpotence inférieure ou égale à sa taille.

Exemple 1.2

Soit $J = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & \dots & 0 \\ \vdots & \ddots & \ddots & \ddots & \vdots \\ \vdots & & \ddots & \ddots & 0 \\ \vdots & & & \ddots & 1 \\ 0 & \dots & \dots & \dots & 0 \end{pmatrix} \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$. Alors J est nilpotente d'indice n .

Proposition 1.3 Majoration de l'indice de nilpotence

- (i) L'indice de nilpotence d'un endomorphisme d'un espace vectoriel E de dimension finie est inférieur ou égal à $\dim E$.
- (ii) L'indice de nilpotence d'une matrice nilpotente de $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ est inférieur ou égal à n .

2 Éléments propres d'un endomorphisme ou d'une matrice carrée**2.1 Valeur propre, vecteur propre, sous-espace propre d'un endomorphisme****Proposition 2.1**

Soient u un endomorphisme d'un \mathbb{K} -espace vectoriel E et $x \in E$. La droite $\text{vect}(x)$ est stable par u si et seulement si il existe $\lambda \in \mathbb{K}$ tel que $u(x) = \lambda x$.

Définition 2.1 Valeur propre et vecteur propre d'un endomorphisme

Soit u un endomorphisme d'un \mathbb{K} -espace vectoriel E .

- On dit qu'un vecteur **non nul** $x \in E$ est un **vecteur propre** de u s'il existe $\lambda \in \mathbb{K}$ tel que $u(x) = \lambda x$.
- On dit qu'un scalaire $\lambda \in \mathbb{K}$ est une **valeur propre** de u s'il existe $x \in E$ **non nul** tel que $u(x) = \lambda x$.

Dans chacun de ces deux cas, on dit que x est un vecteur propre associé à la valeur propre λ .

REMARQUE. Un vecteur propre est forcément **non nul**.

Exemple 2.1

0 est une valeur propre d'un endomorphisme u si et seulement si celui-ci est non injectif.

Exemple 2.2

Soit D l'endomorphisme de $\mathcal{C}^\infty(\mathbb{R})$ qui à une application associe sa dérivée. Pour tout $\lambda \in \mathbb{R}$, l'application $x \mapsto e^{\lambda x}$ est un vecteur propre de D associé à la valeur propre λ .

Exemple 2.3

Si x est un vecteur propre de u associé à la valeur propre λ , alors x est également un vecteur propre de u^n associé à la valeur propre λ^n pour tout $n \in \mathbb{N}$ (et pour tout $n \in \mathbb{Z}$ si u est un automorphisme).

Exemple 2.4

L'unique valeur propre d'un endomorphisme nilpotent est 0.

Définition 2.2 Spectre d'un endomorphisme

Soit u un endomorphisme d'un espace vectoriel de **dimension finie**. On appelle **spectre** de u , noté $\text{Sp}(u)$, l'ensemble des valeurs propres de u .

REMARQUE. En dimension infinie, la définition est légèrement différente.

Définition 2.3 Sous-espace propre d'un endomorphisme

Soient u un endomorphisme d'un \mathbb{K} -espace vectoriel E et λ une valeur propre de u . Le sous-espace vectoriel $E_\lambda(u) = \text{Ker}(u - \lambda \text{Id}_E)$ est appelé **sous-espace propre** de u associé à la valeur propre λ . C'est l'ensemble des vecteurs propres associés à la valeur propre λ et du vecteur nul.

REMARQUE. Le sous-espace propre associé à la valeur propre 0 est le noyau.

REMARQUE. Si λ n'est pas une valeur propre de u , on peut convenir que $E_\lambda(u) = \{0_E\}$.

Exemple 2.5

Considérons l'endomorphisme T de $\mathbb{C}^{\mathbb{N}}$ qui à la suite (u_n) associe la suite (u_{n+2}) .
 Pour $\lambda \in \mathbb{C}^*$, $E_\lambda(T^2) = \text{vect}((\alpha^n), ((-\alpha)^n))$ où α est une racine carrée de λ .

Proposition 2.2

Soient u et v deux endomorphismes d'un même espace vectoriel qui commutent. Montrer que tout sous-espace propre de u est stable par v .

Méthode Déterminer les éléments propres d'un endomorphisme

Pour déterminer les éléments propres d'un endomorphisme u d'un \mathbb{K} -espace vectoriel E , on recherche les scalaires $\lambda \in \mathbb{K}$ tels que l'équation $u(x) = \lambda x$ possède des solutions non nulles. Lesdites solutions sont alors les vecteurs propres associés à la valeur propre λ .

Exercice 2.1 ★★

Soit φ l'endomorphisme de $\mathbb{K}[X]$ défini par $\varphi(P) = XP'$ pour tout $P \in \mathbb{K}[X]$. Déterminer les éléments propres de φ .

2.2 Valeur propre, vecteur propre, sous-espace propre d'une matrice carrée**Définition 2.4 Valeur propre et vecteur propre d'une matrice carrée**

Soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$.

- On dit qu'une matrice colonne **non nulle** $x \in \mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{K})$ est un **vecteur propre** de A s'il existe $\lambda \in \mathbb{K}$ tel que $AX = \lambda X$.
- On dit qu'un scalaire $\lambda \in \mathbb{K}$ est une **valeur propre** de A s'il existe $X \in \mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{K})$ non nulle tel que $AX = \lambda X$.

Dans chacun de ces deux cas, on dit que X est un vecteur propre associé à la valeur propre λ .

REMARQUE. Un vecteur propre est forcément **non nul**.

Exemple 2.6

0 est une valeur propre d'une matrice carrée si et seulement si elle est non inversible.

Exemple 2.7

Soit D une matrice diagonale de coefficients diagonaux $\lambda_1, \dots, \lambda_n$. En notant (E_1, \dots, E_n) la base canonique de $\mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{K})$, pour tout $k \in \llbracket 1, n \rrbracket$, E_k est un vecteur propre de D associé à la valeur propre λ_k .

Exemple 2.8

Si X est un vecteur propre de A associé à la valeur propre λ , alors c'est également un vecteur propre de A^n associé à la valeur propre λ^n pour tout $n \in \mathbb{N}$ (et pour tout $n \in \mathbb{Z}$ si A est inversible).

Exemple 2.9

L'unique valeur propre d'une matrice carrée nilpotente est 0.

Définition 2.5 Spectre d'une matrice carrée

Soit A une matrice carrée. On appelle **spectre** de A , noté $\text{Sp}(A)$, l'ensemble des valeurs propres de A .

Définition 2.6 Sous-espace propre d'une matrice carrée

Soient $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ et λ une valeur propre de A . Le sous-espace vectoriel $E_\lambda(A) = \text{Ker}(A - \lambda I_n)$ est appelé **sous-espace propre** de A associé à la valeur propre λ . C'est l'ensemble des vecteurs propres associés à la valeur propre λ et de la matrice colonne nulle.

REMARQUE. Le sous-espace propre associé à la valeur propre 0 est le noyau.

REMARQUE. Si λ n'est pas une valeur propre de A , on peut convenir que $E_\lambda(A) = \{0\}$.

Proposition 2.3 Lien entre les éléments propres d'un endomorphisme et d'une matrice

Soient u un endomorphisme d'un \mathbb{K} -espace vectoriel E de dimension finie et A sa matrice dans une base \mathcal{B} de E . Alors

- (i) $\text{Sp}(u) = \text{Sp}(A)$;
- (ii) $x \in E$ est un vecteur propre de u si et seulement si $\text{mat}_{\mathcal{B}}(x)$ est un vecteur propre de A ;
- (iii) Pour tout $\lambda \in \text{Sp}(u) = \text{Sp}(A)$, l'isomorphisme $\begin{cases} E & \longrightarrow \mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{K}) \\ x & \longmapsto \text{mat}_{\mathcal{B}}(x) \end{cases}$ induit un isomorphisme de $E_\lambda(u)$ sur $E_\lambda(A)$.

Proposition 2.4

Deux matrices semblables ont même spectre.



ATTENTION ! La réciproque est fausse. Par exemple, le spectre de $\begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$ et $\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$ est $\{0\}$ mais ces deux matrices ne sont évidemment pas semblables.

Proposition 2.5 Spectre et sous-corps

Si \mathbb{K} est un sous-corps d'un corps \mathbb{L} et si $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$, alors $\text{Sp}_{\mathbb{K}}(A) \subset \text{Sp}_{\mathbb{L}}(A)$.



ATTENTION ! L'inclusion peut être stricte. Par exemple, la matrice $A = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}$ peut être considérée comme une matrice de $\mathcal{M}_2(\mathbb{R})$ ou $\mathcal{M}_2(\mathbb{C})$. On peut vérifier que $\text{Sp}_{\mathbb{R}}(A) = \emptyset$ et que $\text{Sp}_{\mathbb{C}}(A) = \{-i, +i\}$.

2.3 Propriétés des sous-espaces propres

Proposition 2.6

La somme d'une famille finie de sous-espaces propres d'un endomorphisme ou d'une matrice carrée est directe.

Corollaire 2.1

Une famille de vecteurs propres d'un endomorphisme associés à des valeurs propres distinctes est libre.

Corollaire 2.2 Cardinal d'un spectre

Le spectre d'un endomorphisme d'un espace vectoriel de **dimension finie** n ou d'une matrice carrée de taille n est un ensemble **fini** de cardinal inférieur ou égal à n .

Proposition 2.7

Soient deux endomorphismes d'un même espace vectoriel qui commutent. Alors tout sous-espace propre de l'un est stable par l'autre.

2.4 Polynôme caractéristique

Définition 2.7 Polynôme caractéristique d'une matrice

Soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$. Le polynôme $\chi_A = \det(XI_n - A)$ de $\mathbb{K}[X]$ est appelé **polynôme caractéristique** de A .

Exemple 2.10

Le polynôme caractéristique de $\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}$ est $(X-1)(X-4) - 2 \times 3 = X^2 - 5X - 2$.

Exemple 2.11 Matrice compagnon

Soient $(a_0, \dots, a_{n-1}) \in \mathbb{K}^n$ et $A = \begin{pmatrix} 0 & \cdots & 0 & -a_0 \\ 1 & \ddots & \vdots & -a_1 \\ 0 & \ddots & \ddots & \vdots \\ \vdots & \ddots & \ddots & 0 & -a_{n-2} \\ 0 & \cdots & 0 & 1 & -a_{n-1} \end{pmatrix}$. Alors en développant par rapport à la dernière colonne,

$$\chi_A = X^n + \sum_{k=0}^{n-1} a_k X^k.$$

REMARQUE. Si $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$, alors $\chi_A = \chi_{A^T}$.

Proposition 2.8

Deux matrices semblables ont même polynôme caractéristique.



ATTENTION ! La réciproque est fausse. Par exemple, les matrices $\begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$ et $\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$ ont même polynôme caractéristique mais ne sont évidemment pas semblables.

Définition 2.8 Polynôme caractéristique d'un endomorphisme

Soit u un endomorphisme d'un espace vectoriel E de **dimension finie**. Le polynôme $\chi_u = \det(X \text{Id}_E - u)$ de $\mathbb{K}[X]$ est appelé **polynôme caractéristique** de u .

REMARQUE. Si $u \in \mathcal{L}(E)$ admet pour matrice M dans une base de E , alors $\chi_u = \chi_M$.

Méthode Déterminer le polynôme caractéristique d'un endomorphisme

Pour déterminer le polynôme caractéristique d'un endomorphisme d'un espace vectoriel de dimension finie, il suffit de déterminer la matrice de cet endomorphisme dans une base de E et de calculer le polynôme caractéristique de cette matrice.

Exemple 2.12

Soit r la rotation d'angle θ du plan euclidien orienté. La matrice de r dans une base orthonormée directe est $\begin{pmatrix} \cos \theta & -\sin \theta \\ \sin \theta & \cos \theta \end{pmatrix}$.
On en déduit que $\chi_r = (X - \cos \theta)^2 + \sin^2 \theta = X^2 - 2 \cos \theta + 1$.

Proposition 2.9 Spectre et polynôme caractéristique

- (i) Soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$. Alors $\text{Sp}(A)$ est l'ensemble des racines de χ_A .
- (ii) Soit u un endomorphisme d'un espace vectoriel E de **dimension finie**. Alors $\text{Sp}(u)$ est l'ensemble des racines de χ_u .



ATTENTION ! Le corps de base peut avoir son importance. Par exemple, si $A = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}$, alors $\chi_A = X^2 + 1$. Ainsi $\text{Sp}_{\mathbb{R}}(A) = \emptyset$ tandis que $\text{Sp}_{\mathbb{C}}(A) = \{-i, +i\}$.

Exemple 2.13

Toute matrice carrée réelle de taille impaire possède une valeur propre réelle.
De même, tout endomorphisme d'un \mathbb{R} -espace vectoriel de dimension impaire possède une valeur propre réelle.

Exemple 2.14

Si A est une matrice carrée **réelle**, les valeurs propres **complexes** de A sont conjuguées deux à deux.

REMARQUE. Si $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$, alors $\text{Sp}(A^T) = \text{Sp}(A)$. En effet, $\chi_A = \chi_{A^T}$.

Méthode Déterminer les éléments propres d'une matrice

Pour déterminer les éléments propres d'une matrice M , il suffit de

1. calculer χ_M ;
2. déterminer les racines de χ_M , ce qui fournit $\text{Sp}(M)$;
3. pour tout $\lambda \in \text{Sp}(M)$, résoudre l'équation $MX = \lambda X$, ce qui fournit $E_\lambda(M)$.

Méthode Déterminer les éléments propres d'un endomorphisme

Pour déterminer les éléments propres d'un endomorphisme u d'un espace vectoriel E de **dimension finie**, il suffit de

1. déterminer la matrice M de u dans une base $\mathcal{B} = (e_1, \dots, e_n)$ de E ;
2. déterminer les éléments propres de M .

On sait alors que $\text{Sp}(u) = \text{Sp}(M)$ et l'isomorphisme $\begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} \in \mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{K}) \mapsto \sum_{k=1}^n x_k e_k \in E$ permet de récupérer le sous-espace propre $E_\lambda(u)$ à partir du sous-espace propre $E_\lambda(M)$.

Exercice 2.2

Déterminer les éléments propres de l'endomorphisme φ de $\mathbb{R}_3[X]$ défini par $\varphi(P) = (X+1)P' - P$ pour tout $P \in \mathbb{R}_3[X]$.

Proposition 2.10 Degré et coefficients du polynôme caractéristique

- (i) Soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$. Alors χ_A est un polynôme unitaire de degré n . De plus, le coefficient constant de χ_A est $(-1)^n \det(A)$ et le coefficient du monôme de degré $n-1$ est $-\text{tr}(A)$.
- (ii) Soit u un endomorphisme d'un espace vectoriel E de **dimension finie**. Alors χ_u est un polynôme unitaire de degré n . De plus, le coefficient constant de χ_u est $(-1)^n \det(u)$ et le coefficient du monôme de degré $n-1$ est $-\text{tr}(u)$.

Exemple 2.15

Soit u un endomorphisme d'un espace vectoriel de dimension finie. Alors u est un automorphisme si et seulement si $\chi_u(0) \neq 0$ i.e. si et seulement si le coefficient constant de χ_u est non nul.

On en déduit que dans ce cas, il existe un polynôme P tel que $u^{-1} = P(u)$. Plus précisément, $P = \frac{\chi_u(0) - \chi_u}{\chi_u(0)X}$.

Exemple 2.16

Soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$. Alors A est inversible si et seulement si $\chi_A(0) \neq 0$ i.e. si et seulement si le coefficient constant de χ_A est non nul.

On en déduit que dans ce cas, il existe un polynôme P tel que $A^{-1} = P(A)$. Plus précisément, $P = \frac{\chi_A(0) - \chi_A}{\chi_A(0)X}$.

Exemple 2.17

Si $A \in \mathcal{M}_2(\mathbb{K})$, alors $\chi_A = X^2 - \text{tr}(A)X + \det(A)$.

Proposition 2.11 Polynôme caractéristique d'une matrice triangulaire

Soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ une matrice triangulaire de coefficients diagonaux $\lambda_1, \dots, \lambda_n$. Alors $\chi_A = \prod_{k=1}^n (X - \lambda_k)$.

REMARQUE. C'est a fortiori vrai pour les matrices diagonales.

REMARQUE. On peut montrer que le polynôme caractéristique d'une matrice triangulaire par blocs est le produit des polynômes caractéristiques des blocs triangulaires.

Proposition 2.12 Polynôme caractéristique d'un endomorphisme induit

Soient u un endomorphisme d'un espace vectoriel de dimension finie et F un sous-espace vectoriel de E stable par u . Si on note $u|_F$ l'endomorphisme de F induit par u , alors $\chi_{u|_F}$ divise χ_u .

Définition 2.9 Multiplicité d'une valeur propre

- (i) Soient u un endomorphisme d'un espace vectoriel de dimension finie et λ une valeur propre de u . On appelle **multiplicité** de la valeur propre λ , notée $m_\lambda(u)$, la multiplicité de λ en tant que racine du polynôme caractéristique χ_u .
- (ii) Soient $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ et $\lambda \in \mathbb{K}$ une valeur propre de A . On appelle **multiplicité** de la valeur propre λ , notée $m_\lambda(A)$, la multiplicité de λ en tant que racine du polynôme caractéristique χ_A .

REMARQUE. On peut convenir qu'une valeur propre de multiplicité nulle n'est tout simplement pas une valeur propre.

REMARQUE. Si $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$, alors $\sum_{\lambda \in \text{Sp}(A)} m_\lambda(A) = n$.

De même, si u est un endomorphisme d'un \mathbb{C} -espace vectoriel E de dimension finie, alors $\sum_{\lambda \in \text{Sp}(u)} m_\lambda(u) = \dim E$.

Proposition 2.13

- (i) Soit $u \in \mathcal{L}(E)$. Pour tout $\lambda \in \text{Sp}(u)$, $1 \leq \dim E_\lambda(u) \leq m_\lambda(u)$.
- (ii) Soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$. Pour tout $\lambda \in \text{Sp}(A)$, $1 \leq \dim E_\lambda(A) \leq m_\lambda(A)$.

3 Diagonalisabilité

3.1 Endomorphisme diagonalisable

Définition 3.1 Endomorphisme diagonalisable

Un endomorphisme u d'un espace vectoriel E de **dimension finie** est dit **diagonalisable** s'il existe une base de E dans laquelle la matrice de u est diagonale.

Dans ce cas, les coefficients diagonaux de cette matrice sont les valeurs propres de u , chaque valeur propre apparaissant autant de fois que sa multiplicité dans χ_u .

Exemple 3.1

Une homothétie, un projecteur ou une symétrie d'un espace vectoriel de dimension finie sont diagonalisables.



ATTENTION ! La diagonalisabilité peut dépendre du corps de base. L'endomorphisme $\begin{cases} \mathbb{C} & \longrightarrow & \mathbb{C} \\ z & \longmapsto & iz \end{cases}$ est diagonalisable en tant qu'endomorphisme du \mathbb{C} -espace vectoriel \mathbb{C} mais ne l'est pas en tant qu'endomorphisme du \mathbb{R} -espace vectoriel \mathbb{C} .

Exemple 3.2

Si u est un endomorphisme diagonalisable d'un espace vectoriel E de dimension finie possédant une unique valeur propre λ , alors $u = \lambda \text{Id}_E$.

Proposition 3.1

Un endomorphisme u d'un espace vectoriel E de **dimension finie** est diagonalisable si et seulement si il existe une base de E formée de vecteurs propres de u .

Proposition 3.2 Diagonalisabilité et sous-espaces propres

Un endomorphisme u d'un espace vectoriel E de **dimension finie** est diagonalisable si et seulement si une des conditions équivalentes suivantes est réalisée :

- (i) $E = \bigoplus_{\lambda \in \text{Sp}(u)} E_\lambda(u)$;
- (ii) $\sum_{\lambda \in \text{Sp}(u)} \dim E_\lambda(u) = \dim E$;
- (iii) χ_u est scindé et pour tout $\lambda \in \text{Sp}(u)$, $\dim E_\lambda(u) = m_\lambda(u)$.

Exercice 3.1

Soient u et v deux endomorphismes d'un espace vectoriel de dimension finie. On suppose u diagonalisable. Montrer que u et v commutent si et seulement si tout sous-espace propre de u est stable par v .

Proposition 3.3

Un endomorphisme u d'un espace vectoriel E de **dimension finie** $n \in \mathbb{N}^*$ est diagonalisable si une des deux conditions équivalentes suivantes est réalisée :

- (i) u possède n valeurs propres distinctes ;
- (ii) χ_u est scindé à racines simples.



ATTENTION ! Il s'agit d'une condition suffisante mais pas nécessaire. Par exemple, si E est un \mathbb{K} -espace vectoriel de dimension finie supérieure ou égale à 2, alors pour tout $\lambda \in \mathbb{K}$, λId_E est diagonalisable mais possède λ comme unique valeur propre et son polynôme caractéristique $(X - \lambda)^n$ admet λ comme racine de multiplicité n .

Exemple 3.3

La matrice de l'endomorphisme u de $\mathbb{K}_n[X]$ défini par $u(P) = XP' - P''$ est triangulaire supérieure et ses coefficients diagonaux sont $0, 1, \dots, n$. Son polynôme caractéristique est $\prod_{k=0}^n (X - k)$ qui est scindé à racines simples. Ainsi u est diagonalisable.

Décomposition spectrale

Soit u un endomorphisme diagonalisable d'un espace vectoriel E de dimension finie. Notons $(p_\lambda)_{\lambda \in \text{Sp}(u)}$ la famille de projecteurs associée à la décomposition en somme directe $E = \bigoplus_{\lambda \in \text{Sp}(u)} E_\lambda(u)$. Alors $u = \sum_{\lambda \in \text{Sp}(u)} \lambda p_\lambda$. Cette écriture s'appelle la décomposition spectrale de u .

3.2 Matrice diagonalisable**Définition 3.2 Matrice diagonalisable**

On dit qu'une matrice $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ est **diagonalisable** si elle est semblable à une matrice diagonale. Dans ce cas, les coefficients diagonaux de cette matrice diagonale sont les valeurs propres de A , chaque valeur propre apparaissant autant de fois que sa multiplicité dans χ_A .

Proposition 3.4

Une matrice $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ est diagonalisable si et seulement si l'endomorphisme de \mathbb{K}^n qui lui est canoniquement associé est diagonalisable.



ATTENTION ! La diagonalisabilité peut dépendre du corps de base. Par exemple, $\begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$ est diagonalisable en tant que matrice de $\mathcal{M}_2(\mathbb{C})$ mais ne l'est pas en tant que matrice de $\mathcal{M}_2(\mathbb{R})$.

Proposition 3.5

Une matrice $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ est diagonalisable si et seulement si il existe une base de $\mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{K})$ formée de vecteurs propres de A .

Proposition 3.6 Diagonalisabilité et sous-espace propre

Une matrice $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ est diagonalisable si et seulement si une des conditions équivalentes suivantes est réalisée :

- (i) $\mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{K}) = \sum_{\lambda \in \text{Sp}(A)} E_\lambda(A)$;
- (ii) $\sum_{\lambda \in \text{Sp}(A)} \dim E_\lambda(A) = n$;
- (iii) χ_A est scindé et pour tout $\lambda \in \text{Sp}(A)$, $\dim E_\lambda(A) = m_\lambda(A)$.

Proposition 3.7

Une matrice $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ est diagonalisable **si** une des deux conditions équivalentes suivantes est réalisée :

- (i) A possède n valeurs propres distinctes ;
- (ii) χ_A est scindé à racines simples.



ATTENTION ! Il s'agit d'une condition suffisante mais pas nécessaire. Par exemple, si $n \geq 2$, alors pour tout $\lambda \in \mathbb{K}$, λI_n est diagonalisable mais possède λ comme unique valeur propre et son polynôme caractéristique $(X - \lambda)^n$ admet λ comme racine de multiplicité n .

Méthode Diagonalisation d'une matrice

Diagonaliser une matrice diagonalisable A consiste à trouver une matrice diagonale D et une matrice inversible P telles que $A = PDP^{-1}$. La marche à suivre est la suivante.

1. Déterminer les valeurs propres de A et des bases des sous-espaces propres associés.
2. Former la matrice P dont les colonnes sont les vecteurs des bases des différents sous-espaces propres.
3. Former la matrice diagonale D constituée des valeurs propres de A , chaque colonne de D contenant la valeur propre associée à la colonne correspondante de P .

Exemple 3.4

Considérons la matrice

$$A = \begin{pmatrix} -32 & -2 & 14 & -21 & 92 & -69 \\ 6 & 3 & 6 & -32 & 2 & 28 \\ 36 & 12 & 35 & -184 & 8 & 164 \\ 3 & 2 & 8 & -36 & 12 & 23 \\ -15 & -2 & 0 & 17 & 29 & -43 \\ 3 & 0 & -2 & 5 & -10 & 6 \end{pmatrix}$$

On trouve $\chi_A = X^6 - 5X^5 + 2X^4 + 10X^3 - 7X^2 - 5X + 4$. On en déduit que $\text{Sp}(A) = \{4, -1, 1\}$. On trouve successivement

$$E_4(A) = \text{vect} \left(\begin{pmatrix} 9 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \\ 3 \\ -1 \end{pmatrix} \right) \quad E_{-1}(A) = \text{vect} \left(\begin{pmatrix} 10 \\ 0 \\ -1 \\ 1 \\ 3 \\ -1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 10 \\ 59 \\ 11 \\ -7 \\ -1 \end{pmatrix} \right) \quad E_1(A) = \text{vect} \left(\begin{pmatrix} 5 \\ 0 \\ 0 \\ 2 \\ 3 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 10 \\ -1 \\ -4 \\ -3 \end{pmatrix} \right)$$

On en déduit que $A = PDP^{-1}$ avec

$$D = \begin{pmatrix} 4 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \quad P = \begin{pmatrix} 9 & 10 & 0 & 5 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 10 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & 59 & 0 & 0 & 10 \\ 1 & 1 & 11 & 2 & 1 & -1 \\ 3 & 3 & -7 & 3 & 1 & -4 \\ -1 & -1 & -1 & 1 & 1 & -3 \end{pmatrix}$$

Calcul de puissance

Si A est une matrice carrée diagonalisable, alors il existe une matrice D diagonale et une matrice P inversible telles que $A = PDP^{-1}$. On a alors $A^n = PD^nP^{-1}$ pour tout $n \in \mathbb{N}$ (et même pour tout $n \in \mathbb{Z}$ si A est inversible). Puisque D est diagonale, le calcul de ses puissances est aisé.

Exercice 3.2 Commutant

Soit M une matrice diagonalisable dont toutes les valeurs propres sont distinctes deux à deux. Déterminer le commutant de M , c'est-à-dire l'ensemble des matrices commutant avec M .

4 Trigonalisabilité

4.1 Endomorphisme trigonalisable

Définition 4.1 Endomorphisme trigonalisable

Un endomorphisme u d'un espace vectoriel E de **dimension finie** est dit **trigonalisable** s'il existe une base de E dans laquelle la matrice de u est triangulaire supérieure.

Dans ce cas, les coefficients diagonaux de cette matrice sont les valeurs propres de u , chaque valeur propre apparaissant autant de fois que sa multiplicité dans χ_u .

REMARQUE. On a une définition équivalente en remplaçant «triangulaire supérieure» par «triangulaire inférieure» (il suffit d'inverser l'ordre des vecteurs de la base).

REMARQUE. Un endomorphisme diagonalisable est a fortiori trigonalisable.

Proposition 4.1 Trigonalisabilité, déterminant et trace

Soit u un endomorphisme trigonalisable d'un espace vectoriel de dimension finie. Alors

$$\operatorname{tr}(u) = \sum_{\lambda \in \operatorname{Sp}(u)} m_{\lambda}(u) \lambda \qquad \det(u) = \prod_{\lambda \in \operatorname{Sp}(u)} \lambda^{m_{\lambda}(u)}$$

Autrement dit, la trace et le déterminant sont respectivement la somme et le produit des valeurs propres **comptées** avec multiplicité.

REMARQUE. C'est a fortiori vrai pour les endomorphismes diagonalisables.

Proposition 4.2 Trigonalisabilité et polynôme caractéristique

Soit u un endomorphisme d'un espace vectoriel de dimension finie. Alors u est trigonalisable si et seulement si χ_u est scindé.



ATTENTION ! La trigonalisabilité peut donc dépendre du corps de base.

Corollaire 4.1

Tout endomorphisme d'un \mathbb{C} -espace vectoriel de dimension finie est trigonalisable.

4.2 Matrice trigonalisable

Définition 4.2 Matrice trigonalisable

On dit qu'une matrice $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ est **trigonalisable** si elle est semblable à une matrice triangulaire supérieure. Dans ce cas, les coefficients diagonaux de cette matrice triangulaire supérieure sont les valeurs propres de A , chaque valeur propre apparaissant autant de fois que sa multiplicité dans χ_A .

REMARQUE. Une matrice diagonalisable est a fortiori trigonalisable.

Proposition 4.3

Une matrice $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ est trigonalisable si et seulement si l'endomorphisme de \mathbb{K}^n qui lui est canoniquement associé est trigonalisable.

Proposition 4.4 Trigonalisabilité, déterminant et trace

Soit A une matrice carrée trigonalisable. Alors

$$\operatorname{tr}(A) = \sum_{\lambda \in \operatorname{Sp}(A)} m_{\lambda}(A) \lambda \qquad \det(A) = \prod_{\lambda \in \operatorname{Sp}(A)} \lambda^{\mu_{\lambda}(A)}$$

Autrement dit, la trace et le déterminant sont respectivement la somme et le produit des valeurs propres **comptées** avec multiplicité.

REMARQUE. C'est a fortiori vrai pour les matrices diagonalisables.

Proposition 4.5 Trigonalisabilité et polynôme caractéristique

Soit A une matrice carrée. Alors A est trigonalisable si et seulement si χ_A est scindé.



ATTENTION ! La trigonalisabilité peut donc dépendre du corps de base.

Corollaire 4.2

Toute matrice de $\mathcal{M}_n(\mathbb{C})$ est trigonalisable.

Méthode Trigonalisation d'une matrice

Il s'agit essentiellement de remarquer que si $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ admet pour polynôme caractéristique $\chi_A = \prod_{\lambda \in \operatorname{Sp}(A)} (X - \lambda)^{m_{\lambda}(A)}$ alors

- $\mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{K}) = \bigoplus_{\lambda \in \operatorname{Sp}(A)} \operatorname{Ker}(A - \lambda I_n)^{m_{\lambda}(A)}$ d'après le lemme des noyaux (cf. plus loin);
- la suite $(\operatorname{Ker}(A - \lambda I_n)^k)$ est croissante pour l'inclusion.

L'algorithme suivant fournit alors une matrice $P \in \operatorname{GL}_n(\mathbb{K})$ et une matrice $T \in \mathcal{T}_n^+(\mathbb{K})$ telles que $A = PTP^{-1}$.

On remarque que T peut alors s'écrire $T = D + T'$ avec D diagonale et T' triangulaire stricte et que D et T' **commutent**.

Algorithme 1 Trigonalisation d'une matrice**Données :** Une matrice $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ trigonalisable**Résultat :** Une matrice $P \in GL_n(\mathbb{K})$ et une matrice $T \in \mathcal{T}_n^+(\mathbb{K})$ telles que $A = PTP^{-1}$.Déterminer $\text{Sp}(A)$ **Pour** $\lambda \in \text{Sp}(A)$ **Faire**Déterminer une base \mathcal{B}_λ de $E_\lambda(A) = \text{Ker}(A - \lambda I_n)$ $k \leftarrow 1$ **Tant que** $\dim \text{Ker}(A - \lambda I_n)^k < m_\lambda(A)$ **Faire**Ajouter des vecteurs à \mathcal{B}_λ la transformer en une base de $\text{Ker}(A - \lambda I_n)^k$ $k \leftarrow k + 1$ **Fin Tant que****Fin Pour**Poser $\mathcal{B} = \bigcup_{\lambda \in \text{Sp}(A)} \mathcal{B}_\lambda$ Former la matrice P dont les colonnes sont les vecteurs de \mathcal{B} Former la matrice T dont les colonnes sont constituées des coordonnées dans la base \mathcal{B} des produits de A par les vecteurs de \mathcal{B} **Exemple 4.1**

Soit $A = \begin{pmatrix} -1 & -3 & -1 \\ -1 & 1 & 1 \\ -2 & -3 & 0 \end{pmatrix}$. On trouve $\chi_A = (X + 2)(X - 1)^2$. On calcule ensuite

$$\text{Ker}(A - 2I_3) = \text{vect}(C_1)$$

$$\text{Ker}(A + I_3) = \text{vect}(C_2)$$

$$\text{Ker}(A + I_3)^2 = \text{vect}(C_2, C_3)$$

avec

$$C_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$

$$C_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix}$$

$$C_3 = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$

On a alors

$$AC_1 = -2C_1$$

$$AC_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix} = C_2$$

$$AC_3 = \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} = -C_2 + C_3$$

On en déduit qu'en posant $T = \begin{pmatrix} -2 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$ et $P = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$, on a $A = PTP^{-1}$.

Exemple 4.2

Soit $A = \begin{pmatrix} -1 & 0 & -1 \\ 2 & -3 & -5 \\ -1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$. On trouve $\chi_A = (X + 1)^3$ de sorte que $\text{Sp}(A) = \{-1\}$. On calcule ensuite

$$\text{Ker}(A + I_3) = \text{vect}(C_1)$$

$$\text{Ker}(A + I_3)^2 = \text{vect}(C_1, C_2)$$

$$\text{Ker}(A + I_3)^3 = \text{vect}(C_1, C_2, C_3)$$

avec

$$C_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$C_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 2 \\ -1 \end{pmatrix}$$

$$C_3 = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$

On a alors

$$AC_1 = -C_1$$

$$AC_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix} = C_1 - C_2$$

$$AC_3 = \begin{pmatrix} -1 \\ -5 \\ 1 \end{pmatrix} = -C_1 - 2C_2 - C_3$$

On en déduit qu'en posant $T = \begin{pmatrix} -1 & 1 & -1 \\ 0 & -1 & -2 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}$ et $P = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & 2 & 0 \\ 0 & -1 & 1 \end{pmatrix}$, on a $A = PTP^{-1}$.

Proposition 4.6 Trigonalisabilité et nilpotence

- (i) Un endomorphisme d'un espace vectoriel de dimension finie est nilpotent si et seulement si il est trigonalisable et admet 0 comme unique valeur propre.
- (ii) Une matrice carrée est nilpotente si et seulement si elle est trigonalisable et admet 0 comme unique valeur propre.

REMARQUE. Un endomorphisme nilpotent est nilpotent si et seulement si il existe une base dans laquelle sa matrice est triangulaire stricte.

Une matrice est nilpotente si et seulement si elle est semblable à une matrice triangulaire stricte.

Exemple 4.3

Une matrice nilpotente et diagonalisable est nulle.