

DEVOIR À LA MAISON N°15

- Le devoir devra être rédigé sur des copies *doubles*.
- Les copies ne devront comporter ni rature, ni renvoi, ni trace d'effaceur.
- Toute copie ne satisfaisant pas à ces exigences devra être intégralement réécrite.

Problème 1

Partie I – Polynômes de Bernoulli

On admet l'existence et l'unicité d'une suite de polynômes $(B_n)_{n \in \mathbb{N}}$ de $\mathbb{R}[X]$ vérifiant les trois conditions suivantes :

$$B_0 = 1 \qquad \forall n \in \mathbb{N}^*, B'_n = B_{n-1} \qquad \forall n \in \mathbb{N}^*, \int_0^1 B_n(t) dt = 0$$

On pose également $b_n = B_n(0)$ pour tout $n \in \mathbb{N}$.

1. Calculer B_1 et B_2 . En déduire b_1 et b_2 .
2. Montrer que pour tout entier $n \geq 2$, $B_n(0) = B_n(1)$.
3. On pose pour $n \in \mathbb{N}$, $A_n = (-1)^n B_n(1 - X)$. Montrer que la suite $(A_n)_{n \in \mathbb{N}}$ vérifie les trois mêmes conditions que celles définissant la suite $(B_n)_{n \in \mathbb{N}}$. En déduire que pour tout $n \in \mathbb{N}$, $B_n = (-1)^n B_n(1 - X)$.
4. Montrer que pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, $B_{2n+1}(0) = B_{2n+1}(1) = 0$.
5. A l'aide de la formule de Taylor, montrer que pour tout $n \in \mathbb{N}$, $B_n = \sum_{k=0}^n \frac{b_{n-k}}{k!} X^k$.

6. En déduire que

$$\forall n \in \mathbb{N}, b_{2n+2} = \sum_{k=0}^{2n+2} \frac{b_k}{(2n+2-k)!}$$

puis que

$$\forall n \in \mathbb{N}^*, b_{2n} = \frac{1}{(2n+1)!} - 2 \sum_{k=0}^{n-1} \frac{b_{2k}}{(2n+2-2k)!}$$

7. Calculer b_4 .

Partie II – Lemme de Riemann-Lebesgue et noyau de Dirichlet

8. Soit f une fonction de classe \mathcal{C}^1 sur $[0, 1]$. A l'aide d'une intégration par parties, montrer que

$$\lim_{\lambda \rightarrow +\infty} \int_0^1 f(t) \sin(\lambda t) dt = 0$$

9. Montrer que $\varphi : t \in]0, 1[\mapsto \frac{t(1-t)}{\sin(\pi t)}$ peut se prolonger en une fonction de classe \mathcal{C}^1 sur $[0, 1]$.

10. Soit $p \in \mathbb{N}^*$. Montrer que

$$\forall t \in]0, 1[, \sum_{k=1}^p \cos(2k\pi t) = \frac{\sin((2p+1)\pi t)}{2 \sin(\pi t)} - \frac{1}{2}$$

11. Soit $P \in \mathbb{R}[X]$ tel que $P(0) = P(1) = 0$. Montrer que

$$\lim_{p \rightarrow +\infty} \sum_{k=1}^p \int_0^1 P(t) \cos(2k\pi t) dt = -\frac{1}{2} \int_0^1 P(t) dt$$

Partie III – Fonction ζ de Riemann

On note pour tout réel $\alpha > 1$, $\zeta(\alpha) = \sum_{k=1}^{+\infty} \frac{1}{k^\alpha}$.

On pose pour $(k, n) \in (\mathbb{N}^*)^2$,

$$I_{k,n} = \int_0^1 B_{2n}(t) \cos(2k\pi t) dt$$

12. Calculer $I_{k,1}$.

13. Déterminer une relation entre $I_{k,n}$ et $I_{k,n-1}$ valide pour tout entier $n \geq 2$. En déduire que

$$\forall (k, n) \in (\mathbb{N}^*)^2, I_{k,n} = \frac{(-1)^{n-1}}{(2k\pi)^{2n}}$$

14. Montrer que pour tout $n \in \mathbb{N}^*$,

$$\zeta(2n) = \frac{(-1)^{n-1}}{2} \cdot (2\pi)^{2n} b_{2n}$$

15. Calculer $\zeta(2)$ et $\zeta(4)$.