

DEVOIR À LA MAISON N°04

- Le devoir devra être rédigé sur des copies *doubles*.
- Les copies ne devront comporter ni rature, ni renvoi, ni trace d'effaceur.
- Toute copie ne satisfaisant pas à ces exigences devra être intégralement réécrite.

Problème 1

1 Remarquons que pour tout $x \in [0, 1]$,

$$\frac{1 - (-1)^p x^{2p}}{1 + x^2} = \frac{1 - (-x^2)^p}{1 - (-x^2)} = \sum_{k=0}^{p-1} (-x^2)^k = \sum_{k=0}^{p-1} (-1)^k x^{2k}$$

En intégrant sur $[0, 1]$, on obtient par linéarité de l'intégrale

$$H_p = \sum_{k=0}^{p-1} (-1)^k \int_0^1 x^{2k} dx = \sum_{k=0}^{p-1} \frac{(-1)^k}{2k+1}$$

2

$$H_p = \int_0^1 \frac{dx}{1+x^2} - (-1)^p \int_0^1 \frac{x^{2p} dx}{1+x^2}$$

D'une part,

$$\int_0^1 \frac{dx}{1+x^2} = \arctan(1) - \arctan(0) = \frac{\pi}{4}$$

D'autre part,

$$\left| (-1)^p \int_0^1 \frac{x^{2p} dx}{1+x^2} \right| = \int_0^1 \frac{x^{2p} dx}{1+x^2} \leq \int_0^1 x^{2p} dx = \frac{1}{2p+1}$$

donc

$$\lim_{p \rightarrow +\infty} (-1)^p \int_0^1 \frac{x^{2p} dx}{1+x^2} = 0$$

Par conséquent,

$$\lim_{p \rightarrow +\infty} H_p = \frac{\pi}{4}$$

3 **3.a** I_0 est clairement défini. Supposons $n \neq 0$. La fonction $x \mapsto \frac{\sin(nx)}{\sin x}$ est continue sur $]0, \frac{\pi}{2}]$ et

$$\frac{\sin(nx)}{\sin(x)} \underset{x \rightarrow 0}{\sim} \frac{nx}{x} = n$$

donc $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin(nx)}{\sin(x)} = n$. La fonction $x \mapsto \frac{\sin(nx)}{\sin x}$ est donc prolongeable en une fonction continue sur $[0, \frac{\pi}{2}]$ de sorte que I_n est bien défini.

3.b Pour tout $x \in [0, \frac{\pi}{2}]$

$$\sin((2p+1)x) - \sin((2p-1)x) = 2 \sin(x) \cos(2px)$$

donc

$$I_{2p+1} - I_{2p-1} = 2 \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos(2px) dx = \frac{1}{p} [\sin(2px)]_0^{\frac{\pi}{2}} = 0$$

Ainsi pour tout $p \in \mathbb{N}$,

$$I_{2p+1} = I_1 = \frac{\pi}{2}$$

3.c De la même manière, pour tout $x \in \left[0, \frac{\pi}{2}\right]$

$$\sin(2px) - \sin((2p-2)x) = 2 \sin(x) \cos((2p-1)x)$$

donc

$$I_{2p} - I_{2p-2} = 2 \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos((2p-1)x) dx = \frac{2}{2p-1} [\sin((2p-1)x)]_0^{\frac{\pi}{2}} = \frac{2}{2p-1} (-1)^{p-1}$$

Par télescopage

$$I_{2p} = I_{2p} - I_0 = \sum_{k=1}^p I_{2k} - I_{2k-2} = \sum_{k=1}^p \frac{2}{2k-1} (-1)^{k-1} = 2 \sum_{k=0}^{p-1} \frac{(-1)^k}{2k+1} = 2H_p$$

Comme (H_p) converge vers $\frac{\pi}{4}$, (I_{2p}) converge vers $\frac{\pi}{2}$.

4 **4.a** Comme précédemment, $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin^2(nx)}{\sin^2(x)} = n^2$ donc $x \mapsto \frac{\sin^2(nx)}{\sin^2(x)}$ est prolongeable en une fonction continue sur $\left[0, \frac{\pi}{2}\right]$ de sorte que J_n est bien défini.

4.b Pour tout $x \in \left[0, \frac{\pi}{2}\right]$

$$\sin^2(nx) - \sin^2((n-1)x) = \frac{1 - \cos(2nx)}{2} - \frac{1 - \cos((2n-2)x)}{2} = \frac{1}{2} (\cos((2n-2)x) - \cos(2nx)) = \sin((2n-1)x) \sin(x)$$

Ainsi pour tout entier $n \geq 1$,

$$J_n - J_{n-1} = I_{2n-1} = \frac{\pi}{2}$$

Or $J_0 = 0$ donc $J_n = \frac{n\pi}{2}$ pour tout $n \in \mathbb{N}$.

5 La fonction $x \mapsto \frac{\sin(x)}{x}$ est continue sur $\left]0, \frac{\pi}{2}\right]$ et prolongeable par continuité en 0, $\int_0^{\frac{\pi}{2}} g(t) dt$ converge.

Une primitive de $x \mapsto \sin x$ est $x \mapsto -\cos x$ tandis que la dérivée de $x \mapsto \frac{1}{x}$ est $x \mapsto -\frac{1}{x^2}$. De plus, comme \cos est bornée

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{-\cos x}{x} = 0$$

Par intégration par parties, $\int_{\frac{\pi}{2}}^{+\infty} \frac{\sin x}{x} dx$ est de même nature que $\int_{\frac{\pi}{2}}^{+\infty} \frac{\cos x}{x^2} dx$. Cette dernière intégrale converge puisque $\frac{\cos x}{x^2} = \mathcal{O}\left(\frac{1}{x^2}\right)$. Ainsi $\int_{\frac{\pi}{2}}^{+\infty} \frac{\sin x}{x} dx$ converge et finalement $\int_0^{+\infty} \frac{\sin x}{x} dx$ converge aussi.

6 h est de classe \mathcal{C}^1 sur $\left]0, \frac{\pi}{2}\right]$. De plus

$$h(x) = \frac{1}{x} - \frac{1}{\sin x} = \frac{\sin x - x}{x \sin x} \underset{x \rightarrow 0}{\sim} \frac{-x^3/6}{x^2} = -\frac{x}{6}$$

donc $\lim_{x \rightarrow 0} h(x) = 0$. Enfin,

$$h'(x) = -\frac{1}{x^2} + \frac{\cos x}{\sin^2 x} = \frac{x^2 \cos x - \sin^2 x}{x^2 \sin^2 x}$$

Or

$$x^2 \cos x \underset{x \rightarrow 0}{=} x^2 \left(1 - \frac{x^2}{2} + o(x^2)\right) \underset{x \rightarrow 0}{=} x^2 - \frac{x^4}{2} + o(x^4)$$

et

$$\sin^2 x \underset{x \rightarrow 0}{=} x^2 \left(1 - \frac{x^2}{6} + o(x^2)\right) \underset{x \rightarrow 0}{=} x^2 - \frac{x^4}{3} + o(x^4)$$

donc

$$h'(x) \underset{x \rightarrow 0}{\sim} \frac{-x^4/6}{x^4} = -\frac{1}{6}$$

donc $\lim_{x \rightarrow 0} h'(x) = -\frac{1}{6}$.

D'après un théorème de prolongement, h est prolongeable en une fonction de classe \mathcal{C}^1 sur $\left[0, \frac{\pi}{2}\right]$.

7 Il s'agit du lemme de Riemann-Lebesgue. Notons encore h la fonction prolongée sur $\left[0, \frac{\pi}{2}\right]$. Par intégration par parties

$$\begin{aligned} \int_0^{\frac{\pi}{2}} h(x) \sin((2n+1)x) \, dx &= -\frac{1}{2n+1} \left[h(x) \cos((2n+1)x) \right]_0^{\frac{\pi}{2}} + \frac{1}{2n+1} \int_0^{\frac{\pi}{2}} h'(x) \cos((2n+1)x) \, dx \\ &= \frac{h(0) \cos(0)}{2n+1} - \frac{h(\pi/2) \cos(\pi/2 + n\pi)}{2n+1} + \frac{1}{2n+1} \int_0^{\frac{\pi}{2}} h'(x) \cos((2n+1)x) \, dx \\ &= \frac{1}{2n+1} \int_0^{\frac{\pi}{2}} h'(x) \cos((2n+1)x) \, dx \end{aligned}$$

Par inégalité triangulaire,

$$\left| \int_0^{\frac{\pi}{2}} h(x) \sin((2n+1)x) \, dx \right| \leq \int_0^{\frac{\pi}{2}} |h'(x) \cos((2n+1)x)| \, dx \leq \frac{1}{2n+1} \int_0^{\frac{\pi}{2}} |h'(x)| \, dx$$

On en déduit que

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \int_0^{\frac{\pi}{2}} h(x) \sin((2n+1)x) \, dx = 0$$

8 Remarquons que

$$\int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\sin((2n+1)x)}{x} \, dx = \int_0^{\frac{\pi}{2}} h(x) \sin((2n+1)x) \, dx + \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\sin((2n+1)x)}{x} \, dx = \int_0^{\frac{\pi}{2}} h(x) \sin((2n+1)x) \, dx + I_{2n+1}$$

D'après les questions 7 et 3.b,

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\sin((2n+1)x)}{x} \, dx = \frac{\pi}{2}$$

Or par le changement de variable $u = (2n+1)x$,

$$\int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\sin((2n+1)x)}{x} \, dx = \int_0^{(2n+1)\pi/2} \frac{\sin x}{x} \, dx$$

Comme l'intégrale $\int_0^{+\infty} \frac{\sin x}{x} \, dx$ converge,

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \int_0^{(2n+1)\pi/2} \frac{\sin x}{x} \, dx = \int_0^{+\infty} \frac{\sin x}{x} \, dx$$

Par conséquent

$$K_1 = \frac{\pi}{2}$$

9 Le cas $n = 1$ a déjà été traité. Supposons donc $n \geq 2$. Alors $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin^n(x)}{x^n} = 1$ et $\frac{\sin^n(x)}{x^n} = \mathcal{O}(1/x^n)$ avec $n \geq 2$.

Ainsi $x \mapsto \frac{\sin^n(x)}{x^n}$ est intégrable sur \mathbb{R}_+^* et K_n est bien défini.

10 **10.a** Si n est pair, alors $x \mapsto \frac{\sin^n(x)}{x^n}$ est positive sur \mathbb{R}_+^* donc $K_n \geq 0$.

10.b Supposons n impair. Comme l'intégrale définissant K_n converge, on a d'après la relation de Chasles

$$K_n = \sum_{p=0}^{+\infty} \int_{p\pi}^{(p+1)\pi} \frac{\sin^n(x)}{x^n} \, dx$$

Par le changement de variable $t = x - p\pi$

$$K_n = \sum_{p=0}^{+\infty} \int_0^\pi \frac{\sin^n(t + p\pi)}{(t + p\pi)^n} \, dt = \sum_{p=0}^{+\infty} \int_0^\pi \frac{((-1)^p \sin(t))^n}{(t + p\pi)^n} \, dt = \sum_{p=0}^{+\infty} (-1)^p \int_0^\pi \frac{\sin^n(t)}{(t + p\pi)^n} \, dt$$

Posons $u_p = \int_0^\pi \frac{\sin^n(t)}{(t + p\pi)^n} dt$. La suite (u_p) est décroissante et pour tout $p \in \mathbb{N}^*$

$$0 \leq u_p \leq \int_0^\pi \frac{dt}{(p\pi)^n} = \frac{\pi}{(p\pi)^n}$$

donc (u_p) converge vers 0 par encadrement. La série $\sum_{p \in \mathbb{N}} (-1)^p u_p$ vérifie donc le critère spécial. Sa somme K_n est donc du signe de son premier terme u_0 . Ainsi $K_n \geq 0$.

11 **11.a** g_n est 2π périodique et de classe \mathcal{C}^∞ sur \mathbb{R} donc $g_n^{(k)}$ est continue sur \mathbb{R} et 2π -périodique. En particulier, $g_n^{(k)}$ est continue sur le segment $[0, 2\pi]$: elle y est donc bornée. Par 2π -périodicité, $g_n^{(k)}$ est bornée sur \mathbb{R} .

11.b Comme $g_n(x) \underset{x \rightarrow 0}{\sim} x^n$, $g_n(x) = o(x^{n-1})$. Comme g_n est de classe \mathcal{C}^∞ , on peut dériver ce développement limité de sorte que $g_n^{(k)}(x) \underset{x \rightarrow 0}{=} o(x^{n-1-k})$.

11.c On va montrer par récurrence la propriété

$$\mathcal{P}_k : K_n = \frac{(n-k-1)!}{(n-1)!} \int_0^{+\infty} \frac{g_n^{(k)}(x)}{x^{n-k}} dx$$

\mathcal{P}_0 est vraie par définition de K_n . On suppose \mathcal{P}_k vraie pour un certain $k \in \llbracket 0, n-2 \rrbracket$. La dérivée de $g_n^{(k)}$ est $g_n^{(k+1)}$ et une primitive de $x \mapsto \frac{1}{x^{n-k}}$ est $x \mapsto -\frac{1}{n-1-k} \cdot \frac{1}{x^{n-1-k}}$. Comme $g_n^{(k)}$ est bornée et $n-1-k > 0$, $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{g_n^{(k)}(x)}{x^{n-1-k}} = 0$.

De plus, $g_n^{(k)}(x) \underset{x \rightarrow 0}{=} o(x^{n-1-k})$ donc $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{g_n^{(k)}(x)}{x^{n-1-k}} = 0$. Par intégration par parties,

$$\begin{aligned} K_n &= \frac{(n-1-k)!}{(n-1)!} \int_0^{+\infty} \frac{g_n^{(k)}(x)}{x^{n-k}} dx \\ &= \frac{(n-1-k)!}{(n-1)!} \left(-\frac{1}{n-1-k} \left[\frac{g_n^{(k)}(x)}{x^{n-1-k}} \right]_0^{+\infty} + \frac{1}{n-1-k} \int_0^{+\infty} \frac{g_n^{(k+1)}(x)}{x^{n-1-k}} dx \right) \\ &= \frac{(n-2-k)!}{(n-1)!} \int_0^{+\infty} \frac{g_n^{(k+1)}(x)}{x^{n-1-k}} dx \end{aligned}$$

donc \mathcal{P}_{k+1} est vraie.

Par récurrence finie, \mathcal{P}_{n-1} est vraie, ce qui est le résultat attendu.

12 **12.a**

$$\begin{aligned} g_{2n}(t) &= \left(\frac{e^{it} - e^{-it}}{2i} \right)^{2n} \\ &= \frac{1}{2^{2n} i^{2n}} \sum_{k=0}^{2n} \binom{2n}{k} (e^{it})^{2n-k} (-e^{-it})^k \\ &= \frac{1}{2^{2n} (-1)^n} \sum_{k=0}^{2n} \binom{2n}{k} (-1)^k e^{i(2n-2k)t} \\ &= \frac{1}{2^{2n}} \sum_{k=0}^{2n} (-1)^{n+k} \binom{2n}{k} e^{i(2n-2k)t} \\ g_{2n+1}(t) &= \left(\frac{e^{it} - e^{-it}}{2i} \right)^{2n+1} \\ &= \frac{1}{2^{2n+1} i^{2n+1}} \sum_{k=0}^{2n+1} \binom{2n+1}{k} (e^{it})^{2n+1-k} (-e^{-it})^k \\ &= \frac{i}{2^{2n+1} (-1)^n} \sum_{k=0}^{2n+1} \binom{2n+1}{k} (-1)^k e^{i(2n+1-2k)t} \\ &= \frac{1}{2^{2n+1} i} \sum_{k=0}^{2n+1} (-1)^{n+k} \binom{2n+1}{k} e^{i(2n+1-2k)t} \end{aligned}$$

12.b

$$\begin{aligned}
h_{2n}^{(2n-1)}(t) &= \frac{1}{2^{2n}} \sum_{k=0}^{2n} (-1)^{n+k} \binom{2n}{k} (i(2n-2k))^{2n-1} e^{i(2n-2k)t} \\
&= \frac{2^{2n-1} i^{2n-1}}{2^{2n}} \sum_{k=0}^{2n} (-1)^{n+k} \binom{2n}{k} (n-k)^{2n-1} e^{i(2n-2k)t} \\
&= \frac{1}{2i} \left(\sum_{k=0}^{n-1} (-1)^k \binom{2n}{k} (n-k)^{2n-1} e^{i(2n-2k)t} + \sum_{k=n+1}^{2n} (-1)^k \binom{2n}{k} (n-k)^{2n-1} e^{i(2n-2k)t} \right) \quad \text{car le terme d'indice } n \text{ est nul} \\
&= \frac{1}{2i} \left(\sum_{j=1}^n (-1)^{n-j} \binom{2n}{n-j} j^{2n-1} e^{2ij t} + \sum_{j=1}^n (-1)^{n+j} \binom{2n}{n+j} (-j)^{2n-1} e^{-2ij t} \right) \quad \text{en posant } j = n-k \text{ et } j = k-n \\
&= \frac{1}{2i} \left(\sum_{j=1}^n (-1)^{n+j} \binom{2n}{n-j} j^{2n-1} e^{2ij t} - \sum_{j=1}^n (-1)^{n+j} \binom{2n}{n-j} j^{2n-1} e^{-2ij t} \right) \quad \text{par symétrie des coefficients binomiaux} \\
&= (-1)^n \sum_{j=1}^n (-1)^j \binom{2n}{n-j} j^{2n-1} \frac{e^{2ij t} - e^{-2ij t}}{2i} \\
&= (-1)^n \sum_{j=1}^n (-1)^j \binom{2n}{n+j} j^{2n-1} \sin(2jt) \quad \text{via une relation d'Euler} \\
h_{2n+1}^{(2n)}(t) &= \frac{1}{2^{2n+1} i} \sum_{k=0}^{2n+1} (-1)^{n+k} \binom{2n+1}{k} (i(2n+1-2k))^{2n} e^{i(2n+1-2k)t} \\
&= \frac{1}{2^{2n+1} i} \sum_{k=0}^{2n+1} (-1)^{n+k} \binom{2n+1}{k} i^{2n} (2n+1-2k)^{2n} e^{i(2n+1-2k)t} \\
&= \frac{1}{2^{2n+1} i} \sum_{k=0}^{2n+1} (-1)^k \binom{2n+1}{k} (2n+1-2k)^{2n} e^{i(2n+1-2k)t} \\
&= \frac{1}{2^{2n+1} i} \left(\sum_{k=0}^n (-1)^k \binom{2n+1}{k} (2n+1-2k)^{2n} e^{i(2n+1-2k)t} + \sum_{k=n+1}^{2n+1} (-1)^k \binom{2n+1}{k} (2n+1-2k)^{2n} e^{i(2n+1-2k)t} \right) \\
&= \frac{1}{2^{2n+1} i} \left(\sum_{k=0}^n (-1)^{n-j} \binom{2n+1}{n-j} (2j+1)^{2n} e^{i(2j+1)t} + \sum_{j=0}^n (-1)^{j+n+1} \binom{2n+1}{j+n+1} (-2j-1)^{2n} e^{-i(2j+1)t} \right) \quad \text{en posant } j = n-k \\
&= \frac{1}{2^{2n+1} i} \left(\sum_{k=0}^n (-1)^{n-j} \binom{2n+1}{n-j} (2j+1)^{2n} e^{i(2j+1)t} - \sum_{j=0}^n (-1)^{j+n} \binom{2n+1}{n-j} (2j+1)^{2n} e^{-i(2j+1)t} \right) \quad \text{par symétrie des coefficients binomiaux} \\
&= \frac{1}{2^{2n}} \sum_{k=0}^n (-1)^{n+j} \binom{2n+1}{n-j} (2j+1)^{2n} \frac{e^{i(2j+1)t} - e^{-i(2j+1)t}}{2i} \\
&= (-1)^n \sum_{k=0}^n (-1)^j \binom{2n+1}{n-j} \left(j + \frac{1}{2}\right)^{2n} \sin((2j+1)t) \quad \text{via une relation d'Euler}
\end{aligned}$$

12.c Soit $\alpha \in \mathbb{R}_+^*$. Via le changement de variable $u = \alpha t$,

$$\int_0^{+\infty} \frac{\sin(\alpha t)}{t} dt = \int_0^{+\infty} \frac{\sin t}{t} dt = K_1 = \frac{\pi}{2}$$

Par linéarité de l'intégration, on en déduit immédiatement que

$$\begin{aligned}
K_{2n} &= \frac{(-1)^n \pi}{2(2n-1)!} \sum_{j=1}^n (-1)^j \binom{2n}{n-j} j^{2n-1} \\
K_{2n+1} &= \frac{(-1)^n \pi}{2(2n)!} \sum_{j=0}^n \binom{2n+1}{n-j} \left(j + \frac{1}{2}\right)^{2n}
\end{aligned}$$

13 **13.a** Pour tout entier $n \geq 2$,

$$\left| \int_{\pi}^{+\infty} \frac{\sin^n(x)}{x^n} dx \right| \leq \int_{\pi}^{+\infty} \frac{|\sin^n(x)|}{x^n} dx \leq \int_{\pi}^{+\infty} \frac{dx}{x^n} = \frac{1}{(n-1)\pi^{n-1}}$$

Par encadrement,

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \int_{\pi}^{+\infty} \frac{\sin^n(x)}{x^n} dx = 0$$

13.b φ est clairement dérivable sur $]0, \pi]$ et

$$\forall x \in]0, \pi], \varphi'(x) = \frac{x \cos x - \sin x}{x^2}$$

Posons maintenant $\psi : x \mapsto x \cos x - \sin x$. ψ est dérivable sur $[0, \pi]$ et

$$\forall x \in [0, \pi], \psi'(x) = -x \sin x \leq 0$$

Comme ψ' ne s'annule qu'en 0 et π sur l'intervalle $[0, \pi]$, ψ est strictement décroissante sur $[0, \pi]$. Or $\psi(0) = 0$ donc ψ est strictement négative sur $]0, \pi]$. Par conséquent, φ' est strictement négative sur $]0, \pi]$ et φ est strictement décroissante sur cet intervalle.

Remarquons que $\lim_{x \rightarrow 0} \varphi = 1$ donc, par stricte décroissance, $\varphi(x) < 1$ pour tout $x \in]0, \pi]$. Posons $\varepsilon \in]0, \pi]$. Alors

$$0 \leq \int_0^\pi \varphi^n(x) dx = \int_0^{\frac{\varepsilon}{2}} \varphi^n(x) dx + \int_{\frac{\varepsilon}{2}}^\pi \varphi^n(x) dx \leq \frac{\varepsilon}{2} + \pi \varphi^n(\varepsilon/2)$$

Comme $0 \leq \varphi(\varepsilon/2) < 1$, $\lim_{n \rightarrow +\infty} \varphi^n(\varepsilon/2) = 0$. Il existe donc $N \in \mathbb{N}$ tel que pour tout entier $n \geq N$, $\varphi^n(\varepsilon/2) \leq \frac{\varepsilon}{2\pi}$ et donc

$$0 \leq \int_0^\pi \varphi^n(x) dx \leq \varepsilon$$

Ainsi, par définition de la limite, $\lim_{n \rightarrow +\infty} \int_0^\pi \varphi^n(x) dx = 0$. D'après la relation de Chasles, (K_n) converge vers 0.

14 Pour tout $x \in [0, \frac{\pi}{2}]$, $0 \leq \sin(x) \leq 1$ donc $\sin^{n+1}(x) \leq \sin^n(x)$ puis $A_{n+1} \leq A_n$ par croissance de l'intégrale. La suite (A_n) est donc décroissante.

15 Soit un entier $n \geq 1$. Par intégration par parties,

$$\begin{aligned} A_n &= \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^{n-1}(x) \cdot \sin(x) dx \\ &= -\left[\sin^{n-1}(x) \cos(x)\right]_0^{\frac{\pi}{2}} + \int_0^{\frac{\pi}{2}} (n-1) \sin^{n-2}(x) \cos^2(x) dx \\ &= (n-1) \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^{n-2}(x) (1 - \sin^2(x)) dx = (n-1)(A_{n-2} - A_n) \end{aligned}$$

ou encore

$$nA_n = (n-1)A_{n-2}$$

16 Pour tout entier $n \geq 2$,

$$nA_n A_{n-1} = (n-1)A_{n-2} A_{n-1}$$

La suite $(nA_n A_{n-1})_{n \in \mathbb{N}^*}$ est donc constante égale à $1 \cdot A_1 \cdot A_0 = 1 \cdot 1 \cdot \frac{\pi}{2} = \frac{\pi}{2}$.

17 Par décroissance de (A_n) , pour tout entier $n \geq 2$,

$$\frac{n}{n-1} A_n = A_{n-2} \leq A_{n-1} \leq A_n$$

La suite (A_n) est strictement positive donc pour tout entier $n \geq 2$,

$$\frac{n}{n-1} \leq \frac{A_{n-1}}{A_n} \leq 1$$

Par encadrement, $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{A_{n-1}}{A_n} = 1$ i.e.

$$A_{n-1} \underset{n \rightarrow +\infty}{\sim} A_n$$

Par conséquent,

$$\frac{\pi}{2} = nA_n A_{n-1} \underset{n \rightarrow +\infty}{\sim} nA_n^2$$

puis, comme (A_n) est positive,

$$A_n \underset{n \rightarrow +\infty}{\sim} \sqrt{\frac{\pi}{2n}}$$

18 Soit $\xi: x \mapsto \sin(x) - x + x^2$. ξ est de classe \mathcal{C}^∞ sur \mathbb{R} et

$$\begin{aligned}\forall x \in \mathbb{R}, \xi'(x) &= \cos(x) - 1 + 2x \\ \forall x \in \mathbb{R}, \xi''(x) &= -\sin(x)\end{aligned}$$

Notamment ξ'' est négative sur $[0, 1]$. ξ' est donc décroissante sur $[0, 1]$. De plus, $\xi'(1) = \cos(1) + 1 \geq 0$ donc ξ' est positive sur $[0, 1]$. Finalement, ξ est croissante sur $[0, 1]$ et, comme $\xi(0) = 0$, ξ est positive sur $[0, 1]$. On en déduit aisément que

$$\forall x \in]0, 1], \frac{\sin(x)}{x} \geq 1 - x^2$$

19 Pour $p \in \mathbb{N}$,

$$K_{2p} = \int_0^{+\infty} \left(\frac{\sin(x)}{x} \right)^{2p} dx \geq \int_0^1 \left(\frac{\sin(x)}{x} \right)^{2p} dx \geq \int_0^1 (1 - x^2)^{2p} dx$$

On effectue alors le changement de variable $x = \cos(t)$:

$$\int_0^1 (1 - x^2)^{2p} dx = \int_0^{\frac{\pi}{2}} (1 - \cos^2(t))^{2p} \sin(t) dt = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^{4p+1}(t) dt = A_{4p+1}$$

20 Les K_n sont positifs donc pour tout $n \in \mathbb{N}^*$,

$$\sum_{p=1}^{2n} K_p \geq \sum_{p=1}^n K_{2p} \geq \sum_{p=1}^n A_{4p+1}$$

Or $A_{4p+1} \underset{p \rightarrow +\infty}{\sim} \sqrt{\frac{\pi}{8p}}$ donc la série $\sum A_{4p+1}$ diverge vers $+\infty$. On en déduit que $\lim_{n \rightarrow +\infty} \sum_{p=1}^{2n} K_p = +\infty$. La série $\sum K_n$ diverge donc (vers $+\infty$).