

# DEVOIR À LA MAISON N° 8 : CORRIGÉ

## Problème 1 — Petites Mines 2009

### Partie I – Étude d'une fonction

1.  $f$  est dérivable sur  $\mathbb{R}$  par opérations arithmétiques sur des fonctions dérivables. Pour tout  $x \in \mathbb{R}$ ,

$$f'(x) = 3(1 - 2x^2)e^{-2x^2}$$

On en déduit que  $f$  est

- ▶ strictement décroissante sur  $] -\infty, -\frac{1}{\sqrt{2}} ]$  ;
- ▶ strictement croissante sur  $[ -\frac{1}{\sqrt{2}}, \frac{1}{\sqrt{2}} ]$  ;
- ▶ strictement décroissante sur  $[ \frac{1}{\sqrt{2}}, +\infty [$ .

Pour tout  $x \neq 0$ ,  $xe^{-x^2} = \frac{x^2 e^{-x^2}}{x}$ . Par croissances comparées,

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} x^2 e^{-x^2} = \lim_{x \rightarrow -\infty} x^2 e^{-x^2} = 0$$

via le changement de variables  $X = x^2$ . A fortiori

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} x e^{-x^2} = \lim_{x \rightarrow -\infty} x e^{-x^2} = 0$$

Puis, par opérations

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = -1$$

On en déduit le tableau de variations suivant.

$x$	$-\infty$	$-\frac{1}{\sqrt{2}}$	$\frac{1}{\sqrt{2}}$	$+\infty$	
$f'(x)$	$-$	$0$	$+$	$0$	$-$
$f(x)$	$-1$	$f\left(-\frac{1}{\sqrt{2}}\right)$	$f\left(\frac{1}{\sqrt{2}}\right)$	$-1$	

En particulier,  $\mathcal{C}_f$  admet une asymptote horizontale d'équation  $y = -1$  au voisinage de  $+\infty$  et  $-\infty$ .

Puisque  $f(-x) + f(x) = -2$  pour tout  $x \in \mathbb{R}$ ,  $\mathcal{C}_f$  est symétrique par rapport au point de coordonnées  $(0, -1)$ .


2. Puisque  $f(0) = -1$  et  $f'(0) = 3$ ,  $\mathcal{C}_f$  admet au point d'abscisse 0 une tangente d'équation  $y = 3x - 1$ .

Pour tout  $x \in \mathbb{R}$

$$f(x) - (3x - 1) = 3x(e^{-x^2} - 1)$$

Pour tout  $x \in \mathbb{R}$ ,  $e^{-x^2} - 1 \leq 0$  car  $-x^2 \leq 0$  et par croissance de  $\exp$  sur  $\mathbb{R}$ . Ainsi  $f(x) - (3x - 1) \leq 0$  pour  $x \geq 0$  et  $f(x) - (3x - 1) \geq 0$  pour  $x \leq 0$ . On en déduit que  $\mathcal{C}_f$  est au-dessus de sa tangente à gauche de 0 et au-dessous de celle-ci à droite de 0.  $\mathcal{C}_f$  admet donc un point d'inflexion au point d'abscisse 0.

3.



4. a.  $f$  étant de classe  $\mathcal{C}^\infty$  sur  $\mathbb{R}$ , elle admet un développement limité à tout ordre en 0.  
 b. On sait que  $e^u = 1 + u + \frac{u^2}{2} + o(u^2)$ . On en déduit que

$$e^{-x^2} = 1 - x^2 + \frac{x^4}{2} + o(x^4)$$

puis que

$$f(x) = -1 + 3x - 3x^3 + \frac{3}{2}x^5 + o(x^5)$$

## Partie II – Étude d'une équation différentielle

1. L'équation différentielle  $H_n$  est  $xy' - (n - 2x^2)y = 0$ . Sur  $\mathbb{R}^*$ , elle équivaut à  $y' - \left(\frac{n}{x} - 2x\right)y = 0$ . Une primitive de  $x \mapsto \frac{n}{x} - 2x$  sur  $\mathbb{R}_+^*$  est  $x \mapsto n \ln(x) - x^2$ . Les solutions de  $H_n$  sur  $\mathbb{R}_+^*$  sont donc les fonctions  $x \mapsto \lambda x^n e^{-x^2}$  où  $\lambda$  décrit  $\mathbb{R}$ . Une primitive de  $x \mapsto \frac{n}{x} - 2x$  sur  $\mathbb{R}_-^*$  est  $x \mapsto n \ln(-x) - x^2$ . Les solutions de  $H_n$  sur  $\mathbb{R}_-^*$  sont donc les fonctions  $x \mapsto \lambda(-x)^n e^{-x^2}$  où  $\lambda$  décrit  $\mathbb{R}$  ou, de manière plus simple, les fonctions  $x \mapsto \lambda x^n e^{-x^2}$  où  $\lambda$  décrit encore  $\mathbb{R}$ .
2. La fonction constante égale à  $-1$  étant clairement une solution particulière de  $E_n$  sur  $\mathbb{R}$ . On en déduit que les solutions de  $E_n$  sur  $\mathbb{R}_+^*$  et sur  $\mathbb{R}_-^*$  sont les fonctions  $x \mapsto -1 + \lambda x^n e^{-x^2}$ .
3. Supposons dans un premier temps  $n = 1$ . Soit  $y$  une solution de  $E_1$  sur  $\mathbb{R}$ . Comme  $y$  est solution de  $E_1$  sur  $\mathbb{R}_+^*$  et  $\mathbb{R}_-^*$ , il existe  $(\lambda, \mu) \in \mathbb{R}^2$  tel que

$$y(x) = \begin{cases} -1 + \lambda x e^{-x^2} & \text{si } x > 0 \\ -1 + \mu x e^{-x^2} & \text{si } x < 0 \end{cases}$$

La continuité de  $y$  en 0 impose  $y(0) = -1$ . De plus,

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{y(x) - y(0)}{x - 0} = \lambda \quad \text{et} \quad \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{y(x) - y(0)}{x - 0} = \mu$$

La dérivabilité de  $y$  en 0 impose donc  $\lambda = \mu$ . On a donc  $y(x) = \lambda x e^{-x^2}$  pour tout  $x \in \mathbb{R}$ .

Réciproquement pour tout  $\lambda \in \mathbb{R}$ ,  $x \mapsto -1 + \lambda x e^{-x^2}$  est de classe  $\mathcal{C}^1$  et solution de  $E_1$  sur  $\mathbb{R}$ .

Les solutions de  $E_1$  sur  $\mathbb{R}$  sont donc les fonctions  $x \mapsto -1 + \lambda x e^{-x^2}$  où  $\lambda$  décrit  $\mathbb{R}$ .

Supposons maintenant  $n \geq 2$ . Comme précédemment toute solution  $y$  de  $E_n$  sur  $\mathbb{R}$  est nécessairement de la forme

$$y(x) = \begin{cases} -1 + \lambda x e^{-x^2} & \text{si } x > 0 \\ -1 + \mu x e^{-x^2} & \text{si } x < 0 \\ -1 & \text{si } x = 0 \end{cases}$$

Réciproquement, si  $y$  est de la forme précédente, elle est bien solution de  $E_n$  sur  $\mathbb{R}$ , elle est bien de classe  $\mathcal{C}^1$  sur  $\mathbb{R}_+^*$  et sur  $\mathbb{R}_-^*$ , elle est continue en 0 et

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} y'(x) = \lim_{x \rightarrow 0^-} y'(x) = 0$$

donc  $y$  est de classe  $\mathcal{C}^1$  sur  $\mathbb{R}$  en vertu du théorème de prolongement  $\mathcal{C}^1$ .

**REMARQUE.** Si on ne connaît pas encore le théorème de prolongement  $\mathcal{C}^1$ , on procède «à la main». On constate que

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{y(x) - y(0)}{x - 0} = \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{y(x) - y(0)}{x - 0} = 0$$

donc  $y$  est dérivable en 0. De plus,

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} y'(x) = \lim_{x \rightarrow 0^-} y'(x) = 0 = y'(0)$$

donc  $y'$  est continue en 0. Puisque  $y'$  est continue sur  $\mathbb{R}_+^*$  et  $\mathbb{R}_-^*$ ,  $y'$  est continue sur  $\mathbb{R}$  i.e.  $y$  est de classe  $\mathcal{C}^1$  sur  $\mathbb{R}$ .

### Partie III – Étude de deux suites

1. On a  $f_n(0) = -1 < 0$  et  $f_n(1) = \frac{3}{e} - 1 > 0$ .
2.  $f_n$  est dérivable sur  $\mathbb{R}$  et pour tout  $x \in \mathbb{R}$

$$f'_n(x) = 3(nx^{n-1} - 2x^{n+1})e^{-x^2} = 3x^{n-1}(n - 2x^2)e^{-x^2}$$

On en déduit que  $f_n$  est strictement croissante sur  $[0, \sqrt{\frac{n}{2}}]$  et strictement décroissante sur  $[\sqrt{\frac{n}{2}}, +\infty[$ .  
Pour tout  $x \in \mathbb{R}_+^*$

$$f_n(x) = (x^2)^{\frac{n}{2}} e^{-x^2} - 1$$

donc, par croissances comparées,  $\lim_{x \rightarrow +\infty} f_n(x) = -1$ .

Remarquons que puisque  $n \geq 2$ ,  $1 \in [0, \sqrt{\frac{n}{2}}]$  et puisque  $f_n$  est strictement croissante sur cet intervalle,  $f_n(\sqrt{\frac{n}{2}}) \geq f_n(1) > 0$ .

$f$  est strictement monotone et continue sur chacun des deux intervalles  $[0, \sqrt{\frac{n}{2}}]$  et  $[\sqrt{\frac{n}{2}}, +\infty[$ . De plus,  $f_n(0) < 0$ ,  $f_n(\sqrt{\frac{n}{2}}) > 0$  et  $\lim_{+\infty} f < 0$  donc, d'après le corollaire du théorème des valeurs intermédiaires,  $f_n$  s'annule une unique fois sur chacun des deux intervalles  $[0, \sqrt{\frac{n}{2}}]$  et  $[\sqrt{\frac{n}{2}}, +\infty[$  en deux réels notés respectivement  $u_n$  et  $v_n$ .

Puisque  $f_n(1) > 0$  et que 1 appartient à l'intervalle  $[0, \sqrt{\frac{n}{2}}]$  sur lequel  $f_n$  est strictement croissante,  $u_n > 1$ . Par ailleurs  $v_n > \sqrt{\frac{n}{2}} \geq 1$  puisque  $n \geq 2$ .

3. D'après la question précédente,  $v_n \geq \sqrt{\frac{n}{2}}$  pour tout  $n \geq 2$ . Or  $\lim_{n \rightarrow +\infty} \sqrt{\frac{n}{2}} = +\infty$  donc  $\lim_{n \rightarrow +\infty} v_n = +\infty$  par théorème de minoration.
4. a. Par définition,  $f_n(u_n) = 0$  pour tout  $n \geq 2$  donc  $e^{-u_n^2} = \frac{1}{3u_n^n}$ .  
b.  $f_{n+1}(u_n) = 3u_n^{n+1}e^{-u_n^2} - 1 = u_n - 1 < 0$ .  
c. On sait également que  $f_{n+1}(u_{n+1}) = 0$  et que  $f_{n+1}$  est strictement croissante sur l'intervalle  $[0, 1]$  contenant  $u_n$  et  $u_{n+1}$ . D'où  $u_n < u_{n+1}$ . Ceci étant valable pour tout  $n \geq 2$ , la suite  $(u_n)_{n \geq 2}$  est strictement croissante.  
d. La suite  $(u_n)_{n \geq 2}$  est également majorée par 1 donc elle converge en vertu du théorème de la limite monotone.
5. a. Évident.

- b. Supposons  $l \neq 1$ . On a en fait  $l < 1$  puisque  $(u_n)$  est majorée par 1. Pour tout  $n \geq 2$ ,  $f_n(u_n) = 0$  et donc  $g_n(u_n) = 0$  d'après la question précédente. Ainsi pour tout  $n \in \mathbb{N}$ ,  $n \geq 2$ .

$$0 = \ln 3 + n \ln(u_n) - u_n^2$$

Puisque  $l < 1$ , le membre de droite diverge vers  $-\infty$ , ce qui est absurde.

On en déduit que  $l = 1$ .

- c. Pour tout  $n \geq 2$ ,  $g_n(u_n) = 0$  et donc

$$n \ln(1 + w_n) = u_n^2 - \ln 3$$

Puisque  $(w_n)$  converge vers 0,  $n \ln(1 + w_n) \underset{n \rightarrow +\infty}{\sim} n w_n$ . Par ailleurs,  $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n^2 - \ln 3 = 1 - \ln 3$  donc

$$w_n \underset{n \rightarrow +\infty}{\sim} \frac{1 - \ln 3}{n}$$