SEMAINE DU 14/12 AU 18/12

1 Cours

Nombres réels

Approximations d'un réel Ensembles de nombres : $\mathbb{N} \subset \mathbb{Z} \subset \mathbb{D} \subset \mathbb{Q} \subset \mathbb{R}$. Partie entière. Approximations décimales. Densité dans \mathbb{R} . Caractérisation séquentielle de la densité. \mathbb{D} , \mathbb{Q} et $\mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$ sont denses dans \mathbb{R} .

Relation d'ordre sur \mathbb{R} Majorant, minorant, maximum, minimum, borne supérieure borne inférieure d'une partie de \mathbb{R} . Théorème de la borne supérieure. Caractérisation séquentielle de la borne inférieure et de la borne supérieure. Droite réelle achevée $\overline{\mathbb{R}}$. Borne supérieure et inférieure dans $\overline{\mathbb{R}}$. Applications à valeurs dans \mathbb{R} : majorant, minorant, maximum, minimum, borne supérieure borne inférieure.

Intervalles de \mathbb{R} Définition : une partie I de \mathbb{R} est un intervalle si $\forall (x, y, t) \in I^2 \times \mathbb{R}, x \leq t \leq y \implies t \in I$. Les intervalles de \mathbb{R} sont les parties de la forme $[a, b], [a, b], [a, b], [a, +\infty[,]a, +\infty[,]-\infty, b],]-\infty, b[,]-\infty, +\infty[$.

Relations binaires

Généralités Réflexivité, symétrie, antisymétrie, transitivité. Exemples.

Relation d'ordre Définition. Ordre total, partiel. Majorant/minorant, maximum/minimum, borne supérieure/inférieure. Unicité du maximum/minimum, de la borne supérieure/inférieure sous réserve d'existence. Un maximum/minimum est une borne supérieure/inférieure.

Relation d'équivalence Définition. Classes d'équivalence. Les classes d'équivalence forment une partition.

Suites numériques

Généralités Définition d'une suite. Modes de définition : explicite ou par récurrence. Vocabulaire : suites constantes, stationnaires, majorées, minorées bornées, croissantes, décroissantes, monotones. Suites classiques : arithmétiques, géométriques, arithmétiques, récurrentes linéaires homogènes d'ordre 2.

Limite d'une suite Définition. Unicité. Vocabulaire : convergence et divergence. Toute suite de limite strictement positive est minorée par un réel strictement positif à partir d'un certain rang. Deux suites équivalentes sont de même signe à partir d'un certain rang. Toute suite convergente est bornée. Opérations sur les limites. Suites extraites. Si une suite admet une limite, alors toute suite extraite admet la même limite.

2 Méthodes à maîtriser

- ightharpoonup Déterminer le maximum/minimum M d'une partie A:
 - \diamond M est un majorant/minorant de \mathcal{A} ;
 - $\diamond M \in \mathcal{A}$.
- \blacktriangleright Déterminer la borne supérieure/inférieure M d'une partie \mathcal{A} :
 - \diamond M est un majorant/minorant de \mathcal{A} ;
 - puis au choix :
 - tout majorant/minorant de \mathcal{A} est minoré/majoré par M;
 - il existe une suite d'éléments de \mathcal{A} convergeant vers M (si \mathcal{A} est une partie de \mathbb{R} muni de la relation d'ordre usuelle);
 - pour tout $\varepsilon > 0$, il existe $\mathfrak{a} \in \mathcal{A}$ tel que $\mathfrak{a} > M \varepsilon/\mathfrak{a} < M + \varepsilon$ (si \mathcal{A} est une partie de \mathbb{R} muni de la relation d'ordre usuelle).
- ► Caractérisation de la partie entière :

$$n = |x| \iff x - 1 < n \leqslant x \iff n \leqslant x < n + 1$$

- ▶ Montrer qu'une relation binaire est une relation d'équivalence ou une relation d'ordre.
- ▶ Déterminer le sens de variation d'une suite : signe de $u_{n+1} u_n$ ou position de $\frac{u_{n+1}}{u_n}$ par rapport à 1 si les u_n sont tous strictement positifs.
- ▶ Prouver qu'une suite n'admet pas de limite en exhibant deux suites extraites de limites différentes.
- ▶ Déterminer le terme général d'une suite récurrente linéaire homogène d'ordre 2 via l'équation caractéristique.

3 Questions de cours

- \blacktriangleright Soit \mathcal{R} une relation d'équivalence sur un ensemble E. Rappeler la définition d'une classe d'équivalence. Montrer que deux classes d'équivalence sont soit disjointes soit confondues.
- ▶ Soit E un ensemble. On définit une relation binaire \sim sur E^E de la manière suivante : pour tout couple $(f,g) \in (E^E)^2$, $f \sim g$ si et seulement si il existe une bijection $\phi : E \to E$ telle que $f = \phi^{-1} \circ g \circ \phi$. Montrer que \sim est une relation d'équivalence.
- ▶ Montrer l'unicité de la limite d'une suite réelle. On se restreindra aux cas de limites finies.
- $\blacktriangleright \text{ Soient } (u_n) \text{ et } (\nu_n) \text{ deux suites réelles de limites finies } \ell_1 \text{ et } \ell_2. \text{ Montrer que } \lim_{n \to +\infty} u_n + \nu_n = \ell_1 + \ell_2.$
- ▶ Déterminer le terme général d'une suite récurrente linéaire homogène d'ordre 2 au choix de l'examinateur.

Bonnes fêtes et bonnes vacances.