

SEMAINE DU 11/04 AU 15/04

1 Cours

Intégration

Intégration des fonctions en escalier Définition d'une fonction en escalier sur un segment, de son intégrale sur ce segment. Propriétés de l'intégrale : linéarité, positivité, croissance, relation de Chasles.

Intégration des fonctions continues par morceaux Définition d'une fonction continue par morceaux sur un segment. Approximation uniforme d'une fonction continue par morceaux par une fonction en escalier (hors-programme). Intégrale d'une fonction continue par morceaux. Propriétés de l'intégrale : linéarité, positivité, croissance, inégalité triangulaire, relation de Chasles. Une fonction *continue* et de signe constant admet une intégrale nulle sur $[a, b]$ *si et seulement si* elle est nulle sur $[a, b]$.

Calcul de primitives et d'intégrales Définition d'une primitive d'une fonction continue. Si f continue, $x \mapsto \int_a^x f(t)dt$ est l'unique primitive de f nulle en a . Deux primitives diffèrent d'une constante. Si F est une primitive de f , $\int_a^b f(t)dt = F(b) - F(a)$. Intégration par parties. Changement de variables.

Approximation d'intégrales Sommes de Riemann et convergence.

Intégration des fonctions à valeurs complexes Fonctions en escalier et continues par morceaux à valeurs complexes. Intégrale d'une fonction continue par morceaux à valeurs complexes. Inégalité triangulaire.

2 Révisions

Algèbre linéaire : espaces vectoriels, dimension, applications linéaires

3 Méthodes à maîtriser

- Majorer, minorer, encadrer une intégrale par croissance de l'intégrale ou inégalité triangulaire.
- Étudier une suite définie par des intégrales (souvent une IPP pour déterminer une relation de récurrence).
- Étudier une fonction définie par une intégrale à bornes variables (notamment calculer sa dérivée).
- Connaître les différentes techniques de calcul d'intégrales et de primitives.
- Reconnaître des sommes de Riemann.

4 Démonstrations classiques

- Convergence de la somme de Riemann vers l'intégrale dans le cas d'une fonction \mathcal{C}^1 .
- Cas d'égalité dans l'inégalité triangulaire.
- Etude de fonctions définies par une intégrale (exemple classique : $x \mapsto \int_x^{x^2} \frac{dt}{\ln t}$).
- L'intégrale d'une fonction continue et de signe constant sur un segment non réduit à un point est nulle *si et seulement si* cette fonction est nulle (exercice de la banque CCP).