Convergences

Exercice 1 ★★

On pose $u_n = \int_{-\infty}^{(n+1)\pi} \frac{\mathrm{d}x}{1 + x^4 \sin^2 x}$ pour $n \in \mathbb{N}$.

- 1. Montrer que $u_n = \int_0^{\pi} \frac{\mathrm{d}x}{1 + (x + n\pi)^4 \sin^2 x}$ pour tout $n \in \mathbb{N}$.
- 2. Encadrer les termes de la suite (u_n) à l'aide des termes de la suite (v_n) où

$$v_n = \int_0^\pi \frac{\mathrm{d}x}{1 + (n\pi)^4 \sin^2 x}$$

- 3. Calculer explicitement v_n et en déduire un équivalent de u_n .
- **4.** En déduire la convergence de l'intégrale $\int_{0}^{+\infty} \frac{\mathrm{d}x}{1 + x^4 \sin^2 x}.$

Exercice 2 $\star\star\star\star$

Mines MP 2016

Soit $P \in \mathbb{R}[X]$ de degré supérieur ou égal à 2.

- 1. Déterminer la nature de l'intégrale I = $\int_0^{+\infty} \cos(P(x)) dx$.
- 2. Déterminer la nature de l'intégrale $J = \int_{0}^{+\infty} |\cos(P(x))| dx$.
- **3.** Déterminer le signe de I lorsque $P = X^2$.

Exercice 3 ★★

Les intégrales suivantes convergent-elles?

$$1. \int_0^1 \ln t \, dt$$

$$5. \int_0^1 \frac{\mathrm{d}t}{(1-t)\sqrt{t}}$$

$$2. \int_0^{+\infty} e^{-t^2} \, \mathrm{d}t$$

$$6. \int_0^{+\infty} \frac{\ln(t)}{t^2 + 1} \, \mathrm{d}t$$

$$3. \int_0^{+\infty} x \sin(x) e^{-x} dx$$

$$6. \int_0^{+\infty} \frac{\ln(t)}{t^2 + 1} \, \mathrm{d}$$

4.
$$\int_0^{+\infty} \ln(t)e^{-t} dt$$

$$7. \int_1^{+\infty} \frac{\sqrt{\ln x}}{(x-1)\sqrt{x}} \, \mathrm{d}x$$

Exercice 4 ★★

Intégrales de Bertrand

- 1. Pour quelles valeurs des réels α et β l'intégrale $\int_{-t}^{+\infty} \frac{dt}{t^{\alpha}(\ln t)^{\beta}}$ converge-t-elle?
- 2. Même question pour l'intégrale $\int_0^{\frac{1}{e}} \frac{dt}{t^{\alpha} |\ln t|^{\beta}}$.

Exercice 5 $\star\star\star$

Centrale-Supélec MP 2021

On considère I = $\int_{-\infty}^{+\infty} e^{-x} \ln x \, dx$.

- 1. Montrer l'existence de I.
- **2.** Montrer I < 0.

Exercice 6 ***

- 1. Montrer que $\int_{1}^{+\infty} \frac{\sin x}{\sqrt{x}} dx$ converge.
- **2.** Déterminer la nature de $\int_1^{+\infty} \frac{\sin x}{\sqrt{x} + \sin x} dx$.

Exercice 7 ***

Pour quelles valeurs du réel α l'intégrale $\int_0^{+\infty} \frac{\sin t}{t^{\alpha}} dt$ converge-t-elle?

Exercice 8 ***

X-ESPCI PC 2013

Soit $f: [1, +\infty[\to \mathbb{R} \text{ telle que } (f')^2 \text{ est intégrable sur } [1, +\infty[$. Montrer qu'il en est de même pour $g: t \mapsto \left(\frac{f(t)}{t}\right)^2$.

Exercice 9 **

Non convergence absolue de l'intégrale de Dirichlet

Montrer que $t\mapsto \frac{\sin t}{t}$ n'est pas intégrable sur \mathbb{R}_+^* .

Théorie

Exercice 10 ★★★★

- 1. Soit f une application continue par morceaux de \mathbb{R}_+ dans \mathbb{R} admettant une limite ℓ en $+\infty$ et telle que l'intégrale $\int_0^{+\infty} f(t) dt$ converge. Montrer que $\ell = 0$.
- **2.** Soit f une application uniformément continue de \mathbb{R}_+ dans \mathbb{R} telle que l'intégrale $\int_0^{+\infty} f(t) \, \mathrm{d}t \text{ converge. Montrer que } \lim_{t \to \infty} f = 0.$

Exercice 11 ★★★★

Soit $f: \mathbb{R}_+ \to \mathbb{R}$ une fonction lipschitzienne telle que l'intégrale $\int_0^{+\infty} f(t) \, \mathrm{d}t$ converge. Montrer que $\lim_{t \to +\infty} f(t) = 0$.

Exercice 12 ***

Soit $f: \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ une fonction de classe \mathcal{C}^2 telle que f et f'' soit de carré intégrable sur \mathbb{R} .

- **1.** Montrer que f' est également de carré intégrable sur \mathbb{R} .
- 2. Montrer que

$$\left(\int_{\mathbb{R}} f'^2\right)^2 \le \left(\int_{\mathbb{R}} f^2\right) \left(\int_{\mathbb{R}} f''^2\right)$$

Exercice 13 ***

Banque Mines-Ponts PSI 2021

Soit $f: \mathbb{R}_+ \to \mathbb{R}$ continue telle que $\lim_{x \to +\infty} f(x) = 0$.

1. Prouver que $\int_0^{+\infty} f(t) dt$ converge si et seulement si la suite $n \mapsto \int_0^n f(t) dt$ converge et que dans ces conditions :

$$\int_0^{+\infty} f(t) dt = \lim_{n \to +\infty} \int_0^n f(t) dt$$

2. Que se passe-t-il si on enlève l'hypothèse $\lim_{x \to +\infty} f(x) = 0$?

Calculs

Exercice 14 ★★★

Convergence et calcul de $\int_0^{+\infty} e^{-a^2t^2 - \frac{b^2}{t^2}} dt$ où a, b > 0. On admettra que $\int_{-\infty}^{+\infty} e^{-u^2} du = \sqrt{2\pi}$.

Exercice 15 ***

n désigne un entier naturel et α un réel strictement supérieur à -1. On pose

$$I_n(\alpha) = \int_0^1 \frac{x^n dx}{\sqrt{(1-x)(1+\alpha x)}}$$

- 1. Justifier que cette intégrale est bien définie.
- **2.** Calculer $I_0(0)$. Posant $t = \sqrt{\frac{1 + \alpha x}{1 x}}$, calculer $I_0(\alpha)$. Montrer que la fonction $\alpha \mapsto I_0(\alpha)$ est continue en 0.
- 3. En dérivant $x^n \sqrt{(1-x)(1+\alpha x)}$ trouver une relation de récurrence entre $I_{n-1}(\alpha)$, $I_n(\alpha)$ et $I_{n+1}(\alpha)$. En déduire les valeurs de $I_n(0)$ et $I_n(1)$.

Exercice 16 ★★

Convergence et calcul de

$$I = \int_0^{+\infty} \ln\left(1 + \frac{1}{t^2}\right) dt$$

Exercice 17 ***

X MP 2010

Déterminer

$$\sup_{x>0} \int_0^{+\infty} \frac{\ln t}{x^2 + t^2} dt$$

Exercice 18 ***

- **1.** Pour quelles valeurs de $a \in \mathbb{R}$ l'intégrale $I(a) = \int_0^{+\infty} \frac{dt}{(1+t^2)(1+t^a)}$ converget-elle?
- 2. On pose $J(a) = \int_0^1 \frac{dt}{(1+t^2)(1+t^a)}$. Montrer que I(a) = J(a) + J(-a).
- **3.** En déduire la valeur de I(a).

Exercice 19 ★★

CCP MP

- 1. Déterminer le domaine de définition F : $x \mapsto \int_0^{+\infty} \frac{\ln t}{x^2 + t^2} dt$.
- 2. Calculer F(1).
- **3.** Calculer F(x) pour tout x dans le domaine de définition de f.

Exercice 20 ***

Intégrale de Dirichlet

- **1.** A l'aide d'une intégration par parties, montrer que l'intégrale $I = \int_0^{+\infty} \frac{\sin t}{t} dt$ converge.
- **2.** On pose pour $n \in \mathbb{N}^*$,

$$u_n = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\cos(t)\sin(2nt)}{\sin(t)} dt \qquad \text{et} \qquad v_n = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\sin(2nt)}{t} dt$$

Justifier que u_n et v_n sont bien définies.

- 3. En calculant $u_{n+1} u_n$, montrer que la suite (u_n) est constante et préciser sa valeur.
- **4.** Soit φ une fonction de classe \mathcal{C}^1 sur un segment [a,b]. Par une intégration par parties, montrer que $\lim_{\lambda \to +\infty} \int_a^b h(t) \sin(\lambda t) dt = 0$.
- **5.** Montrer que la fonction $h: t \mapsto \frac{1}{t} \frac{\cos t}{\sin t}$ est prolongeable en une fonction de classe $C^1 \sup \left[0, \frac{\pi}{2}\right]$.
- **6.** Calculer la limite de la suite $(u_n v_n)$ puis celle de (v_n) .
- 7. En déduire la valeur de I.

Exercice 21 ★★★

TPE-EIVP PSI 2017

Soit a > 1, Soit f une fonction continue sur $[1, +\infty[$ admettant une limite finie ℓ en $+\infty$.

1. Montrer que pour tout x dans $[1, +\infty[$:

$$\int_{1}^{x} \frac{f(at) - f(t)}{t} dt = \int_{x}^{ax} \frac{f(t)}{t} dt - \int_{1}^{a} \frac{f(t)}{t} dt$$

2. En déduire que $\int_{1}^{+\infty} \frac{f(at) - f(t)}{t} dt$ converge et la calculer en fonction de $\int_{1}^{a} \frac{f(t)}{t} dt$ et de ℓ .

Exercice 22 ★★

On pose $I = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \ln(\sin t) dt$.

- 1. Justifier que l'intégrale définissant I converge.
- **2.** Montrer que $I = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \ln(\cos t) dt$.
- 3. Montrer que $2I = \int_0^{\pi} \ln(\sin t) dt$.
- 4. En déduire la valeur de I.

Exercice 23 ***

Soient a et b deux réels strictement positifs. Convergence et calcul de

$$I = \int_0^{+\infty} \frac{e^{-at} - e^{-bt}}{t} dt$$

Exercice 24 ★★

Existence et calcul de

$$I = \int_0^{+\infty} \frac{\mathrm{d}x}{x^3 + 1}$$

Exercice 25 **

Trigonométrie

Soit $a \in \mathbb{R}_+^*$. Justifier la convergence et calculer

$$I = \int_0^{+\infty} \cos(t)e^{-at} dt \qquad \text{et} \qquad J = \int_0^{+\infty} \sin(t)e^{-at} dt$$

Exercice 26 ★

Déterminer la nature des intégrales suivantes et calculer leurs valeurs le cas échéant.

1.
$$I = \int_0^{+\infty} \frac{1}{4+t^2} dt$$

5.
$$M = \int_0^{+\infty} e^{-at} dt$$
 avec $a \in \mathbb{R}_+^*$

2.
$$J = \int_0^2 \frac{1}{4 - t^2} dt$$

6. N =
$$\int_0^{\frac{1}{3}} \frac{1}{\sqrt{1-9t^2}} dt$$

$$3. K = \int_0^{+\infty} \sin(t) dt$$

7.
$$O = \int_{3}^{+\infty} \frac{dt}{t^2 - 3t + 2}$$

4.
$$L = \int_0^1 \ln(t) dt$$

$$8. P = \int_2^{+\infty} \frac{\mathrm{d}t}{t \ln t}$$

Comportements asymptotiques

Exercice 27 ★★★

Centrale PSI

Soit f une fonction continue sur \mathbb{R}_+ . On pose

$$\forall x \in \mathbb{R}_+, \ \varphi(x) = f(x) + \int_0^x f(t) \ dt$$

On suppose que φ admet une limite finie en $+\infty$. Montrer que f admet pour limite 0 en $+\infty$.

Exercice 28 ***

Mines-Ponts MP 2016

- **1.** Soient $a \in \mathbb{C}$ tel que $\operatorname{Re}(a) > 0$ et f de classe \mathcal{C}_1 sur \mathbb{R}_+ à valeurs dans \mathbb{C} telle que $\lim_{t \to \infty} f' + af = 0$. Montrer que $\lim_{t \to \infty} f = 0$.
- **2.** Soit f de classe \mathcal{C}^2 sur \mathbb{R}_+ à valeurs dans \mathbb{C} telle que $\lim_{t\to\infty}f''+f'+f=0$. Montrer que $\lim_{t\to\infty}f=0$.
- 3. Généraliser.

Exercice 29 ***

Centrale MP 2018

Soit $f: \mathbb{R}_+ \mapsto \mathbb{R}$ continue de carré intégrable sur \mathbb{R}_+ . On pose $g: x \in \mathbb{R}_+^* \mapsto \frac{1}{x} \int_0^x f(t) dt$.

- 1. Déterminer la limite de g en 0.
- 2. Déterminer la limite de g en $+\infty$.
- 3. Montrer que g est de carré intégrable sur \mathbb{R}_+ .

Exercice 30 ***

Déterminer un équivalent simple de F: $x \mapsto \int_0^x e^{t^2} dt$ au voisinage de $+\infty$.

Exercice 31 ★★★

- **1.** Montrer que $f: t \mapsto e^{-t^2}$ est intégrable sur \mathbb{R}_+ .
- 2. Déterminer un équivalent de g: $x \mapsto \int_{x}^{+\infty} e^{-t^2} dt$ au voisinage de $+\infty$.

Exercice 32 ★★★

Soit f une fonction de classe \mathcal{C}^1 sur \mathbb{R} telle que $\lim_{x\to +\infty} f(x) + f'(x) = 0$. Montrer que $\lim_{x\to +\infty} f(x) = 0$.

Exercice 33 ***

Banque Mines-Ponts PSI 2021

Soit $f(x) = \int_{x}^{+\infty} \frac{e^{-t}}{t} dt$.

- 1. Montrer que f est définie sur $I =]0, +\infty[$.
- **2.** Montrer que f est dérivable sur I et déterminer f'.
- 3. Déterminer un équivalent de f en 0 et en $+\infty$.
- **4.** Montrer que $\int_0^{+\infty} f(t) dt$ est définie et la calculer.

Exercice 34 ★★

Mines-Télécom (hors Mines-Ponts) MP 2017

On pose pour tout x non nul,

$$F(x) = \int_{x}^{7x} \frac{1 - e^{-t}}{t^2} dt$$

Déterminer $\lim_{x\to 0^+} F(x)$ et $\lim_{x\to +\infty} F(x)$.

Exercice 35 ★

Déterminer des équivalents de

- 1. $\int_{1}^{x} \frac{\arctan t}{t} dt$ lorsque x tend vers $+\infty$;
- 2. $\int_{x}^{+\infty} \frac{\operatorname{th} t}{t^2} dt$ lorsque x tend vers $+\infty$;
- 3. $\int_{x}^{1} \frac{e^{t}}{t^{3}} dt$ lorsque x tend vers 0^{+} ;
- 4. $\int_0^x \frac{\sin t}{t^{\frac{3}{2}}} dt \text{ lorsque } x \text{ tend vers } 0^+.$

Suites d'intégrales

Exercice 36 ★★★

CCP MP 2018

Soit $f: \mathbb{R}_+ \to \mathbb{R}$ continue et π -périodique vérifiant

$$\int_0^{\pi} f(t) \, \mathrm{d}t = 0$$

Pour $n \in \mathbb{N}^*$, on pose

$$u_n = \int_0^{\pi} f(t)e^{-t/n} dt \qquad v_n = \int_0^{+\infty} f(t)e^{-t/n} dt$$

- **1.** Justifier que u_n et v_n sont bien définis pour tout $n \in \mathbb{N}^*$.
- **2.** Justifier qu'il existe une suite (a_n) , que l'on précisera, telle que $v_n = a_n u_n$ pour tout $n \in \mathbb{N}^*$.
- **3.** Montrer que $a_n \sim \frac{n}{n \to +\infty} \frac{n}{\pi}$.
- **4.** Montrer que (u_n) converge vers 0. Montrer que (v_n) converge et préciser sa limite.

Exercice 37 ★★

Soit $f_n: t \mapsto \cos(2nt)\ln(\sin t)$ pour $n \in \mathbb{N}^*$.

- **1.** Justifier que f_n est intégrable sur $\left[0, \frac{\pi}{2}\right]$
- **2.** On pose alors $I_n = \int_0^{\frac{\pi}{2}} f_n(t) dt$ et $J_n = 2nI_n$. Justifier que pour tout $n \in \mathbb{N}^*$,

$$J_n = -\int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\cos t}{\sin t} \cdot \sin(2nt) dt$$

3. Calculer $J_{n+1} - J_n$ et en déduire la valeur de J_n puis celle de I_n .

Exercice 38 ★★

Mines-Télécom (hors Mines-Ponts) MP 2021

Pour tout $n \in \mathbb{N}$, on pose $I_n = \int_0^1 (t \ln(t))^n dt$. Montrer que cette intégrale converge. Donner sa valeur.

Exercice 39 ★

On pose $I_n = \int_0^1 \ln^n(x) dx$ pour $n \in \mathbb{N}$.

- **1.** Justifier que I_n converge.
- 2. Déterminer une relation de récurence suivie par la suite (I_n) .
- **3.** En déduire la valeur de I_n .

Fonctions définies par des intégrales

Exercice 40 ★★

Fonction Γ

On pose
$$\Gamma(x) = \int_0^{+\infty} t^{x-1} e^{-t} dt$$
.

- **1.** Déterminer le domaine de définition de Γ .
- 2. Montrer que

$$\forall x \in \mathbb{R}_+^*, \ \Gamma(x+1) = x\Gamma(x)$$

3. Déterminer $\Gamma(n)$ pour $n \in \mathbb{N}^*$.

Exercice 41 ★★

Fonction B d'Euler

Onpose B:
$$(x, y) \mapsto \int_0^1 t^{x-1} (1-t)^{y-1}$$
.

- **1.** Montrer que B est définie sur $(\mathbb{R}_+^*)^2$.
- **2.** Montrer que

$$\forall (x, y) \in (\mathbb{R}_+^*)^2, \ \mathrm{B}(x, y) = \mathrm{B}(y, x)$$

3. Montrer que

$$\forall (x,y) \in (\mathbb{R}_+^*)^2, \ B(x+1,y) = \frac{x}{x+y} B(x,y)$$

4. Calculer B(n+1, p+1) pour tout $(n, p) \in \mathbb{N}^2$.