

DEVOIR SURVEILLÉ N° 8 : CORRIGÉ

Problème 1 — Polynômes de Bernoulli – D’après ENAC 1995

Partie I –

1. a. On montre que d est injective et surjective.

Injectivité Soit $P \in \ker \phi$. Donc P est un polynôme constant. Il existe donc $\lambda \in \mathbb{R}$ tel que $P = \lambda$. Comme $P \in E$, on en déduit $\int_0^1 \lambda dx = 0$ i.e. $\lambda = 0$. Ainsi $P = 0$.

Surjectivité Soit $P \in \mathbb{K}[X]$. Comme D est clairement surjective, il existe $Q \in \mathbb{K}[X]$ tel que $D(Q) = P$. Posons $\lambda = \int_0^1 Q(t)dt$. Alors $Q - \lambda \in E$ et $D(Q - \lambda) = P$. Ainsi d est surjective.

b. $P = \phi(Q) \iff Q = d(P) \iff (P \in E \text{ ET } P' = Q)$.

2. a. Non. Il suffit de prendre $P = 1$. On trouve $\Phi(P) = X - \frac{1}{2}$ et donc $\Phi(P)(0) = -\frac{1}{2}$ tandis que $\Phi(P(0)) = \Phi(1) = X - \frac{1}{2}$.
- b. Non. Il suffit à nouveau de prendre $P = 1$. On trouve $\Phi(P) = X - \frac{1}{2}$ et donc $\Phi(P)(1 - X) = \frac{1}{2} - X$ tandis que $\Phi(P(1 - X)) = \Phi(1) = X - \frac{1}{2}$.

3. a. On a $B'_1 = B_0$ et donc il existe $\lambda \in \mathbb{R}$ tel que $B_1 = X + \lambda$. De plus, $\int_0^1 B_1(t)dt = 0$ donc $\lambda = -\frac{1}{2}$. D'où

$$B_1 = X - \frac{1}{2}$$

De même, $B'_2 = B_1$ et donc il existe $\mu \in \mathbb{R}$ tel que $B_2 = \frac{1}{2}X^2 - \frac{1}{2}X + \mu$. De plus, $\int_0^1 B_2(t)dt = 0$ donc $\mu = \frac{1}{12}$. D'où

$$B_2 = \frac{1}{2}X^2 - \frac{1}{2}X + \frac{1}{12}$$

- b. Remarquons tout d'abord que $B_n \in E$ pour $n \geq 1$. De plus, pour tout $n \in \mathbb{N}$, $B_{n+1} = \phi(B_n)$ et donc $B'_{n+1} = B_n$. Soit $n \geq 2$. On a :

$$B_n(1) - B_n(0) = \int_0^1 B'_n(t)dt = \int_0^1 B_{n-1}(t)dt = 0$$

car $B_{n-1} \in E$.

4. a. On a $P_{n+1} = (-1)^{n+1}B_{n+1}(1 - X)$ et donc

$$P'_{n+1} = (-1)^{n+2}B'_{n+1}(1 - X) = (-1)^n B_n(1 - X) = P_n$$

- b. D'après la question précédente, il suffit donc de montrer que $P_{n+1} \in E$ pour tout $n \in \mathbb{N}$. Or pour tout $n \in \mathbb{N}$

$$\int_0^1 P_{n+1}(t)dt = (-1)^n \int_0^1 B_{n+1}(1 - t)dt = (-1)^n \int_0^1 B_{n+1}(t)dt = 0$$

car $B_n \in E$ pour $n \geq 1$.

- c. On a $P_0 = B_0 = 1$. De plus, $P_{n+1} = \phi(P_n)$ et $B_{n+1} = \phi(B_n)$ pour tout $n \in \mathbb{N}$. On en déduit donc par récurrence que $P_n = B_n$ pour tout $n \in \mathbb{N}$. Ainsi

$$\forall n \in \mathbb{N}, B_n(1 - X) = (-1)^n B_n(X)$$

5. a. Soit $n \in \mathbb{N}$. En dérivant l'expression définissant Q_{n+1} , on obtient :

$$Q'_{n+1} = p^n \sum_{k=0}^{p-1} \frac{1}{p} B'_{n+1} \left(\frac{X+k}{p} \right) = p^{n-1} \sum_{k=0}^{p-1} \frac{1}{p} B_n \left(\frac{X+k}{p} \right) = Q_n$$

Vérifions que $Q_{n+1} \in E$:

$$\int_0^1 Q_{n+1}(t) dt = p^n \sum_{k=0}^{p-1} \int_0^1 B_{n+1} \left(\frac{t+k}{p} \right) dt$$

En effectuant le changement de variable $u = \frac{t+k}{p}$ dans chaque intégrale, on obtient :

$$\int_0^1 Q_{n+1}(t) dt = p^n \sum_{k=0}^{p-1} \int_{\frac{k}{p}}^{\frac{k+1}{p}} B_{n+1}(u) p du = p^{n+1} \int_0^1 B_{n+1}(u) du = 0$$

en utilisant la relation de Chasles et car $B_{n+1} \in E$. Ainsi $Q'_{n+1} = Q_n$ et $Q_{n+1} \in E$ donc $Q_{n+1} = \phi(Q_n)$ d'après **I.1.b**.

- b. On a $Q_0 = B_0 = 1$. Comme $Q_{n+1} = \phi(Q_n)$ et $B_{n+1} = \phi(B_n)$ pour tout $n \in \mathbb{N}$, on conclut par récurrence que pour tout $n \in \mathbb{N}$, $Q_n = B_n$. On a ainsi la relation demandée.
6. a. Soit $n \in \mathbb{N}$. On a $R'_{n+1} = B'_{n+1}(X+1) - B'_{n+1}(X) = B_n(X+1) - B_n(X) = R_n$
- b. Soit $n \in \mathbb{N}^*$. $R_n(0) = B_{n+1}(1) - B_{n+1}(0) = 0$ car $n+1 \geq 2$.
- c. On a $R_0 = 1$. Une récurrence simple montre que $R_n = \frac{X^n}{n!}$.
- d. D'après la question précédente :

$$\sum_{k=1}^m k^n = n! \sum_{k=1}^m R_n(k) = \sum_{k=1}^m B_{n+1}(k+1) - B_{n+1}(k) = n! (B_{n+1}(m+1) - B_{n+1}(1))$$

par télescope.

Partie II –

1. a. Comme $\deg B_0 = 0$ et que $B'_{n+1} = B_n$ pour tout $n \in \mathbb{N}$, on en déduit par récurrence que $B_n^{(k)} = B_{n-k}$ pour $0 \leq k \leq n$ et que $B_n^{(k)} = 0$ pour $k > n$. D'après la formule de Taylor appliquée à B_n en 0, on a :

$$B_n = \sum_{k=0}^n \frac{B_n^{(k)}(0)}{k!} X^k = \sum_{k=0}^n \frac{B_{n-k}(0)}{k!} X^k = \sum_{k=0}^n \frac{b_{n-k}}{k!} X^k$$

- b. Comme $B_0 = 1$, on a clairement $b_0 = 1$.

Soit $n \in \mathbb{N}^*$. En intégrant la relation précédente entre 0 et 1, on a :

$$\int_0^1 B_n(t) dt = \sum_{k=0}^n \frac{b_{n-k}}{(k+1)!}$$

Or pour $n \geq 1$, $B_n \in E$ car $B_n = \phi(B_{n-1})$ donc $\int_0^1 B_n(t) dt = 0$. En isolant le terme d'indice $k = 0$ de la somme, on en déduit :

$$b_n = - \sum_{k=1}^n \frac{b_{n-k}}{(k+1)!}$$

- c. Soit $m \in \mathbb{N}^*$. D'après la question **I.4.c**, on a $B_{2m+1}(1-X) = -B_{2m+1}(X)$. En substituant 0 à X , on obtient $B_{2m+1}(1) = -B_{2m+1}(0)$. Mais comme $2m+1 \geq 2$, on a $B_{2m+1}(0) = B_{2m+1}(1)$ d'après la question **I.3.b**. Ainsi $b_{2m+1} = B_{2m+1}(0) = 0$.

2. a. En choisissant $p = 2$ et en substituant 0 à X dans la relation de la question **I.5.b**, on obtient :

$$B_n(0) = 2^{n-1} \left[B_n(0) + B_n\left(\frac{1}{2}\right) \right]$$

et donc

$$B_n\left(\frac{1}{2}\right) = \frac{b_n(1 - 2^{n-1})}{2^{n-1}}$$

- b. En choisissant $p = 3$ et en substituant 0 à X dans la relation de la question **I.5.b**, on obtient :

$$B_n(0) = 3^{n-1} \left[B_n(0) + B_n\left(\frac{1}{3}\right) + B_n\left(\frac{2}{3}\right) \right]$$

Mais comme $B_n(1 - X) = (-1)^n B_n(X)$, on obtient en substituant $\frac{1}{3}$ à X : $B_n\left(\frac{2}{3}\right) = B_n\left(\frac{1}{3}\right)$ car n est pair. Par conséquent

$$B_n\left(\frac{1}{3}\right) = \frac{b_n(1 - 3^{n-1})}{2 \times 3^{n-1}}$$

De même, en choisissant $p = 4$ et en substituant 0 à X dans la relation de la question **I.5.b**, on obtient :

$$B_n(0) = 4^{n-1} \left[B_n(0) + B_n\left(\frac{1}{4}\right) + B_n\left(\frac{1}{2}\right) + B_n\left(\frac{3}{4}\right) \right]$$

Or on a vu plus haut que $2^{n-1} [B_n(0) + B_n(\frac{1}{2})] = b_n$. De plus, pour les mêmes raisons que précédemment $B_n(\frac{1}{4}) = B_n(\frac{3}{4})$. Par conséquent

$$B_n\left(\frac{1}{4}\right) = \frac{b_n(1 - 2^{n-1})}{2 \times 4^{n-1}}$$

Enfin, en choisissant $p = 6$ et en substituant 0 à X dans la relation de la question **I.5.b**, on obtient :

$$B_n(0) = 6^{n-1} \left[B_n(0) + B_n\left(\frac{1}{6}\right) + B_n\left(\frac{1}{3}\right) + B_n\left(\frac{1}{2}\right) + B_n\left(\frac{2}{3}\right) + B_n\left(\frac{5}{6}\right) \right]$$

On a vu précédemment que $3^{n-1} [B_n(0) + B_n(\frac{1}{3}) + B_n(\frac{2}{3})] = b_n$ et on a encore $B_n(\frac{1}{6}) = B_n(\frac{5}{6})$. Par conséquent

$$B_n\left(\frac{1}{6}\right) = \frac{b_n(1 + 6^{n-1} - 2^{n-1} - 3^{n-1})}{2 \times 6^{n-1}}$$

3. a. Il suffit de prendre $m = 1$.

- b. Comme $(-1)^m B_{2m-1}$ est la dérivée de $(-1)^m B_{2m}$, $(-1)^m B_{2m}$ est strictement croissante sur $[0, \frac{1}{2}]$ et elle est également continue sur cet intervalle. De plus, d'après la question **II.2.a**, $B_{2m}(0)$ et $B_{2m}(\frac{1}{2})$ sont de signes opposés donc $(-1)^m B_{2m}$ s'annule une unique fois sur $]0, \frac{1}{2}[$ en vertu du théorème de la bijection monotone.

- c. $(-1)^m B_{2m}$ est donc négative puis positive sur $[0, \frac{1}{2}]$. De plus, $(-1)^m B_{2m}$ ne s'annule qu'une fois sur $[0, \frac{1}{2}]$. On en déduit que $(-1)^{m+1} B_{2m+1}$ est strictement croissante puis strictement décroissante sur $[0, \frac{1}{2}]$. Comme $2m+1$ est impair, on a $B_{2m+1}(0) = B_{2m+1}(\frac{1}{2}) = 0$. Ainsi $(-1)^{m+1} B_{2m+1}$ est strictement positive sur $]0, \frac{1}{2}[$.

- d. Soit l'hypothèse de récurrence :

HR(m) : « $(-1)^m B_{2m-1}$ est strictement positive sur $]0, \frac{1}{2}[$. »

On a vu à la question **II.3.a** que HR(1) est vraie. Les questions **II.3.b** et **II.3.c** prouvent que $HR(m) \Rightarrow HR(m+1)$. On en conclut que HR(m) est vraie pour tout $m \in \mathbb{N}^*$.

Mais la question **II.3.b** prouve alors que $(-1)^m B_{2m}$ s'annule une unique fois sur $]0, \frac{1}{2}[$ pour tout $m \in \mathbb{N}^*$.

- e. Comme B_{2m} est continue sur $[0, \frac{1}{2}]$ et que $B_{2m}(\frac{1}{6})$ et $B_{2m}(\frac{1}{4})$ sont de signes opposés, on en déduit que $\theta_m \in]\frac{1}{4}, \frac{1}{6}[$.

4. a. La fonction $(-1)^m B_{2m}$ est strictement croissante sur $[0, \frac{1}{2}]$. De plus,

$$\left| B_{2m}\left(\frac{1}{2}\right) \right| = |b_{2m}| \frac{2^{2m-1} - 1}{2^{2m-1}} \leq |b_{2m}|$$

pour $m \geq 1$ car, dans ce cas, $2^{2m-1} - 1 \geq 0$. Les variations de $(-1)^m B_{2m}$ permettent donc de déduire que la borne supérieure de $|B_{2m}|$ est atteinte en 0 et vaut $|b_{2m}|$. Le résultat est encore valable pour $m = 0$ puisque B_0 est constante égale à b_0 .

- b. On a $B_{2m}(1-t) = B_{2m}(t)$ pour tout $t \in \mathbb{R}$. Les variations de $(-1)^m B_{2m}$ sur $[\frac{1}{2}, 1]$ se déduisent donc de celles sur $[0, \frac{1}{2}]$: ainsi $|B_{2m}|$ atteint sa borne supérieure sur $[0, 1]$ en 0 et en 1 et celle-ci vaut $|b_{2m}|$.

Partie III –

```
1. def integrale(P):  
    return sum([P[k]/(k+1) for k in range(len(P))])  
  
2. def primitive(P):  
    return [0]+[P[k]/(k+1) for k in range(len(P))]  
  
3. def phi(P):  
    Q=primitive(P)  
    Q[0]=-integrale(Q)  
    return Q  
  
4. def B(n):  
    res=[[1]]  
    for _ in range(n):  
        res.append(phi(res[-1]))  
    return res
```