

DEVOIR SURVEILLÉ N°11

- La présentation, la lisibilité, l'orthographe, la qualité de la rédaction et la précision des raisonnements entreront pour une part importante dans l'appréciation des copies.
- On prendra le temps de vérifier les résultats dans la mesure du possible.
- Les calculatrices sont interdites.

Problème 1 – Centrale MP Maths 1 2014 – Polynômes de Tchebychev et de Dickson, applications

I Définitions et propriétés usuelles

Les polynômes de Tchebychev de première espèce $(T_n)_{n \in \mathbb{N}}$ sont définis par la relation

$$\forall n \in \mathbb{N}, \forall \theta \in \mathbb{R}, T_n(\cos \theta) = \cos(n\theta)$$

On ne demande pas de justifier l'existence et l'unicité de la famille de polynômes définie par cette relation.

1 Polynômes de première espèce

1.a Déterminer T_0 , T_1 , T_2 et T_3 .

1.b En remarquant que pour tout réel θ , on a $e^{in\theta} = (e^{i\theta})^n$, montrer que

$$\forall n \in \mathbb{N}, T_n = \sum_{0 \leq k \leq n/2} \binom{n}{2k} (X^2 - 1)^k X^{n-2k}$$

1.c Montrer que la suite $(T_n)_{n \in \mathbb{N}}$ vérifie la relation de récurrence

$$\forall n \in \mathbb{N}, T_{n+2} = 2XT_{n+1} - T_n \quad (\star)$$

En déduire, pour tout entier naturel n , le degré et le coefficient dominant de T_n . Retrouver ce résultat à l'aide de l'expression de la question **1.b**.

1.d Ecrire une fonction tchebychev en Python prenant en argument un entier naturel n et renvoyant la liste des coefficients de T_n par ordre de degré croissant.

1.e Montrer que, pour tout entier naturel n , le polynôme T_n est scindé sur \mathbb{R} à racines simples appartenant à $] -1, 1[$. Déterminer les racines de T_n .

2 Polynômes de deuxième espèce

On définit les polynômes $(U_n)_{n \in \mathbb{N}}$ de Tchebychev de deuxième espèce par

$$\forall n \in \mathbb{N}, U_n = \frac{1}{n+1} T'_{n+1}$$

2.a Montrer que

$$\forall n \in \mathbb{N}, \forall \theta \in \mathbb{R} \setminus \pi\mathbb{Z}, U_n(\cos \theta) = \frac{\sin((n+1)\theta)}{\sin \theta}$$

2.b En déduire les propriétés suivantes.

2.b.i La suite $(U_n)_{n \in \mathbb{N}}$ vérifie la même relation de récurrence (\star) que la suite $(T_n)_{n \in \mathbb{N}}$.

2.b.ii Pour tout entier naturel n , le polynôme U_n est scindé sur \mathbb{R} à racines simples appartenant à $] -1, 1[$. Déterminer les racines de U_n .

II Arithmétique des polynômes de Tchebychev

3 Division euclidienne

3.a Montrer que

$$\begin{cases} T_m T_n = \frac{1}{2}(T_{n+m} + T_{n-m}) & \text{pour tous entiers } 0 \leq m \leq n \\ T_m U_{n-1} = \frac{1}{2}(U_{n+m-1} + U_{n-m-1}) & \text{pour tous entiers } 0 \leq m < n \end{cases}$$

3.b Pour m et n entiers naturels tels que $m \geq n$, on se propose de déterminer le quotient $Q_{n,m}$ et le reste $R_{n,m}$ de la division euclidienne de T_n par T_m .

3.b.i On suppose $m < n < 3m$. Montrer que

$$Q_{n,m} = 2T_{n-m} \quad \text{et} \quad R_{n,m} = -T_{|n-2m|}$$

3.b.ii Déterminer $Q_{n,m}$ et $R_{n,m}$ lorsque n est de la forme $(2p+1)m$ avec $p \in \mathbb{N}^*$.

3.b.iii On suppose que $m > 0$ et que n n'est pas le produit de m par un entier impair. Montrer qu'il existe un unique entier $p \geq 1$ tel que $|n - 2pm| < m$ et que

$$Q_{n,m} = 2(T_{n-m} - T_{n-3m} + \cdots + (-1)^{p-1}T_{n-(2p-1)m}) \quad \text{et} \quad R_{n,m} = (-1)^p T_{|n-2pm|}$$

4 Plus grand commun diviseur

Dans cette question, on fixe deux entiers naturels m et n .

4.a Soit h le pgcd dans \mathbb{N} de $m+1$ et $n+1$. En examinant les racines communes à U_n et U_m , montrer que U_{h-1} est un pgcd dans $\mathbb{R}[X]$ de U_n et U_m .

4.b Soit $g > 0$ le pgcd de m et n . On pose $m_1 = m/g$ et $n_1 = n/g$.

4.b.i Montrer que si m_1 et n_1 sont impairs, alors T_g est un pgcd de T_n et T_m .

4.b.ii Montrer que si l'un des deux entiers m_1 ou n_1 est pair, alors T_n et T_m sont premiers entre eux.

4.b.iii Que peut-on dire des pgcd de T_n et T_m lorsque m et n sont impairs ? Lorsque n et m sont des puissances de 2 distinctes ?

III Un théorème

Dans cette partie, on munit l'ensemble $\mathbb{C}[X]$ des polynômes complexes de la loi de composition interne associative donnée par la composition, notée \circ . Plus précisément, étant donné $(P, Q) \in \mathbb{C}[X]^2$, si $P = \sum_{k=0}^{+\infty} p_k X^k$, la suite $(p_k)_{k \in \mathbb{N}}$ étant nulle à partir d'un certain rang, on a :

$$P \circ Q = \sum_{k=0}^{+\infty} p_k Q^k$$

On dit que les polynômes P et Q commutent si $P \circ Q = Q \circ P$. On note $\mathcal{C}(P)$ l'ensemble des polynômes complexes qui commutent avec le polynôme P :

$$\mathcal{C}(P) = \{Q \in \mathbb{C}[X], P \circ Q = Q \circ P\}$$

On cherche dans cette partie les familles $(F_n)_{n \in \mathbb{N}}$ de polynômes complexes vérifiant

$$\forall n \in \mathbb{N}, \deg(F_n) = n \quad \text{et} \quad \forall (m, n) \in \mathbb{N}^2, F_n \circ F_m = F_m \circ F_n \quad (\blacktriangle)$$

Il est clair que la famille $(X^n)_{n \in \mathbb{N}}$ convient.

On note G l'ensemble des polynômes complexes de degré 1, et pour $\alpha \in \mathbb{C}$, on pose $P_\alpha = X^2 + \alpha$.

5 Préliminaires

5.a Montrer que la famille $(T_n)_{n \in \mathbb{N}}$ vérifie la propriété (▲). On pourra comparer $T_n \circ T_m$ et T_{nm} .

5.b Vérifier que G est un groupe pour la loi \circ .

L'inverse pour la loi \circ d'un élément U de G sera noté U^{-1} .

6 Commutant de X^2 et T_2

6.a Soit $\alpha \in \mathbb{C}$ et soit Q un polynôme complexe non constant qui commute avec P_α . Montrer que Q est unitaire.

6.b En déduire que, pour tout entier $n \geq 1$, il existe au plus un polynôme de degré n qui commute avec P_α . Déterminer $\mathcal{C}(X^2)$.

6.c Soit P un polynôme complexe de degré 2. Justifier l'existence et l'unicité de $U \in G$ et $\alpha \in \mathbb{C}$ tels que $U \circ P \circ U^{-1} = P_\alpha$. Déterminer ces deux éléments lorsque $P = T_2$.

6.d Justifier que $\mathcal{C}(T_2) = \{-1/2\} \cup \{T_n, n \in \mathbb{N}\}$.

7 **7.a** Montrer que les seuls complexes α tels que $\mathcal{C}(P_\alpha)$ contienne un polynôme de degré 3 sont 0 et -2 .

7.b En déduire le théorème de Block et Thielmann : si $(F_n)_{n \in \mathbb{N}}$ vérifie (▲), alors il existe $U \in G$ tel que

$$\forall n \in \mathbb{N}^*, F_n = U^{-1} \circ X^n \circ U \quad \text{ou} \quad \forall n \in \mathbb{N}^*, F_n = U^{-1} \circ T_n \circ U$$

IV Puissances dans $GL_2(\mathbb{Z})$

Dans toute cette partie, on note $GL_2(\mathbb{Z})$ l'ensemble des inversibles de l'anneau $\mathcal{M}_2(\mathbb{Z})$, muni de son addition et de sa multiplication usuelles.

8 Justifier qu'un élément M de $\mathcal{M}_2(\mathbb{Z})$ appartient à $GL_2(\mathbb{Z})$ si et seulement si $|\det M| = 1$.

9 On introduit les polynômes de Dickson de première et deuxième espèce, $(D_n)_{n \in \mathbb{N}}$ et $(E_n)_{n \in \mathbb{N}}$, définis sous la forme de fonctions polynomiales de deux variables par :

$$D_0(x, a) = 2 \quad D_1(x, a) = x \quad E_0(x, a) = 1 \quad E_1(x, a) = x$$

puis, pour tout entier $n \in \mathbb{N}$,

$$D_{n+2}(x, a) = xD_{n+1}(x, a) - aD_n(x, a) \quad \text{et} \quad E_{n+2}(x, a) = xE_{n+1}(x, a) - aE_n(x, a)$$

Justifier la relation suivante avec les polynômes de Tchebychev :

$$\forall (x, a) \in \mathbb{C}^2, D_n(2xa, a^2) = 2a^n T_n(x) \quad \text{et} \quad E_n(2xa, a^2) = a^n U_n(x)$$

ainsi que les deux relations suivantes, valables pour tout entier naturel n et tout $(x, a) \in \mathbb{C}^* \times \mathbb{C}$:

$$D_n\left(x + \frac{a}{x}, a\right) = x^n + \frac{a^n}{x^n} \quad \text{et} \quad \left(x - \frac{a}{x}\right) E_n\left(x + \frac{a}{x}, a\right) = x^{n+1} - \frac{a^{n+1}}{x^{n+1}} \quad (\blacksquare)$$

10 Dans cette question, on cherche une condition nécessaire et suffisante pour qu'un élément A de $GL_2(\mathbb{Z})$ soit une puissance n -ième dans $GL_2(\mathbb{Z})$, c'est-à-dire qu'il existe une matrice $B \in GL_2(\mathbb{Z})$ telle que $A = B^n$. Dans toute la suite, on notera :

$$A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \quad \tau = \text{tr } A \quad \delta = \det A$$

10.a Soit $B \in GL_2(\mathbb{Z})$. On note, dans cette question uniquement, $\sigma = \text{tr } B$ et $\nu = \det B$. Montrer, pour tout $n \geq 2$, l'égalité

$$B^n = E_{n-1}(\sigma, \nu)B - \nu E_{n-2}(\sigma, \nu)I_2$$

où I_2 est la matrice identité d'ordre 2.

Etablir que $\text{tr}(B^n) = D_n(\sigma, \nu)$.

10.b En déduire que si A est une puissance n -ième ($n \geq 2$) dans $GL_2(\mathbb{Z})$, alors il existe $\sigma \in \mathbb{Z}$ et $\nu \in \{-1, 1\}$ tels que :

- $E_{n-1}(\sigma, \nu)$ divise b, c et $a - d$. On justifiera brièvement que $E_{n-1}(\sigma, \nu)$ est bien un entier.
- $\tau = D_n(\sigma, \nu)$ et $\delta = \nu^n$.

10.c On va maintenant établir la réciproque.

Soit A un élément de $GL_2(\mathbb{Z})$ pour lequel il existe $\sigma \in \mathbb{Z}$ et $\nu \in \{-1, 1\}$ vérifiant les deux conditions de la question précédente. Pour simplifier, on note $p = E_{n-1}(\sigma, \nu)$. On définit alors une matrice $B =$

$$\begin{pmatrix} r & s \\ t & u \end{pmatrix} \text{ avec}$$

$$r = \frac{1}{2} \left(\sigma + \frac{a-d}{p} \right) \quad s = \frac{b}{p} \quad t = \frac{c}{p} \quad u = \frac{1}{2} \left(\sigma - \frac{a-d}{p} \right)$$

10.c.i En introduisant une racine complexe du polynôme $X^2 - \sigma X + \nu$ et à l'aide de (■), montrer que

$$\tau^2 - 4\delta = p^2(\sigma^2 - 4\nu) \quad \text{puis} \quad ru - st = \nu$$

En déduire que B appartient à $GL_2(\mathbb{Z})$.

10.c.ii Montrer que $A = B^n$.

10.d Montrer que la matrice $A = \begin{pmatrix} 7 & 10 \\ 5 & 7 \end{pmatrix}$ est un cube dans $GL_2(\mathbb{Z})$ et déterminer une matrice $B \in GL_2(\mathbb{Z})$ telle que $B^3 = A$.