

DEVOIR À LA MAISON N° 4 : CORRIGÉ

Problème 1 — Étude d'une fonction

1. a. Pour tout $x \in I$, $\cos x \leq 1$ et donc $5 - 4 \cos x \geq 1 > 0$. f est donc bien définie sur I (et même sur \mathbb{R}).
 b. On peut utiliser la quantité conjuguée. Pour tout $x \in I$,

$$\begin{aligned} f(x) - \sin x &= \sin x \left(\frac{1}{\sqrt{5-4\cos x}} - 1 \right) = \frac{\sin x}{\sqrt{5-4\cos x}} (1 - \sqrt{5-4\cos x}) \\ &= \frac{\sin x}{\sqrt{5-4\cos x}} \frac{1 - (5-4\cos x)}{1 + \sqrt{5-4\cos x}} = -\frac{4\sin x}{\sqrt{5-4\cos x}} \frac{1 - \cos x}{1 + \sqrt{5-4\cos x}} \end{aligned}$$

Comme $1 - \cos x \geq 0$ et $\sin x \geq 0$ pour tout $x \in I$, $f(x) \leq \sin x$ i.e. $f(x) - \sin x \leq 0$ pour tout $x \in I$.


- c. On étudie la fonction $\varphi : x \mapsto \sin x - x$ sur I . On a $\varphi'(x) = \cos x - 1 \leq 0$ pour tout $x \in I$ et φ' ne s'annule qu'en 0 sur $[0, \pi]$. Ainsi φ est strictement décroissante sur $[0, \pi]$. Puisque $\varphi(0) = 0$, $\varphi(x) < 0$ pour tout $x \in]0, \pi]$.
 $f(0) = 0$ et pour tout $x \in]0, \pi]$, $f(x) \leq \sin x < x$. Donc l'unique solution de l'équation $f(x) = x$ sur I est $x = 0$.
2. Pour tout $x \in I$, $5 - 4 \cos x > 0$ donc $x \mapsto \sqrt{5 - 4 \cos x}$ est dérivable sur I et ne s'y annule pas. Comme \sin est également dérivable sur I , f est dérivable sur I comme quotient de fonctions dérivables sur I et pour $x \in I$:

$$\begin{aligned} f'(x) &= \frac{\cos x}{\sqrt{5-4\cos x}} - \frac{4\sin^2 x}{2(5-4\cos x)^{\frac{3}{2}}} = \frac{\cos x(5-4\cos x) - 2\sin^2 x}{(5-4\cos x)^{\frac{3}{2}}} \\ &= \frac{-2\cos^2 x + 5\cos x - 2}{(5-4\cos x)^{\frac{3}{2}}} = \frac{(2-\cos x)(2\cos x-1)}{(5-4\cos x)^{\frac{3}{2}}} \end{aligned}$$

En effet, $-2X^2 + 5X - 2$ se factorise sous la forme $(2-X)(2X-1)$. Comme $2 - \cos x > 0$ pour tout $x \in I$, le signe de $f(x)$ ne dépend que du signe de $2 \cos x - 1$. On en déduit le tableau de variations et le graphe suivants.

x	0	$\frac{\pi}{2}$	π
$f'(x)$		0	
f	0	$\frac{1}{2}$	0

On a notamment $f'(0) = 1$ et $f'(\pi) = -\frac{1}{3}$.



3. a. Comme $t \mapsto 5 - 4t$ ne s'annule pas sur $[-1, 1]$, ϕ est dérivable sur $[-1, 1]$ et $\phi'(t) = -\frac{9}{(4t-5)^2} < 0$ pour $t \in [-1, 1]$. ϕ est donc strictement décroissante sur $[-1, 1]$. Comme ϕ est continue et strictement décroissante sur $[-1, 1]$, $\phi([-1, 1]) = [\phi(1), \phi(-1)] = [-1, 1]$.
- b. \cos est définie sur I à valeurs dans $[-1, 1]$, ϕ est définie sur $[-1, 1]$ à valeurs dans $[-1, 1]$ et \arccos est définie sur $[-1, 1]$ donc $g = \arccos \circ \phi \circ \cos$ est définie sur I .
- c. \cos est strictement décroissante sur I à valeurs dans $[-1, 1]$, ϕ est strictement décroissante sur $[-1, 1]$ à valeurs dans $[-1, 1]$ et \arccos est strictement décroissante sur $[-1, 1]$. On en déduit que $g = \arccos \circ \phi \circ \cos$ est strictement décroissante sur I . Comme g est également continue sur I comme composée de fonctions continues, $g(I) = [g(\pi), g(0)] = [0, \pi] = I$.
4. a. Les variations de f montrent que $f(x) \in [0, \frac{1}{2}]$. Comme f est strictement décroissante et continue sur $[\frac{\pi}{3}, \pi]$, f induit une bijection de $[\frac{\pi}{3}, \pi]$ sur $[0, \frac{1}{2}]$. Il existe donc un unique $z \in [\frac{\pi}{3}, \pi]$ tel que $f(z) = f(x)$.
- b. $\cos(g(x)) = \cos(\arccos(\phi(\cos x))) = \phi(\cos x)$. Ainsi $\cos(g(x)) = \phi(\cos x) = \frac{4 - 5 \cos x}{5 - 4 \cos x}$.
- $\sin(g(x)) = \sqrt{1 - \cos^2(g(x))}$. On obtient $\sin(g(x)) = \sqrt{\frac{9 \sin^2 x}{(5 - 4 \cos x)^2}} = \frac{3 \sin x}{5 - 4 \cos x}$ car $\sin x \geq 0$ et $5 - 4 \cos x \geq 0$.
- c. $f(g(x)) = \frac{\sin(g(x))}{\sqrt{5 - 4 \cos(g(x))}}$. En remplaçant $\cos(g(x))$ et $\sin(g(x))$ par les expressions trouvées à la question précédente, on obtient bien $f(g(x)) = f(x)$.
De plus, $x \in [0, \frac{\pi}{3}]$ et g est strictement décroissante sur $[0, \frac{\pi}{3}]$ donc $g(x) \in [g(\frac{\pi}{3}), g(0)] = [\frac{\pi}{3}, \pi]$.
Enfin, z est l'unique réel appartenant à $[\frac{\pi}{3}, \pi]$ tel que $f(z) = f(x)$ donc $z = g(x)$.
5. a. On a $\cos \theta = 2 \cos^2 \frac{\theta}{2} - 1 = 1 - 2 \sin^2 \frac{\theta}{2}$. Or $\theta \in [0, \pi]$ donc $\frac{\theta}{2} \in [0, \frac{\pi}{2}]$. Ainsi $\cos \frac{\theta}{2}$ et $\sin \frac{\theta}{2}$ sont positifs. On en déduit les résultats annoncés.
- b. On a $\cos\left(\frac{x+z}{2}\right) = \cos \frac{x}{2} \cos \frac{z}{2} - \sin \frac{x}{2} \sin \frac{z}{2}$ et $\cos\left(\frac{z-x}{2}\right) = \cos \frac{x}{2} \cos \frac{z}{2} + \sin \frac{x}{2} \sin \frac{z}{2}$. De plus, $x, z \in [0, \pi]$ donc

$$\cos \frac{x}{2} \cos \frac{z}{2} = \sqrt{\frac{1 + \cos x}{2}} \sqrt{\frac{1 + \cos z}{2}} \qquad \sin \frac{x}{2} \sin \frac{z}{2} = \sqrt{\frac{1 - \cos x}{2}} \sqrt{\frac{1 - \cos z}{2}}$$

Or $\cos z = \cos(g(x)) = \frac{4 - 5 \cos x}{5 - 4 \cos x}$ donc

$$\begin{aligned} \cos \frac{x}{2} \cos \frac{z}{2} &= \frac{1}{2} \sqrt{(1 + \cos x) \left(1 + \frac{4 - 5 \cos x}{5 - 4 \cos x}\right)} = \frac{1}{2} \frac{\sqrt{(1 + \cos x)(9 - 9 \cos x)}}{\sqrt{5 - 4 \cos x}} = \frac{3}{2} \frac{\sqrt{1 - \cos^2 x}}{\sqrt{5 - 4 \cos x}} = \frac{3}{2} f(x) \\ \sin \frac{x}{2} \sin \frac{z}{2} &= \frac{1}{2} \sqrt{(1 - \cos x) \left(1 - \frac{4 - 5 \cos x}{5 - 4 \cos x}\right)} = \frac{1}{2} \frac{\sqrt{(1 + \cos x)(1 + \cos x)}}{\sqrt{5 - 4 \cos x}} = \frac{1}{2} \frac{\sqrt{1 - \cos^2 x}}{\sqrt{5 - 4 \cos x}} = \frac{1}{2} f(x) \end{aligned}$$

car $\sin x \geq 0$. On en déduit que $\cos\left(\frac{x+z}{2}\right) = f(x)$ et $\cos\left(\frac{z-x}{2}\right) = 2f(x)$.

6. a. f est strictement croissante et continue sur $[0, \frac{\pi}{3}]$ donc induit une bijection de $[0, \frac{\pi}{3}]$ sur $[f(0), f(\frac{\pi}{3})] = [0, \frac{1}{2}]$.
- b. Soit $y \in [0, \frac{1}{2}]$ et posons $x = h(y)$ de sorte que $y = f(x)$. Posons également $z = g(x)$.
D'après la question précédente, $\cos\left(\frac{x+z}{2}\right) = y$. De plus, $x \in [0, \frac{\pi}{3}]$ et $z \in [\frac{\pi}{3}, \pi]$ donc $\frac{x+z}{2} \in [\frac{\pi}{6}, \frac{2\pi}{3}] \subset [0, \pi]$.
Ainsi $\frac{x+z}{2} = \arccos y$.
D'après la question précédente, $\cos\left(\frac{z-x}{2}\right) = 2y$. De plus, $x \in [0, \frac{\pi}{3}]$ et $z \in [\frac{\pi}{3}, \pi]$ donc $\frac{z-x}{2} \in [0, \frac{\pi}{2}] \subset [0, \pi]$.
Ainsi $\frac{z-x}{2} = \arccos 2y$.
Enfin, $x = \frac{x+z}{2} - \frac{z-x}{2} = \arccos y - \arccos 2y$. On a donc $h(y) = \arccos y - \arccos 2y$.