

SEMAINE DU 23/11 AU 27/11

1 Cours

Équations différentielles linéaires

Notion d'équation différentielle Exemples. Ordre d'une équation différentielle. Problème de Cauchy. Équations différentielles linéaires homogènes et avec second membre. Structure de l'ensemble des solutions (solution particulière + solution de l'équation homogène). Principe de superposition.

EDL du premier ordre Solution d'une EDL homogène. Solution d'une EDL avec second membre. Méthode de variation de la constante. Unicité de la solution d'un problème de Cauchy.

EDL du second ordre à coefficients constants Équation caractéristique. Solution d'une EDL homogène (cas réel et complexe). Unicité de la solution d'un problème de Cauchy. Recherche d'une solution particulière : second membre de la forme $P(t)e^{kt}$, $P(t)\sin(kt)$, $P(t)\cos(kt)$ (P polynomiale).

Compléments Résolution par changement de variable ou de fonction. Équations fonctionnelles. Problèmes de raccord.

Comparaison de fonctions

Négligeabilité Définition et notation. Critère de négligeabilité : $f = o(g) \iff \lim_a \frac{f}{g} = 0$. Règles de calcul et opérations interdites. Changement de variable. Exemples usuels : croissances comparées. Lien avec les limites : $\lim_a f = l \iff f = l + o(1)$.

Équivalence Définition et notation. Critère d'équivalence : $f \sim_a g \iff \lim_a \frac{f}{g} = 1$. Lien avec les petits o : $f \sim_a g \iff f = g + o(g)$. Règles de calcul et opérations interdites. Changement de variable. Équivalents usuels en 0 et formules avec petits o associées. Lien avec les limites : si deux fonctions sont équivalentes alors elles admettent toutes deux la même limite ou elles n'admettent pas de limites ; si l est un réel **non nul** alors $f \sim_a l \iff \lim_a f = l$.

Domination Définition et notation. Règles de calcul et opérations interdites. L'équivalence et la négligeabilité impliquent la domination.

2 Méthodes à maîtriser

- ▶ Résoudre une EDL d'ordre un avec second membre :
 1. Résoudre l'équation homogène.
 2. Rechercher une solution particulière (utilisation éventuelle de la méthode de variation de la constante).
 3. Ensemble des solutions de l'équation avec second membre.
 4. Prise en compte d'une condition initiale éventuelle.
- ▶ Résoudre une EDL d'ordre deux à coefficients constants avec second membre :
 1. Résoudre l'équation homogène via l'équation caractéristique.
 2. Recherche d'une solution particulière (utilisation éventuelle du principe de superposition)
 - (a) second membre $P(t)e^{\alpha t} \rightarrow$ solution particulière $Q(t)e^{\alpha t}$
 - (b) second membre $P(t)\sin(kt)$ ou $P(t)\cos(kt) \rightarrow$ passage en complexe pour se ramener au premier cas puis retour au problème initial par passage à la partie réelle (cas cos) ou imaginaire (cas sin)
- ▶ Pour les comparaisons de fonctions, on retiendra surtout les erreurs à ne pas commettre :
 1. On ne compose pas à gauche.
 2. On n'additionne pas des équivalents.
 3. On n'additionne pas des relations avec des petits o différents.
 4. On ne mélange pas équivalents et petits o dans une même ligne.
- ▶ Passage par les petits o pour déterminer l'équivalent d'une somme.
- ▶ Déterminer des limites à partir d'équivalents ou de petits o .
- ▶ Savoir se ramener en 0 par un changement de variable.

3 Questions de cours

Pas de question de cours cette semaine.