

# 数学分析习题指南——课后习题

### 数分、数分、数分

作者: CharlesLC

组织: the stdio of LC

时间: January 31, 2020

版本: 1.00

确实,时 间和空间 是有限的。确实,我们总会有 分开的时候。但是正因为这样, 我们才会努力学习,我们才会 努力前进。我们的信仰是 享受数学。因为"数 学穿越时空"。



# 目 录

1	声明	2
2	分析基础	3
	2.1 实数共理、确界、不等式	3
	2.2 函数	4
	2.3 序列极限	4
	2.4 函数极限与连续概念	4
	2.5 闭区间上连续函数的性质	4
3	一元函数微分学	5
4	一元函数积分学	6
5	级数	7
6	多元函数积分学	8
7	多元函数积分学	9
8	典型综合题分析	10
9	附录及一些说明事项	11

### 第1章 声明

本产品不用与任何商业用途,最新版下载地址为: Github(点击即可下载),不保证题目和答案的正确性 (因为本人能力有限),但如有错误可通过 QQ(见图1.1) <sup>1</sup>或者邮箱<sup>2</sup>联系我。





### Keep doing

扫一扫二维码,加我QQ。

图 1.1: 二维码

点击Github后,找到 main.ptf 后点击,点击 download 即可。

<sup>11411279054</sup> 

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>1411279054@qq.com

### 第2章 分析基础

### 2.1 实数共理、确界、不等式

#### 练习题

- $|\mathbf{x}| = |a + b + a - b| \le |a + b| + |a - b| \le 2\max\{a + b, |a - b|\} < 1$ :  $|a| < \frac{1}{2}$  $2|b| = |a+b-(a-b)| \le |a+b| + |a-b| \le 2\max\{a+b, |a-b|\} < 1 : |b| < \frac{1}{2}$
- 2. 求证: 对  $\forall a, b \in \mathbf{R}$ , 有  $\max\{|a+b|, |a-b|, |1-b|\} \ge \frac{1}{2}$ .  $\mathbb{R} = |a+b-(a-b)+2(1-b)| \le |a+b|+|a-b|+2|1-b| \le 4\max\{|a+b|,|a-b|,|1-b|\}$  $\therefore \max\{|a+b|, |a-b|, |1-b|\} \ge \frac{1}{2}$
- 3. 求证: 对  $\forall a,b \in \mathbf{R}$ , 有  $\max\{a,b\} = \frac{a+b}{2} + \frac{|a-b|}{2}, \min\{a,b\} = \frac{a+b}{2} - \frac{|a-b|}{2};$ 并解释其几何意义.

解 易知, $\max\{a,b\} + \min\{a,b\} = a + b$  ①  $\max\{a,b\} - \min\{a,b\} = |a-b|$  ② 曲①、②得  $\max\{a,b\} = \frac{a+b}{2} + \frac{|a-b|}{2}$   $\min\{a,b\} = \frac{a+b}{2} - \frac{|a-b|}{2}$ 几何意义: $\max\{a,b\}$  指的是 a,b 中较大的那个,  $\min\{a,b\}$  指的是 a,b 中较小的那个。

4. 设 f(x) 在集合 X 上有界,求证:

$$|f(x) - f(y)| \le \sup_{x \in X} f(x) - \inf_{x \in X} f(x) \quad (\forall x, y \in X)$$

 $\underset{x \in X}{\text{pr}} f(x) - f(y) \le \sup_{x \in X} f(x) - \inf_{x \in X} f(x) : |f(x) - f(y)| \le |\sup_{x \in X} f(x) - \inf_{x \in X} f(x)| = \sup_{x \in X} f(x) - \inf_{x \in X} f(x) = \sup_{x \in X} f(x) - \inf_{x \in X} f(x) = \sup_{x \in X} f(x) - \inf_{x \in X} f(x) = \sup_{x \in X} f(x) - \inf_{x \in X} f(x) = \sup_{x \in X} f(x) - \inf_{x \in X} f(x) = \sup_{x \in X} f(x) - \inf_{x \in X} f(x) = \sup_{x \in X} f(x) - \inf_{x \in X} f(x) = \sup_{x \in X} f(x) - \inf_{x \in X} f(x) = \sup_{x \in X} f(x) - \inf_{x \in X} f(x) = \sup_{x \in X} f(x) - \inf_{x \in X} f(x) = \sup_{x \in X} f(x) - \inf_{x \in X} f(x) = \sup_{x \in X} f(x) - \inf_{x \in X} f(x) = \sup_{x \in X} f(x) - \inf_{x \in X} f(x) = \sup_{x \in X} f(x) - \inf_{x \in X} f(x) = \sup_{x \in X} f(x) - \inf_{x \in X} f(x) = \sup_{x \in X} f(x) - \inf_{x \in X} f(x) = \sup_{x \in X} f(x) - \inf_{x \in X} f(x) = \sup_{x \in X} f(x) - \inf_{x \in X} f(x) = \lim_{x \in X} f(x) - \inf_{x \in X} f(x) = \lim_{x \in X} f(x) - \inf_{x \in X} f(x) = \lim_{x \in X} f(x) - \inf_{x \in X} f(x) = \lim_{x \in X} f(x) - \inf_{x \in X} f(x) = \lim_{x \in X} f(x) - \inf_{x \in X} f(x) = \lim_{x \in X} f(x) - \inf_{x \in X} f(x) = \lim_{x \in X} f(x) - \inf_{x \in X} f(x) = \lim_{x \in X} f(x) - \inf_{x \in X} f(x) = \lim_{x \in X} f(x) - \inf_{x \in X} f(x) = \lim_{x \in X} f(x) - \lim_{x \in$  $\inf_{x \in X} f(x)$ 5. 设 f(x),g(x) 在集合 X 上有界, 求证:

$$\inf_{x \in X} \{f(x)\} + \inf_{x \in X} \{g(x)\} \le \inf_{x \in X} \{f(x) + g(x)\} \le \inf_{x \in X} \{f(x)\} + \sup_{x \in X} \{g(x)\}$$

1

$$\sup_{x \in X} \{f(x)\} \ + \inf_{x \in X} \{g(x)\} \le \sup_{x \in X} \{f(x) + g(x)\} \le \sup_{x \in X} \{f(x)\} \ + \sup_{x \in X} \{g(x)\}$$

(2)

① 易知,  $\sup_{x \in X} \{f(x)\} + \inf_{x \in X} \{g(x)\} \le f(x) + g(x) \ (\forall x \in X), \ \therefore \inf_{x \in X} \{f(x)\} + g(x) \}$  $\inf_{x \in X} \{g(x)\} \le \inf_{x \in X} \{f(x) + g(x)\}, \ \ \ \ \ \ \ \ \ \inf_{x \in X} \{f(x) + g(x)\} \le f(x) + g(x) \le f(x) + \sup_{x \in Y} \{g(x)\},$ 即  $\inf_{x \in X} \{f(x) + g(x)\} - \sup_{x \in X} g(x) \le f(x), (\forall x \in X), \therefore \inf_{x \in X} \{f(x) + g(x)\} \le \inf_{x \in X} \{f(x)\} + \sup_{x \in X} \{g(x)\}, 所以, \inf_{x \in X} \{f(x)\} + \inf_{x \in X} \{g(x)\} \le \inf_{x \in X} \{f(x) + g(x)\} \le \inf_{x \in X} \{f(x)\} + \sup_{x \in X} \{g(x)\}$ ② 类似上面做法.

2.2 函数 -4/11-

### 2.2 函数

#### 练习题

- - (1) 求证: f(x) 是奇函数;
  - (2) 求证:  $|f(x)| \le 2$ .
  - $(3) \ \ \mathring{\mathbb{R}} \underbrace{(f \circ f \circ \cdots \circ f)}_{n / \chi}(x).$

#### 解

- (1) f(x) = f(-x), f(x) 是奇函数.
- (2)  $f(x) = |1 + x| |1 x| \le |1 + x + 1 x| = 2$
- (3)
- 2. 设 f(x) 在 (0,+∞) 上定义, a > 0, b > 0. 求证:
  - (1) 若  $\frac{f(x)}{x}$  单调下降,则  $f(a+b) \le f(a) + f(b)$ ;
  - (2) 若  $\frac{f(x)}{x}$  单调上升,则  $f(a+b) \ge f(a) + f(b)$
- 3. 利用上题证明: 当 a > 0, b > 0 时,有
  - (1)  $\stackrel{\text{def}}{=} p > 1$   $\stackrel{\text{def}}{=} (a+b)^p \ge a^p + b^p$ ;
  - (2)  $\stackrel{\text{def}}{=} 0 , <math>(a+b)^p \ge a^p + b^p$ .
- 4. 设 f(x) 在 **R** 上定义, 且  $f(f(x)) \equiv x$ .
  - (1) 问这种函数有几个?
  - (2) 若 f(x) 为单调增加函数, 问这种函数有几个?
- 5. 求证: 若  $y = f(x)(x \in (-\infty, +\infty))$  是奇函数, 并且它的图像关于直线 x = b(b > 0) 对称, 则函数 f(x) 是周期函数并求其周期.
- 6. 设  $f: X \to Y$  时满射,  $g: Y \to Z$ . 求证:  $g \circ f: X \circ Z$ . 有反函数的充分必要条件为 f 和 g 都有反函数存在, 且  $(g \circ f)^{-1} = f^{-1} \circ g^{-1}$ .

### 2.3 序列极限

- 2.4 函数极限与连续概念
- 2.5 闭区间上连续函数的性质

## 第3章 一元函数微分学

## 第4章 一元函数积分学

## 第5章 级数

## 第6章 多元函数积分学

# 第7章 多元函数积分学

## 第8章 典型综合题分析

## 第9章 附录及一些说明事项

#### 附录及一些说明事项

- 1. 本书参考此作者编写的内容Github,另外还有参考文档,其下载地址为Github。
- 2. 另外,由于本人能力有限,对于一些没有完成的习题,若你有能力帮助,敬请Fork Github。