


# Cálculo Numérico

Um Livro Colaborativo

21 de outubro de 2016



# Organizadores

Dagoberto Adriano Rizzotto Justo - UFRGS

Esequia Sauter - UFRGS

Fabio Souto de Azevedo - UFRGS

Leonardo Fernandes Guidi - UFRGS

Matheus Correia dos Santos - UFRGS

Pedro Henrique de Almeida Konzen - UFRGS

# Licença

Este trabalho está licenciado sob a Licença Creative Commons Atribuição CompartilhaIgual 3.0 Não Adaptada. Para ver uma cópia desta licença, visite <http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/> ou envie uma carta para Creative Commons, PO Box 1866, Mountain View, CA 94042, USA.

# Nota dos organizadores

Este livro vem sendo construído de forma colaborativa desde 2011. Nosso intuito é melhorá-lo, expandi-lo e adaptá-lo às necessidades de um curso de cálculo numérico em nível de graduação.

Caso queira colaborar, tenha encontrado erros, tenha sugestões ou reclamações, entre em contato conosco pelo endereço de e-mail:

`livro_colaborativo@googlegroups.com`

Alternativamente, abra um chamado no repositório GitHub do projeto:

<https://github.com/livroscolaborativos/CalculoNumerico>

# Prefácio

Este livro busca abordar os tópicos de um curso de introdução ao cálculo numérico moderno oferecido a estudantes de matemática, física, engenharias e outros. A ênfase é colocada na formulação de problemas, implementação em computador da resolução e interpretação de resultados. Pressupõe-se que o estudante domine conhecimentos e habilidades típicas desenvolvidas em cursos de graduação de cálculo, álgebra linear e equações diferenciais. Conhecimentos prévios em linguagem de computadores é fortemente recomendável, embora apenas técnicas elementares de programação sejam real-

mente necessárias.

Ao longo do livro, fazemos ênfase na utilização do **software** livre **Scilab** para a implementação dos métodos numéricos abordados. Recomendamos que o leitor tenha à sua disposição um computador com o **Scilab** instalado. Não é necessário estar familiarizado com a linguagem **Scilab**, mas recomendamos a leitura do Apêndice A, no qual apresentamos uma rápida introdução a este pacote computacional. Alternativamente, existem algumas soluções em nuvem que fornecem acesso ao Scilab via internet. Por exemplo, a plataforma virtual rollApp (<https://www.rollapp.com/app/scilab>).

# Capítulo 1

## Introdução

Cálculo numérico é a disciplina que estuda as técnicas para a solução aproximada de problemas matemáticos. Estas técnicas são de natureza analítica e computacional. As principais preocupações normalmente envolvem exatidão e performance.

Aliado ao aumento contínuo da capacidade de computação dispo-



nível, o desenvolvimento de métodos numéricos tornou a simulação computacional de modelos matemáticos uma prática usual nas mais diversas áreas científicas e tecnológicas. As então chamadas simulações numéricas são constituídas de um arranjo de vários esquemas numéricos dedicados a resolver problemas específicos como, por exemplo: resolver equações algébricas, resolver sistemas lineares, interpolar e ajustar pontos, calcular derivadas e integrais, resolver equações diferenciais ordinárias, etc.. Neste livro, abordamos o desenvolvimento, a implementação, utilização e aspectos teóricos de métodos numéricos para a resolução desses problemas.

Os problemas que discutiremos não formam apenas um conjunto de métodos fundamentais, mas são, também, problemas de interesse na engenharia e na matemática aplicada. A necessidade de aplicar aproximações numéricas decorre do fato de que esses problemas podem se mostrar intratáveis se dispomos apenas de meios puramente analíticos, como aqueles estudados nos cursos de cálculo e álgebra linear. Por exemplo, o teorema de Abel-Ruffini nos garante que não existe uma fórmula algébrica, isto é, envolvendo apenas opera-

ções aritméticas e radicais, para calcular as raízes de uma equação polinomial de qualquer grau, mas apenas casos particulares:

- Simplesmente isolar a incógnita para encontrar a raiz de uma equação do primeiro grau;
- Fórmula de Bhaskara para encontrar raízes de uma equação do segundo grau;
- Fórmula de Cardano para encontrar raízes de uma equação do terceiro grau;
- Existe expressão para equações de quarto grau;
- Casos simplificados de equações de grau maior que 4 onde alguns coeficientes são nulos também podem ser resolvidos.

Equações não polinomiais podem ser ainda mais complicadas de resolver exatamente, por exemplo:

$$\cos(x) = x \quad \text{e} \quad xe^x = 10$$

Para resolver o problema de valor inicial

$$y' + xy = x,$$

$$y(0) = 2,$$

podemos usar o método de fator integrante e obtemos  $y = 1 + e^{-x^2/2}$ . Já o cálculo da solução exata para o problema

$$y' + xy = e^{-y},$$

$$y(0) = 2,$$

não é possível.

Da mesma forma, resolvemos a integral

$$\int_1^2 x e^{-x^2} dx$$

pelo método da substituição e obtemos  $\frac{1}{2}(e^{-1} - e^{-2})$ . Porém a integral

$$\int_1^2 e^{-x^2} dx$$

não pode ser resolvida analiticamente.

A maioria dos modelos de fenômenos reais chegam em problemas matemáticos onde a solução analítica é difícil (ou impossível) de ser encontrada, mesmo quando provamos que ela existe. Nesse curso propomos calcular aproximações numéricas para esses problemas, que apesar de, em geral, serem diferentes da solução exata, mostraremos que elas podem ser bem próximas.

Para entender a construção de aproximações é necessário estudar um pouco como funciona a aritmética de computador e erros de arredondamento. Como computadores, em geral, usam uma base binária para representar números, começaremos falando em mudança de base.

# Capítulo 2

## Aritmética de máquina

## 2.1 Sistema de numeração e mudança de base

Usualmente, utilizamos o sistema de numeração decimal para representar números. Esse é um sistema de numeração posicional onde a posição do dígito indica a potência de 10 que o dígito está representando.

**Exemplo 1.** O número 293 é decomposto como

$$\begin{aligned} 293 &= 2 \text{ centenas} + 9 \text{ dezenas} + 3 \text{ unidades} \\ &= 2 \times 10^2 + 9 \times 10^1 + 3 \times 10^0. \end{aligned}$$

O sistema de numeração posicional também pode ser usado com outras bases. Vejamos a seguinte definição.

**Definição 1** (Sistema de numeração de base  $b$ ). Dado um número natural  $b > 1$  e o conjunto de símbolos  $\{, , - , 0 , 1 , 2 , \dots , b - 1 \}^a$ , a sequência de símbolos

$$(d_n d_{n-1} \cdots d_1 d_0, d_{-1} d_{-2} \cdots)_b$$

representa o número positivo

$$d_n \cdot b^n + d_{n-1} \cdot b^{n-1} + \cdots + d_0 \cdot b^0 + d_{-1} \cdot b^{-1} + d_{-2} \cdot b^{-2} + \cdots$$

Para representar números negativos usamos o símbolo  $-$  a esquerda do numeral.

---

<sup>a</sup>Para  $b > 10$ , veja a Observação 1

*Observação 1* ( $b \geq 10$ ). Para sistemas de numeração com base  $b \geq 10$  é usual utilizar as seguintes notações:

- No sistema de numeração decimal ( $b = 10$ ), costumamos representar o número sem os parênteses e o subíndice, ou seja,

$$\pm d_n d_{n-1} \dots d_1 d_0, d_{-1} d_{-2} \dots := \pm (d_n d_{n-1} \dots d_1 d_0, d_{-1} d_{-2} \dots)_{10}$$

- Se  $b > 10$ , usamos as letras  $A, B, C, \dots$  para completar os símbolos:  $A = 10$ ,  $B = 11$ ,  $C = 12$ ,  $D = 13$ ,  $E = 14$ ,  $F = 15$ .

**Exemplo 2** (Sistema binário). O sistema de numeração em base dois é chamado de binário e os algarismos binários são conhecidos como *bits*, do inglês **binary digits**. Um *bit* pode assumir dois



valores distintos: 0 ou 1. Por exemplo:

$$\begin{aligned}x &= (1001,101)_2 \\&= 1 \cdot 2^3 + 0 \cdot 2^2 + 0 \cdot 2^1 + 1 \cdot 2^0 + 1 \cdot 2^{-1} + 0 \cdot 2^{-2} + 1 \cdot 2^{-3} \\&= 8 + 0 + 0 + 1 + 0,5 + 0 + 0,125 = 9,625\end{aligned}$$

Ou seja,  $(1001,101)_2$  é igual a 9,625 no sistema decimal.

**Exemplo 3** (Sistema quaternário). No sistema quaternário a base  $b$  é igual a 4. Por exemplo:

$$(301,2)_4 = 3 \cdot 4^2 + 0 \cdot 4^1 + 1 \cdot 4^0 + 2 \cdot 4^{-1} = 49,5$$

**Exemplo 4** (Sistema octal). No sistema octal a base é  $b = 8$  e utilizamos os símbolos em  $\{0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7\}$ . Por exemplo:

$$\begin{aligned}(1357,24)_8 &= 1 \cdot 8^3 + 3 \cdot 8^2 + 5 \cdot 8^1 + 7 \cdot 8^0 + 2 \cdot 8^{-1} + 4 \cdot 8^{-2} \\&= 512 + 192 + 40 + 7 + 0,25 + 0,0625 = 751,3125\end{aligned}$$

**Exemplo 5** (Sistema hexadecimal). O sistema de numeração cuja a base é  $b = 16$  é chamado de sistema hexadecimal. O conjunto de símbolos necessários é  $S = \{“,”, -, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D, E$ . Convertendo o número  $(E2AC)_{16}$  para a base 10 temos

$$\begin{aligned}(E2AC)_{16} &= 14 \cdot 16^3 + 2 \cdot 16^2 + 10 \cdot 16^1 + 12 \cdot 16^0 \\ &= 57344 + 512 + 160 + 12 = 58028\end{aligned}$$

**Exemplo 6** (Scilab). O Scilab oferece algumas funções para a conversão de números inteiros em dada base para a base decimal. Por exemplo, temos:

```
-->bin2dec('1001')
ans  =
    9.
-->hex2dec('451')
ans  =
  1105.
-->oct2dec('157')
```

```
ans =
    111.
-->base2dec('BEBA',16)
ans =
    48826.
```

A partir da Definição 1 acabamos de mostrar vários exemplos de conversão de números de uma sistema de numeração de base  $b$  para o sistema decimal. Agora, vamos estudar como fazer o processo inverso. Isto é, dado um número decimal  $(X)_{10}$  queremos escrevê-lo em uma outra base  $b$ , i.e., queremos obter a seguinte representação:

$$\begin{aligned}(X)_{10} &= (d_n d_{n-1} \cdots d_0, d_{-1} \cdots)_b \\ &= d_n \cdot b^n + d_{n-1} \cdot b^{n-1} + \cdots + d_0 \cdot b^0 + d_{-1} \cdot b^{-1} + d_{-2} \cdot b^{-2} + \cdots\end{aligned}$$

Separando as partes inteira e fracionária de  $X$ , i.e.  $X = X^{\text{i}} + X^{\text{f}}$ , temos:

$$X^{\text{i}} = d_n \cdot b^n + \cdots + d_{n-1} b^{n-1} + d_1 \cdot b^1 + d_0 \cdot b^0$$

e

$$X^f = \frac{d_{-1}}{b^1} + \frac{d_{-2}}{b^2} + \dots$$

Nosso objetivo é determinar os algarismos  $\{d_n, d_{n-1}, \dots\}$ .

Primeiramente, vejamos como tratar a parte inteira  $X^i$ . Calculando sua divisão por  $b$ , temos:

$$\frac{X^i}{b} = \frac{d_0}{b} + d_1 + d_2 b^1 \dots + d_{n-1} \cdot b^{n-2} + d_n \cdot b^{n-1}.$$

Observe que  $d_0$  é o resto da divisão de  $X^i$  por  $b$ , pois  $d_1 + d_2 b^1 \dots + d_{n-1} \cdot b^{n-2} + d_n \cdot b^{n-1}$  é inteiro e  $\frac{d_0}{b}$  é uma fração (lembramos que  $d_0 < b$ ). Da mesma forma, o resto da divisão de  $d_1 + d_2 b^1 \dots + d_{n-1} \cdot b^{n-2} + d_n \cdot b^{n-1}$  por  $b$  é  $d_1$ . Repetimos o processo até encontrar os símbolos  $d_0, d_1, d_2, \dots$ .

**Exemplo 7** (Conversão da parte inteira). Vamos escrever o número 125 na base 6. Para tanto, fazemos sucessivas divisões por 6 como

segue:

$$\begin{aligned}125 &= 20 \cdot 6 + 5 \quad (125 \text{ dividido por } 6 \text{ é igual a } 20 \text{ e resta } 5) \\ &= (3 \cdot 6 + 2) \cdot 6 + 5 = 3 \cdot 6^2 + 2 \cdot 6 + 5,\end{aligned}$$

logo  $125 = (325)_6$ .

Estes cálculos podem ser feitos no **Scilab** com o auxílio das funções `modulo` e `int`. A primeira calcula o resto da divisão entre dois números, enquanto que a segunda retorna a parte inteira de um número dado. No nosso exemplo, temos:

```
-->q = 125, d0 = modulo(q,6)
-->q = int(q/6), d1 = modulo(q,6)
-->q = int(q/6), d2 = modulo(q,6)
```

Verifique!

**Exemplo 8** (Scilab). O **Scilab** oferece algumas funções para a conversão de números inteiros em dada base para a base decimal. Assim, temos:

```
-->bin2dec('1001')
ans =
    9.
-->hex2dec('451')
ans =
   1105.
-->oct2dec('157')
ans =
    111.
-->base2dec('BEBA',16)
ans =
   48826.
```

Vamos converter a parte fracionária de um número decimal em uma dada base  $b$ . Usando a notação  $X = X^i + X^f$  para as partes inteira e fracionária, respectivamente, temos:

$$bX^f = d_{-1} + \frac{d_{-2}}{b} + \frac{d_{-3}}{b^2} + \dots$$

Observe que a parte inteira desse produto é  $d_{-1}$  e  $\frac{d_{-2}}{b} + \frac{d_{-3}}{b^2} + \dots$  é a parte fracionária. Quando multiplicamos  $\frac{d_{-2}}{b} + \frac{d_{-3}}{b^2} + \dots$  por  $b$  novamente, encontramos  $d_{-2}$ . Repetimos o processo até encontrar todos os símbolos.

**Exemplo 9** (Conversão da parte fracionária). Escrever o número  $125,58\overline{3}$  na base 6. Do exemplo anterior temos que  $125 = (325)_6$ . Assim, nos resta converter a parte fracionária. Para tanto, fazemos sucessivas multiplicações por 6 como segue:]

$$\begin{aligned}0,58\overline{3} &= 3,5 \cdot 6^{-1} \quad (0,58\overline{3} \text{ multiplicado por } 6 \text{ é igual a } 3,5) \\&= 3 \cdot 6^{-1} + 0,5 \cdot 6^{-1} \\&= 3 \cdot 6^{-1} + (3 \cdot 6^{-1}) \cdot 6^{-1} \\&= 3 \cdot 6^{-1} + 3 \cdot 6^{-2},\end{aligned}$$

logo  $0,58\overline{3} = (0,33)_6$ . As contas feitas aqui, também podem ser feitas no **Scilab**. Você sabe como?

Uma maneira de converter um número dado numa base  $b_1$  para uma

base  $b_2$  é fazer em duas partes: primeiro converter o número dado na base  $b_2$  para base decimal e depois converter para a base  $b_1$ .



## 2.1.1 Exercícios

**E 2.1.1.** Converta para base decimal cada um dos seguintes números:

- |              |              |                |               |
|--------------|--------------|----------------|---------------|
| a) $(100)_2$ | c) $(100)_b$ | e) $(AA)_{16}$ | g) $(3,12)_5$ |
| b) $(100)_3$ | d) $(12)_5$  | f) $(7,1)_8$   |               |

**E 2.1.2.** Escreva os números abaixo na base decimal.

- a)  $(25,13)_8$
- b)  $(101,1)_2$
- c)  $(12F,4)_{16}$
- d)  $(11,2)_3$

**E 2.1.3.** Escreva cada número decimal na base  $b$ .

a)  $7,\overline{6}$  na base  $b = 5$

b)  $29,1\overline{6}$  na base  $b = 6$

**E 2.1.4.** Escreva cada número dado para a base  $b$ .

a)  $(45,1)_8$  para a base  $b = 2$

b)  $(21,2)_8$  para a base  $b = 16$

c)  $(1001,101)_2$  para a base  $b = 8$

d)  $(1001,101)_2$  para a base  $b = 16$

**E 2.1.5.** Escreva o número  $x = 5,5$  em base binária.

**E 2.1.6.** Escreva o número  $x = 17,109375$  em base hexadecimal (16).

**E 2.1.7.** Quantos algarismos são necessários para representar o número 937163832173947 em base binária? E em base 7? Dica: Qual é o menor e o maior inteiro que pode ser escrito em dada base com  $N$  algarismos?

**E 2.1.8.** Escreva  $x = (12.4)_8$  em base decimal e binária.

## 2.2 Representação de números

Os computadores, em geral, usam a base binária para representar os números, onde as posições, chamadas de bits, assume as condições “verdadeiro” ou “falso”, ou seja, 0 ou 1. Cada computador tem um número de bits fixo e, portanto, representa uma quantidade finita de números. Os demais números são tomados por proximidade àqueles conhecidos, gerando erros de arredondamento. Por exemplo, em aritmética de computador, o número 2 tem representação exata, logo  $2^2 = 4$ , mas  $\sqrt{3}$  não tem representação finita, logo  $(\sqrt{3})^2 \neq 3$ . Veja isso no Scilab:

```
-->2^2 == 4
```

```
ans  =
```

```
T
```

```
-->sqrt(3)^2 == 3
```

```
ans  =
```

```
F
```

## 2.2.1 Números inteiros

Tipicamente um número inteiro é armazenado num computador como uma sequência de dígitos binários de comprimento fixo denominado **registro**.

## Representação sem sinal

Um registro com  $n$  bits da forma 

$d_{n-1}$	$d_{n-2}$	$\cdots$	$d_1$	$d_0$
-----------	-----------	----------	-------	-------

 representa o número  $(d_{n-1}d_{n-2}\dots d_1d_0)_2$ .

Assim é possível representar números inteiros entre

$$(111\dots 111)_2 = 2^{n-1} + 2^{n-2} + \cdots + 2^1 + 2^0 = 2^n - 1.$$

$$\vdots$$

$$(000\dots 011)_2 = 3$$

$$(000\dots 010)_2 = 2$$

$$(000\dots 001)_2 = 1$$

$$(000\dots 000)_2 = 0$$

**Exemplo 10.** No Scilab,

```
-->uint8( bin2dec('00000011') )  
ans = 3  
-->uint8( bin2dec('11111110') )
```

```
ans = 254
```

## Representação com bit de sinal

O bit mais significativo (o primeiro à esquerda) representa o sinal: por convenção, 0 significa positivo e 1 significa negativo. Um registro com  $n$  bits da forma 

$s$	$d_{n-2}$	$\dots$	$d_1$	$d_0$
-----	-----------	---------	-------	-------

 representa o número  $(-1)^s(d_{n-2}...d_1d_0)_2$ . Assim é possível representar números inteiros entre  $-2^{n-1}$  e  $2^{n-1}$ , com duas representações para o zero:  $(1000...000)_2$  e  $(00000...000)_2$ .



**Exemplo 11.** Em um registro com 8 bits, teremos os números

$$(11111111)_2 = -(2^6 + \cdots + 2 + 1) = -127$$

$$\vdots$$

$$(10000001)_2 = -1$$

$$(10000000)_2 = -0$$

$$(01111111)_2 = 2^6 + \cdots + 2 + 1 = 127$$

$$\vdots$$

$$(00000010)_2 = 2$$

$$(00000001)_2 = 1$$

$$(00000000)_2 = 0$$

## Representação complemento de dois

O bit mais significativo (o primeiro à esquerda) representa o coeficiente de  $-2^{n-1}$ . Um registro com  $n$  bits da forma:

$d_{n-1}$	$d_{n-2}$	$\cdots$	$d_1$	$d_0$
-----------	-----------	----------	-------	-------

representa o número  $-d_{n-1}2^{n-1} + (d_{n-2}\dots d_1d_0)_2$ .

Note que todo registro começando com 1 será um número negativo.

**Exemplo 12.** O registro com 8 bits  $[01000011]$  representa o número:

$$-0(2^7) + (1000011)_2 = 64 + 2 + 1 = 67.$$

O registro com 8 bits  $[10111101]$  representa o número:

$$-1(2^7) + (0111101)_2 = -128 + 32 + 16 + 8 + 4 + 1 = -67.$$

Note que podemos obter a representação de  $-67$  invertendo os dígitos de 67 em binário e somando 1.

**Exemplo 13.** Em um registro com 8 bits, teremos os números

$$(11111111)_2 = -2^7 + 2^6 + \cdots + 2 + 1 = -1$$

$$\vdots$$

$$(10000001)_2 = -2^7 + 1 = -127$$

$$(10000000)_2 = -2^7 = -128$$

$$(01111111)_2 = 2^6 + \cdots + 2 + 1 = 127$$

$$\vdots$$

$$(00000010)_2 = 2$$

$$(00000001)_2 = 1$$

$$(00000000)_2 = 0$$

**Exemplo 14.** No Scilab,

```
-->int8( bin2dec('00000011') )
```

```
ans = 3
```

```
-->int8( bin2dec('11111110') )
```

ans = -2

## 2.2.2 Sistema de ponto fixo

O sistema de ponto fixo representa as partes inteira e fracionária do número com uma quantidade fixas de dígitos.

**Exemplo 15.** Em um computador de 32 bits que usa o sistema de ponto fixo, o registro 

$d_{31}$	$d_{30}$	$d_{29}$	$\cdots$	$d_1$	$d_0$
----------	----------	----------	----------	-------	-------

 pode representar o número

- $(-1)^{d_{31}}(d_{30}d_{29} \cdots d_{17}d_{16}, d_{15}d_{14} \cdots d_1d_0)_2$  se o sinal for representado por um dígito. Observe que nesse caso o zero possui duas representações possíveis:

10000000000000000000000000000000

e

00000000000000000000000000000000

- $(d_{30}d_{29} \cdots d_{17}d_{16})_2 - d_{31}(2^{15} - 2^{-16}) + (0, d_{15}d_{14} \cdots d_1d_0)_2$  se o sinal do número estiver representado por uma implementação

em complemento de um. Observe que o zero também possui duas representações possíveis:

111111111111111111111111111111111111

e

0000000000000000000000000000000000

- $(d_{30}d_{29} \cdots d_{17}d_{16})_2 - d_{31}2^{15} + (0,d_{15}d_{14} \cdots d_1d_0)_2$  se o sinal do número estiver representado por uma implementação em complemento de dois. Nesse caso o zero é unicamente representado por

0000000000000000000000000000000000

Observe que 16 dígitos são usados para representar a parte fracionária, 15 são para representar a parte inteira e um dígito, o  $d_{31}$ , está relacionado ao sinal do número.

### 2.2.3 Normalização

Os números  $h = 6.626 \times 10^{-34}$  e  $N_A = 6.0221 \times 10^{23}$  não podem ser armazenados na máquina em ponto fixo do exemplo anterior.

Entretanto, a constante

$$h = 6626 \times 10^{-37}$$

$$h = 6.626 \times 10^{-34}$$

$$h = 0.6626 \times 10^{-33}$$

$$h = 0.006626 \times 10^{-31}$$

pode ser escrita de várias formas diferentes. Para termos uma **representação única** definimos como notação normalizada a segunda opção ( $1 \leq m < 10$ ) que apresenta apenas um dígito diferente de zero a esquerda do ponto decimal ( $m = 6.626$ ).

**Definição 2.** *Definimos que*

$$x = (-1)^s (M)_b \times b^E,$$

*está na **notação normalizada**<sup>a</sup> quando  $1 \leq (M)_b < b$ , onde*

- *s é o  **sinal** (0 para positivo e 1 para negativo),*
- *E é o **expoente**,*
- *b é a base (por ex. 2, 8, 10 ou 16),*
- *$(M)_b$  é o significando. O **significando** (também chamado de mantissa ou coeficiente) contém os dígitos significativos do número.*

---

<sup>a</sup>Em algumas referências é usado  $(0.1)_b \leq (M)_b < 1$ .



**Exemplo 16.** Os números abaixo estão em notação normalizada:

$$x_1 = (-1.011101)_2 \times 2^{(100)_2}$$

$$x_2 = (-2.325)_{10} \times 10^1$$

**Exemplo 17.** Represente os números  $0,00\overline{51}$  e  $1205,41\overline{54}$  em um sistema de ponto fixo de 4 dígitos para a parte inteira e 4 dígitos para a parte fracionária. Depois represente os mesmos números utilizando notação normalizada com 7 dígitos significativos.

**Solução.** As representações dos números  $0,00\overline{51}$  e  $1205,41\overline{54}$  no sistema de ponto fixo são  $0,0051$  e  $1205,4154$ , respectivamente. Em notação normalizada, as representações são  $5,151515 \cdot 10^{-3}$  e  $1,205415 \cdot 10^3$ , respectivamente.  $\diamond$

*Observação 2.* No **Scilab**, a representação em ponto flutuante com  $n$  dígitos é dada na forma  $\pm d_1 d_2 d_3 \dots d_n \times 10^E$ . Consulte sobre o comando **format**!

## 2.2.4 Sistema de ponto flutuante

O sistema de ponto flutuante não possui quantidade fixa de dígitos para as partes inteira e fracionária do número.

Podemos definir uma máquina  $F$  em ponto flutuante de dois modos:

$$F(\beta, |M|, |E|, BIAS) \text{ ou } F(\beta, |M|, E_{MIN}, E_{MAX})$$

onde

- $\beta$  é a base (em geral 2 ou 10),
- $|M|$  é o número de dígitos da mantissa,
- $|E|$  é o número de dígitos do expoente,
- $BIAS$  é um valor de deslocamento do expoente (veja a seguir),
- $E_{MIN}$  é o menor expoente,
- $E_{MAX}$  é o maior expoente.

Considere uma máquina com um registro de 64 bits e base  $\beta = 2$ . Pelo padrão IEEE754, 1 bit é usado para o sinal, 11 bits para o expoente e 52 bits são usados para o significando tal que

$s$	$c_{10}$	$c_9$	$\dots$
-----	----------	-------	---------

represente o número (o  $BIAS = 1023$  por definição)

$$x = (-1)^s M \times 2^{c-BIAS},$$

onde a **característica** é representada por

$$c = (c_{10}c_9 \dots c_1c_0)_2 = c_{10}2^{10} + \dots + c_12^1 + c_02^0$$

e o significando por

$$M = (1.m_1m_2 \dots m_{51}m_{52})_2.$$

Em base 2 não é necessário armazenar o primeiro dígito (por quê?). Por exemplo, o registro

$$[0|100\ 0000\ 0000|1010\ 0000\ 0000\dots0000\ 0000]$$

representa o número

$$(-1)^0(1 + 2^{-1} + 2^{-3}) \times 2^{1024-1023} = (1 + 0.5 + 0.125)2 = 3.25.$$

## O expoente deslocado

Uma maneira de representar os expoentes inteiros é deslocar todos eles uma mesma quantidade. Desta forma permitimos a representação de números negativos e a ordem deles continua crescente. O expoente é representado por um inteiro sem sinal do qual é deslocado o **BIAS**.

Tendo  $|E|$  dígitos para representar o expoente, geralmente o *BIAS* é predefinido de tal forma a dividir a tabela ao meio de tal forma que o expoente *um* seja representado pela sequência [100...000].

**Exemplo 18.** Com 64 bits, pelo padrão *IEEE754*, temos que  $|E| := 11$ . Assim  $(100\ 0000\ 0000)_2 = 2^{10} = 1024$ . Como queremos que esta sequência represente o 1, definimos  $BIAS := 1023$ , pois

$$1024 - BIAS = 1.$$

Com 32 bits, temos  $|E| := 8$  e  $BIAS := 127$ . E com 128 bits, temos  $|E| := 15$  e  $BIAS := 16383$ .

Com 11 bits temos

$$[111\ 1111\ 1111] = \textit{reservado}$$

$$[111\ 1111\ 1110] = 2046 - BIAS = 1023_{10} = E_{MAX}$$

$$\vdots =$$

$$[100\ 0000\ 0001] = 2^{10} + 1 - BIAS = 2_{10}$$

$$[100\ 0000\ 0000] = 2^{10} - BIAS = 1_{10}$$

$$[011\ 1111\ 1111] = 1023 - BIAS = 0_{10}$$

$$[011\ 1111\ 1110] = 1022 - BIAS = -1_{10}$$

$$\vdots =$$

$$[000\ 0000\ 0001] = 1 - BIAS = -1022 = E_{MIN}$$

$$[000\ 0000\ 0000] = \textit{reservado}$$

O maior expoente é dado por  $E_{MAX} = 1023$  e o menor expoente é dado por  $E_{MIN} = -1022$ .

O menor número representável positivo é dado pelo registro

$$[0|000\ 0000\ 000\mathbf{1}|0000\ 0000\ 0000\dots0000\ 0000]$$

quando  $s = 0$ ,  $c = \mathbf{1}$  e  $M = (1.000\dots000)_2$ , ou seja,

$$MINR = (1 + \mathbf{0})_2 \times 2^{\mathbf{1}-1023} \approx 0.2225 \times 10^{-307}.$$

O maior número representável é dado por

$$[0|\mathbf{111\ 1111\ 1110}|1111\ 1111\ \dots1111\ 1111]$$

quando  $s = 0$ ,  $c = 2046$  e  $M = (1.1111\ 1111\dots1111)_2 = 2 - 2^{-52}$ , ou seja,

$$MAXR = (2 - 2^{-52}) \times 2^{2046-1023} \approx 2^{1024} \approx 0.17977 \times 10^{309}.$$

## Casos especiais

O **zero** é um caso especial representado pelo registro

$$[0|000\ 0000\ 0000|0000\ 0000\ 0000\dots0000\ 0000]$$

Os expoentes **reservados** são usados para casos especiais:

- $c = [0000\dots0000]$  é usado para representar o zero (se  $m = 0$ ) e os números subnormais (se  $m \neq 0$ ).
- $c = [1111\dots1111]$  é usado para representar o infinito (se  $m = 0$ ) e NaN (se  $m \neq 0$ ).

Os números subnormais<sup>1</sup> tem a forma

$$x = (-1)^s(\mathbf{0}.m_1m_2\cdots m_{51}m_{52})_2 \times 2^{1-BIAS}.$$

---

<sup>1</sup>Note que poderíamos definir números um pouco menores que o *MINR*.

*Observação 3.* O menor número positivo, o maior número e o menor número subnormal representáveis no **Scilab** são:

```
-->MINR=number_properties('tiny')  
-->MAXR=number_properties('huge')  
-->number_properties('tiniest')
```

Outras informações sobre a representação em ponto flutuante podem ser obtidas com `help number_properties`.



## 2.2.5 A precisão e o epsilon de máquina

A **precisão**  $p$  de uma máquina é o número de dígitos significativos usado para representar um número. Note que  $p = |M| + 1$  em binário e  $p = |M|$  para outras bases.

O **epsilon de máquina**,  $\epsilon_{mach} = \epsilon$ , é definido de forma que  $1 + \epsilon$  seja o menor número representável maior que 1, isto é,  $1 + \epsilon$  é representável, mas não existem números representáveis em  $(1, 1 + \epsilon)$ .

**Exemplo 19.** Com 64 bits, temos que o epsilon será dado por

$$\begin{aligned}1 &\rightarrow (1.0000\ 0000\dots 0000)_2 \times 2^0 \\ \epsilon &\rightarrow +(0.0000\ 0000\dots 0001)_2 \times 2^0 = 2^{-52} \\ &\quad (1.0000\ 0000\dots 0001)_2 \times 2^0 \neq 1\end{aligned}$$

Assim  $\epsilon = 2^{-52}$ .

## 2.2.6 A distribuição dos números

Utilizando uma máquina em ponto flutuante temos um número finito de números que podemos representar.

Um número muito pequeno geralmente é aproximado por zero (underflow) e um número muito grande (overflow) geralmente faz o cálculo parar. Além disso, os números não estão uniformemente espaçados no eixo real. Números pequenos estão bem próximos enquanto que números com expoentes grandes estão bem distantes.

Se tentarmos armazenar um número que não é representável, devemos utilizar o número mais próximo, gerando os erros de arredondamento.

Por simplicidade, a partir daqui nós adotaremos  $b = 10$ .

*Observação 4.* O chamado modo de exceção de ponto flutuante é controlado pela função `ieee`. O padrão do Scilab é `ieee(0)`. Estude os seguintes resultados das seguintes operações usando os diferentes modos de exceção:

-->`2*number_properties('huge'), 1/2^999, 1/0, 1/-0`

## 2.2.7 Exercícios

**E 2.2.1.** Explique a diferença entre o sistema de ponto fixo e ponto flutuante.

**E 2.2.2.** Considere a seguinte rotina escrita para ser usada no Scilab:

```
x=1
while x+1>x
    x=x+1
end
```

Explique se esta rotina finaliza em tempo finito, em caso afirmativo calcule a ordem de grandeza do tempo de execução supondo que cada passo do laço demore  $10^{-7}s$ . Justifique sua resposta.

## 2.3 Tipos de Erros

Em geral, os números não são representados de forma exata nos computadores. Isto nos leva ao chamado erro de arredondamento. Quando resolvemos problemas com técnicas numéricas estamos sujeitos a este e outros tipos de erros. Nesta seção, veremos quais são estes erros e como controlá-los, quando possível.

Quando fazemos aproximações numéricas, os erros são gerados de várias formas, sendo as principais delas as seguintes:

1. **Incerteza dos dados:** equipamentos de medição possuem precisão finita, acarretando erros nas medidas físicas.
2. **Erros de Arredondamento:** são aqueles relacionados com as limitações que existem na forma representar números de máquina.
3. **Erros de Truncamento:** surgem quando aproximamos um procedimento formado por uma sequência infinita de passos

através de um procedimento finito. Por exemplo, a definição de integral é dada por uma soma infinita e a aproximamos por uma soma finita. O erro de truncamento deve ser analisado para cada método empregado.

Uma questão fundamental é a quantificação dos erros que estamos sujeitos ao computar a solução de um dado problema. Para tanto, precisamos definir medidas de erros (ou de exatidão). As medidas de erro mais utilizadas são o **erro absoluto** e o **erro relativo**.

**Definição 3** (Erro absoluto e relativo). *Seja  $x$  um número real e  $\bar{x}$  sua aproximação. O **erro absoluto** da aproximação  $\bar{x}$  é definido como*

$$|x - \bar{x}|.$$

*O **erro relativo** da aproximação  $\bar{x}$  é definido como*

$$\frac{|x - \bar{x}|}{|x|}, \quad x \neq 0.$$

*Observação 5.* Observe que o erro relativo é adimensional e, muitas vezes, é dado em porcentagem. Mais precisamente, o erro relativo em porcentagem da aproximação  $\bar{x}$  é dado por

$$\frac{|x - \bar{x}|}{|x|} \times 100\%.$$

**Exemplo 20.** Sejam  $x = 123456,789$  e sua aproximação  $\bar{x} = 123000$ . O erro absoluto é

$$|x - \bar{x}| = |123456,789 - 123000| = 456,789$$

e o erro relativo é

$$\frac{|x - \bar{x}|}{|x|} = \frac{456,789}{123456,789} \approx 0,00369999 \text{ ou } 0,36\%$$

**Exemplo 21.** Sejam  $y = 1,23456789$  e  $\bar{y} = 1,13$ . O erro absoluto é

$$|y - \bar{y}| = |1,23456789 - 1,13| = 0,10456789$$

que parece pequeno se compararmos com o exemplo anterior. Entretanto o erro relativo é

$$\frac{|y - \bar{y}|}{|y|} = \frac{0,10456789}{1,23456789} \approx 0,08469999 \text{ ou } 8,4\%$$

Note que o erro relativo leva em consideração a escala do problema.

**Exemplo 22.** Observe os erros absolutos e relativos em cada caso

$x$	$\bar{x}$	Erro absoluto	Erro relativo
$0,\bar{3} \cdot 10^{-2}$	$0,3 \cdot 10^{-2}$	$0,\bar{3} \cdot 10^{-3}$	$\frac{0,\bar{3} \cdot 10^{-3}}{0,\bar{3} \cdot 10^{-2}} = 10^{-1} = 10\%$
$0,\bar{3}$	$0,3$	$0,\bar{3} \cdot 10^{-1}$	$\frac{0,\bar{3} \cdot 10^{-1}}{0,\bar{3}} = 10^{-1} = 10\%$
$0,\bar{3} \cdot 10^2$	$0,3 \cdot 10^2$	$0,\bar{3} \cdot 10^1$	$\frac{0,\bar{3} \cdot 10^1}{0,\bar{3} \cdot 10^2} = 10^{-1} = 10\%$

Outra forma de medir a exatidão de uma aproximação numérica é contar o **número de dígitos significativos corretos** em relação ao valor exato.



**Definição 4** (Número de dígitos significativos corretos). A aproximação  $\bar{x}$  de um número  $x$  tem  $s$  **dígitos significativos corretos** quando<sup>a</sup>

$$\frac{|x - \bar{x}|}{|x|} < 5 \times 10^{-s}.$$

---

<sup>a</sup>Esta definição é apresentada em [3]. Não existe uma definição única na literatura para o conceito de dígitos significativos corretos, embora não precisamente equivalentes, elas transmitem o mesmo conceito. Uma maneira de interpretar essa regra é: calcula-se o erro relativo na forma normalizada e a partir da ordem do expoente temos o número de dígitos significativos corretos. Como queremos o expoente, podemos estimar  $s$  por

$$DIGSE(x, \bar{x}) = s \approx \text{int} \left\lfloor \log_{10} \frac{|x - \bar{x}|}{|x|} \right\rfloor.$$

**Exemplo 23.** Vejamos os seguintes casos:

- a) A aproximação de  $x = 0,333333$  por  $\bar{x} = 0,333$  tem 3 dígitos significativos corretos, pois

$$\frac{|x - \bar{x}|}{|x|} = \frac{0,000333}{0,333333} \approx 0,000999 \leq 5 \times 10^{-3}.$$

- b) Considere as aproximações  $\bar{x}_1 = 0,666$  e  $\bar{x}_2 = 0,667$  de  $x = 0,666888$ . Os erros relativos são

$$\frac{|x - \bar{x}_1|}{|x|} = \frac{|0,666888 - 0,666|}{0,666888} \approx 0,00133... < 5 \times 10^{-3}.$$

$$\frac{|x - \bar{x}_2|}{|x|} = \frac{|0,666888 - 0,667|}{0,666888} \approx 0,000167... < 5 \times 10^{-4}.$$

Note que  $\bar{x}_1$  possui 3 dígitos significativos corretos e  $\bar{x}_2$  possui 4 dígitos significativos (o quarto dígito é o dígito 0 que não aparece a direita, i.e,  $\bar{x}_2 = 0.\textcolor{red}{6670}$ ). Isto também leva a conclusão que  $x_2$  aproxima melhor o valor de  $x$  do que  $x_1$  pois está mais próximo de  $x$ .

- c)  $\bar{x} = 9,999$  aproxima  $x = 10$  com 4 dígitos significativos corretos, pois

$$\frac{|x - \bar{x}|}{|x|} = \frac{|10 - 9,999|}{10} \approx 0,0000999... < 5 \times 10^{-4}.$$

- d) Considere as aproximações  $\bar{x}_1 = 1,49$  e  $\bar{x}_2 = 1,5$  de  $x = 1$ . Da definição, temos que 1,49 aproxima 1 com um dígito significativo correto (verifique), enquanto 1,5 tem zero dígito significativo correto, pois:

$$\frac{|1 - 1,5|}{|1|} = 5 \times 10^{-1} < 5 \times 10^0.$$

## 2.3.1 Erros de arredondamento

Os erros de arredondamento são aqueles gerados quando aproximamos um número real por um número com representação finita.

Existem várias formas de arredondar

$$x = \pm d_0, d_1 d_2 \dots d_{k-1} d_k d_{k+1} \dots d_n \times 10^e$$

usando  $k$  dígitos significativos. As duas principais são as seguintes:

1. **Arredondamento por truncamento** (ou corte): aproximamos  $x$  por

$$\bar{x} = \pm d_0, d_1 d_2 \dots d_k \times 10^e$$

simplesmente descartando os dígitos  $d_j$  com  $j > k$ .

2. **Arredondamento por proximidade**: se  $d_{k+1} < 5$  aproximamos  $x$  por

$$\bar{x} = \pm d_0, d_1 d_2 \dots d_k \times 10^e$$

senão aproximamos  $x$  por<sup>2</sup>

$$\bar{x} = \pm(d_0, d_1 d_2 \dots d_k + 10^{-k}) \times 10^e$$

*Observação 6.* Observe que o arredondamento pode mudar todos os dígitos e o expoente da representação em ponto flutuante de um número dado.

**Exemplo 24.** Represente os números  $x_1 = 0,567$ ,  $x_2 = 0,233$ ,  $x_3 = -0,675$  e  $x_4 = 0,314159265 \dots \times 10^1$  com dois dígitos significativos por truncamento e arredondamento.

**Solução.** Vejamos cada caso:

---

<sup>2</sup>Note que essas duas opções são equivalentes a somar 5 no dígito a direita do corte e depois arredondar por corte, ou seja, arredondar por corte

$$\pm(d_0, d_1 d_2 \dots d_k d_{k+1} + 5 \times 10^{-(k+1)}) \times 10^e$$

- Por truncamento:

$$x_1 = 0,56, \quad x_2 = 0,23, \quad x_3 = -0,67 \quad \text{e} \quad x_4 = 3,1.$$

No **Scilab**, podemos obter a representação de  $x_3 = -0,675$  fazendo (verifique):

```
-->format('e',8)
-->int(-0.675*1e2)/1e2
```

- Por arredondamento:

$$x_1 = 0,57; \quad x_2 = 0,23; \quad x_3 = -0,68 \quad \text{e} \quad x_4 = 3,1.$$

No **Scilab**, a representação de números por arredondamento é o padrão. Assim, para obtermos a representação desejada de  $x_3 = 0,675$  fazemos: podemos obter a representação de  $x_3 = -0,675$  fazemos (verifique):

```
-->format('e',8)
```

```
-->-0.675
```



**Exemplo 25.** O arredondamento de  $0,9999 \times 10^{-1}$  com 3 dígitos significativos é  $0,1 \times 10^0$ .

## 2.3.2 Exercícios

**E 2.3.1.** Calcule os erros absoluto e relativo das aproximações  $\bar{x}$  para  $x$ .

a)  $x = \pi = 3,14159265358979 \dots$  e  $\bar{x} = 3,141$

b)  $x = 1,00001$  e  $\bar{x} = 1$

c)  $x = 100001$  e  $\bar{x} = 100000$

**E 2.3.2.** Arredonde os seguintes números para cinco algarismos significativos corretos:

a) 1,7888544

d) 0,004596632

f)  $2,1754999 \times 10^{10}$

b) 1788,8544

e)  $2,1754999 \times 10^{-10}$

c) 0,0017888544



**E 2.3.3.** Verifique quantos são os dígitos significativos corretos em cada aproximação  $\bar{x}$  para  $x$ .

a)  $x = 2,5834$  e  $\bar{x} = 2,6$

b)  $x = 100$  e  $\bar{x} = 99$

**E 2.3.4.** Represente os números 3276; 42,55 e 0,00003331 com três dígitos significativos por truncamento e arredondamento.

**E 2.3.5.** Resolva a equação  $0,1x - 0,01 = 12$  usando arredondamento com três dígitos significativos em cada passo e compare com o resultado analítico

**E 2.3.6.** Calcule o erro relativo e absoluto envolvido nas seguintes aproximações e expresse as respostas com três algarismos significativos corretos.

a)  $x = 3,1415926535898$  e  $\tilde{x} = 3,141593$

b)  $x = \frac{1}{7}$  e  $\tilde{x} = 1,43 \times 10^{-1}$

## 2.4 Erros nas operações elementares

O erro presente relativo nas operações elementares de adição, subtração, multiplicação e divisão é da ordem do epsilon de máquina. Se estivermos usando uma máquina com 64 bits, temos que  $\epsilon = 2^{-52} \approx 2,22E16$ .

Este erro é bem pequeno! Assumindo que  $x$  e  $y$  são representados com todos dígitos corretos, temos aproximadamente 15 dígitos significativos corretos quando fizemos uma das operações  $x + y$ ,  $x - y$ ,  $x \times y$  ou  $x/y$ .

Mesmo que fizéssemos, por exemplo, 1000 operações elementares em ponto flutuante sucessivas, teríamos no pior dos casos acumulado todos esses erros e perdido 3 casas decimais ( $1000 \times 10^{-15} \approx 10^{-12}$ ). Entretanto, quando subtraímos números muito próximos, os problemas aumentam.

## 2.5 Cancelamento catastrófico

Quando fazemos subtrações com números muito próximos entre si ocorre o cancelamento catastrófico, onde podemos perder vários dígitos de precisão em uma única subtração.

**Exemplo 26.** Efetue a operação

$$0,987624687925 - 0,987624 = 0,687925 \times 10^{-6}$$

usando arredondamento com seis dígitos significativos e observe a diferença se comparado com resultado sem arredondamento.

**Solução.** Os números arredondados com seis dígitos para a mantissa resultam na seguinte diferença

$$0,987625 - 0,987624 = 0,100000 \times 10^{-5}$$

Observe que os erros relativos entre os números exatos e aproximados no lado esquerdo são bem pequenos,

$$\frac{|0,987624687925 - 0,987625|}{|0,987624687925|} = 0,00003159$$

e

$$\frac{|0,987624 - 0,987624|}{|0,987624|} = 0\%,$$

enquanto no lado direito o erro relativo é enorme:

$$\frac{|0,100000 \times 10^{-5} - 0,687925 \times 10^{-6}|}{0,687925 \times 10^{-6}} = 45,36\%.$$



**Exemplo 27.** Considere o problema de encontrar as raízes da equação de segundo grau

$$x^2 + 300x - 0,014 = 0,$$

usando seis dígitos significativos.

Aplicando a fórmula de Bhaskara com  $a = 0,100000 \times 10^1$ ,  $b =$

$0,300000 \times 10^3$  e  $c = 0,140000 \times 10^{-1}$ , temos o discriminante:

$$\begin{aligned}\Delta &= b^2 - 4 \cdot a \cdot c \\&= 0,300000 \times 10^3 \times 0,300000 \times 10^3 \\&+ 0,400000 \times 10^1 \times 0,100000 \times 10^1 \times 0,140000 \times 10^{-1} \\&= 0,900000 \times 10^5 + 0,560000 \times 10^{-1} \\&= 0,900001 \times 10^5\end{aligned}$$

e as raízes:

$$\begin{aligned}x_1, x_2 &= \frac{-0,300000 \times 10^3 \pm \sqrt{\Delta}}{0,200000 \times 10^1} \\&= \frac{-0,300000 \times 10^3 \pm \sqrt{0,900001 \times 10^5}}{0,200000 \times 10^1} \\&= \frac{-0,300000 \times 10^3 \pm 0,300000 \times 10^3}{0,200000 \times 10^1}\end{aligned}$$

Então, as duas raízes são:

$$\begin{aligned}\tilde{x}_1 &= \frac{-0,300000 \times 10^3 - 0,300000 \times 10^3}{0,200000 \times 10^1} \\ &= -\frac{0,600000 \times 10^3}{0,200000 \times 10^1} = -0,300000 \times 10^3\end{aligned}$$

e

$$\tilde{x}_2 = \frac{-0,300000 \times 10^3 + 0,300000 \times 10^3}{0,200000 \times 10^1} = 0,000000 \times 10^0$$

Agora, os valores das raízes com seis dígitos significativos deveriam ser

$$x_1 = -0,300000 \times 10^3 \quad \text{e} \quad x_2 = 0,466667 \times 10^{-4}.$$

Observe que uma raiz saiu com seis dígitos significativos corretos, mas a outra não possui nenhum dígito significativo correto.

*Observação 7.* No exemplo anterior  $b^2$  é muito maior que  $4ac$ , ou seja,  $b \approx \sqrt{b^2 - 4ac}$ , logo a diferença

$$-b + \sqrt{b^2 - 4ac}$$

estará próxima de zero. Uma maneira padrão de evitar o cancelamento catastrófico é usar procedimentos analíticos para eliminar essa diferença. Abaixo veremos alguns exemplos.

**Exemplo 28.** Para eliminar o cancelamento catastrófico do exemplo anterior, usamos a seguinte expansão em série de Taylor em torno da origem

$$\sqrt{1-x} = 1 - \frac{1}{2}x + O(x^2).$$



Substituindo na fórmula de Bhaskara, temos:

$$\begin{aligned}x &= \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a} \\&= \frac{-b \pm b\sqrt{1 - \frac{4ac}{b^2}}}{2a} \\&\approx \frac{-b \pm b\left(1 - \frac{4ac}{2b^2}\right)}{2a}\end{aligned}$$

Observe que  $\frac{4ac}{b^2}$  é um número pequeno e por isso a expansão faz sentido. Voltamos no exemplo anterior e calculamos as duas raízes

com a nova expressão

$$\begin{aligned}\tilde{x}_1 &= \frac{-b - b + \frac{4ac}{2b}}{2a} = -\frac{b}{a} + \frac{c}{b} \\&= -\frac{0,300000 \times 10^3}{0,100000 \times 10^1} - \frac{0,140000 \times 10^{-1}}{0,300000 \times 10^3} \\&= -0,300000 \times 10^3 - 0,466667 \times 10^{-4} \\&= -0,300000 \times 10^3\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\tilde{x}_2 &= \frac{-b + b - \frac{4ac}{2b}}{2a} \\&= -\frac{4ac}{4ab} \\&= -\frac{c}{b} = -\frac{-0,140000 \times 10^{-1}}{0,300000 \times 10^3} = 0,466667 \times 10^{-4}\end{aligned}$$

Observe que o efeito catastrófico foi eliminado.

## 2.6 Condicionamento de um problema

Geralmente podemos pensar um problema como um mapeamento  $f$  onde a partir de valores de entrada  $x$  devemos encontrar a saída, a solução  $y$ , ou seja,  $f : x \rightarrow y$ , ou simplesmente

$$y = f(x)$$

Entretanto, a entrada do problema  $x$  normalmente terá erros (por exemplo, erros na coleta dos dados ou erros na representação dos dados devido a arredondamentos). Assim, ao invés de usar  $x$  estamos usando  $x^*$  para resolver o problema e encontrar a solução  $y^*$ , ou seja, estamos resolvendo

$$y^* = f(x^*)$$

Estamos interessados em saber se os erros cometidos na entrada  $\Delta x = x - x^*$  influenciaram na saída do problema  $\Delta y = y - y^*$ .

No caso mais simples, temos que  $x \in \mathbb{R}$  e  $y \in \mathbb{R}$ . Assumindo que  $f$  seja diferenciável, a partir da série de Taylor

$$f(x + \Delta x) \approx f(x) + f'(x)\Delta x$$

obtemos (subtraindo  $f(x)$  dos dois lados)

$$\Delta y = f(x + \Delta x) - f(x) \approx f'(x)\Delta x$$

Para relacionarmos os erros relativos, dividimos o lado esquerdo por  $y$ , o lado direito por  $f(x) = y$  e obtemos

$$\frac{\Delta y}{y} \approx \frac{f'(x)}{f(x)} \frac{x\Delta x}{x}$$

sugerindo a definição de número de condicionamento de um problema.

**Definição 5.** *Seja  $f$  uma função diferenciável. O **número de condicionamento** de um problema é definido como*

$$\kappa_f(x) := \left| \frac{x f'(x)}{f(x)} \right|$$

*e fornece uma estimativa de quanto os erros relativos na entrada  $\left| \frac{\Delta x}{x} \right|$  serão amplificados na saída  $\left| \frac{\Delta y}{y} \right|$ .*

De modo geral, quando  $f$  depende de várias variáveis, podemos obter

$$\delta_f = |f(x_1, x_2, \dots, x_n) - f(\bar{x}_1, \bar{x}_2, \dots, \bar{x}_n)| \approx \sum_{i=1}^n \left| \frac{\partial f}{\partial x_i}(x_1, x_2, \dots, x_n) \right| \delta_{x_i}$$

Uma matriz de números de condicionamento também poderia ser obtida como em [5].

**Exemplo 29.** Considere o problema de calcular  $\sqrt{x}$  em  $x = 2$ . Se usarmos  $x^* = 1,999$ , quanto será o erro relativo na saída? O erro relativo na entrada é

$$\left| \frac{\Delta x}{x} \right| = \left| \frac{2 - 1,999}{2} \right| = 0,0005$$

O número de condicionamento do problema calcular a raiz é

$$\kappa_f(x) := \left| \frac{x f'(x)}{f(x)} \right| = \left| \frac{x \frac{1}{2\sqrt{x}}}{\sqrt{x}} \right| = \frac{1}{2}$$

Ou seja, os erros na entrada serão diminuídos pela metade. De fato, usando  $y = \sqrt{2} = 1,4142136\dots$  e  $y^* = \sqrt{1,999} = 1,41386\dots$ , obtemos

$$\frac{\Delta y}{y} = \frac{\sqrt{2} - \sqrt{1,999}}{\sqrt{2}} \approx 0,000250031\dots$$

**Exemplo 30.** Considere a função  $f(x) = \frac{10}{1-x^2}$  e  $x^* = 0,9995$  com um erro absoluto na entrada de 0,0001.

Calculando  $y^* = f(x^*)$  temos

$$y^* = \frac{10}{1 - (0,9995)^2} \approx 10002,500625157739705173$$

Mas qual é a estimativa de erro nessa resposta? Quantos dígitos significativos temos nessa resposta?

Sabendo que  $f'(x) = -10/(1 - x^2)^2$ , o número de condicionamento é

$$\kappa_f(x) := \left| \frac{x f'(x)}{f(x)} \right| = \left| \frac{2x^2}{1 - x^2} \right|$$

o que nos fornece para  $x^* = 0,9995$ ,

$$\kappa_f(0,9995) \approx 1998,5$$

Como o erro relativo na entrada é

$$\left| \frac{\Delta x}{x} \right| = \left| \frac{0,0001}{0,9995} \right| \approx 0,00010005...$$

temos que o erro na saída será aproximadamente

$$\left| \frac{\Delta y}{y} \right| \approx \kappa_f(x) \left| \frac{\Delta x}{x} \right| \approx 1998,5 \times 0,00010005 \dots \approx 0,1999$$

ou seja um erro relativo de aproximadamente 19,99%.

Note que se usarmos  $x_1 = 0,9994$  e  $x_2 = 0,9996$  (ambos no intervalo do erro absoluto da entrada) encontramos

$$\begin{aligned} y_1^* &\approx 8335,83 \\ y_2^* &\approx 12520,50 \end{aligned}$$

confirmando a estimativa de 19,99%.

**Exemplo 31.** Seja  $f(x) = x \exp(x)$ . Calcule o erro absoluto em se calcular  $f(x)$  sabendo que  $x = 2 \pm 0,05$ .

**Solução.** Temos que  $x \approx 2$  com erro absoluto de  $\delta_x = 0,05$ . Neste caso, calculamos  $\delta_f$ , i.e. o erro absoluto em se calcular  $f(x)$ , por:

$$\delta_f = |f'(x)|\delta_x.$$



Como  $f'(x) = (1+x)e^x$ , temos:

$$\begin{aligned}\delta_f &= |(1+x)e^x| \cdot \delta_x \\ &= |3e^2| \cdot 0,05 = 1,1084.\end{aligned}$$

Portanto, o erro absoluto em se calcular  $f(x)$  quando  $x = 2 \pm 0,05$  é de 1,084.  $\diamond$

**Exemplo 32.** Calcule o erro relativo ao medir  $f(x,y) = \frac{x^2+1}{x^2}e^{2y}$  sabendo que  $x \approx 3$  é conhecido com 10% de erro e  $y \approx 2$  é conhecido com 3% de erro.

**Solução.** Calculamos as derivadas parciais de  $f$ :

$$\frac{\partial f}{\partial x} = \frac{2x^3 - (2x^3 + 2x)}{x^4}e^{2y} = -\frac{2e^{2y}}{x^3}$$

e

$$\frac{\partial f}{\partial y} = 2\frac{x^2+1}{x^2}e^{2y}$$

Calculamos o erro absoluto em termos do erro relativo:

$$\frac{\delta_x}{|x|} = 0,1 \Rightarrow \delta_x = 3 \cdot 0,1 = 0,3$$

$$\frac{\delta_y}{|y|} = 0,03 \Rightarrow \delta_y = 2 \cdot 0,03 = 0,06$$

Aplicando a expressão para estimar o erro em  $f$  temos

$$\begin{aligned}\delta_f &= \left| \frac{\partial f}{\partial x} \right| \delta_x + \left| \frac{\partial f}{\partial y} \right| \delta_y \\ &= \frac{2e^4}{27} \cdot 0,3 + 2\frac{9+1}{9}e^4 \cdot 0,06 = 8,493045557\end{aligned}$$

Portanto, o erro relativo ao calcular  $f$  é estimado por

$$\frac{\delta f}{|f|} = \frac{8,493045557}{\frac{9+1}{9}e^4} = 14\%$$



**Exemplo 33.** No exemplo anterior, reduza o erro relativo em  $x$  pela metade e calcule o erro relativo em  $f$ . Depois, repita o processo reduzindo o erro relativo em  $y$  pela metade.

**Solução.** Na primeira situação temos  $x = 3$  com erro relativo de 5% e  $\delta_x = 0,05 \cdot 3 = 0,15$ . Calculamos  $\delta_f = 7,886399450$  e o erro relativo em  $f$  de 13%. Na segunda situação, temos  $y = 2$  com erro de 1,5% e  $\delta_y = 2 \cdot 0,015 = 0,03$ . Calculamos  $\delta_f = 4,853168892$  e o erro relativo em  $f$  de 8%. Observe que mesma o erro relativo em  $x$  sendo maior, o erro em  $y$  é mais significativo na função.  $\diamond$

**Exemplo 34.** Considere um triângulo retângulo onde a hipotenusa e um dos catetos são conhecidos a menos de um erro: hipotenusa  $a = 3 \pm 0,01$  metros e cateto  $b = 2 \pm 0,01$  metros. Calcule o erro absoluto ao calcular a área dessa triângulo.

**Solução.** Primeiro vamos encontrar a expressão para a área em função da hipotenusa  $a$  e um cateto  $b$ . A tamanho de segundo cateto  $c$  é dado pelo teorema de Pitágoras,  $a^2 = b^2 + c^2$ , ou seja,

$c = \sqrt{a^2 - b^2}$ . Portanto a área é

$$A = \frac{bc}{2} = \frac{b\sqrt{a^2 - b^2}}{2}.$$

Agora calculamos as derivadas

$$\frac{\partial A}{\partial a} = \frac{ab}{2\sqrt{a^2 - b^2}},$$

$$\frac{\partial A}{\partial b} = \frac{\sqrt{a^2 - b^2}}{2} - \frac{b^2}{2\sqrt{a^2 - b^2}},$$

e substituindo na estimativa para o erro  $\delta_A$  em termos de  $\delta_a = 0,01$  e  $\delta_b = 0,01$ :

$$\begin{aligned}\delta_A &\approx \left| \frac{\partial A}{\partial a} \right| \delta_a + \left| \frac{\partial A}{\partial b} \right| \delta_b \\ &\approx \frac{3\sqrt{5}}{5} \cdot 0,01 + \frac{\sqrt{5}}{10} \cdot 0,01 = 0,01565247584\end{aligned}$$

Em termos do erro relativo temos erro na hipotenusa de  $\frac{0,01}{3} \approx 0,333\%$ , erro no cateto de  $\frac{0,01}{2} = 0,5\%$  e erro na área de

$$\frac{0,01565247584}{\frac{2\sqrt{3^2-2^2}}{2}} = 0,7\%$$



## 2.6.1 Exercícios

**E 2.6.1.** Considere que a variável  $x \approx 2$  é conhecida com um erro relativo de 1% e a variável  $y \approx 10$  com um erro relativo de 10%. Calcule o erro relativo associado a  $z$  quando:

$$z = \frac{y^4}{1 + y^4} e^x.$$

Suponha que você precise conhecer o valor de  $z$  com um erro de 0,5%. Como engenheiro, você propõe uma melhoria na medição da variável  $x$  ou  $y$ ? Explique.

**E 2.6.2.** A corrente  $I$  em ampères e a tensão  $V$  em volts em uma lâmpada se relacionam conforme a seguinte expressão:

$$I = \left( \frac{V}{V_0} \right)^\alpha,$$

onde  $\alpha$  é um número entre 0 e 1 e  $V_0$  é tensão nominal em volts. Sabendo que  $V_0 = 220 \pm 3\%$  e  $\alpha = -,8 \pm 4\%$ , calcule a corrente e o

erro relativo associado quando a tensão vale  $220 \pm 1\%$ .

**Obs:.** Este problema pode ser resolvido de duas formas distintas: usando a expressão aproximada para a propagação de erro e inspecionando os valores máximos e mínimos que a expressão pode assumir. Pratique os dois métodos.

**E 2.6.3.** A corrente  $I$  em ampères e a tensão  $V$  em volts em uma lâmpada se relacionam conforme a seguinte expressão:

$$I = \left( \frac{V}{V_0} \right)^\alpha$$

Onde  $\alpha$  é um número entre 0 e 1 e  $V_0$  é a tensão nominal em volts. Sabendo que  $V_0 = 220 \pm 3\%$  e  $\alpha = 0,8 \pm 4\%$  Calcule a corrente e o erro relativo associado quando a tensão vale  $220 \pm 1\%$ . **Dica:** lembre que  $x^\alpha = e^{\alpha \ln(x)}$

## 2.7 Mais exemplos

**Exemplo 35.** Considere o seguinte processo iterativo:

$$\begin{cases} x_0 = \frac{1}{3} \\ x_{n+1} = 4x_n - 1, & n \in \mathbb{N} \end{cases}.$$

Observe que  $x_0 = \frac{1}{3}$ ,  $x_1 = 4 \cdot \frac{1}{3} - 1 = \frac{1}{3}$ ,  $x_2 = \frac{1}{3}$ , ou seja, temos uma sequência constante igual a  $\frac{1}{3}$ . No entanto, ao calcularmos no computador, usando o sistema de numeração 'double', a sequência obtida não é constante e, de fato, diverge. Faça o teste no **Scilab**, colocando:

```
-->x = 1/3
```

e itere algumas vezes a linha de comando:

```
-->x = 4*x-1
```



Para compreender o que acontece, devemos levar em consideração que o número  $\frac{1}{3} = 0,\overline{3}$  possui uma representação infinita tanto na base decimal quanto na base binária. Logo, sua representação de máquina inclui um erro de arredondamento. Seja  $\epsilon$  a diferença entre o valor exato de  $\frac{1}{3}$  e sua representação de máquina, isto é,  $\tilde{x}_0 = \frac{1}{3} + \epsilon$ . A sequência efetivamente calculada no computador é:

$$\begin{aligned}\tilde{x}_0 &= \frac{1}{3} + \epsilon \\ \tilde{x}_1 &= 4x_0 - 1 = 4\left(\frac{1}{3} + \epsilon\right) - 1 = \frac{1}{3} + 4\epsilon \\ \tilde{x}_2 &= 4x_1 - 1 = 4\left(\frac{1}{3} + 4\epsilon\right) - 1 = \frac{1}{3} + 4^2\epsilon \\ &\vdots \\ \tilde{x}_n &= \frac{1}{3} + 4^n\epsilon\end{aligned}$$

Portanto o limite da sequência diverge,

$$\lim_{x \rightarrow \infty} |\tilde{x}_n| = \infty$$

Qual o número de condicionamento desse problema?

**Exemplo 36.** Observe a seguinte identidade

$$f(x) = \frac{(1+x) - 1}{x} = 1$$

Calcule o valor da expressão à esquerda para  $x = 10^{-12}$ ,  $x = 10^{-13}$ ,  $x = 10^{-14}$ ,  $x = 10^{-15}$ ,  $x = 10^{-16}$  e  $x = 10^{-17}$ . Observe que quando  $x$  se aproxima do  $\epsilon$  de máquina a expressão perde o significado. Veja a Figura 2.1 com o gráfico de  $f(x)$  em escala logarítmica.

**Exemplo 37.** Neste exemplo, estamos interessados em compreender mais detalhadamente o comportamento da expressão

$$\left(1 + \frac{1}{n}\right)^n \tag{2.1}$$

quando  $n$  é um número grande ao computá-la em sistemas de numeral de ponto flutuante com acurácia finita. Um resultado bem




Figura 2.1: Oi. Eu estou aqui!

conhecido do cálculo nos diz que o limite de (2.1) quando  $n$  tende a infinito é o número de Euler:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n = e = 2,718281828459... \quad (2.2)$$

Sabemos também que a sequência produzida por (2.1) é crescente, isto é:


$$\left(1 + \frac{1}{1}\right)^1 < \left(1 + \frac{1}{2}\right)^2 < \left(1 + \frac{1}{3}\right)^3 < \dots$$

No entanto, quando calculamos essa expressão no **Scilab**, nos de-

frontamos com o seguinte resultado:


$n$	$\left(1 + \frac{1}{n}\right)^n$		$n$	$\left(1 + \frac{1}{n}\right)^n$
1	2,000000000000000		$10^2$	2,7048138294215
2	2,250000000000000		$10^4$	2,7181459268249
3	2,3703703703704		$10^6$	2,7182804690957
4	2,4414062500000		$10^8$	2,7182817983391
5	2,4883200000000		$10^{10}$	2,7182820532348
6	2,5216263717421		$10^{12}$	2,7185234960372
7	2,5464996970407		$10^{14}$	2,7161100340870
8	2,5657845139503		$10^{16}$	1,0000000000000
9	2,5811747917132		$10^{18}$	1,0000000000000

Podemos resumir esses dados no seguinte gráfico de  $\left(1 + \frac{1}{n}\right)^n$  em função de  $n$ :



Observe que quando  $x$  se torna grande, da ordem de  $10^{15}$ , o gráfico da função deixa de ser crescente e apresenta oscilações. Observe também que a expressão se torna identicamente igual a 1 depois de um certo limiar. Tais fenômenos não são intrínsecos da função  $f(x) = \left(1 + \frac{1}{x}\right)^x$ , mas oriundas de erros de arredondamento,

isto é, são resultados numéricos espúrios. A fim de pôr o comportamento numérico de tal expressão, apresentamos abaixo o gráfico da mesma função, porém restrito à região entre  $10^{14}$  e  $10^{16}$ .



..

Para compreendermos melhor por que existe um limiar  $N$  que, quando atingido torna a expressão do exemplo acima identicamente

igual a 1, observamos a sequência de operações realizadas pelo computador:

$$x \rightarrow 1/x \rightarrow 1 + 1/x \rightarrow (1 + 1/x)^x \quad (2.3)$$

Devido ao limite de precisão da representação de números em ponto flutuante, existe um menor número representável que é maior do que 1. Este número é  $1+\text{eps}$ , onde **eps** é chamado de **épsilon de máquina** e é o menor número que somado a 1 produz um resultado superior a 1 no sistema de numeração usado. O épsilon de máquina no sistema de numeração **double** vale aproximadamente  $2,22 \times 10^{-16}$ . No **Scilab**, o epsilon de máquina é a constante **eps**. Observe que:

```
-->1+%eps
ans  =
1.00000000000000002220446
```

Quando somamos a 1 um número positivo inferior ao épsilon de máquina, obtemos o número 1. Dessa forma, o resultado obtido



pela operação de ponto flutuante  $1 + x$  para  $0 < x < 2,22 \times 10^{-16}$  é 1.

Portanto, quando realizamos a sequência de operações dada em (2.3), toda informação contida no número  $x$  é perdida na soma com 1 quando  $1/x$  é menor que o épsilon de máquina, o que ocorre quando  $x > 5 \times 10^{15}$ . Assim  $(1 + 1/x)$  é aproximado para 1 e a última operação se resume a  $1^x$ , o que é igual a 1 mesmo quando  $x$  é grande.

Um erro comum é acreditar que o perda de significância se deve ao fato de  $1/x$  ser muito pequeno para ser representado e é aproximando para 0. Isto é falso, o sistema de ponto de flutuante permite representar números de magnitude muito inferior ao épsilon de máquina. O problema surge da limitação no tamanho da mantissa. Observe como a seguinte sequência de operações não perde significância para números positivos  $x$  muito menores que o épsilon de máquina:

$$x \rightarrow 1/x \rightarrow 1/(1/x) \tag{2.4}$$

compare o desempenho numérico desta sequência de operações para

valores pequenos de  $x$  com o da seguinte sequência:

$$x \rightarrow 1 + x \rightarrow (1 + x) - 1. \quad (2.5)$$

Finalmente, notamos que quando tentamos calcular  $\left(1 + \frac{1}{n}\right)^n$  para  $n$  grande, existe perda de significância no cálculo de  $1 + 1/n$ . Para entendermos isso melhor, vejamos o que acontece no **Scilab** quando  $n = 7 \times 10^{13}$ :

```
-->n=7e13
n  =
    7.00000000000000000000D+13

-->1/n
ans =
    1.428571428571428435D-14

-->y=1+1/n
y  =
```

1.0000000000000014211D+00

Observe a perda de informação ao deslocar a mantissa de  $1/n$ . Para evidenciar o fenômeno, observamos o que acontece quando tentamos recalcular  $n$  subtraindo 1 de  $1 + 1/n$  e invertendo o resultado:

-->y-1

ans =

1.421085471520200372D-14

-->1/(y-1)

ans =

7.036874417766400000D+13

**Exemplo 38** (Analogia da balança). Observe a seguinte comparação interessante que pode ser feita para ilustrar os sistemas de numeração com ponto fixo e flutuante: o sistema de ponto fixo é como uma balança cujas marcas estão igualmente espaçadas; o sistema de ponto flutuante é como uma balança cuja distância entre

as marcas é proporcional à massa medida. Assim, podemos ter uma balança de ponto fixo cujas marcas estão sempre distanciadas de 100g (100g, 200g, 300g, ..., 1Kg, 1,1Kg,...) e outra balança de ponto flutuante cujas marcas estão distanciadas sempre de aproximadamente um décimo do valor lido (100g, 110g, 121g, 133g, ..., 1Kg, 1,1Kg, 1,21Kg, ...) A balança de ponto fixo apresenta uma resolução baixa para pequenas medidas, porém uma resolução alta para grandes medidas. A balança de ponto flutuante distribui a resolução de forma proporcional ao longo da escala.

Seguindo nesta analogia, o fenômeno de perda de significância pode ser interpretado como a seguir: imagine que você deseje obter o peso de um gato (aproximadamente 4Kg). Dois processos estão disponíveis: colocar o gato diretamente na balança ou medir seu peso com o gato e, depois, sem o gato. Na balança de ponto flutuante, a incerteza associada na medida do peso do gato (sozinho) é aproximadamente 10% de 4Kg, isto é, 400g. Já a incerteza associada à medida da uma pessoa (aproximadamente 70Kg) com o gato é de 10% do peso total, isto é, aproximadamente 7Kg. Esta incerteza é

da mesma ordem de grandeza da medida a ser realizada, tornado o processo impossível de ser realizado, já que teríamos uma incerteza da ordem de 14Kg (devido à dupla medição) sobre uma grandeza de 4Kg.

## 2.7.1 Exercícios

**E 2.7.1.** Considere as expressões:

$$\frac{\exp(1/\mu)}{1 + \exp(1/\mu)}$$

e

$$\frac{1}{\exp(-1/\mu) + 1}$$

com  $\mu > 0$ . Verifique que elas são idênticas como funções reais. Teste no computador cada uma delas para  $\mu = 0,1$ ,  $\mu = 0,01$  e  $\mu = 0,001$ . Qual dessas expressões é mais adequada quando  $\mu$  é um número pequeno? Por quê?

**E 2.7.2.** Encontre expressões alternativas para calcular o valor das seguintes funções quando  $x$  é próximo de zero.

a)  $f(x) = \frac{1 - \cos(x)}{x^2}$

$$\text{b)} \quad g(x) = \sqrt{1+x} - 1$$

$$\text{c)} \quad h(x) = \sqrt{x+10^6} - 10^3$$

$$\text{d)} \quad i(x) = \sqrt{1+e^x} - \sqrt{2} \qquad \text{Dica: Faça } y = e^x - 1$$

**E 2.7.3.** Use uma identidade trigonométrica adequada para mostrar que:

$$\frac{1 - \cos(x)}{x^2} = \frac{1}{2} \left( \frac{\sin(x/2)}{x/2} \right)^2.$$

Analise o desempenho destas duas expressões no computador quando  $x$  vale  $10^{-5}$ ,  $10^{-6}$ ,  $10^{-7}$ ,  $10^{-8}$ ,  $10^{-9}$ ,  $10^{-200}$  e 0. Discuta o resultado.

**Dica:** Para  $|x| < 10^{-5}$ ,  $f(x)$  pode ser aproximada por  $1/2 - x^2/24$  com erro de truncamento inferior a  $10^{-22}$ .

**E 2.7.4.** Reescreva as expressões:

$$\sqrt{e^{2x} + 1} - e^x \qquad \text{e} \qquad \sqrt{e^{2x} + x^2} - e^x$$

de modo que seja possível calcular seus valores para  $x = 100$  utilizando a aritmética de ponto flutuante ("Double") no computador.

**E 2.7.5.** Na teoria da relatividade restrita, a energia cinética de uma partícula e sua velocidade se relacionam pela seguinte fórmula:

$$E = mc^2 \left( \frac{1}{\sqrt{1 - (v/c)^2}} - 1 \right),$$

onde  $E$  é a energia cinética da partícula,  $m$  é a massa de repouso,  $v$  o módulo da velocidade e  $c$  a velocidade da luz no vácuo dada por  $c = 299792458 m/s$ . Considere que a massa de repouso  $m = 9,10938291 \times 10^{-31} Kg$  do elétron seja conhecida com erro relativo de  $10^{-9}$ . Qual é o valor da energia e o erro relativo associado a essa grandeza quando  $v = 0,1c$ ,  $v = 0,5c$ ,  $v = 0,99c$  e  $v = 0,999c$  sendo que a incerteza relativa na medida da velocidade é  $10^{-5}$ ?

**E 2.7.6.** Deseja-se medir a concentração de dois diferentes oxidantes no ar. Três sensores eletroquímicos estão disponíveis para a



medida e apresentam a seguintes respostas:

$$v_1 = 270[A] + 30[B], \quad v_2 = 140[A] + 20[B] \quad \text{e} \quad v_3 = 15[A] + 200[B]$$

as tensões  $v_1$ ,  $v_2$  e  $v_3$  são dadas em  $mV$  e as concentrações em  $milimol/l$ .

- a) Encontre uma expressão para os valores de  $[A]$  e  $[B]$  em termos de  $v_1$  e  $v_2$  e, depois, em termos de  $v_1$  e  $v_3$ . Dica: Se  $ad \neq bc$ , então a matriz  $A$  dada por

$$A = \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix}$$

é inversível e sua inversa é dada por

$$A^{-1} = \frac{1}{ad - bc} \begin{bmatrix} d & -b \\ -c & a \end{bmatrix}.$$

- b) Sabendo que incerteza relativa associada às sensibilidades dos sensores 1 e 2 é de 2% e que a incerteza relativa associada às sensibilidades do sensor 3 é 10%, verifique a incerteza associada à medida feita com o par 1 – 2 e o par 1 – 3. Use  $[A] = [B] = 10 \text{ milimol/l}$ . Dica: Você deve diferenciar as grandezas  $[A]$  e  $[B]$  em relação aos valores das tensões.

# Capítulo 3

## Solução de equações de uma variável

Neste capítulo buscaremos aproximações numéricas para a solução de **equações de uma variável real**. Observamos que obter uma solução para uma tal dada equação é equivalente a encontrar um

**zero de uma função** apropriada. Com isso, iniciamos este capítulo discutindo sobre condições de existência e unicidade de raízes de funções de uma variável real. Então, apresentamos o **método da bisseção** como uma primeira abordagem numérica para a solução de tais equações.

Em seguida, exploramos uma outra abordagem via **iteração do ponto fixo**. Desta, obtemos o **método de Newton**<sup>1</sup>, para o qual discutimos sua aplicação e convergência. Por fim, apresentamos o **método das secantes** como uma das possíveis variações do método de Newton.

---

<sup>1</sup>Sir Isaac Newton, 1642 - 1727, matemático e físico inglês.

## 3.1 Existência e unicidade

O **teorema de Bolzano**<sup>2</sup> nos fornece condições suficientes para a existência do zero de uma função. Este é uma aplicação direta do **teorema do valor intermediário**.

**Teorema 1** (Teorema de Bolzano). *Se  $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ ,  $y = f(x)$ , é uma função contínua tal que  $f(a) \cdot f(b) < 0$ , então existe  $x^* \in (a, b)$  tal que  $f(x^*) = 0$ .*

*Demonstração.* O resultado é uma consequência imediata do teorema do valor intermediário que estabelece que dada uma função contínua  $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ ,  $y = f(x)$ , tal que  $f(a) < f(b)$  (ou  $f(b) < f(a)$ ), então para qualquer  $d \in (f(a), f(b))$  (ou  $k \in (f(b), f(a))$ ) existe  $x^* \in (a, b)$  tal que  $f(x^*) = k$ . Ou seja, nestas notações, se  $f(a) \cdot f(b) < 0$ , então  $f(a) < 0 < f(b)$  (ou  $f(b) < 0 < f(a)$ ). Logo,

---

<sup>2</sup>Bernhard Placidus Johann Gonzal Nepomuk Bolzano, 1781 - 1848, matemático do Reino da Boêmia.

tomando  $k = 0$ , temos que existe  $x^* \in (a, b)$  tal que  $f(x^*) = k = 0$ .  $\square$

Em outras palavras, se  $f(x)$  é uma função contínua em um dado intervalo no qual ela troca de sinal, então ela têm pelo menos um zero neste intervalo (veja a Figura 3.1).

**Exemplo 39.** Mostre que existe pelo menos uma solução da equação  $e^x = x + 2$  no intervalo  $(-2, 0)$ .

**Solução.** Primeiramente, observamos que resolver a equação  $e^x = x + 2$  é equivalente a resolver  $f(x) = 0$  com  $f(x) = e^x - x - 2$ . Agora, como  $f(-2) = e^{-2} > 0$  e  $f(0) = -2 < 0$ , temos do teorema de Bolzano que existe pelo menos um zero de  $f(x)$  no intervalo  $(-2, 0)$ . E, portanto, existe pelo menos uma solução da equação dada no intervalo  $(-2, 0)$ .

Podemos usar o **Scilab** para estudarmos esta função. Por exemplo, podemos definir a função  $f(x)$  e computá-la nos extremos do intervalo dado com os seguintes comandos:




Figura 3.1: Teorema de Bolzano.

```
-->deff('y=f(x)', 'y=exp(x)-x-2')
-->f(-2),f(0)
ans =
    0.1353353
ans =
    - 1.
```

Alternativamente (e com maior precisão), podemos verificar diretamente o sinal da função nos pontos desejados com comando **sign**:

```
-->sign(f(-2)),sign(f(0))
ans =
    1.
ans =
    - 1.
```



Quando procuramos aproximações para zeros de funções, é aconselhável isolar cada raiz em um intervalo. Desta forma, gostaríamos de



poder garantir a existência e a unicidade da raiz dentro de um dado intervalo. A seguinte proposição nos fornece condições suficientes para tanto.

**Proposição 1.** *Se  $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$  é uma função diferenciável,  $f(a) \cdot f(b) < 0$  e  $f'(x) > 0$  (ou  $f'(x) < 0$ ) para todo  $x \in (a, b)$ , então existe um único  $x^* \in (a, b)$  tal que  $f(x^*) = 0$ .*

Em outras palavras, para garantirmos que exista um único zero de uma dada função diferenciável num intervalo, é suficiente que ela troque de sinal e seja monótona neste intervalo.

**Exemplo 40.** No Exemplo 39, mostramos que existe pelo menos um zero de  $f(x) = e^x - x - 2$  no intervalo  $(-2, 0)$ , pois  $f(x)$  é contínua e  $f(-2) \cdot f(0) < 0$ . Agora, observamos que, além disso,  $f'(x) = e^x - 1$  e, portanto,  $f'(x) < 0$  para todo  $x \in (-2, 0)$ . Logo, da Proposição 1, temos garantida a existência de um único zero no intervalo dado.

Podemos inspecionar o comportamento da função  $f(x) = e^x - x -$

2 e de sua derivada fazendo seus gráficos no Scilab. Para tanto, podemos fazer o seguinte teste:

```
-->x = linspace(-2,0,50);  
-->deff('y = f(x)', 'y=exp(x)-x-2')    // define f  
-->plot(x,f(x));xgrid                  // grafico de f  
-->deff('y = fl(x)', 'y=exp(x)-1')    // a derivada  
-->plot(x,fl(x));xgrid                 // grafico de f'
```

A discussão feita nesta seção, especialmente o teorema de Bolzano, nos fornece os fundamentos para o método da bisseção, o qual discutimos na próxima seção.

### 3.1.1 Exercícios

**E 3.1.1.** Mostre que  $\cos x = x$  tem solução no intervalo  $[0, \pi/2]$ .

**E 3.1.2.** Mostre que  $\cos x = x$  tem uma única solução no intervalo  $[0, \pi/2]$ .

**E 3.1.3.** Interprete a equação  $\cos(x) = kx$  como o problema de encontrar a intersecção da curva  $y = \cos(x)$  com  $y = kx$ . Encontre o valor positivo  $k$  para o qual essa equação admite exatamente duas raízes positivas distintas.

**E 3.1.4.** Mostre que a equação:

$$\ln(x) + x^3 - \frac{1}{x} = 10$$

possui uma única solução positiva.

**E 3.1.5.** Use o teorema de Bolzano para mostrar que o erro abso-

luto ao aproximar o zero da função  $f(x) = e^x - x - 2$  por  $\bar{x} = -1,841$  é menor que  $10^{-3}$ .

**E 3.1.6.** Mostre que o erro absoluto associado à aproximação  $\bar{x} = 1,962$  para a solução exata  $x^*$  de:

$$e^x + \sin(x) + x = 10$$

é menor que  $10^{-4}$ .

**E 3.1.7.** Mostre que a equação

$$\ln(x) + x - \frac{1}{x} = v$$

possui uma solução para cada  $v$  real e que esta solução é única.

## 3.2 Método da bisseção

O **método da bisseção** explora o fato de que uma função contínua  $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$  com  $f(a) \cdot f(b) < 0$  tem um zero no intervalo  $(a, b)$  (veja o teorema de Bolzano 1). Assim, a ideia para aproximar o zero de uma tal função  $f(x)$  é tomar, como primeira aproximação, o ponto médio do intervalo  $[a, b]$ , i.e.:

$$x^{(0)} = \frac{(a + b)}{2}.$$

Pode ocorrer de  $f(x^{(0)}) = 0$  e, neste caso, o zero de  $f(x)$  é  $x^* = x^{(0)}$ . Caso contrário, se  $f(a) \cdot f(x^{(0)}) < 0$ , então  $x^* \in (a, x^{(0)})$ . Neste caso, tomamos como segunda aproximação do zero de  $f(x)$  o ponto médio do intervalo  $[a, x^{(0)}]$ , i.e.  $x^{(1)} = (a + x^{(0)})/2$ . Noutro caso, temos  $f(x^{(0)}) \cdot f(b) < 0$  e, então, tomamos  $x^{(1)} = (x^{(0)} + b)/2$ . Repetimos este procedimento até obtermos a aproximação desejada (veja, Figura 3.2).

De forma mais precisa, suponha que queiramos calcular uma aproximação com uma certa precisão  $TOL$  para um zero  $x^*$  de uma dada




Figura 3.2: Método da bisseção.

função contínua  $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$  tal que  $f(a) \cdot f(b) < 0$ . Iniciamos, setamos  $n = 0$  e:

$$a^{(n)} = a, \quad b^{(n)} = b \quad \text{e} \quad x^{(n)} = \frac{a^{(n)} + b^{(n)}}{2}.$$

Verificamos o **critério de parada**, i.e. se  $f(x^{(n)}) = 0$  ou:

$$\frac{|b^{(n)} - a^{(n)}|}{2} < TOL,$$

então  $x^{(n)}$  é a aproximação desejada. Caso contrário, preparamos a próxima iteração  $n + 1$  da seguinte forma: se  $f(a^{(n)}) \cdot f(x^{(n)}) < 0$ , então setamos  $a^{(n+1)} = a^{(n)}$  e  $b^{(n+1)} = x^{(n)}$ ; noutro caso, se  $f(x^{(n)}) \cdot f(b^{(n)}) < 0$ , então setamos  $a^{(n+1)} = x^{(n)}$  e  $b^{(n+1)} = b^{(n)}$ . Trocando  $n$  por  $n + 1$ , temos a nova aproximação do zero de  $f(x)$  dada por:

$$x^{(n+1)} = \frac{a^{(n+1)} + b^{(n+1)}}{2}.$$

Voltamos a verificar o critério de parada acima e, caso não satisfeito, iteramos novamente. Iteramos até obtermos a aproximação desejada ou o número máximo de iterações ter sido atingido.

**Exemplo 41.** Use o método da bisseção para calcular uma solução de  $e^x = x + 2$  no intervalo  $[-2, 0]$  com precisão  $TOL = 10^{-1}$ .

**Solução.** Primeiramente, observamos que resolver a equação dada é equivalente a calcular o zero de  $f(x) = e^x - x - 2$ . Além disso, temos  $f(-2) \cdot f(0) < 0$ . Desta forma, podemos iniciar o método da bisseção tomando o intervalo inicial  $[a^{(0)}, b^{(0)}] = [-2, 0]$  e:

$$x^{(0)} = \frac{a^{(0)} + b^{(0)}}{2} = -1.$$

Apresentamos as iterações na Tabela 3.1. Observamos que a precisão  $TOL = 10^{-1}$  foi obtida na quarta iteração com o zero de  $f(x)$  sendo aproximado por  $x^{(4)} = 1,8125$ .

Usando o **Scilab** neste exemplos, temos:



Tabela 3.1: Iteração do método da bisseção para o Exemplo 41.

$n$	$a^{(n)}$	$b^{(n)}$	$x^{(n)}$	$f(a^{(n)})f(x^{(n)})$	$\frac{ b^{(n)} - a^{(n)} }{2}$
0	-2	0	-1	$< 0$	1
1	-2	-1	-1,5	$< 0$	0,5
2	-2	-1,5	-1,75	$< 0$	0,25
3	-2	-1,75	-1,875	$> 0$	0,125
4	-1,875	-1,75	-1,8125	$< 0$	0,0625

```
-->deff('y = f(x)', 'y = exp(x) - x - 2')  
-->a=-2, b=0, x=(a+b)/2, TOL = (b-a)/2, sign(f(a)*f(x))  
-->b=x, x=(a+b)/2, TOL = (b-a)/2, sign(f(a)*f(x))
```

e, assim, sucessivamente.



Vamos, agora, discutir sobre a **convergência** do método da bisseção. O próximo Teorema 2 nos garante a convergência do método da bisseção.

**Teorema 2** (Convergência do método da bisseção). *Sejam  $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$  uma função contínua tal que  $f(a) \cdot f(b) < 0$  e  $x^*$  o único zero de  $f(x)$  no intervalo  $(a, b)$ . Então, a sequência  $\{x^{(n)}\}_{n \geq 0}$  do método da bisseção satisfaz:*

$$|x^{(n)} - x^*| < \frac{b - a}{2^{n+1}}, \quad \forall n \geq 0,$$

*i.e.,  $x^{(n)} \rightarrow x^*$  quando  $n \rightarrow \infty$ .*

*Demonstração.* Notemos que, a cada iteração, a distância entre a aproximação  $x^{(n)}$  e o zero  $x^*$  da função é menor que a metade do tamanho do intervalo  $[a^{(n)}, b^{(n)}]$  (veja Figura 3.2), i.e.:

$$|x^{(n)} - x^*| < \frac{b^{(n)} - a^{(n)}}{2}.$$

Por construção do método, temos  $[a^{(n)}, b^{(n)}] \subset [a^{(n-1)}, b^{(n-1)}]$  e:

$$b^{(n)} - a^{(n)} = \frac{b^{(n-1)} - a^{(n-1)}}{2}.$$

Desta forma:

$$|x^{(n)} - x^*| < \frac{b^{(n)} - a^{(n)}}{2} = \frac{b^{(n-1)} - a^{(n-1)}}{2^2} = \dots = \frac{b^{(0)} - a^{(0)}}{2^{n+1}}, \quad \forall n \geq 1$$

Logo, vemos que:

$$|x^{(n)} - x^*| < \frac{b - a}{2^{n+1}}, \quad \forall n \geq 0.$$



Observamos que a hipótese de que  $f(x)$  tenha um único zero no intervalo não é necessária. Se a função tiver mais de um zero no intervalo inicial, as iterações irão convergir para um dos zeros. Veja o Exercício 43.

*Observação 8.* O Teorema 2 nos fornece uma estimativa para a convergência do método da bisseção. Aproximadamente, temos:

$$|x^{(n+1)} - x^*| \lesssim \frac{1}{2} |x^{(n)} - x^*|.$$

Isto nos leva a concluir que o método da bisseção tem **taxa de convergência** linear.

**Exemplo 42.** No Exemplo 41, precisamos de 4 iterações do método da bisseção para computar uma aproximação com precisão de  $10^{-1}$  do zero de  $f(x) = e^x - x - 2$  tomando como intervalo inicial  $[a, b] = [-2, 0]$ . Poderíamos ter estimado o número de iterações **a priori**,

pois, como vimos acima:

$$|x^{(n)} - x^*| \leq \frac{b-a}{2^{n+1}}, \quad n \geq 0.$$

Logo, temos:

$$\begin{aligned} |x^{(n)} - x^*| &< \frac{b-a}{2^{n+1}} = \frac{2}{2^{n+1}} \\ &= 2^{-n} < 10^{-1} \Rightarrow n > -\log_2 10^{-1} \approx 3,32. \end{aligned}$$

O que está de acordo com o experimento numérico realizado naquele exemplo.

O método da bisseção tem a boa propriedade de garantia de convergência, bem como de fornecer uma simples estimativa da precisão da aproximação calculada. Entretanto, a taxa de convergência linear é superada por outros métodos. A construção de tais métodos está, normalmente, associada a iteração do ponto fixo, a qual exploramos na próxima seção.

### 3.2.1 Código Scilab: método da bisseção

O seguinte código é uma implementação no Scilab do algoritmo da bisseção. As variáveis de entrada são:

- **f** - função objetivo
- **a** - extremo esquerdo do intervalo de inspeção  $[a, b]$
- **b** - extremo direito do intervalo de inspeção  $[a, b]$
- **TOL** - tolerância (critério de parada)
- **N** - número máximo de iterações

A variável de saída é:

- **p** - aproximação da raiz de **f**, i.e.  $f(p) \approx 0$ .

```
function [p] = bissecao(f, a, b, TOL, N)
    i = 1
```

```
fa = f(a)
while (i <= N)
    //iteracao da bissecao
    p = a + (b-a)/2
    fp = f(p)
    //condicao de parada
    if ((fp == 0) | ((b-a)/2 < TOL)) then
        return p
    end
    //bissecta o intervalo
    i = i+1
    if (fa * fp > 0) then
        a = p
        fa = fp
    else
        b = p
    end
end
end
```

```
    error ('Num. max. de iter. excedido!')  
endfunction
```



### 3.2.2 Exercícios

**E 3.2.1.** Considere a equação  $\sqrt{x} = \cos(x)$ . Use o método da bisseção com intervalo inicial  $[a, b] = [0, 1]$  e  $x^{(1)} = (a + b)/2$  para calcular a aproximação  $x^{(4)}$  da solução desta equação.

**E 3.2.2.** Trace o gráfico e isole as três primeiras raízes positivas da função:

$$f(x) = 5 \sin(x^2) - \exp\left(\frac{x}{10}\right)$$

em intervalos de comprimento 0,1. Então, use o método da bisseção para obter aproximações dos zeros desta função com precisão de  $10^{-5}$ .

**Exemplo 43.** O polinômio  $p(x) = -4 + 8x - 5x^2 + x^3$  tem raízes  $x_1 = 1$  e  $x_2 = x_3 = 2$  no intervalo  $[1/2, 3]$ .

- a) Se o método da bisseção for usando com o intervalo inicial  $[1/2, 3]$ , para qual raiz as iterações convergem?

b) É possível usar o método da bisseção para a raiz  $x = 2$ ? Justifique sua resposta.

**E 3.2.3.** Mostre que a equação do problema 3.1.7 possui uma solução no intervalo  $[1, v + 1]$  para todo  $v$  positivo. Dica: defina  $f(x) = \ln(x) + x - \frac{1}{x} - v$  e considere a seguinte estimativa:

$$f(v + 1) = f(1) + \int_1^{v+1} f'(x)dx \geq -v + \int_1^{v+1} dx = 0.$$

Use esta estimativa para iniciar o método de bisseção e obtenha o valor da raiz com pelo menos 6 algarismos significativos para  $v = 1, 2, 3, 4$  e  $5$ .

**E 3.2.4.** Considere o seguinte problema físico: uma plataforma está fixa a uma parede através de uma dobradiça cujo momento é dado por:

$$\tau = k\theta,$$

onde  $\theta$  é ângulo da plataforma com a horizontal e  $k$  é uma constante positiva. A plataforma é feita de material homogêneo, seu peso é  $P$  e sua largura é  $l$ . Modele a relação entre o ângulo  $\theta$  e o peso  $P$  próprio da plataforma. Encontre o valor de  $\theta$  quando  $l = 1$  m,  $P = 200$  N,  $k = 50$  Nm/rad, sabendo que o sistema está em equilíbrio. Use o método da bisseção e expresse o resultado com 4 algarismos significativos.

**E 3.2.5.** Considere a equação de Lambert dada por:

$$xe^x = t,$$

onde  $t$  é um número real positivo. Mostre que esta equação possui uma única solução  $x^*$  que pertence ao intervalo  $[0, t]$ . Usando esta estimativa como intervalo inicial, quantos passos são necessário para obter o valor numérico de  $x^*$  com erro absoluto inferior a  $10^{-6}$  quando  $t = 1$ ,  $t = 10$  e  $t = 100$  através do método da bisseção? Obtenha esses valores.

**E 3.2.6.** O polinômio  $f(x) = x^4 - 4x^2 + 4$  possui raízes duplas em  $\sqrt{2}$  e  $-\sqrt{2}$ . O método da bisseção pode ser aplicados a  $f$ ? Explique.


**E 3.2.7.** O desenho abaixo mostra um circuito não linear envolvendo uma fonte de tensão constante, um diodo retificador e um resistor. Sabendo que a relação entre a corrente ( $I_d$ ) e a tensão ( $v_d$ ) no diodo é dada pela seguinte expressão:

$$I_d = I_R \left( \exp \left( \frac{v_d}{v_t} \right) - 1 \right),$$

onde  $I_R$  é a corrente de condução reversa e  $v_t$ , a tensão térmica dada por  $v_t = \frac{kT}{q}$  com  $k$ , a constante de Boltzmann,  $T$  a temperatura de operação e  $q$ , a carga do elétron. Aqui  $I_R = 1\text{pA} = 10^{-12}\text{ A}$ ,  $T = 300\text{ K}$ . Escreva o problema como uma equação na incógnita  $v_d$  e, usando o método da bisseção, resolva este problema com 3 algarismos significativos para os seguintes casos:

- a)  $V = 30 \text{ V}$  e  $R = 1 \text{ k}\Omega$ .
- b)  $V = 3 \text{ V}$  e  $R = 1 \text{ k}\Omega$ .
- c)  $V = 3 \text{ V}$  e  $R = 10 \text{ k}\Omega$ .
- d)  $V = 300 \text{ mV}$  e  $R = 1 \text{ k}\Omega$ .
- e)  $V = -300 \text{ mV}$  e  $R = 1 \text{ k}\Omega$ .
- f)  $V = -30 \text{ V}$  e  $R = 1 \text{ k}\Omega$ .
- g)  $V = -30 \text{ V}$  e  $R = 10 \text{ k}\Omega$ .

Dica:  $V = RI_d + v_d$ .



**E 3.2.8.** Obtenha os valores de  $I_d$  no problema 3.2.7. Lembre que existem duas expressões disponíveis:

$$I_d = I_R \left( \exp \left( \frac{v_d}{v_t} \right) - 1 \right)$$

e

$$I_d = \frac{v - v_d}{R}$$

Faça o estudo da propagação do erro e decida qual a melhor expressão em cada caso.

### 3.3 Iteração de Ponto Fixo

Nesta seção, discutimos a abordagem da **iteração do ponto fixo** para a solução numérica de equações de uma variável real. Observamos que sempre podemos reescrever uma equação da forma  $f(x) = 0$  (problema de encontrar os zeros de uma função) em uma equação equivalente na forma  $g(x) = x$  (**problema de ponto fixo**). Um ponto  $x = x^*$  tal que  $g(x^*) = x^*$  é chamado de **ponto fixo** da função  $g(x)$ . Geometricamente, um ponto fixo de uma função é um ponto de interseção entre a reta  $y = x$  com o gráfico da função (veja, Figura 3.3).

**Exemplo 44.** Resolver a equação  $e^x = x + 2$  é equivalente a resolver  $f(x) = 0$ , com  $f(x) = e^x - x - 2$ . Estes são equivalentes a resolver  $g(x) = x$ , com  $g(x) = e^x - 2$ . Ou seja, temos:

$$e^x = x + 2 \Leftrightarrow e^x - x - 2 = 0 \Leftrightarrow e^x - 2 = x$$

Dada uma função  $g(x)$ , a **iteração do ponto fixo** consiste em

computar a seguinte sequência recursiva:

$$x^{(n+1)} = g(x^{(n)}), \quad n \geq 1,$$

onde  $x^{(1)}$  é uma aproximação inicial do ponto fixo.

**Exemplo 45** (Método babilônico). O método babilônico<sup>3</sup> é de uma iteração de ponto fixo para extrair a raiz quadrada de um número positivo  $A$ , i.e. para resolver a equação  $x^2 = A$ .

Seja  $r > 0$  uma aproximação para  $\sqrt{A}$ . Temos três possibilidades:

- $r > \sqrt{A} \implies \frac{A}{r} < \sqrt{A} \implies \sqrt{A} \in \left(\frac{A}{r}, r\right)$
- $r = \sqrt{A} \implies \frac{A}{r} = \sqrt{A}$
- $r < \sqrt{A} \implies \frac{A}{r} > \sqrt{A} \implies \sqrt{A} \in \left(r, \frac{A}{r}\right)$

---

<sup>3</sup>Heron de Alexandria, 10 d.C. - 70 d.C., matemático grego.



Ou seja, uma aproximação melhor para  $\sqrt{A}$  está no intervalo entre  $r$  e  $\frac{A}{r}$  que pode ser aproximada como:

$$x = \frac{r + \frac{A}{r}}{2}$$

Aplicando esse método repetidas vezes, podemos construir a iteração (de ponto fixo):

$$\begin{aligned}x^{(1)} &= r \\x^{(n+1)} &= \frac{x^{(n)}}{2} + \frac{A}{2x^{(n)}}, \quad n = 1, 2, 3, \dots\end{aligned}$$

Por exemplo, para obter uma aproximação para  $\sqrt{5}$ , podemos iniciar com a aproximação inicial  $r = 2$  e  $A = 5$ . Então, tomamos  $x^{(1)} = 2$

e daí seguem as aproximações:

$$x^{(2)} = \frac{2}{2} + \frac{2,5}{2} = 2,25$$

$$x^{(3)} = \frac{2,25}{2} + \frac{2,5}{2,25} = 2,2361111$$

$$x^{(4)} = \frac{2,2361111}{2} + \frac{2,5}{2,2361111} = 2,236068$$

$$x^{(5)} = \frac{2,236068}{2} + \frac{2,5}{2,236068} = 2,236068$$

O método babilônico sugere que a iteração do ponto fixo pode ser uma abordagem eficiente para a solução de equações. Ficam, entretanto, as seguintes perguntas:

1. Será que a iteração do ponto fixo é convergente?
2. Caso seja convergente, será que o limite  $x^* = \lim_{n \rightarrow \infty} x^{(n)}$  é um ponto fixo?

### 3. Caso seja convergente, qual é a taxa de convergência?

A segunda pergunta é a mais fácil de ser respondida. No caso de  $g(x)$  ser contínua, se  $x^{(n)} \rightarrow x^* \in \text{Dom}(g)$ , então:

$$x^* = \lim_{n \rightarrow \infty} x^{(n)} = \lim_{n \rightarrow \infty} g(x^{(n-1)}) = g\left(\lim_{n \rightarrow \infty} x^{(n-1)}\right) = g(x^*).$$

Antes de respondermos as perguntas acima, vejamos mais um exemplo.

**Exemplo 46.** Considere o problema de encontrar o zero da função  $f(x) = x \exp(x) - 10$ . Uma maneira geral de construir um problema de ponto fixo equivalente é o seguinte:

$$f(x) = 0 \Rightarrow \alpha f(x) = 0 \Rightarrow x - \alpha f(x) = x,$$

para qualquer parâmetro  $\alpha \neq 0$ . Consideremos, então, as seguintes duas funções:

$$g_1(x) = x - 0,5f(x) \quad \text{e} \quad g_2(x) = x - 0,05f(x).$$

Notamos que o ponto fixo destas duas funções coincide com o zero de  $f(x)$ . Construindo as iterações do ponto fixo:

$$x_1^{(n+1)} = g_1(x_1^{(n)}) \quad \text{e} \quad x_2^{(n+1)} = g_2(x_2^{(n)}),$$

tomando  $x_1^{(1)} = x_2^{(1)} = 1,7$ , obtemos os resultados apresentados na Tabela 3.2. Observamos que, enquanto, a iteração do ponto fixo com a função  $g_1(x)$  ( $\alpha = 0,5$ ) parece divergir, a iteração com a função  $g_2(x)$  ( $\alpha = 0,05$ ) parece convergir.

Afim de estudarmos a convergência da iteração do ponto fixo, apresentamos o Teorema do ponto fixo.

Tabela 3.2: Iterações do ponto fixo para o Exemplo 46.

$n$	$x_1^{(n)}$	$x_2^{(n)}$
1	1,700	1,700
2	2,047	1,735
3	-0,8812	1,743
4	4,3013	1,746
5	-149,4	1,746

### 3.3.1 Teorema do ponto fixo

O Teorema do ponto fixo nos fornece condições suficientes para a existência e unicidade do ponto fixo, bem como para a convergência das iterações do método.

**Definição 6.** Uma **contração** é uma função real  $g : [a, b] \rightarrow [a, b]$  tal que:

$$|g(x) - g(y)| \leq \beta |x - y|, \quad 0 \leq \beta < 1.$$

*Observação 9.* Seja  $g : [a, b] \rightarrow [a, b]$ ,  $y=g(x)$ .

- Se  $g(x)$  é uma contração, então  $g(x)$  função contínua.
- Se  $|g'(x)| < k$ ,  $0 < k < 1$ , para todo  $x \in [a, b]$ , então  $g(x)$  é uma contração.

**Teorema 3** (Teorema do ponto fixo). *Se  $g : [a,b] \rightarrow [a,b]$  é uma contração, então existe um único ponto  $x^* \in [a,b]$  tal que  $g(x^*) = x^*$ , i.e.  $x^*$  é ponto fixo de  $g(x)$ . Além disso, a sequência  $\{x^{(n)}\}_{n \in \mathbb{N}}$  dada por:*

$$x^{(n+1)} = g(x^{(n)})$$

*converge para  $x^*$  para qualquer  $x^{(1)} \in [a,b]$ .*

*Demonstração.* Começamos demonstrando que existe pelo menos um ponto fixo. Para tal definimos a função  $f(x) = x - g(x)$  e observamos que:

$$f(a) = a - g(a) \leq a - a = 0$$

e

$$f(b) = b - g(b) \geq b - b = 0$$

Se  $f(a) = a$  ou  $f(b) = b$ , então o ponto fixo existe. Caso contrário, as desigualdades são estritas e a  $f(x)$  muda de sinal no intervalo. Como esta função é contínua, pelo teorema de Bolzano 1, existe um ponto  $x^*$  no intervalo  $(a, b)$  tal que  $f(x^*) = 0$ , ou seja,  $g(x^*) = x^*$ . Isto mostra a existência.

Para provar que o ponto fixo é único, observamos que se  $x^*$  e  $x^{**}$  são pontos fixos, eles devem ser iguais, pois:

$$|x^* - x^{**}| = |g(x^*) - g(x^{**})| \leq \beta |x^* - x^{**}|.$$

A desigualdade  $|x^* - x^{**}| \leq \beta |x^* - x^{**}|$  com  $0 \leq \beta < 1$  implica  $|x^* - x^{**}| = 0$ .

Para demonstrar a convergência da sequência, observamos que:

$$|x^{(n+1)} - x^*| = |g(x^{(n)}) - x^*| = |g(x^{(n)}) - g(x^*)| \leq \beta |x^{(n)} - x^*|.$$

Daí, temos:

$$|x^{(n)} - x^*| \leq \beta |x^{(n-1)} - x^*| \leq \beta^2 |x^{(n-2)} - x^*| \leq \dots \leq \beta^n |x^{(0)} - x^*|.$$



Portanto, como  $0 \leq \beta < 1$ , temos:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} |x^{(n)} - x^*| = 0,$$

ou seja,  $x^{(n)} \rightarrow x^*$  quando  $n \rightarrow \infty$ . □

**Exemplo 47.** Mostre que o Teorema do ponto fixo se aplica a função  $g(x) = \cos(x)$  no intervalo  $[1/2, 1]$ , i.e. que a iteração do ponto fixo converge para a solução da equação  $\cos x = x$ .

**Solução.** Basta mostrarmos que:

a)  $g([1/2, 1]) \subseteq [1/2, 1]$ ;

b)  $|g'(x)| < \beta$ ,  $0 < \beta < 1$ ,  $\forall x \in [1/2, 1]$ .

Para provar a), observamos que  $g(x)$  é decrescente no intervalo, pelo que temos:

$$0,54 < \cos(1) \leq \cos(x) \leq \cos(1/2) < 0,88$$

Como  $[0,54, 0,88] \subseteq [0,5, 1]$ , temos o item a).

Para provar o item b), observamos que:

$$g'(x) = -\sin(x).$$

Da mesma forma, temos a estimativa:

$$-0,85 < -\sin(1) \leq -\sin(x) \leq -\sin(1/2) < -0,47.$$

Assim,  $|g'(x)| < 0,85$  temos a desigualdade com  $\beta = 0,85 < 1$ .

A Tabela 3.3 apresenta o comportamento numérico da iteração do ponto fixo:

$$\begin{aligned}x^{(1)} &= 0,7 \\x^{(n+1)} &= \cos(x^{(n)}), \quad n \geq 1.\end{aligned}$$



$n$	$x^{(n)}$
1	0,700
2	0,765
3	0,721
4	0,751
5	0,731
6	0,744
7	0,735

Tabela 3.3: Iteração do ponto fixo para o Exemplo 47.

### 3.3.2 Teste de convergência

Seja  $g : [a,b]$  uma função  $C^0[a,b]$  e  $x^* \in (a,b)$  um ponto fixo de  $g$ . Então  $x^*$  é dito estável se existe uma região  $(x^* - \delta, x^* + \delta)$  chamada bacia de atração tal que  $x^{(n+1)} = g(x^{(n)})$  é convergente sempre que  $x^{(0)} \in (x^* - \delta, x^* + \delta)$ .

**Proposição 2** (Teste de convergência). *Se  $g \in C^1[a,b]$  e  $|g'(x^*)| < 1$ , então  $x^*$  é estável. Se  $|g'(x^*)| > 1$  é instável e o teste é inconclusivo quando  $|g'(x^*)| = 1$ .*

**Exemplo 48.** No Exemplo 46 observamos que a função  $g_1(x)$  nos forneceu uma iteração divergente, enquanto que a função  $g_2(x)$  forneceu uma iteração convergente (veja a Figura 3.4. A razão destes comportamentos é explicada pelo teste da convergência. Com efeito, sabemos que o ponto fixo destas funções está no intervalo  $[1,6, 1,8]$  e temos:

$$|g_1'(x)| = |1 - 0,5(x+1)e^x| > 4,8, \quad \forall x \in [1,6, 1,8],$$

enquanto:

$$|g_2'(x)| = |1 - 0,05(x + 1)e^x| < 0,962, \quad \forall x \in [1,6, 1,8].$$

### 3.3.3 Estabilidade e convergência

A fim de compreendermos melhor os conceitos de estabilidade e convergência, considere uma função  $\Phi(x)$  com um ponto fixo  $x^* = g(x^*)$  e analisemos o seguinte processo iterativo:

$$\begin{aligned}x^{(n+1)} &= g\left(x^{(n)}\right) \\x^{(0)} &= x\end{aligned}$$

Vamos supor que a função  $g(x)$  pode ser aproximada por seu polinômio de Taylor em torno do ponto fixo:

$$\begin{aligned}g(x) &= g(x^*) + (x - x^*)g'(x^*) + O\left((x - x^*)^2\right), n \geq 0 \\&= x^* + (x - x^*)g'(x^*) + O\left((x - x^*)^2\right) \\&\approx x^* + (x - x^*)g'(x^*)\end{aligned}$$

Substituindo na relação de recorrência, temos

$$x^{(n+1)} = g\left(x^{(n)}\right) \approx x^* + (x^{(n)} - x^*)g'(x^*)$$

Ou seja:

$$\left(x^{(n+1)} - x^*\right) \approx (x^{(n)} - x^*)g'(x^*)$$

Tomando módulos, temos:

$$\underbrace{\left|x^{(n+1)} - x^*\right|}_{\epsilon_{n+1}} \approx \underbrace{\left|x^{(n)} - x^*\right|}_{\epsilon_n} |g'(x^*)|,$$

onde  $\epsilon_n = \left|x^{(n)} - x^*\right|$ .

*Observação 10.* A análise acima, concluímos:

- Se  $|g'(x^*)| < 1$ , então, a distância de  $x^{(n)}$  até o ponto fixo  $x^*$  está diminuindo a cada passo.
- Se  $|g'(x^*)| > 1$ , então, a distância de  $x^{(n)}$  até o ponto fixo  $x^*$  está aumentando a cada passo.
- Se  $|g'(x^*)| = 1$ , então, nossa aproximação de primeiro ordem não é suficiente para compreender o comportamento da sequência.



### 3.3.4 Erro absoluto e tolerância

Na prática, quando se aplica uma iteração como esta, não se conhece de antemão o valor do ponto fixo  $x^*$ . Assim, o erro  $\epsilon_n = |x^{(n)} - x^*|$  precisa ser estimado com base nos valores calculados  $x^{(n)}$ . Uma abordagem frequente é analisar a evolução da diferença entre dois elementos da sequência:

$$\Delta_n = |x^{(n+1)} - x^{(n)}|$$

A pergunta natural é: Será que o erro  $\epsilon_n = |x^{(n)} - x^*|$  é pequeno quando  $\Delta_n = |x^{(n+1)} - x^{(n)}|$  for pequeno?

Para responder a esta pergunta, observamos que

$$x^* = \lim_{n \rightarrow \infty} x^{(n)}$$

portanto:

$$\begin{aligned}x^* - x^{(N)} &= \left(x^{(N+1)} - x^{(N)}\right) + \left(x^{(N+2)} - x^{(N+1)}\right) + \left(x^{(N+3)} - x^{(N+2)}\right) + \cdots \\&= \sum_{k=0}^{\infty} \left(x^{(N+k+1)} - x^{(N+k)}\right)\end{aligned}$$

Usamos também as expressões:

$$\begin{aligned}x^{(n+1)} &\approx x^* + (x^{(n)} - x^*)g'(x^*) \\x^{(n)} &\approx x^* + (x^{(n-1)} - x^*)g'(x^*)\end{aligned}$$

Subtraindo uma da outra, temos:

$$x^{(n+1)} - x^{(n)} \approx (x^{(n)} - x^{(n-1)})g'(x^*)$$

Portanto:

$$x^{(N+k+1)} - x^{(N+k)} \approx (x^{(N+1)} - x^{(N)}) (g'(x^*))^k$$

E temos:

$$\begin{aligned}x^* - x^{(N)} &= \sum_{k=0}^{\infty} \left( x^{(N+k+1)} - x^{(N+k)} \right) \\&\approx \sum_{k=0}^{\infty} \left( x^{(N+1)} - x^{(N)} \right) \left( g'(x^*) \right)^k \\&= \left( x^{(N+1)} - x^{(N)} \right) \frac{1}{1 - g'(x^*)}, \quad |g'(x^*)| < 1\end{aligned}$$

Tomando módulo, temos:

$$\begin{aligned}\left| x^* - x^{(N)} \right| &\approx \left| x^{(N+1)} - x^{(N)} \right| \frac{1}{1 - g'(x^*)} \\ \epsilon_N &\approx \frac{\Delta_N}{1 - g'(x^*)}\end{aligned}$$

*Observação 11.* Tendo em mente a relação  $x^{(n+1)} - x^{(n)} \approx (x^{(n)} - x^{(n-1)})g'(x^*)$ , concluímos:

- Quando  $g'(x^*) < 0$ , o esquema é alternante, isto é, o sinal do erro se altera a cada passo. O erro  $\epsilon_N$  pode ser estimado diretamente da diferença  $\Delta_N$ , pois o denominador  $1 - g'(x^*) > 1$ .
- Quando  $0 < g'(x^*) < 1$ , o esquema é monótono e  $\frac{1}{1-g'(x^*)} > 1$ , pelo que o erro  $\epsilon_N$  é maior que a diferença  $\Delta_N$ . A relação será tão mais importante quando mais próximo da unidade for  $g'(x^*)$ , ou seja, quando mais lenta for a convergência. Para estimar o erro em função da diferença  $\Delta_N$ , observamos que  $g'(x^*) \approx \frac{x^{(n+1)} - x^{(n)}}{x^{(n)} - x^{(n-1)}}$  e

$$|g'(x^*)| \approx \frac{\Delta_n}{\Delta_{n-1}}$$

e portanto

$$\Delta_N$$

### 3.3.5 Exercícios

**E 3.3.1.** Resolver a equação  $e^x = x + 2$  é equivalente a calcular os pontos fixos da função  $g(x) = e^x + 2$  (veja o Exemplo 44). Use a iteração do ponto fixo  $x^{(n+1)} = g(x^n)$  com  $x^{(1)} = -1,8$  para obter uma aproximação de uma das soluções da equação dada com 8 dígitos significativos.

**E 3.3.2.** Mostre que a equação:

$$\cos(x) = x$$

possui uma única solução no intervalo  $[0, 1]$ . Use a iteração do ponto fixo e encontre uma aproximação para esta solução com 4 dígitos significativos.

**E 3.3.3.** Mostre que a equação  $xe^x = 10$  é equivalente às seguintes equações:

$$x = \ln\left(\frac{10}{x}\right) \quad \text{e} \quad x = 10e^{-x}.$$

Destas, considere as seguintes iterações de ponto fixo:

$$\text{a) } x^{(n+1)} = \ln \left( \frac{10}{x^{(n)}} \right)$$

$$\text{b) } x^{(n+1)} = 10e^{-x^{(n)}}$$

Tomando  $x^{(1)} = 1$ , verifique se estas sequências são convergentes.

**E 3.3.4.** Verifique (analiticamente) que a única solução real da equação:

$$xe^x = 10$$

é ponto fixo das seguintes funções:

$$\text{a) } g(x) = \ln \left( \frac{10}{x} \right)$$

$$\text{b) } g(x) = x - \frac{xe^x - 10}{15}$$

$$\text{c) } g(x) = x - \frac{xe^x - 10}{10 + e^x}$$

Implemente o processo iterativo  $x^{(n+1)} = g(x^{(n)})$  para  $n \geq 0$  e compare o comportamento. Discuta os resultados com base na teoria estudada.

**E 3.3.5.** Verifique (analiticamente) que a única solução real da equação:

$$\cos(x) = x$$

é ponto fixo das seguintes funções:

a)  $g(x) = \cos(x)$

b)  $g(x) = 0,4x + 0,6 \cos(x)$

c)  $g(x) = x + \frac{\cos(x)-x}{1+\sin(x)}$

Implemente o processo iterativo  $x^{(n+1)} = g(x^{(n)})$  para  $n \geq 0$  e compare o comportamento. Discuta os resultados com base na teoria estudada.

**E 3.3.6.** Encontre a solução de cada equação com erro absoluto inferior a  $10^{-6}$ .

a)  $e^x = x + 2$  no intervalo  $(-2,0)$ .

b)  $x^3 + 5x^2 - 12 = 0$  no intervalo  $(1,2)$ .

c)  $\sqrt{x} = \cos(x)$  no intervalo  $(0,1)$ .

**E 3.3.7.** Encontre numericamente as três primeiras raízes positivas da equação dada por:

$$\cos(x) = \frac{x}{10 + x^2}$$

com erro absoluto inferior a  $10^{-6}$ .

**E 3.3.8.** Calcule uma equação da reta tangente a curva  $y = e^{-(x-1)^2}$  que passa pelo ponto  $(3, 1/2)$ .



**E 3.3.9.** Resolva numericamente a inequação:

$$e^{-x^2} < 2x$$

**E 3.3.10.** Considere os seguintes processos iterativos:

$$\begin{array}{l} a \left\{ \begin{array}{l} x^{(n+1)} = \cos(x^{(n)}) \\ x^{(1)} = .5 \end{array} \right. \\ \text{e} \end{array} \quad (3.1)$$
$$b \left\{ \begin{array}{l} x^{(n+1)} = .4x^{(n)} + .6 \cos(x^{(n)}) \\ x^{(1)} = .5 \end{array} \right.$$

Use o teorema do ponto fixo para verificar que cada um desses processos converge para a solução da equação  $x^*$  de  $\cos(x) = x$ . Observe o comportamento numérico dessas sequências. Qual estabiliza mais rápido com cinco casas decimais? Discuta.

Dica: Verifique que  $\cos([0.5,1]) \subseteq [0.5,1]$  e depois a mesma identidade para a função  $f(x) = .4x + .6 \cos(x)$ .

**E 3.3.11.** Use o teorema do ponto fixo aplicado a um intervalo adequado para mostrar que a função  $g(x) = \ln(100 - x)$  possui um ponto fixo estável.

**E 3.3.12.** Na hidráulica, o fator de atrito de Darcy é dado pela implicitamente pela equação de Colebrook-White:

$$\frac{1}{\sqrt{f}} = -2 \log_{10} \left( \frac{\varepsilon}{14.8 R_h} + \frac{2.51}{Re \sqrt{f}} \right)$$

onde  $f$  é o fator de atrito,  $\varepsilon$  é a rugosidade do tubo em metros,  $R_h$  é o raio hidráulico em metros e  $Re$  é o número de Reynolds. Considere  $\varepsilon = 2mm$ ,  $R_h = 5cm$  e  $Re = 10000$  e obtenha o valor de  $f$  pela iteração:

$$x^{(n+1)} = -2 \log_{10} \left( \frac{\varepsilon}{14.8 R_h} + \frac{2.51 x^{(n)}}{Re} \right)$$

**E 3.3.13.** Encontre uma solução aproximada para equação algébrica

$$180 - 100x = 0.052 \sinh^{-1}(10^{13}x)$$

com erro absoluto inferior a  $10^{-3}$  usando um método iterativo. Estime o erro associado ao valor de  $v = 180 - 100x = 0.052 \sinh^{-1}(10^{13}x)$ , usando cada uma dessas expressões. Discuta sucintamente o resultado obtido. Dica: Este caso é semelhante ao problema 3.2.7.

**E 3.3.14.** Considere que  $x_n$  satisfaz a seguinte relação de recorrência:

$$x_{n+1} = x_n - \beta(x_n - x^*)$$

onde  $\beta$  e  $x^*$  são constantes. Prove que

$$x_n - x^* = (1 - \beta)^{n-1}(x_1 - x^*).$$

Conclua que  $x_n \rightarrow x^*$  quando  $|1 - \beta| < 1$ .

**E 3.3.15.** Considere o seguinte esquema iterativo:

$$\begin{cases} x^{(n+1)} = x_n + q^n \\ x^{(0)} = 0 \end{cases}$$

onde  $q = 1 - 10^{-6}$ .

a) Calcule o limite

$$x_\infty = \lim_{n \rightarrow \infty} x^{(n)}$$

analiticamente.

b) Considere que o problema de obter o limite da sequência numericamente usando como critério de parada que  $|x^{(n+1)} - x^{(n)}| < 10^{-5}$ . Qual o valor é produzido pelo esquema numérico? Qual o desvio entre o valor obtido pelo esquema numérico e o valor do limite obtido no item a? Discuta. (Dica: Você não deve implementar o esquema iterativo, obtendo o valor de  $x^{(n)}$  analiticamente)

- c) Qual deve ser a tolerância especificada para obter o resultado com erro relativo inferior a  $10^{-2}$ ?

**E 3.3.16.** Considere o seguinte esquema iterativo:

$$x^{(n+1)} = x^{(n)} - [x^{(n)}]^3, \quad x^{(n)} \geq 0$$

com  $x^{(0)} = 10^{-2}$ . Prove que  $\{x^{(n)}\}$  é sequência de número reais positivos convergindo para zero. Verifique que são necessários mais de mil passos para que  $x^{(n)}$  se torne menor que  $0.9x^{(0)}$ .

**E 3.3.17.**

- a) Use o teorema do ponto fixo para mostrar que a função  $g(x) = 1 - \sin(x)$  possui um único ponto fixo estável o intervalo  $[\frac{1}{10}, 1]$ . Construa um método iterativo  $x^{(n+1)} = g(x^{(n)})$  para encontrar esse ponto fixo. Use o Scilab para encontrar o valor numérico do ponto fixo.

- b) Verifique que função  $\psi(x) = \frac{1}{2} [x + 1 - \sin(x)]$  possui um ponto fixo  $x^*$  que também é o ponto fixo da função  $g$  do item a. Use o Scilab para encontrar o valor numérico do ponto fixo através da iteração  $x^{(n+1)} = \psi(x^{(n)})$ . Qual método é mais rápido?

**E 3.3.18.** (*Esquemas oscilantes*)

- a) Considere a função  $g(x)$  e função composta  $\psi(x) = g \circ g = g(g(x))$ . Verifique todo ponto fixo de  $g$  também é ponto fixo de  $\psi$ .
- b) Considere a função

$$g(x) = 10 \exp(-x)$$

- e função composta  $\psi(x) = g \circ g = g(g(x))$ . Mostre que  $\psi$  possui dois pontos fixos que não são pontos fixos de  $g$ .
- c) No problema anterior, o que acontece quando o processo iterativo  $x^{(n+1)} = g(x^{(n)})$  é inicializado com um ponto fixo de  $\psi$  que não é ponto fixo de  $g$ ?

**E 3.3.19.** Mostre que se  $f(x)$  possui uma raiz  $x^*$  então a  $x^*$  é um ponto fixo de  $\phi(x) = x + \gamma(x)f(x)$ . Encontre uma condição em  $\gamma(x)$  para que o ponto fixo  $x^*$  de  $\phi$  seja estável. Encontre uma condição em  $\gamma(x)$  para que  $\phi'(x^*) = 0$ .

**E 3.3.20.** Considere que  $x^{(n)}$  satisfaz a seguinte relação de recorrência:

$$x^{(n+1)} = x^{(n)} - \gamma f(x^{(n)})$$

onde  $\gamma$  é uma constante. Suponha que  $f(x)$  possui um zero em  $x^*$ . Aproxime a função  $f(x)$  em torno de  $x^*$  por

$$f(x) = f(x^*) + f'(x^*)(x - x^*) + O\left((x - x^*)^2\right).$$

Em vista do problema anterior, qual valor de  $\gamma$  você escolheria para que a sequência  $x^{(n)}$  convirja rapidamente para  $x^*$ .

**E 3.3.21.** Considere o problema da questão 3.2.7 e dois seguintes

esquemas iterativos.

$$A \begin{cases} I^{(n+1)} = \frac{1}{R} \left[ V - v_t \ln \left( 1 + \frac{I^{(n)}}{I_R} \right) \right], n > 0 \\ I^{(0)} = 0 \end{cases}$$

e

$$B \begin{cases} I^{(n+1)} = I_R \left[ \exp \left( \frac{V - RI^{(n)}}{v_t} \right) - 1 \right], n > 0 \\ I^{(0)} = 0 \end{cases}$$

Verifique numericamente que apenas o processo A é convergente para a, b e c; enquanto apenas o processo B é convergente para os outros itens.



## 3.4 Método de Newton-Raphson

Nesta seção, apresentamos o **método de Newton-Raphson**<sup>45</sup> para calcular o zero de funções reais de uma variável real.

Assumimos que  $x^*$  é um zero de uma dada função  $f(x)$  continuamente diferenciável, i.e.  $f(x^*) = 0$ . Afim de usar a iteração do ponto fixo, observamos que, equivalentemente,  $x^*$  é um ponto fixo da função:

$$g(x) = x + \alpha(x)f(x), \quad \gamma(x) \neq 0,$$

onde  $\alpha(x)$  é uma função arbitrária que queremos escolher de forma que a iteração do ponto fixo tenha ótima taxa de convergência.

Do **Teorema do ponto fixo** temos que a taxa de convergência é dada em função do valor absoluto da derivada de  $g(x)$ . Calculando a derivada temos:

$$g'(x) = 1 + \alpha(x)f'(x) + \alpha'(x)f(x).$$

---

<sup>4</sup>Joseph Raphson, 1648 - 1715, matemático inglês.

<sup>5</sup>Também chamado apenas de método de Newton.

No ponto  $x = x^*$ , temos:

$$g'(x^*) = 1 + \alpha(x^*)f'(x^*) + \alpha'(x^*)f(x^*).$$

Como  $f(x^*) = 0$ , temos:

$$g'(x^*) = 1 + \alpha(x^*)f'(x^*).$$

Sabemos que o processo iterativo converge tão mais rápido quanto menor for  $|g'(x)|$  nas vizinhanças de  $x^*$ . Isto nos leva a escolher:

$$g'(x^*) = 0,$$

e, então, temos:

$$\alpha(x^*) = -\frac{1}{f'(x^*)},$$

se  $f'(x^*) \neq 0$ .

A discussão acima nos motiva a introduzir o método de Newton, cujas iterações são dada por:

$$x^{(n+1)} = x^{(n)} - \frac{f(x^{(n)})}{f'(x^{(n)})}, \quad n \geq 1,$$

sendo  $x^{(1)}$  uma aproximação inicial dada.

### 3.4.1 Interpretação geométrica

Seja dada uma função  $f(x)$  conforme na Figura 3.5. Para tanto, escolhamos uma aproximação inicial  $x^{(1)}$  e computamos:

$$x^{(2)} = x^{(1)} - \frac{f(x^{(1)})}{f'(x^{(1)})}.$$

Geometricamente, o ponto  $x^{(2)}$  é a interseção da reta tangente ao gráfico da função  $f(x)$  no ponto  $x = x^{(1)}$  com o eixo das abscissas. Com efeito, a equação desta reta é:

$$y = f'(x^{(1)})(x - x^{(1)}) + f(x^{(1)}).$$

Assim, a interseção desta reta com o eixo das abscissas ocorre quando ( $y = 0$ ):

$$f'(x^{(1)})(x - x^{(1)}) + f(x^{(1)}) = 0 \Rightarrow x = x^{(1)} - \frac{f(x^{(1)})}{f'(x^{(1)})}.$$

Ou seja, dado  $x^{(n)}$  a próxima aproximação  $x^{(n+1)}$  é o ponto de interseção entre o eixo das abscissas e a reta tangente ao gráfico da função no ponto  $x = x^{(n)}$ . Observe a Figura 3.5.

### 3.4.2 Análise de convergência

Seja  $f(x)$  um função com derivadas primeira e segunda contínuas tal que  $f(x^*) = 0$  e  $f'(x^*) \neq 0$ . Seja também a função  $g(x)$  definida como:

$$g(x) = x - \frac{f(x)}{f'(x)}.$$

Expandimos em série de Taylor em torno de  $x = x^*$ , obtemos:

$$g(x) = g(x^*) + g'(x^*)(x - x^*) + \frac{g''(x^*)}{2}(x - x^*)^2 + O\left((x - x^*)^3\right).$$

Observamos que:

$$\begin{aligned} g(x^*) &= x^* \\ g'(x^*) &= 1 - \frac{f'(x^*)f'(x^*) - f(x^*)f''(x^*)}{(f'(x^*))^2} = 0 \end{aligned}$$

Portanto:

$$g(x) = x^* + \frac{g''(x^*)}{2}(x - x^*)^2 + O\left((x - x^*)^3\right)$$

Com isso, temos:

$$x^{(n+1)} = g(x^{(n)}) = x^* + \frac{g''(x^*)}{2}(x^{(n)} - x^*)^2 + O\left((x - x^*)^3\right),$$

ou seja:

$$\left|x^{(n+1)} - x^*\right| \leq C \left|x^{(n)} - x^*\right|^2,$$

com constante  $C = |g''(x^*)/2|$ . Isto mostra que o método de Newton tem **taxa de convergência quadrática**. Mais precisamente, temos o seguinte teorema.

**Teorema 4** (Método de Newton). *Sejam  $f \in C^2([a, b])$  com  $x^* \in (a, b)$  tal que  $f(x^*) = 0$  e:*

$$m := \min_{x \in [a, b]} |f'(x)| > 0 \quad e \quad M := \max_{x \in [a, b]} |f''(x)|.$$

*Escolhendo  $\rho > 0$  tal que:*

$$q := \frac{M}{2m}\rho < 1,$$

*definimos a **bacia de atração** do método de Newton pelo conjunto:*

$$K_\rho(x^*) := \{x \in \mathbb{R}; |x - x^*| \leq \rho\} \subset [a, b].$$

*Então, para qualquer  $x^{(1)} \in K_\rho(x^*)$  a iteração do método de Newton:*

$$x^{(n+1)} = x^{(n)} - \frac{f(x^{(n)})}{f'(x^{(n)})},$$

*fornece uma sequência  $x^{(n)}$  que converge para  $x^*$ , i.e.  $x^{(n)} \rightarrow x^*$  quando  $n \rightarrow \infty$ . Além disso, temos a seguinte estimativa de*



*Demonstração.* Para  $n \in \mathbb{N}$ ,  $n \geq 2$ , temos:

$$x^{n+1} - x^* = x^{(n)} - \frac{f(x^{(n)})}{f'(x^{(n)})} - x^* = -\frac{1}{f'(x^{(n)})} \left[ f(x^{(n)}) + (x^* - x^{(n)})f'(x^{(n)}) \right] \quad (3.2)$$

Agora, para estimar o lado direito desta equação, usamos o polinômio de Taylor de grau 1 da função  $f(x)$  em torno de  $x = x^{(n)}$ , i.e.:

$$f(x^*) = f(x^{(n)}) + (x^* - x^{(n)})f'(x^{(n)}) + \int_{x^{(n)}}^{x^*} f''(t)(x^* - t) dt.$$

Pela mudança de variável  $t = x^{(n)} + s(x^{(n)} - x^*)$ , observamos que o resto deste polinômio de Taylor na forma integral é igual a:

$$R(x^*, x^{(n)}) := (x^* - x^{(n)})^2 \int_0^1 f''(x^{(n)} + s(x^* - x^{(n)})) (1 - s) ds.$$

Assim, da cota da segunda derivada de  $f(x)$ , temos:

$$|R(x^*, x^{(n)})| \leq M|x^* - x^{(n)}|^2 \int_0^1 (1 - s) ds = \frac{M}{2}|x^* - x^{(n)}|^2. \quad (3.3)$$

Se  $x^{(n)} \in K_\rho(x^*)$ , então de (3.2) e (3.3) temos:

$$|x^{(n+1)} - x^*| \leq \frac{M}{2m} |x^{(n)} - x^*|^2 \leq \frac{M}{2m} \rho^2 < \rho. \quad (3.4)$$

Isto mostra que se  $x^{(n)} \in K_\rho(x^*)$ , então  $x^{(n+1)} \in K_\rho(x^*)$ , i.e.  $x^{(n)} \in K_\rho(x^*)$  para todo  $n \in \mathbb{R}$ .

Agora, obtemos a estimativa **a priori** de (3.4.2), pois:

$$|x^{(n)} - x^*| \leq \frac{2m}{M} \left( \frac{M}{2m} |x^{(n-1)} - x^*| \right)^2 \leq \dots \leq \frac{2m}{M} \left( \frac{M}{2m} |x^{(1)} - x^*| \right)^{2^{n-1}}$$

Logo:

$$|x^{(n)} - x^*| \leq \frac{2m}{M} q^{2^{n-1}},$$

donde também vemos que  $x^{(n)} \rightarrow x^*$  quando  $n \rightarrow \infty$ , pois  $q < 1$ .

Por fim, para provarmos a estimativa **a posteriori** tomamos a seguinte expansão em polinômio de Taylor:

$$f(x^{(n)}) = f(x^{(n-1)}) + (x^{(n)} - x^{(n-1)})f'(x^{(n-1)}) + R(x^{(n)}, x^{(n-1)}).$$

Aqui, temos:

$$f(x^{(n-1)}) + (x^{(n)} - x^{(n-1)})f'(x^{(n-1)}) = 0$$

e, então, conforme acima:

$$|f(x^{(n)})| = |R(x^{(n)}, x^{(n-1)})| \leq \frac{M}{2} |x^{(n)} - x^{(n-1)}|^2.$$

Com isso e do Teorema do valor médio, concluímos:

$$|x^{(n)} - x^*| \leq \frac{1}{m} |f(x^{(n)}) - f(x^*)| \leq \frac{M}{2m} |x^{(n)} - x^{(n-1)}|^2.$$

□

**Exemplo 49.** Estime o raio  $\rho$  da bacia de atração  $K_\rho(x^*)$  para a função  $f(x) = \cos(x) - x$  restrita ao intervalo  $[0, \pi/2]$ .

**Solução.** O raio da bacia de atração é tal que:

$$\rho < \frac{2m}{M}$$

onde  $m := \min |f'(x)|$  e  $M := \max |f''(x)|$  com o mínimo e o máximo tomados em um intervalo  $[a, b]$  que contenha o zero da função  $f(x)$ . Aqui, por exemplo, podemos tomar  $[a, b] = [0, \pi/2]$ . Como, neste caso,  $f'(x) = -\sin(x) - 1$ , temos que  $m = 1$ . Também, como  $f''(x) = -\cos x$ , temos  $M = 1$ . Assim, concluímos que  $\rho < 2$  (lembrando que  $K_\rho(x^*) \subset [0, \pi/2]$ ). Ou seja, neste caso as iterações de Newton convergem para o zero de  $f(x)$  para qualquer escolha da aproximação inicial  $x^{(1)} \in [0, \pi/2]$ .  $\diamond$

### 3.4.3 Exercícios

**E 3.4.1.** Considere o problema de calcular as soluções positivas da equação:

$$\operatorname{tg}(x) = 2x^2.$$

- a) Use o método gráfico para isolar as duas primeiras raízes positivas em pequenos intervalos. Use a teoria estudada em aula para argumentar quanto à existência e unicidade das raízes dentro intervalos escolhidos.
- b) Calcule o número de iterações necessárias para que o método da bisseção aproxime cada uma das raízes com erro absoluto inferior a  $10^{-8}$ . Calcule as raízes por este método usando este número de passos.
- c) Calcule cada uma das raízes pelo método de Newton com oito dígitos significativos e discuta a convergência comparando com o item b).

**Obs:** Alguns alunos encontraram como solução  $x_1 \approx 1,5707963$  e  $x_2 \approx 4,7123890$ . O que eles fizeram de errado?

**E 3.4.2.** Considere a equação

$$e^{-x^2} = x$$

trace o gráfico com auxílio do **Scilab** e verifique que ela possui uma raiz positiva. Encontre uma aproximação para esta raiz pelo gráfico e use este valor para inicializar o método de Newton e obtenha uma aproximação para a raiz com 8 dígitos significativos. (Use o comando `format('v',16)` para alterar a visualização no **Scilab**.)

**E 3.4.3.** Isole e encontre as cinco primeiras raízes positivas da equação com 6 dígitos corretos através de traçado de gráfico e do método de Newton.

$$\cos(10x) = e^{-x}.$$

Dica: a primeira raiz positiva está no intervalo  $(0,0.02)$ . Fique atento.

**E 3.4.4.** Encontre as raízes do polinômio  $f(x) = x^4 - 4x^2 + 4$  através do método de Newton. O que você observa em relação ao erro obtido? Compare com a situação do problema 3.2.6.

**E 3.4.5.** Encontre as raízes reais do polinômio  $f(x) = \frac{x^5}{100} + x^4 + 3x + 1$  isolando-as pelo método do gráfico e depois usando o método de Newton. Expresse a solução com 7 dígitos significativos.

**E 3.4.6.** Considere o método de Newton aplicado para encontrar a raiz de  $f(x) = x^3 - 2x + 2$ . O que acontece quando  $x^{(0)} = 0$ ? Escolha um valor adequado para inicializar o método e obter a única raiz real desta equação.

**E 3.4.7.** Justifique a construção do processo iterativo do Método de Newton através do conceito de estabilidade de ponto fixo e convergência do método da iteração. Dica: Considere os problemas 3.3.19 e 3.3.20.

**E 3.4.8.** Entenda a interpretação geométrica ao método de Newton. Encontre um valor para iniciar o método de Newton aplicado ao problema  $f(x) = xe^{-x} = 0$  tal que o esquema iterativo divirja.

**E 3.4.9.** Aplique o método de Newton à função  $f(x) = \frac{1}{x} - u$  e construa um esquema computacional para calcular a inversa de  $u$  com base em operações de multiplicação e soma/subtração.

**E 3.4.10.** Aplique o método de Newton à função  $f(x) = x^n - A$  e construa um esquema computacional para calcular  $\sqrt[n]{A}$  para  $A > 0$  com base em operações de multiplicação e soma/subtração.

**E 3.4.11.** Considere a função dada por

$$\psi(x) = \ln(15 - \ln(x))$$

definida para  $x > 0$

- a) (1.5) Use o teorema do ponto fixo para provar que se  $x_0$  pertence ao intervalo  $[1,3]$ , então a sequência dada iterativamente



por

$$x^{(n+1)} = \psi(x^{(n)}), n \geq 0$$

converge para o único ponto fixo,  $x^*$ , de  $\psi$ . Construa a iteração  $x^{(n+1)} = \psi(x^{(n)})$  e obtenha numericamente o valor do ponto fixo  $x^*$ . Expresse a resposta com 5 algarismos significativos corretos.

- b) (1.0) Construa a iteração do método de Newton para encontrar  $x^*$ , explicitando a relação de recorrência e iniciando com  $x_0 = 2$ . Use o Scilab para obter a raiz e expresse a resposta com oito dígitos significativos corretos.

## 3.5 Método das Secantes

O **método das secantes** é uma variação do método de Newton. Dada uma função  $f(x)$ , a ideia é aproximar sua derivada pela razão fundamental:

$$f'(x) \approx \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0}, \quad x \approx x_0.$$

Mais precisamente, o método de Newton é uma iteração de ponto fixo da forma:

$$x^{(n+1)} = x^{(n)} - \alpha(x^{(n)})f(x^{(n)}), \quad n \geq 1,$$

onde  $x^{(1)}$  é uma aproximação inicial dada e  $\alpha(x^{(n)}) = 1/f'(x^{(n)})$ . Usando a aproximação da derivada acima, com  $x = x^{(n)}$  e  $x_0 = x^{(n-1)}$ , temos:

$$\alpha(x^{(n)}) = \frac{1}{f'(x^{(n)})} \approx \frac{x^{(n)} - x^{(n-1)}}{f(x^{(n)}) - f(x^{(n-1)})}.$$

Isto nos motiva a introduzir a **iteração do método das secantes** dada por:

$$x^{(n+1)} = x^{(n)} - f(x^{(n)}) \frac{x^{(n)} - x^{(n-1)}}{f(x^{(n)}) - f(x^{(n-1)})}, \quad n \geq 2.$$

Observe que para inicializarmos a iteração acima precisamos de duas aproximações iniciais, a saber,  $x^{(1)}$  e  $x^{(2)}$ . Maneiras apropriadas de escolher estas aproximações podem ser inferidas da interpretação geométrica do método.

**Exemplo 50.** Encontre as raízes de  $f(x) = \cos(x) - x$ .

**Solução.** Da inspeção do gráfico das funções  $y = \cos(x)$  e  $y = x$ , sabemos que esta equação possui uma raiz em torno de  $x = 0,8$ . Iniciamos o método com  $x_0 = 0,7$  e  $x_1 = 0,8$ .

$x^{(n-1)}$	$x^{(n)}$	$m$	$x^{(n+1)}$
0,7	0,8	$\frac{f(0,8)-f(0,7)}{0,8-0,7} =$ -1,6813548	$0,8 - \frac{f(0,8)}{-1,6813548} =$ 0,7385654
0,8	0,7385654	-1,6955107	0,7390784
0,7385654	0,7390784	-1,6734174	0,7390851
0,7390784	0,7390851	-1,6736095	0,7390851



### 3.5.1 Interpretação geométrica

Enquanto, o método de Newton está relacionado às retas tangentes ao gráfico da função objetivo  $f(x)$ , o método das secantes, como o próprio nome indica, está relacionado às retas secantes.

Sejam  $f(x)$  e as aproximações  $x^{(1)}$  e  $x^{(2)}$  do zero  $x^*$  desta função (veja Figura 3.6). A iteração do método das secantes fornece:

$$x^{(3)} = x^{(2)} - f(x^{(2)}) \frac{x^{(2)} - x^{(1)}}{f(x^{(2)}) - f(x^{(1)})}.$$

De fato,  $x^{(3)}$  é o ponto de interseção da reta secante ao gráfico de  $f(x)$  pelos pontos  $x^{(1)}$  e  $x^{(2)}$  com o eixo das abscissas. Com efeito, a equação desta reta secante é:

$$y = \frac{f(x^{(2)}) - f(x^{(1)})}{x^{(2)} - x^{(1)}}(x - x^{(2)}) + f(x^{(2)}).$$

Esta reta intercepta o eixo das abscissas no ponto  $x$  tal que  $y = 0$ ,

i.e.:

$$\frac{f(x^{(2)}) - f(x^{(1)})}{x^{(2)} - x^{(1)}}(x - x^{(2)}) + f(x^{(2)}) \Rightarrow x = x^{(2)} - f(x^{(2)}) \frac{x^{(2)} - x^{(1)}}{f(x^{(2)}) - f(x^{(1)})}$$

### 3.5.2 Análise de convergência

Uma análise assintótica semelhante aquela feita para o método de Newton nos indica que, para uma função  $f(x)$  duas vezes diferenciável, as iterações do método da secante satisfazem:

$$|x^{(n+1)} - x^*| \approx C|x^{(n)} - x^*||x^{(n-1)} - x^*|,$$

para aproximações iniciais suficientemente próximas de  $x^*$ , onde  $f(x^*) = 0$ . Além disso, veremos que:

$$|x^{(n+1)} - x^*| \leq C|x^{(n)} - x^*|^{1,6}$$

sob certas condições. Ou seja, o método das secantes tem **taxa de convergência superlinear**.

**Teorema 5** (Método das secantes). *Seja  $f \in C^2([a, b])$  uma função com  $x^* \in (a, b)$  tal que  $f(x^*) = 0$ . Sejam, também:*

$$m := \min_{x \in [a, b]} |f'(x)| > 0 \quad e \quad M := \max_{x \in [a, b]} |f''(x)| < \infty.$$

*Além disso, seja  $\rho > 0$  tal que:*

$$q := \frac{M}{2m}\rho < 1, \quad K_\rho(x^*) := \{x \in \mathbb{R}; |x - x^*| \leq \rho\} \subset [a, b].$$

*Então, para aproximações iniciais  $x^{(1)}, x^{(2)} \in K_\rho(x^*)$ , com  $x^{(1)} \neq x^{(2)}$ , temos que as iterações do método das secantes  $x^{(n)} \in K_\rho(x^*)$ ,  $n \geq 1$ , e  $x^{(n)} \rightarrow x^*$ , quando  $n \rightarrow \infty$ . Além disso, vale a seguinte estimativa de convergência **a priori**:*

$$|x^{(n)} - x^*| \leq \frac{2m}{M} q^{\gamma_n - 1}, \quad n \geq 1,$$

*onde  $\{\gamma_n\}_{n \in \mathbb{N}}$  é a sequência de Fibonacci<sup>ab</sup>, bem como vale a estimativa **a posteriori**:*



*Demonstração.* Sejam  $n \in \mathbb{N}$ ,  $n \geq 2$ , e  $x^{(n)}, x^{(n-1)} \in K_\rho(x^*)$ , tal que  $x^{(n)} \neq x^{(n-1)}$ ,  $x^{(n)} \neq x^*$  e  $x^{(n-1)} \neq x^*$ . Seja, também:

$$g(x^{(n)}, x^{(n-1)}) := x^{(n)} - f(x^{(n)}) \frac{x^{(n)} - x^{(n-1)}}{f(x^{(n)}) - f(x^{(n-1)})}.$$

Com isso, temos:

$$\begin{aligned} g(x^{(n)}, x^{(n-1)}) - x^* &= x^{(n)} - f(x^{(n)}) \frac{x^{(n)} - x^{(n-1)}}{f(x^{(n)}) - f(x^{(n-1)})} - x^* \\ &= \frac{x^{(n)} - x^{(n-1)}}{f(x^{(n)}) - f(x^{(n-1)})} \left\{ (x^{(n)} - x^*) \frac{f(x^{(n)}) - f(x^{(n-1)})}{x^{(n)} - x^{(n-1)}} - f(x^{(n)}) \right\} + x^* \end{aligned}$$

Então, da cota assumida para primeira derivada de  $f(x)$  e do Teorema do valor médio, temos:

$$|g(x^{(n)}, x^{(n-1)}) - x^*| \leq \frac{|x^{(n)} - x^*|}{m} \left| \frac{f(x^{(n)}) - f(x^{(n-1)})}{x^{(n)} - x^{(n-1)}} - \frac{f(x^{(n)}) - f(x^*)}{x^{(n)} - x^*} \right| \quad (3.5)$$

Agora, iremos estimar este último termo a direita. Para tanto, começamos observando que da expansão em polinômio de Taylor de ordem 0 da função  $f(x)$  com resto na forma integral, temos:

$$\begin{aligned}\frac{f(x^{(n)}) - f(x^{(n-1)})}{x^{(n)} - x^{(n-1)}} &= - \int_0^1 \frac{d}{dr} f(x^{(n)} + r(x^{(n-1)} - x^{(n)})) \frac{dr}{x^{(n)} - x^{(n-1)}} \\ &= \int_0^1 f'(x^{(n)} + r(x^{(n-1)} - x^{(n)})) dr\end{aligned}$$

De forma análogo, temos:

$$\frac{f(x^{(n)}) - f(x^*)}{x^{(n)} - x^*} = \int_0^1 f'(x^{(n)} + r(x^* - x^{(n)})) dr$$

Logo, temos:

$$\begin{aligned}\frac{f(x^{(n)}) - f(x^{(n-1)})}{x^{(n)} - x^{(n-1)}} - \frac{f(x^{(n)}) - f(x^*)}{x^{(n)} - x^*} &= \\ \int_0^1 \left[ f'(x^{(n)} + r(x^{(n-1)} - x^{(n)})) - f'(x^{(n)} + r(x^* - x^{(n)})) \right] dr.\end{aligned}\tag{3.6}$$

Agora, novamente temos:

$$\begin{aligned} & f'(x^{(n)} + r(x^{(n-1)} - x^{(n)})) - f'(x^{(n)} + r(x^* - x^{(n)})) \\ &= \int_0^r \frac{d}{ds} f'(x^{(n)} + r(x^{(n-1)} - x^{(n)}) + s(x^* - x^{(n-1)})) ds \\ &= \int_0^r f''(x^{(n)} + r(x^{(n-1)} - x^{(n)}) + s(x^* - x^{(n-1)})) ds (x^* - x^{(n-1)}). \end{aligned}$$

Então, retornando à Equação (3.6) e usando a assumida cota para a segunda derivada, obtemos:

$$\left| \frac{f(x^{(n)}) - f(x^{(n-1)})}{x^{(n)} - x^{(n-1)}} - \frac{f(x^{(n)}) - f(x^*)}{x^{(n)} - x^*} \right| \leq \frac{M}{2} |x^{(n-1)} - x^*|.$$

Agora, retornando à Equação (3.5), obtemos:

$$|g(x^{(n)}, x^{(n-1)}) - x^*| \leq \frac{M}{2m} |x^{(n)} - x^*| |x^{(n-1)} - x^*| \leq \frac{M}{2m} \rho^2 < \rho.$$

Portanto, concluímos que as iterações do método das secantes  $x^{(n)}$  permanecem no conjunto  $K_\rho(x^*)$ , se começarem nele. Além disso,

temos demonstrado que:

$$|x^{(n+1)} - x^*| \leq \frac{M}{2m} |x^{(n)} - x^*| |x^{(n-1)} - x^*|.$$

Com isso, temos:

$$\rho_n := \frac{M}{2m} |x^{(n)} - x^*| \Rightarrow \rho_{n+1} \leq \rho_n \rho_{n-1}, \quad n \geq 2.$$

Como  $\rho_1 \leq q$  e  $\rho_2 \leq q$ , temos  $\rho_n \leq q^{\gamma_{n-1}}$ ,  $n \geq 1$ . Isto mostra a estimativa de convergência **a priori**:

$$|x^n - x^*| \leq \frac{2m}{M} q^{\gamma_{n-1}}.$$

Além disso, como  $\gamma_n \rightarrow \infty$  quando  $n \rightarrow \infty$  e  $q < 1$ , temos que as iterações do método das secantes  $x^{(n)} \rightarrow x^*$  quando  $n \rightarrow \infty$ .

Por fim, mostramos a estimativa de convergência **a posteriori**. Para tanto, da cota assumida para a primeira derivada e do Teorema

do valor médio, temos, para  $n \geq 3$ :

$$\begin{aligned}|x^{(n)} - x^*| &\leq \frac{1}{m} |f(x^{(n)}) - f(x^*)| \\&= \frac{1}{m} \left| f(x^{(n-1)}) + (x^{(n)} - x^{(n-1)}) \frac{f(x^{(n)}) - f(x^{(n-1)})}{x^{(n)} - x^{(n-1)}} \right| \\&= \frac{1}{m} |x^{(n)} - x^{(n-1)}| \left| \frac{f(x^{(n)}) - f(x^{(n-1)})}{x^{(n)} - x^{(n-1)}} + \frac{f(x^{(n-1)})}{x^{(n)} - x^{(n-1)}} \right|\end{aligned}$$

Agora, da iteração do método das secantes:

$$x^{(n)} = x^{(n-1)} - f(x^{(n-1)}) \frac{x^{(n-1)} - x^{(n-2)}}{f(x^{(n-1)}) - f(x^{(n-2)})},$$

temos:

$$\frac{f(x^{(n-1)})}{x^{(n)} - x^{(n-1)}} = - \frac{f(x^{(n-1)}) - f(x^{(n-2)})}{x^{(n-1)} - x^{(n-2)}}.$$

Logo:

$$|x^{(n)} - x^*| \leq \frac{1}{m} |x^{(n)} - x^{(n-1)}| \left| \frac{f(x^{(n-1)}) - f(x^{(n)})}{x^{(n-1)} - x^{(n)}} - \frac{f(x^{(n-1)}) - f(x^{(n-2)})}{x^{(n-1)} - x^{(n-2)}} \right|$$

Observamos que o último termo pode ser estimado como feito acima para o termo análogo na Inequação (3.5). Com isso, obtemos a estimativa desejada:

$$|x^{(n)} - x^*| \leq \frac{M}{2m} |x^{(n)} - x^{(n-1)}| |x^{(n)} - x^{(n-2)}|.$$

□

**Proposição 3** (Sequência de Fibonacci). *A sequência de Fibonacci  $\{\gamma_n\}_{n \in \mathbb{N}}$  é assintótica a  $\gamma_n \sim \lambda_1^{n+1}/\sqrt{5}$  e:*

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\gamma_{n+1}}{\gamma_n} = \lambda_1,$$

onde  $\lambda_1 = (1 + \sqrt{5})/2 \approx 1,618$  é a porção áurea.

*Demonstração.* A sequência de Fibonacci  $\{\gamma_n\}_{n \in \mathbb{N}}$  é definida por  $\gamma_0 = \gamma_1 = 1$  e  $\gamma_{n+1} = \gamma_n + \gamma_{n-1}$ ,  $n \geq 1$ . Logo, satisfaz a seguinte

equação de diferenças:

$$\gamma_{n+2} - \gamma_{n+1} - \gamma_n = 0, \quad n \in \mathbb{N}.$$

Tomando  $\gamma_n = \lambda^n$ ,  $\lambda \neq 0$  temos:

$$\lambda^n (\lambda^2 - \lambda - 1) = 0 \Rightarrow \lambda^2 - \lambda - 1 = 0 \Rightarrow \lambda_{1,2} = \frac{1 \pm \sqrt{5}}{2}.$$

Portanto,  $\gamma_n = c_1 \lambda_1^n + c_2 \lambda_2^n$ . Como  $\gamma_0 = \gamma_1 = 1$ , as constantes satisfazem:

$$\begin{aligned} c_1 + c_2 &= 1 \\ c_1 \lambda_1 + c_2 \lambda_2 &= 1 \end{aligned} \Rightarrow c_1 = \frac{1 + \sqrt{5}}{2\sqrt{5}}, \quad c_2 = -\frac{1 - \sqrt{5}}{2\sqrt{5}}.$$

Ou seja, obtemos a seguinte forma explícita para os números de Fibonacci:

$$\gamma_n = \frac{1}{\sqrt{5}} \left[ \left( \frac{1 + \sqrt{5}}{2} \right)^{n+1} - \left( \frac{1 - \sqrt{5}}{2} \right)^{n+1} \right].$$

Daí, segue imediatamente o enunciado.



*Observação 12.* Sob as hipóteses do Teorema 5 e da Proposição 3, temos:

$$\begin{aligned}\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{|x^{(n+1)} - x^*|}{|x^{(n)} - x^*|^{\lambda_1}} &\leq \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{M}{2m} |x^{(n)} - x^*|^{1-\lambda_1} |x^{(n-1)} - x^*| \\ &\leq \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{2m}{M}\right)^{1-\lambda_1} q^{(2-\lambda_1)\lambda_1^n/\sqrt{5}} = 0.\end{aligned}$$

Isto mostra que o método das secantes (nestas hipóteses) tem taxa de convergência superlinear ( $\lambda_1 \approx 1,6$ ).



## 3.6 Critérios de parada

Quando usamos métodos iterativos precisamos determinar um critério de parada. A Tabela 3.4 indica critérios de parada usuais para os métodos que estudamos neste capítulo.

*Observação 13.* O erro na tabela sempre se refere ao erro absoluto esperado. Nos três últimos métodos, é comum que se exija como critério de parada que a condição seja satisfeita por alguns poucos passos consecutivos. Outros critérios podem ser usados. No métodos das secantes, deve-se ter o cuidado de evitar divisões por zero quando  $x_{n+1} - x_n$  muito pequeno em relação à resolução do sistema de numeração.

## 3.6.1 Exercícios

**E 3.6.1.** Refaça as questões 3.4.2, 3.4.3, 3.4.4 e 3.4.5, usando o método das secantes.

**E 3.6.2.** Dê uma interpretação geométrica ao método das secantes. Qual a vantagem do método das secantes sobre o método de Newton?

**E 3.6.3.** Aplique o método das secantes para resolver a equação

$$e^{-x^2} = 2x$$

**E 3.6.4.** Refaça o problema 3.2.7 usando o método de Newton e das secantes.

**E 3.6.5.** Seja dada uma função  $f(x)$  duas vezes continuamente diferenciável. Faça uma análise assintótica para mostrar que as

iterações do método das secantes satisfazem:

$$|x^{(n+1)} - x^*| \approx C|x^{(n)} - x^*||x^{(n-1)} - x^*|,$$

para aproximações iniciais  $x^{(1)}$  e  $x^{(2)}$  suficientemente próximas de  $x^*$ , onde  $f(x^*) = 0$ .

## 3.7 Exercícios finais

**E 3.7.1.** A equação

$$\cos(\pi x) = e^{-2x}$$

tem infinitas raízes. Usando métodos numéricos encontre as primeiras raízes dessa equação. Verifique a  $j$ -ésima raiz ( $z_j$ ) pode ser aproximada por  $j - 1/2$  para  $j$  grande. Use o método de Newton para encontrar uma aproximação melhor para  $z_j$ .

**E 3.7.2.** A corrente elétrica,  $I$ , em Ampères em uma lâmpada em função da tensão elétrica,  $V$ , é dada por

$$I = \left( \frac{V}{150} \right)^{0.8}$$

Qual a potência da lâmpada quando ligada em série com uma resistência de valor  $R$  a uma fonte de 150V quando. (procure erro inferior a 1%)

a)  $R = 0\Omega$

b)  $R = 10\Omega$

c)  $R = 50\Omega$

d)  $R = 100\Omega$

E)  $R = 500\Omega$

**E 3.7.3.** (Bioquímica) A concentração sanguínea de um medicamento é modelado pela seguinte expressão

$$c(t) = Ate^{-\lambda t}$$

onde  $t > 0$  é o tempo em minutos decorrido desde a administração da droga.  $A$  é a quantidade administrada em  $mg/ml$  e  $\lambda$  é a constante de tempo em  $\text{min}^{-1}$ . Responda:

- a) Sendo  $\lambda = 1/3$ , em que instantes de tempo a concentração é metade do valor máximo. Calcule com precisão de segundos.

- b) Sendo  $\lambda = 1/3$  e  $A = 100mg/ml$ , durante quanto tempo a concentração permanece maior que  $10mg/ml$ .

**E 3.7.4.** Considere o seguinte modelo para crescimento populacional em um país:

$$P(t) = A + Be^{\lambda t}.$$

onde  $t$  é dado em anos. Use  $t$  em anos e  $t = 0$  para 1960. Encontre os parâmetros  $A$ ,  $B$  e  $\lambda$  com base nos anos de 1960, 1970 e 1991 conforme tabela:

Ano	população
1960	70992343
1970	94508583
1980	121150573
1991	146917459

Use esses parâmetros para calcular a população em 1980 e compare com o valor do censo.

**E 3.7.5.** Uma boia esférica flutua na água. Sabendo que a boia tem  $10\ell$  de volume e  $2\text{Kg}$  de massa. Calcule a altura da porção molhada da boia.

**E 3.7.6.** Uma boia cilíndrica tem secção transversal circular de raio  $10\text{cm}$  e comprimento  $2\text{m}$  e pesa  $10\text{Kg}$ . Sabendo que a boia flutua sobre água com o eixo do cilindro na posição horizontal, calcule a altura da parte molhada da boia.

**E 3.7.7.** Encontre com 6 casas decimais o ponto da curva  $y = \ln x$  mais próximo da origem.

**E 3.7.8.** Um computador é vendido pelo valor a vista de  $\text{R\$}2.000,00$  ou em  $1+15$  prestações de  $\text{R\$}200,00$ . Calcule a taxa de juros associada à venda a prazo.

**E 3.7.9.** O valor de R\$110.000,00 é financiado conforme a seguinte programa de pagamentos:

Mês	pagamento
1	20.000,00
2	20.000,00
3	20.000,00
4	19.000,00
5	18.000,00
6	17.000,00
7	16.000,00

Calcule a taxa de juros envolvida. A data do empréstimo é o mês zero.



**E 3.7.10.** Depois de acionado um sistema de aquecedores, a temperatura em um forno evolui conforme a seguinte equação

$$T(t) = 500 - 800e^{-t} + 600e^{-t/3}.$$

onde  $T$  é a temperatura em Kelvin e  $t$  é tempo em horas.

- a) Obtenha analiticamente o valor de  $\lim_{t \rightarrow \infty} T(t)$ .
- b) Obtenha analiticamente o valor máximo de  $T(t)$  e o instante de tempo quando o máximo acontece
- c) Obtenha numericamente com precisão de minutos o tempo decorrido até que a temperatura passe pela primeira vez pelo valor de equilíbrio obtido no item a.
- c) Obtenha numericamente com precisão de minutos a duração do período durante o qual a temperatura permanece pelo menos 20% superior ao valor de equilíbrio.

**E 3.7.11.** Encontre os pontos onde a elipse que satisfaz  $\frac{x^2}{3} + y^2 = 1$  intersepta a parábola  $y = x^2 - 2$ .

**E 3.7.12.** Encontre a área do maior retângulo que é possível inscrever entre a curva  $e^{-x^2} (1 + \cos(x))$  e o eixo  $y = 0$ .

**E 3.7.13.** Uma indústria consome energia elétrica de duas usinas fornecedoras. O custo de fornecimento em reais por hora como função da potência consumida em  $kW$  é dada pelas seguintes funções

$$C_1(x) = 500 + .27x + 4.1 \cdot 10^{-5}x^2 + 2.1 \cdot 10^{-7}x^3 + 4.2 \cdot 10^{-10}x^4$$

$$C_2(x) = 1000 + .22x + 6.3 \cdot 10^{-5}x^2 + 8.5 \cdot 10^{-7}x^3$$

Onde  $C_1(x)$  e  $C_2(x)$  são os custos de fornecimento das usinas 1 e 2, respectivamente. Calcule o custo mínimo da energia elétrica quando a potência total consumida é  $1500kW$ .

**E 3.7.14.** A pressão de saturação (em bar) de um dado hidrocarboneto pelo ser modelada pela equação de Antoine:

$$\ln(P^{sat}) = A - \frac{B}{T + C}$$

onde  $T$  é a temperatura e  $A$ ,  $B$  e  $C$  são constantes dadas conforme a seguir:

Hidrocarboneto	A	B	C
N-pentano	9.2131	2477.07	-39.94
N-heptano	9.2535	2911.32	-56.51

- a) Calcule a temperatura de bolha de uma mistura de N-pentano e N-heptano à pressão de 1.2bar quando as frações molares dos gases são  $z_1 = z_2 = 0.5$ . Para tal utilize a seguinte equação:

$$P = \sum_i z_i P_i^{sat}$$

- b) Calcule a temperatura de orvalho de uma mistura de N-pentano e N-heptano à pressão de 1.2bar quando as frações molares dos gases são  $z_1 = z_2 = 0.5$ . Para tal utilize a seguinte equação:

$$\frac{1}{P} = \sum_i \frac{z_i}{P_i^{sat}}$$

**E 3.7.15.** Encontre os três primeiros pontos de mínimo da função

$$f(x) = e^{-x/11} + x \cos(2x)$$

para  $x > 0$  com erro inferior a  $10^{-7}$ .






Figura 3.3: Ponto fixo  $g(x^*) = x^*$ .






Figura 3.5: Interpretação do método de Newton.




Figura 3.6: Método das secantes.



Tabela 3.4: Quadro comparativo.

Método	Convergência	Erro	Critério de par
Bisseção	Linear ( $p = 1$ )	$\epsilon_{n+1} = \frac{1}{2}\epsilon$	$\frac{b_n - a_n}{2} < \text{er}$
Iteração linear	Linear ( $p = 1$ )	$\epsilon_{n+1} \approx  \phi'(x^*) \epsilon_n$	$\frac{ \Delta_n }{1 - \frac{\Delta_n}{\Delta_{n-1}}} < \text{er}$ $\Delta_n < \Delta_{n-1}$
Newton	Quadrática ( $p = 2$ )	$\epsilon_{n+1} \approx \frac{1}{2} \left  \frac{f''(x^*)}{f'(x^*)} \right  \epsilon_n^2$	$ \Delta_n  < \text{erro}$
Secante	$p = \frac{\sqrt{5} + 1}{2}$ $\approx 1,618$	$\epsilon_{n+1} \approx \left  \frac{f''(x^*)}{f'(x^*)} \right  \epsilon_n \epsilon_{n-1}$ $\approx M \epsilon_n^\phi$	$ \Delta_n  < \text{erro}$

# Capítulo 4

## Solução de sistemas lineares

Muitos problemas da engenharia, física e matemática estão associados a solução de sistemas de equações lineares. Nesse capítulo, tratamos de técnicas numéricas empregadas para obter a solução desses sistemas. Iniciamos por uma rápida revisão do Método de Eliminação Gaussiana do ponto de vista computacional. No contexto de

análise da propagação dos erros de arredondamento, introduzimos o Método de Eliminação Gaussiana com Pivotamento Parcial, bem como, apresentamos o conceito de condicionamento de um sistema linear. Então, passamos a discutir sobre técnicas iterativos, mais especificamente, sobre os Métodos de Jacobi e Gauss-Seidel.

Considere o sistema de equações lineares:

$$\begin{array}{rcl} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \cdots + a_{1n}x_n & = & b_1 \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \cdots + a_{2n}x_n & = & b_2 \\ & \vdots & \\ a_{m1}x_1 + a_{m2}x_2 + \cdots + a_{mn}x_n & = & b_m \end{array}$$

onde  $m$  é o número de equações e  $n$  é o número de incógnitas. Este sistema pode ser escrito na forma matricial:

$$Ax = b$$

onde:

$$A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{bmatrix}, x = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix} \text{ e } b = \begin{bmatrix} b_1 \\ b_2 \\ \vdots \\ b_m \end{bmatrix}$$

Salvo especificado ao contrário, assumiremos ao longo deste capítulo que a matriz dos coeficientes  $A$  é uma matriz real não-singular.

## 4.1 Eliminação gaussiana

Lembramos que algumas operações feitas nas linhas de um sistema não alteram a solução:

1. Multiplicação de um linha por um número
2. Troca de uma linha por ela mesma somada a um múltiplo de outra.
3. Troca de duas linhas.

O processo que transforma um sistema em outro com mesma solução, mas que apresenta uma forma triangular é chamado eliminação Gaussiana. A solução do sistema pode ser obtida fazendo substituição regressiva.

**Exemplo 51** (Eliminação Gaussiana sem pivotamento). Resolva o

sistema

$$\begin{aligned}x + y + z &= 1 \\2x + y - z &= 0 \\2x + 2y + z &= 1\end{aligned}$$

**Solução.** A matriz completa do sistema é escrita como

$$\left[ \begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 2 & 1 & -1 & 0 \\ 2 & 2 & 1 & 1 \end{array} \right] \sim \left[ \begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & -1 & -3 & -2 \\ 0 & 0 & -1 & -1 \end{array} \right]$$

Encontramos  $-z = -1$ , ou seja,  $z = 1$ . Substituindo na segunda equação, temos  $-y - 3z = -2$ , ou seja,  $y = -1$  e finalmente  $x + y + z = 1$ , resultando em  $x = 1$ .  $\diamond$

### 4.1.1 Eliminação Gaussiana com pivotamento parcial

A Eliminação Gaussiana com **pivotamento parcial** consiste em fazer uma permutação de linhas de forma a escolher o maior pivô (em módulo) a cada passo.

**Exemplo 52** (Eliminação Gaussiana com pivotamento parcial). Resolva o sistema

$$\begin{array}{rcrcrcrcl} x & + & y & + & z & = & 1 \\ 2x & + & y & - & z & = & 0 \\ 2x & + & 2z & + & z & = & 1 \end{array}$$

**Solução.** A matriz completa do sistema é

$$\begin{aligned} \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 2 & 1 & -1 & 0 \\ 2 & 2 & 1 & 1 \end{bmatrix} &\sim \begin{bmatrix} 2 & 1 & -1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \\ 2 & 2 & 1 & 1 \end{bmatrix} \\ &\sim \begin{bmatrix} 2 & 1 & -1 & 0 \\ 0 & 1/2 & 3/2 & 1 \\ 0 & 1 & 2 & 1 \end{bmatrix} \\ &\sim \begin{bmatrix} 2 & 1 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & 2 & 1 \\ 0 & 1/2 & 3/2 & 1 \end{bmatrix} \\ &\sim \begin{bmatrix} 2 & 1 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & 2 & 1 \end{bmatrix} \end{aligned}$$



Encontramos  $1/2z = 1/2$ , ou seja,  $z = 1$ . Substituímos na segunda equação e temos  $y+2z = 1$ , ou seja,  $y = -1$  e, finalmente  $2x+y-z = 0$ , resultando em  $x = 1$ .  $\diamond$

**Exemplo 53.** Resolva o sistema por eliminação gaussiana com pivotamento parcial.

$$\begin{bmatrix} 0 & 2 & 2 \\ 1 & 2 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 8 \\ 9 \\ 6 \end{bmatrix}$$

**Solução.** Construimos a matriz completa:

$$\begin{aligned} \left[ \begin{array}{ccc|c} 0 & 2 & 2 & 8 \\ 1 & 2 & 1 & 9 \\ 1 & 1 & 1 & 6 \end{array} \right] & \sim \left[ \begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 1 & 9 \\ 0 & 2 & 2 & 8 \\ 1 & 1 & 1 & 6 \end{array} \right] \\ & \sim \left[ \begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 1 & 9 \\ 0 & 2 & 2 & 8 \\ 0 & -1 & 0 & -3 \end{array} \right] \\ & \sim \left[ \begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 1 & 9 \\ 0 & 2 & 2 & 8 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \end{array} \right] \\ & \sim \left[ \begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 0 & 8 \\ 0 & 2 & 0 & 6 \end{array} \right] \end{aligned}$$

Portanto  $x = 2$ ,  $y = 3$  e  $z = 1$ .



**Exemplo 54** (Problema com elementos com grande diferença de escala).

$$\begin{bmatrix} \varepsilon & 2 \\ 1 & \varepsilon \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 4 \\ 3 \end{bmatrix}$$

Executamos a eliminação gaussiana sem pivotamento parcial para  $\varepsilon \neq 0$  e  $|\varepsilon| \ll 1$ :

$$\left[ \begin{array}{cc|c} \varepsilon & 2 & 4 \\ 1 & \varepsilon & 3 \end{array} \right] \sim \left[ \begin{array}{cc|c} \varepsilon & 2 & 4 \\ 0 & \varepsilon - \frac{2}{\varepsilon} & 3 - \frac{4}{\varepsilon} \end{array} \right]$$

Temos

$$y = \frac{3 - 4/\varepsilon}{\varepsilon - 2/\varepsilon}$$

e

$$x = \frac{4 - 2y}{\varepsilon}$$

Observe que a expressão obtida para  $y$  se aproxima de 2 quando  $\varepsilon$  é pequeno:

$$y = \frac{3 - 4/\varepsilon}{\varepsilon - 2/\varepsilon} = \frac{3\varepsilon - 4}{\varepsilon^2 - 2} \longrightarrow \frac{-4}{-2} = 2, \quad \text{quando } \varepsilon \rightarrow 0.$$

Já expressão obtida para  $x$  depende justamente da diferença  $2 - y$ :

$$x = \frac{4 - 2y}{\varepsilon} = \frac{2}{\varepsilon}(2 - y)$$

Assim, quando  $\varepsilon$  é pequeno, a primeira expressão, implementado em um sistema de ponto flutuante de acurácia finita, produz  $y = 2$  e, conseqüentemente, a expressão para  $x$  produz  $x = 0$ . Isto é, estamos diante um problema de cancelamento catastrófico.

Agora, quando usamos a Eliminação Gaussiana com pivotamento parcial, fazemos uma permutação de linhas de forma a escolher o maior pivô a cada passo:

$$\left[ \begin{array}{cc|c} \varepsilon & 2 & 4 \\ 1 & \varepsilon & 3 \end{array} \right] \sim \left[ \begin{array}{cc|c} 1 & \varepsilon & 3 \\ \varepsilon & 2 & 4 \end{array} \right] \sim \left[ \begin{array}{cc|c} 1 & \varepsilon & 3 \\ 0 & 2 - \varepsilon^2 & 4 - 3\varepsilon \end{array} \right]$$

Continuando o procedimento, temos:

$$y = \frac{4 - 4\varepsilon}{2 - \varepsilon^2}$$

e

$$x = 3 - \varepsilon y$$

Observe que tais expressões são analiticamente idênticas às anteriores, no entanto, são mais estáveis numericamente. Quando  $\varepsilon$  converge a zero,  $y$  converge a 2, como no caso anterior. No entanto, mesmo que  $y = 2$ , a segunda expressão produz  $x = 3 - \varepsilon y$ , isto é, a aproximação  $x \approx 3$  não depende mais de obter  $2 - y$  com precisão.

# Exercícios

**E 4.1.1.** Resolva o seguinte sistema de equações lineares

$$\begin{aligned}x + y + z &= 0 \\x + 10z &= -48 \\10y + z &= 25\end{aligned}$$

Usando eliminação gaussiana com pivotamento parcial (não use o computador para resolver essa questão).

**E 4.1.2.** Resolva o seguinte sistema de equações lineares

$$\begin{aligned}x + y + z &= 0 \\x + 10z &= -48 \\10y + z &= 25\end{aligned}$$

Usando eliminação gaussiana com pivotamento parcial (não use o computador para resolver essa questão).

**E 4.1.3.** Calcule a inversa da matriz

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & -1 \\ -1 & 2 & 0 \\ 2 & 1 & -1 \end{bmatrix}$$

usando eliminação Gaussiana com pivotamento parcial.

**E 4.1.4.** Demonstre que se  $ad \neq bc$ , então a matriz  $A$  dada por:

$$A = \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix}$$

é inversível e sua inversa é dada por:

$$A^{-1} = \frac{1}{ad - bc} \begin{bmatrix} d & -b \\ -c & a \end{bmatrix}.$$

**E 4.1.5.** Considere as matrizes

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

e

$$E = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{bmatrix}$$

e o vetor

$$v = \begin{bmatrix} 2 \\ 3 \\ 4 \end{bmatrix}$$



- a) Resolva o sistema  $Ax = v$  sem usar o computador.
- b) Sem usar o computador e através da técnica algébrica de sua preferência, resolva o sistema  $(A + \varepsilon E)x_\varepsilon = v$  considerando  $|\varepsilon| \ll 1$  e obtenha a solução exata em função do parâmetro  $\varepsilon$ .
- c) Usando a expressão analítica obtida acima, calcule o limite  $\lim_{\varepsilon \rightarrow 0} x_\varepsilon$ .
- d) Resolva o sistema  $(A + \varepsilon E)x = v$  no **Scilab** usando pivotamento parcial e depois sem usar pivotamento parcial para valores muito pequenos de  $\varepsilon$  como  $10^{-10}, 10^{-15}, \dots$ . O que você observa?

**E 4.1.6.** Resolva o seguinte sistema de 5 equações lineares

$$\begin{aligned}x_1 - x_2 &= 0 \\ -x_{i-1} + 2.5x_i - x_{i+1} &= e^{-\frac{(i-3)^2}{20}}, \quad 2 \leq i \leq 4 \\ 2x_5 - x_4 &= 0\end{aligned}$$

representando-o como um problema do tipo  $Ax = b$  no **Scilab** e usando o comando de contra-barra para resolvê-lo. Repita usando a rotina que implementa eliminação gaussiana.

**E 4.1.7.** Encontre a inversa da matriz

$$\begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & 2 \\ 1 & 1 & 4 \end{bmatrix}$$

a) Usando Eliminação Gaussiana com pivotamento parcial à mão.

b) Usando a rotina 'gausspp()'.

c) Usando a rotina 'inv()' do **Scilab**.

## 4.2 Complexidade de Algoritmos em Álgebra Linear

Dados dois algoritmos diferentes para resolver o mesmo problema, como podemos escolher qual desses algoritmos é o melhor? Se pensarmos em termos de **eficiência** (ou custo computacional), queremos saber qual desses algoritmos consome menos recursos para realizar a mesma tarefa.

Em geral podemos responder essa pergunta de duas formas: em termos de tempo ou de espaço.

Quando tratamos de **eficiência espacial**, queremos saber quanta memória (em geral RAM) é utilizada pelo algoritmo para armazenar os dados, sejam matrizes, vetores ou escalares.

Quando tratamos de **eficiência temporal**, queremos saber quanto tempo um algoritmo leva para realizar determinada tarefa. Vamos nos concentrar nessa segunda opção, que em geral é a mais difícil de ser respondida.

Obviamente o tempo vai depender do tipo de computador utilizado. É razoável de se pensar que o tempo vai ser proporcional ao número de operações de ponto flutuante (flops) feito pelo algoritmo (observe que o tempo total não depende apenas disso, mas também de outros fatores como memória, taxas de transferências de dados da memória para o cpu, redes,...). Entretanto vamos nos concentrar na contagem do número de operações (flops) para realizar determinada tarefa.

No passado (antes dos anos 80), os computadores demoravam mais tempo para realizar operações como multiplicação e divisão, se comparados a adição ou subtração. Assim, em livros clássicos eram contados apenas o custo das operações  $\times$  e  $/$ . Nos computadores atuais as quatro operações básicas levam o mesmo tempo. Entretanto, na maioria dos algoritmos de álgebra linear o custo associado as multiplicações e divisões é proporcional ao custo das somas e subtrações (pois a maioria dessas operações podem ser escritas como a combinação de produtos internos). Dessa forma, na maior parte deste material levaremos em conta somente multiplicações e divisões, a não ser que mencionado o contrário.

Tenha em mente que a ideia é estimar o custo a medida que o tamanho dos vetores e matrizes cresce muito (para  $n$  grande).

**Exemplo 55** (Produto escalar-vetor). Qual o custo para multiplicar um escalar por um vetor?

**Solução.** Seja  $a \in \mathbf{R}$  e  $\vec{x} \in \mathbf{R}^n$ , temos que

$$a\vec{x} = [a \times x_1, a \times x_2, \dots, a \times x_n] \quad (4.1)$$

usando  $n$  multiplicações, ou seja, um custo computacional,  $C$ , de

$$C = n \text{ flops.} \quad (4.2)$$

◇

**Exemplo 56** (Produto vetor-vetor). Qual o custo para calcular o produto interno  $\vec{x} \cdot \vec{y}$ ?

**Solução.** Sejam  $\vec{x}, \vec{y} \in \mathbf{R}^n$ , temos que

$$\vec{x} \cdot \vec{y} = x_1 \times y_1 + x_2 \times y_2 + \dots + x_n \times y_n \quad (4.3)$$

São realizadas  $n$  multiplicações (cada produto  $x_i$  por  $y_i$ ) e  $n - 1$  somas, ou seja, o custo total de operações é de

$$C := (n) + (n - 1) = 2n - 1 \text{ flops} \quad (4.4)$$



**Exemplo 57** (Produto matriz-vetor). Qual o custo para calcular o produto de matriz por vetor  $A\vec{x}$ ?

**Solução.** Sejam  $A \in \mathbf{R}^{n \times n}$  e  $\vec{x} \in \mathbf{R}^n$ , temos que

$$\begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & & \vdots & \\ a_{n1} & & \cdots & a_{nn} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a_{11} \times x_1 + a_{12}x_2 + \dots + a_{1n} \times x_n \\ \vdots \\ a_{n1} \times x_1 + a_{n2}x_2 + \dots + a_{nn} \times x_n \end{bmatrix} \quad (4.5)$$

Para obter o primeiro elemento do vetor do lado direito devemos multiplicar a primeira linha de  $A$  pelo vetor coluna  $\vec{x}$ . Note que esse

é exatamente o custo do produto vetor-vetor do exemplo anterior. Como o custo para cada elemento do vetor do lado direito é o mesmo e temos  $n$  elementos, teremos que o custo para multiplicar matriz-vetor é<sup>1</sup>

$$C := n \cdot (2n - 1) = 2n^2 - n \text{ flops.} \quad (4.7)$$

A medida que  $n \rightarrow \infty$ , temos

$$\mathcal{O}(2n^2 - n) = \mathcal{O}(2n^2) = \mathcal{O}(n^2) \text{ flops.} \quad (4.8)$$



**Exemplo 58** (Produto matriz-matriz). Qual o custo para calcular o produto de duas matrizes  $AB$ ?

---

<sup>1</sup>Contando apenas multiplicações/divisões obtemos

$$n \cdot \mathcal{O}(n) = \mathcal{O}(n^2) \text{ flops.} \quad (4.6)$$



**Solução.** Sejam  $A, B \in \mathbf{R}^{n \times n}$  temos que

$$\begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & & & \vdots \\ a_{n1} & & \cdots & a_{nn} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} b_{11} & b_{12} & \cdots & b_{1n} \\ \vdots & & & \vdots \\ b_{n1} & & \cdots & b_{nn} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} c_{11} & c_{12} & \cdots & c_{1n} \\ \vdots & & & \vdots \\ c_{n1} & & \cdots & c_{nn} \end{bmatrix} \quad (4.9)$$

onde o elemento  $d_{ij}$  é o produto da linha  $i$  de  $A$  pela coluna  $j$  de  $B$ ,

$$d_{ij} = a_{i1} \times b_{1j} + a_{i2} \times b_{2j} + \dots + a_{in} \times b_{nj} \quad (4.10)$$

Note que esse produto tem o custo do produto vetor-vetor, ou seja,  $2n - 1$ . Como temos  $n \times n$  elementos em  $D$ , o custo total para multiplicar duas matrizes é<sup>2</sup>

$$C = n \times n \times (2n - 1) = 2n^3 - n^2 \text{ flops.} \quad (4.12)$$

---

<sup>2</sup>Contando apenas  $\times$  e  $/$  obtemos

$$n \times n \times (n) = n^3 \text{ flops.} \quad (4.11)$$



## 4.3 Sistemas triangulares

Considere um sistema linear onde a matriz é triangular superior, ou seja,

$$\begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ 0 & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & \cdots & 0 & a_{nn} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} b_1 \\ b_2 \\ \vdots \\ b_n \end{bmatrix}$$

tal que todos elementos abaixo da diagonal são iguais a zero.

Podemos resolver esse sistema iniciando pela última equação e isolando  $x_n$  obtemos

$$x_n = b_n/a_{nn} \quad (4.13)$$

Substituindo  $x_n$  na penúltima equação

$$a_{n-1,n-1}x_{n-1} + a_{n-1,n}x_n = b_{n-1} \quad (4.14)$$

e isolando  $x_{n-1}$  obtemos

$$x_{n-1} = (b_{n-1} - a_{n-1,n}x_n)/a_{n-1,n-1} \quad (4.15)$$

e continuando desta forma até a primeira equação obteremos

$$x_1 = (b_1 - a_{12}x_2 \cdots - a_{1n}x_n)/a_{11}. \quad (4.16)$$

De forma geral, temos que

$$x_i = (b_i - a_{i,i+1}x_{i+1} \cdots - a_{i,n}x_n)/a_{i,i}, \quad i = 2, \dots, n. \quad (4.17)$$

### 4.3.1 Algoritmo para resolução de um sistema triangular superior

Para resolver um sistema triangular superior iniciamos da última linha em direção a primeira.

```
1. function [x]=solveU(U,b) // U:= matriz triangular su
2.     n=size(U,1)           // b:= vetor
3.     x(n)=b(n)/U(n,n)
4.     for i=n-1:-1:1
5.         x(i)=(b(i)-U(i,i+1:n)*x(i+1:n))/U(i,i)
6.     end
7. endfunction
```

### 4.3.2 Algoritmo para resolução de um sistema triangular inferior

Para resolver um sistema triangular inferior podemos fazer o processo inverso iniciando da primeira equação.

```
1. function [x]=solveL(L,b)    // L: matriz triangular inf
2.     n=size(L,1)             // b: vetor
3.     x(1)=b(1)/L(1,1)
4.     for i=2:n
5.         x(i)=(b(i)-L(i,1:i-1)*x(1:i-1))/L(i,i)
6.     end
7. endfunction
```

## Custo computacional

Vamos contar o número total de flops para resolver um sistema triangular inferior. Note que o custo para um sistema triangular superior será o mesmo.

Na linha 3, temos uma divisão, portanto 1 flop.

Na linha 5 quando  $i = 2$ , temos

$$x(2) = (b(2) - L(2, 1:1) * x(1:1)) / L(2, 2),$$

ou seja, 1 subtração + 1 multiplicação + 1 divisão = 3 flops.

Quando  $i = 3$ ,

$$x(3) = (b(3) - L(3, 1:2) * x(1:2)) / L(3, 3)$$

temos 1 subtração + (2 multiplicações + 1 soma) + 1 divisão = 5 flops.

Quando  $i = 4$ , temos 1 subtração + (3 multiplicações + 2 somas) + 1 divisão = 7 flops.

Até que para  $i = n$ , temos

$$x(n) = (b(n) - L(n, 1:n-1) * x(1:n-1)) / L(n, n),$$

com 1 subtração + ( $n - 1$  multiplicações +  $n - 2$  somas) + 1 divisão,

ou seja,  $1 + (n - 1 + n - 2) + 1 = 2n - 1$  flops.

Somando todos esses custos<sup>3</sup> temos que o custo para resolver um sistema triangular inferior é

$$1 + 3 + 5 + 7 + \dots + 2n - 1 = \sum_{k=1}^n (2k - 1) = 2 \sum_{k=1}^n k - \sum_{k=1}^n 1 \quad (4.19)$$

e utilizando que a soma dos  $k$  inteiros é uma progressão aritmética<sup>4</sup>

$$2(n(n + 1)/2) - n = n^2 \text{ flops.} \quad (4.20)$$

---

<sup>3</sup>Contando apenas multiplicações/divisões obtemos

$$(n^2 + n)/2 \text{ flops.} \quad (4.18)$$

<sup>4</sup>Temos que  $\sum_{k=1}^n k = n(n + 1)/2$ ,  $\sum_{k=1}^n 1 = n$



## 4.4 Fatoração LU

Considere um sistema linear onde a matriz  $A$  é densa<sup>5</sup>. Para resolver o sistema, podemos transformar a matriz  $A$  nas matrizes  $L$ , triangular inferior, e  $U$ , triangular superior de tal forma que  $A = LU$ . Sendo assim o sistema pode ser reescrito tal que

$$\begin{aligned}Ax &= b \\(LU)x &= b \\L(Ux) &= b \\Ly = b &\quad \text{e} \quad Ux = y\end{aligned}$$

Assim ao invés de resolvermos o sistema original, devemos resolver um sistema triangular inferior e um sistema triangular superior. A matriz  $U$  da fatoração<sup>6</sup>  $LU$  é a matriz obtida ao final do escalonamento da matriz  $A$ .

---

<sup>5</sup>Diferentemente de uma matriz esparsa, uma matriz densa possui a maioria dos elementos diferentes de zero.

<sup>6</sup>Não vamos usar pivotamento nesse primeiro exemplo.

A matriz  $L$  inicia igual a identidade  $I$ . Os elementos da matriz  $L$  são os múltiplos do primeiro elemento da linha de  $A$  a ser zerado dividido pelo pivô acima na mesma coluna.

Por exemplo, para zerar o primeiro elemento da segunda linha de  $A$ , calculamos

$$L_{21} = A_{21}/A_{11}$$

e fazemos

$$A_{2,:} \Leftarrow A_{2,:} - L_{21}A_{1,:}$$

Note que usaremos  $A_{i,:}$  para nos referenciarmos a linha  $i$  de  $A$ . Da mesma forma, se necessário usaremos  $A_{:,j}$  para nos referenciarmos a linha  $j$  de  $A$ .

Para zerar o primeiro elemento da terceira linha de  $A$ , temos

$$L_{31} = A_{31}/A_{11}$$

e fazemos

$$A_{3,:} \Leftarrow A_{3,:} - L_{31}A_{1,:}$$

até chegarmos ao último elemento da primeira coluna de  $A$ .

Repetimos o processo para as próximas colunas, escalonando a matriz  $A$  e coletando os elementos  $L_{ij}$  abaixo da diagonal<sup>7</sup>.

---

<sup>7</sup>Perceba que a partir da segunda coluna para calcular  $L_{ij}$  não usamos os elementos de  $A$ , mas os elementos da matriz  $A$  em processo de escalonamento

### 4.4.1 Algoritmo para fatoração LU

O algoritmo para fatoração  $LU$  pode ser escrito como

```
1. function [L,A]=fatoraLU(A)
2.     n=size(A,1)
3.     L=eye(n,n)
4.     for j=1:n-1
5.         for i=j+1:n
6.             L(i,j)=A(i,j)/A(j,j)
7.             A(i,j+1:n)=A(i,j+1:n)-L(i,j)*A(j,j+1:n)
8.             A(i,j)=0
9.         end
10.    end
11. endfunction
```

## Custo computacional

Podemos analisar o custo computacional reduzindo o problema em problemas menores.

Na linha 4, iniciamos com  $j = 1$ . Desta forma  $i$  varia de 2 até  $n$  na linha 5.

A linha 6 terá sempre 1 flop.

A linha 7, com  $j = 1$  tem um bloco de tamanho  $2:n$  contabilizando  $n - 1$  flops do produto e  $n - 1$  flops da subtração.

Nas linhas 6-8 são feitas  $(2(n-1)+1) = 2n-1$  flops independente do valor de  $i$ . Como  $i$  varia de 2 até  $n$ , teremos que o bloco é repetido  $n - 1$  vezes, ou seja, o custo das linhas 5-9 é

$$(n - 1) \times (2(n - 1) + 1) = 2(n - 1)^2 + (n - 1) \quad (4.21)$$

Voltamos a linha 4 quando  $j = 2$ . Das linhas 6-8 teremos  $n - 2$  flops (o bloco terá um elemento a menos) que será repetido  $n - 2$  vezes, pois  $i=3:n$ , ou seja,

$$(n - 2) \times (2(n - 2) + 1) = 2(n - 2)^2 + (n - 2) \quad (4.22)$$

Para  $j = 3$ , temos  $2(n - 3)^2 + (n - 3)$ .

Para  $j = n - 2$ , temos  $2(2)^2 + 2$ .

Finalmente, para  $j = n - 1$ , temos  $2 \cdot 1^2 + 1$ .

Somando todos esses custos, temos

$$\begin{aligned}(n - 1) + 2(n - 1)^2 &+ (n - 2) + 2(n - 2)^2 + \dots + (2) + 2(2)^2 + 1 + \\&= \sum_{k=1}^{n-1} 2k^2 + k \\&= 2 \sum_{k=1}^{n-1} k^2 + \sum_{k=1}^{n-1} k \\&= 2 \frac{(n - 1)n(2n - 1)}{6} + \frac{n(n - 1)}{2} \\&= \frac{2n^3}{3} - \frac{n^2}{2} - \frac{n}{6} \text{ flops.}\end{aligned}$$

## 4.4.2 Custo computacional para resolver um sistema linear usando fatoração LU

Para calcularmos o custo computacional de um algoritmo completo, uma estratégia é separar o algoritmo em partes menores mais fáceis de calcular.

Para resolver o sistema, devemos primeiro fatorar a matriz  $A$  nas matrizes  $L$  e  $U$ . Vimos que o custo é

$$\frac{2n^3}{3} - \frac{n^2}{2} - \frac{n}{6} \text{ flops.}$$

Depois devemos resolver os sistemas  $Ly = b$  e  $Ux = y$ . O custo de resolver os dois sistemas é (devemos contar duas vezes)

$$2n^2 \text{ flops.}$$

Somando esses 3 custos, temos que o custo para resolver um sistema linear usando fatoração  $LU$  é

$$\frac{2n^3}{3} + \frac{3n^2}{2} - \frac{n}{6} \text{ flops.}$$

Quando  $n$  cresce, prevalessem os termos de mais alta ordem, ou seja,

$$\mathcal{O}\left(\frac{2n^3}{3} + \frac{3n^2}{2} - \frac{n}{6}\right) = \mathcal{O}\left(\frac{2n^3}{3} + \frac{3n^2}{2}\right) = \mathcal{O}\left(\frac{2n^3}{3}\right)$$



### 4.4.3 Custo para resolver $m$ sistemas lineares

Devemos apenas multiplicar  $m$  pelo custo de resolver um sistema linear usando fatoração  $LU$ , ou seja, o custo será

$$m\left(\frac{2n^3}{3} + \frac{3n^2}{2} - \frac{n}{6}\right) = \frac{2mn^3}{3} + \frac{3mn^2}{2} - \frac{mn}{6}$$

e com  $m = n$  temos

$$\frac{2n^4}{3} + \frac{3n^3}{2} - \frac{n^2}{6}.$$

Porém, se estivermos resolvendo  $n$  sistemas com *a mesma matriz*  $A$  (e diferente lado direito  $\vec{b}$  para cada sistema) podemos fazer a fatoração  $LU$  uma única vez e contar apenas o custo de resolver os sistemas triangulares obtidos.

Custo para fatoração  $LU$  de  $A$ :  $\frac{2n^3}{3} - \frac{n^2}{2} - \frac{n}{6}$ .

Custo para resolver  $m$  sistemas triangulares inferiores:  $mn^2$ .

Custo para resolver  $m$  sistemas triangulares superiores:  $mn^2$ .

Somando esses custos obtemos

$$\frac{2n^3}{3} - \frac{n^2}{2} - \frac{n}{6} + 2mn^2$$

que quando  $m = n$  obtemos

$$\frac{8n^3}{3} - \frac{n^2}{2} - \frac{n}{6} \text{ flops.}$$

### 4.4.4 Custo para calcular a matriz inversa de $A$

Como vemos em Álgebra Linear, um método para obter a matriz  $A^{-1}$  é realizar o escalonamento da matriz  $[A|I]$  onde  $I$  é a matriz identidade. Ao terminar o escalonamento, o bloco do lado direito conterá  $A^{-1}$ .

Isto é equivalente a resolver  $n$  sistemas lineares com a mesma matriz  $A$  e os vetores da base canônica  $\vec{e}_i = [0, \dots, 0, 1, 0, \dots, 0]^T$  tal que

$$A\vec{x}_i = \vec{e}_i, \quad i = 1 : n$$

onde  $\vec{x}_i$  serão as colunas da matriz  $A$  inversa, já que  $AX = I$ .

O custo para resolver esses  $n$  sistemas lineares foi calculado na seção anterior como

$$\frac{8n^3}{3} - \frac{n^2}{2} - \frac{n}{6}.$$

**Exemplo 59.** Qual o melhor método para resolver um sistema linear: via fatoração LU ou calculando a inversa de  $A$  e obtendo  $x = A^{-1}b$ ?

## 4.5 Condicionamento de sistemas lineares

Quando lidamos com matrizes no corpo dos números reais (ou complexos), existem apenas duas alternativas: i) a matriz é inversível; ii) a matriz não é inversível e, neste caso, é chamada de matriz singular. Ao lidarmos em aritmética de precisão finita, encontramos uma situação mais sutil: alguns problemas lineares são mais difíceis de serem resolvidos, pois os erros de arredondamento se propagam de forma mais significativa que em outros problemas. Neste caso falamos de problemas bem-condicionados e mal-condicionados. Intuitivamente falando, um problema bem-condicionado é um problema em que os erros de arredondamento se propagam de forma menos importante; enquanto problemas mal-condicionados são problemas em que os erros se propagam de forma mais relevante.

Um caso típico de sistema mal-condicionado é aquele cujos coeficientes estão muito próximos ao de um problema singular. Considere o seguinte exemplo:

**Exemplo 60.** Observe que o sistema

$$\begin{bmatrix} 71 & 41 \\ \lambda & 30 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 100 \\ 70 \end{bmatrix} \quad (4.23)$$

é impossível quando  $\lambda = \frac{71 \times 30}{41} \approx 51,95122$ .

Considere os próximos três sistemas:

$$\text{a) } \begin{bmatrix} 71 & 41 \\ 51 & 30 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 100 \\ 70 \end{bmatrix}, \text{ com solução } \begin{bmatrix} 10/3 \\ -10/3 \end{bmatrix},$$

$$\text{b) } \begin{bmatrix} 71 & 41 \\ 52 & 30 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 100 \\ 70 \end{bmatrix}, \text{ com solução } \begin{bmatrix} -65 \\ 115 \end{bmatrix},$$

$$\text{c) } \begin{bmatrix} 71 & 41 \\ 52 & 30 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 100,4 \\ 69,3 \end{bmatrix}, \text{ com solução } \begin{bmatrix} -85,35 \\ 150,25 \end{bmatrix}.$$

Pequenas variações nos coeficientes das matrizes fazem as soluções ficarem bem distintas, isto é, pequenas variações nos dados de entrada acarretaram em grandes variações na solução do sistema. Quando isso acontece, dizemos que o problema é mal-condicionado.

Precisamos uma maneira de medir essas variações. Como os dados de entrada e os dados de saída são vetores (ou matrizes), precisamos introduzir as definições de norma de vetores e matrizes.

## 4.5.1 Norma de vetores

Definimos a **norma**  $L^p$ ,  $1 \leq p \leq \infty$ , de um vetor em  $v = (v_1, v_2, \dots, v_n)$  em  $\mathbb{R}^n$  por:

$$\|v\|_p := \left( \sum_{i=1}^n |v_i|^p \right)^{1/p} = (|v_1|^p + |v_2|^p + \dots + |v_n|^p)^{1/p}, \quad 1 \leq p < \infty.$$

Para  $p = \infty$ , definimos a norma  $L^\infty$  (**norma do máximo**) por:

$$\|v\|_\infty = \max_{1 \leq j \leq n} \{|v_j|\}.$$

**Proposição 4** (Propriedades de normas). *Sejam dados  $\alpha \in \mathbb{R}$  um escalar e os vetores  $u, v \in \mathbb{R}^n$ . Então, para cada  $1 \leq p \leq \infty$ , valem as seguintes propriedades:*

a)  $\|u\|_p = 0 \Leftrightarrow u = 0$ .

b)  $\|\alpha u\|_p = |\alpha| \|u\|_p$ .

c)  $\|u + v\|_p \leq \|u\|_p + \|v\|_p$  (**desigualdade triangular**).

d)  $\|u\|_p \rightarrow \|u\|_\infty$  quando  $p \rightarrow \infty$ .

*Demonstração.* Demonstramos cada item em separado.

- a) Se  $u = 0$ , então segue imediatamente da definição da norma  $L^p$ ,  $1 \leq p \leq \infty$ , que  $\|u\|_p = 0$ . Reciprocamente, se  $\|u\|_\infty = 0$ , então, para cada  $i = 1, 2, \dots, n$ , temos:

$$|u_i| \leq \max_{1 \leq j \leq n} \{|u_j|\} = \|u\|_\infty = 0 \Rightarrow u_i = 0.$$



Isto é,  $u = 0$ . Agora, se  $\|u\|_p = 0$ ,  $1 \leq p < \infty$ , então:

$$0 = \|u\|_p^p := \sum_{i=1}^n |u_i|^p \leq n\|u\|_\infty \Rightarrow \|u\|_\infty = 0.$$

Logo, pelo resultado para a norma do máximo, concluímos que  $u = 0$ .

b) Segue imediatamente da definição da norma  $L^p$ ,  $1 \leq p \leq \infty$ .

c) Em construção ...

d) Em construção ...

□

**Exemplo 61.** Calcule a norma  $L^1$ ,  $L^2$  e  $L^\infty$  do vetor coluna  $v = (1, 2, -3, 0)$ .

## Solução.

$$\|v\|_1 = 1 + 2 + 3 + 0 = 6$$

$$\|v\|_2 = \sqrt{1 + 2^2 + 3^2 + 0^2} = \sqrt{14}$$

$$\|v\|_\infty = \max\{1, 2, 3, 0\} = 3$$

No **Scilab** podemos computar normas  $L^p$ 's de vetores usando o comando `norm`. Neste exemplo, temos:

```
-->norm(v,1), norm(v,'inf'), norm(v,2)
```

```
ans =
```

```
6.
```

```
ans =
```

```
3.
```

```
ans =
```

```
3.7416574
```



## 4.5.2 Norma de matrizes

Definimos a norma induzida  $L^p$  de uma matriz  $A = [a_{i,j}]_{i,j=1}^{n,n}$  da seguinte forma:

$$\|A\|_p = \sup_{\|v\|_p=1} \|Av\|_p,$$

ou seja, a norma  $p$  de uma matriz é o máximo valor assumido pela norma de  $Av$  entre todos os vetores de norma unitária.

Temos as seguintes propriedades, se  $A$  e  $B$  são matrizes,  $I$  é a matriz identidade,  $v$  é um vetor e  $\lambda$  é um real (ou complexo):

$$\|A\|_p = 0 \iff A = 0$$

$$\|\lambda A\|_p = |\lambda| \|A\|_p$$

$$\|A + B\|_p \leq \|A\|_p + \|B\|_p \quad (\text{desigualdade do triângulo})$$

$$\|Av\|_p \leq \|A\|_p \|v\|_p$$

$$\|AB\|_p \leq \|A\|_p \|B\|_p$$

$$\|I\|_p = 1$$

$$1 = \|I\|_p = \|AA^{-1}\|_p \leq \|A\|_p \|A^{-1}\|_p \quad (\text{se } A \text{ é inversível})$$

Casos especiais:

$$\|A\|_1 = \max_{j=1}^n \sum_{i=1}^n |A_{ij}|$$

$$\|A\|_2 = \sqrt{\max\{|\lambda| : \lambda \in \sigma(AA^*)\}}$$

$$\|A\|_\infty = \max_{i=1}^n \sum_{j=1}^n |A_{ij}|$$

onde  $\sigma(M)$  é o conjunto de autovalores da matriz  $M$ .

**Exemplo 62.** Calcule as normas 1, 2 e  $\infty$  da seguinte matriz:

$$A = \begin{bmatrix} 3 & -5 & 7 \\ 1 & -2 & 4 \\ -8 & 1 & -7 \end{bmatrix}$$

## Solução.

$$\|A\|_1 = \max\{12, 8, 18\} = 18$$

$$\|A\|_\infty = \max\{15, 7, 16\} = 16$$

$$\|A\|_2 = \sqrt{\max\{0, 5865124, 21, 789128, 195, 62436\}} = 13,98657$$

No Scilab podemos computar normas  $L^p$ 's de matrizes usando o comando `norm`. Neste exemplo, temos:

```
-->A = [3 -5 7;1 -2 4;-8 1 -7];  
-->norm(A,1), norm(A,'inf'), norm(A,2)  
ans =  
    18.  
ans =  
    16.  
ans =  
    13.986578
```



### 4.5.3 Número de condicionamento

O condicionamento de um sistema linear é um conceito relacionado à forma como os erros se propagam dos dados de entrada para os dados de saída, ou seja, se o sistema

$$Ax = y$$

possui uma solução  $x$  para o vetor  $y$ , quando varia a solução  $x$  quando o dado de entrada  $y$  varia. Consideramos, então, o problema

$$A(x + \delta_x) = y + \delta_y$$

Aqui  $\delta_x$  representa a variação em  $x$  e  $\delta_y$  representa a respectiva variação em  $y$ . Temos:

$$Ax + A\delta_x = y + \delta_y$$

e, portanto,

$$A\delta_x = \delta_y.$$

Queremos avaliar a magnitude do erro relativo em  $y$ , representado por  $\|\delta_y\|/\|y\|$  em função da magnitude do erro relativo  $\|\delta_x\|/\|x\|$ .

$$\begin{aligned}\frac{\|\delta_x\|/\|x\|}{\|\delta_y\|/\|y\|} &= \frac{\|\delta_x\|}{\|x\|} \frac{\|y\|}{\|\delta_y\|} \\ &= \frac{\|A^{-1}\delta_y\|}{\|x\|} \frac{\|Ax\|}{\|\delta_y\|} \\ &\leq \frac{\|A^{-1}\| \|\delta_y\|}{\|x\|} \frac{\|A\| \|x\|}{\|\delta_y\|} \\ &= \|A\| \|A^{-1}\|\end{aligned}$$

Assim, definimos o número de condicionamento de uma matriz inversível  $A$  como

$$k_p(A) = \|A\|_p \|A^{-1}\|_p$$

O número de condicionamento, então, mede o quão instável é resolver o problema  $Ax = y$  frente a erros no vetor de entrada  $x$ .

**Obs:** O número de condicionamento depende da norma escolhida.

**Obs:** O número de condicionamento da matriz identidade é 1.

**Obs:** O número de condicionamento de qualquer matriz inversível é igual ou maior que 1.



# Exercícios

**E 4.5.1.** Calcule o valor de  $\lambda$  para o qual o problema

$$\begin{cases} 71x + 41y = 10 \\ \lambda x + 30y = 4 \end{cases}$$

é impossível, depois calcule os números de condicionamento com norma 1, 2 e  $\infty$  quando  $\lambda = 51$  e  $\lambda = 52$ .

**E 4.5.2.** Calcule o número de condicionamento da matriz

$$A = \begin{bmatrix} 3 & -5 & 7 \\ 1 & -2 & 4 \\ -8 & 1 & -7 \end{bmatrix}$$

nas normas 1, 2 e  $\infty$ .

**E 4.5.3.** Calcule o número de condicionamento das matrizes

$$\begin{bmatrix} 71 & 41 \\ 52 & 30 \end{bmatrix}$$

e

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 3 & 4 \\ 4 & 5 & 5 \end{bmatrix}$$

usando as normas 1,2 e  $\infty$ .

**E 4.5.4.** Usando a norma 1, calcule o número de condicionamento da matriz

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 2 + \varepsilon & 4 \end{bmatrix}$$

em função de  $\varepsilon$  quando  $0 < \varepsilon < 1$ . Interprete o limite  $\varepsilon \rightarrow 0$ .

**E 4.5.5.** Considere os sistemas:

$$\begin{cases} 100000x & - & 9999.99y & = & -10 \\ -9999.99x & + & 1000.1y & = & 1 \end{cases} \quad \text{e} \quad \begin{cases} 100000x & - & 9999.99y & = & -10 \\ -9999.99x & + & 1000.1y & = & 1 \end{cases}$$

Encontre a solução de cada um e discuta.

**E 4.5.6.** Considere os vetores de 10 entradas dados por

$$x_j = \sin(j/10), \quad y_j = j/10 \quad z_j = j/10 - \frac{(j/10)^3}{6}, \quad j = 1, \dots, 10$$

Use o **Scilab** para construir os seguintes vetores de erro:

$$e_j = \frac{|x_j - y_j|}{|x_j|} \quad f_j = \frac{|x_j - z_j|}{x_j}$$

Calcule as normas 1, 2 e  $\infty$  de  $e$  e  $f$

## 4.6 Métodos iterativos para sistemas lineares

Na seção anterior tratamos de métodos diretos para a resolução de sistemas lineares. Em um **método direto** (por exemplo, solução via fatoração LU) obtemos uma aproximação da solução depois de realizarmos um número finito de operações (só teremos a solução ao final do processo).

Veremos nessa seção dois **métodos iterativos** básicos para obter uma aproximação para a solução de um sistema linear. Geralmente em um método iterativo iniciamos com uma aproximação para a solução (que pode ser ruim) e vamos melhorando essa aproximação através de sucessivas iterações.

## 4.6.1 Método de Jacobi

O método de Jacobi pode ser obtido a partir do sistema linear

$$\begin{aligned}a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \cdots + a_{1n}x_n &= y_1 \\a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \cdots + a_{2n}x_n &= y_2 \\&\vdots \\a_{n1}x_1 + a_{n2}x_2 + \cdots + a_{nn}x_n &= y_n\end{aligned}$$

Isolando o elemento  $x_1$  da primeira equação temos

$$x_1^{(k+1)} = \frac{y_1 - (a_{12}x_2^{(k)} + \cdots + a_{1n}x_n^{(k)})}{a_{11}} \quad (4.24)$$

Note que utilizaremos os elementos  $x_i^{(k)}$  da iteração  $k$  (a direita da equação) para estimar o elemento  $x_1$  da próxima iteração.

Da mesma forma, isolando o elemento  $x_i$  de cada equação  $i$ , para

todo  $i = 2, \dots, n$  podemos construir a iteração

$$\begin{aligned}x_1^{(k+1)} &= \frac{y_1 - (a_{12}x_2^{(k)} + \dots + a_{1n}x_n^{(k)})}{a_{11}} \\x_2^{(k+1)} &= \frac{y_2 - (a_{21}x_1^{(k)} + a_{23}x_3^{(k)} + \dots + a_{2n}x_n^{(k)})}{a_{22}} \\&\vdots \\x_n^{(k+1)} &= \frac{y_n - (a_{n1}x_1^{(k)} + \dots + a_{n,n-2}x_{n-2}^{(k)} + a_{n,n-1}x_{n-1}^{(k)})}{a_{nn}}\end{aligned}$$

Em notação mais compacta, o método de Jacobi consiste na iteração

$$\begin{aligned}x^{(1)} &= \text{aproximação inicial} \\x_i^{(k)} &= \left( y_i - \sum_{\substack{j=1 \\ j \neq i}}^n a_{ij}x_j^{(k)} \right) / a_{ii}\end{aligned}$$

**Exemplo 63.** Resolva o sistema

$$10x + y = 23$$

$$x + 8y = 26$$

usando o método de Jacobi iniciando com  $x^{(1)} = y^{(1)} = 0$ .

$$x^{(k+1)} = \frac{23 - y^{(k)}}{10}$$

$$y^{(k+1)} = \frac{26 - x^{(k)}}{8}$$

$$x^{(2)} = \frac{23 - y^{(1)}}{10} = 2,3$$

$$y^{(2)} = \frac{26 - x^{(1)}}{8} = 3,25$$

$$x^{(3)} = \frac{23 - y^{(2)}}{10} = 1,975$$

$$y^{(3)} = \frac{26 - x^{(2)}}{8} = 2,9625$$

## Código Scilab: Jacobi

```
function [x,deltax]=jacobi(A,b,x,tol,N)
n=size(A,1)
xnew      =x
convergiu=%F                                //FALSE;

k=1
while k<=N & ~convergiu
    xnew(1)=(b(1) - A(1,2:n)*x(2:n))/A(1,1)
    for i=2:n-1
        xnew(i)=(b(i) -A(i,1:i-1)*x(1:i-1) ...
                  -A(i,i+1:n)*x(i+1:n) )/A(i,i)
    end
    xnew(n)= (b(n) -A(n,1:n-1)*x(1:n-1) )/A(n,n)

    deltax=max( abs(x-xnew) )
    if deltax<tol then
```



```
        convergiu=%T           //TRUE
    end
    k=k+1
    x=xnew                     // atualiza x
    disp([k,x',deltax])       // depuracao
end
if ~convergiu then
    error('Nao convergiu')
end

endfunction
```

## 4.6.2 Método de Gauss-Seidel

Assim como no método de Jacobi, no método de Gauss-Seidel também isolamos o elemento  $x_i$  da equação  $i$ . Porém perceba que a equação para  $x_2^{(k+1)}$  depende de  $x_1^{(k)}$  na iteração  $k$ . Intuitivamente podemos pensar em usar  $x_1^{(k+1)}$  que acabou de ser calculado e temos

$$x_2^{(k+1)} = \frac{y_2 - \left( a_{21}x_1^{(k+1)} + a_{23}x_3^{(k)} + \cdots + a_{2n}x_n^{(k)} \right)}{a_{22}}$$

Aplicando esse raciocínio podemos construir o método de Gauss-

Seidel como

$$\begin{aligned}x_1^{(k+1)} &= \frac{y_1 - \left(a_{12}x_2^{(k)} + \cdots + a_{1n}x_n^{(k)}\right)}{a_{11}} \\x_2^{(k+1)} &= \frac{y_2 - \left(a_{21}x_1^{(k+1)} + a_{23}x_3^{(k)} + \cdots + a_{2n}x_n^{(k)}\right)}{a_{22}} \\&\vdots \\x_n^{(k+1)} &= \frac{y_n - \left(a_{n1}x_1^{(k+1)} + \cdots + a_{n(n-1)}x_{n-1}^{(k+1)}\right)}{a_{nn}}\end{aligned}$$

Em notação mais compacta, o método de Gauss-Seidel consiste na iteração:

$$\begin{aligned}x^{(1)} &= \text{aproximação inicial} \\x_i^{(k)} &= \frac{y_i - \sum_{j=1}^{i-1} a_{ij}x_j^{(k+1)} - \sum_{j=i+1}^n a_{ij}x_j^{(k)}}{a_{ii}}\end{aligned}$$

**Exemplo 64.** Resolva o sistema

$$10x + y = 23$$

$$x + 8y = 26$$

usando o método de Gauss-Seidel iniciando com  $x^{(1)} = y^{(1)} = 0$ .

$$x^{(k+1)} = \frac{23 - y^{(k)}}{10}$$

$$y^{(k+1)} = \frac{26 - x^{(k+1)}}{8}$$

$$x^{(2)} = \frac{23 - y^{(1)}}{10} = 2,3$$

$$y^{(2)} = \frac{26 - x^{(2)}}{8} = 2,9625$$

$$x^{(3)} = \frac{23 - y^{(2)}}{10} = 2,00375$$

$$y^{(3)} = \frac{26 - x^{(3)}}{8} = 2,9995312$$

## Código Scilab: Gauss-Seidel

```
function [x,deltax]=gauss_seidel(A,b,x,tol,N)
n=size(A,1)
xnew      =x
convergiu=%F                                //FALSE;

k=1
while k<=N & ~convergiu
    xnew(1)=(b(1) - A(1,2:n)*x(2:n))/A(1,1)
    for i=2:n-1
        xnew(i)=(b(i) -A(i,1:i-1)*xnew(1:i-1) ...
                  -A(i,i+1:n)*x(i+1:n) )/A(i,i)
    end
    xnew(n)=(b(n) -A(n,1:n-1)*xnew(1:n-1) )/A(n,n)

    deltax=max( abs(x-xnew) )
    if deltax<tol then
```

```
        convergiu=%T           //TRUE
    end
    k=k+1
    x=xnew                     // atualiza x
    disp([k,x',deltax])       // depuracao
end
if ~convergiu then
    error('Nao convergiu')
end

endfunction
```

### 4.6.3 Análise de convergência

Nesta seção, discutimos sobre a análise de convergência de métodos iterativos para solução de sistema lineares. Para tanto, consideramos um sistema linear  $Ax = b$ , onde  $A = [a_{i,j}]_{i,j=1}^{n,n}$  é a matriz (real) dos coeficientes,  $b = (a_j)_{j=1}^n$  é um vetor dos termos constantes e  $x = (x_j)_{j=1}^n$  é o vetor incógnita. No decorrer, assumimos que  $A$  é uma matriz não-singular.

Geralmente, métodos iterativos são construídos como uma iteração de ponto fixo. No caso de um sistema linear, reescreve-se a equação matricial em um problema de ponto fixo equivalente, i.e.:

$$Ax = b \Leftrightarrow x = Tx + c,$$

onde  $T = [t_{i,j}]_{i,j=1}^{n,n}$  é chamada de **matriz da iteração** e  $c = (c_j)_{j=1}^n$  de **vetor da iteração**. Construídos a matriz  $T$  e o vetor  $c$ , o método iterativo consiste em computar a iteração:

$$x^{(k+1)} = Tx^{(k)} + c, \quad n \geq 1,$$

onde  $x^{(1)}$  é uma aproximação inicial dada.

Afim de construirmos as matrizes e os vetores de iteração do método de Jacobi e de Gauss-Seidel, decompomos a matriz  $A$  da seguinte forma:

$$A = L + D + U,$$

onde  $D$  é a matriz diagonal  $D = \text{diag}(a_{11}, a_{22}, \dots, a_{nn})$ , i.e.:

$$D := \begin{bmatrix} a_{11} & 0 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & a_{22} & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 0 & a_{33} & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & a_{nn} \end{bmatrix},$$

e, respectivamente,  $L$  e  $U$  são as seguintes matrizes triangular infe-



rior e superior:

$$L := \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 \\ a_{21} & 0 & 0 & \cdots & 0 \\ a_{31} & a_{32} & 0 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & a_{n3} & \cdots & 0 \end{bmatrix}, \quad U := \begin{bmatrix} 0 & a_{12} & a_{13} & \cdots & a_{1n} \\ 0 & 0 & a_{23} & \cdots & a_{2n} \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & a_{3n} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 \end{bmatrix}.$$

**Exemplo 65.** Considere o seguinte sistema linear:

$$\begin{aligned} 3x_1 + x_2 - x_3 &= 2 \\ -x_1 - 4x_2 + x_3 &= -10 \\ x_1 - 2x_2 - 5x_3 &= 10 \end{aligned}$$

Escreva o sistema na sua forma matricial  $Ax = b$  identificando a matriz dos coeficientes  $A$ , o vetor incógnita  $x$  e o vetor dos termos constantes  $b$ . Em seguida, faça a decomposição  $A = L + D + U$ .

**Solução.** A forma matricial deste sistema é  $Ax = b$ , onde:

$$A = \begin{bmatrix} 3 & 1 & -1 \\ -1 & -4 & 1 \\ 1 & -2 & -5 \end{bmatrix}, \quad x = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} \quad \text{e} \quad b = \begin{bmatrix} 2 \\ -10 \\ 10 \end{bmatrix}.$$

A decomposição da matriz  $A$  nas matrizes  $L$  triangular inferior,  $D$  diagonal e  $U$  triangular superior é:

$$\underbrace{\begin{bmatrix} 3 & 1 & -1 \\ -1 & -4 & 1 \\ 1 & -2 & -5 \end{bmatrix}}_A = \underbrace{\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ -1 & 0 & 0 \\ 1 & -2 & 0 \end{bmatrix}}_L + \underbrace{\begin{bmatrix} 3 & 0 & 0 \\ 0 & -4 & 0 \\ 0 & 0 & -5 \end{bmatrix}}_D + \underbrace{\begin{bmatrix} 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}}_U.$$

No **Scilab**, podemos construir as matrizes  $L$ ,  $D$  e  $U$ , da seguinte forma:

```
-->A = [3 1 -1;-1 -4 1;1 -2 -5];  
-->D = eye(A).*A;  
-->L = tril(A)-D;  
-->U=triu(A)-D;
```



## Iteração de Jacobi

Vamos, agora, usar a decomposição discutida acima para construir a matriz de iteração  $T_J$  e o vetor de iteração  $c_J$  associado ao método de Jacobi. Neste caso, temos:

$$\begin{aligned} Ax = b &\Leftrightarrow (L + D + U)x = b \\ &\Leftrightarrow Dx = -(L + U)x + b \\ &\Leftrightarrow x = \underbrace{-D^{-1}(L + U)}_{=:T_J} x + \underbrace{D^{-1}b}_{=:c_J}. \end{aligned}$$

Ou seja, a iteração do método de Jacobi escrita na forma matricial é:

$$x^{(k+1)} = T_J x^{(k)} + c_J, \quad k \geq 1,$$

com  $x^{(1)}$  uma aproximação inicial dada, sendo  $T_J := -D^{-1}(L + U)$  a matriz de iteração e  $c_J = D^{-1}b$  o vetor da iteração.

**Exemplo 66.** Construa a matriz de iteração  $T_J$  e o vetor de iteração  $c_J$  do método de Jacobi para o sistema dado no Exemplo 65.

**Solução.** A matriz de iteração é dada por:

$$T_J := -D^{-1}(L+U) = - \underbrace{\begin{bmatrix} \frac{1}{3} & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{1}{4} & 0 \\ 0 & 0 & -\frac{1}{5} \end{bmatrix}}_{D^{-1}} \underbrace{\begin{bmatrix} 0 & 1 & -1 \\ -1 & 0 & 1 \\ 1 & 2 & 0 \end{bmatrix}}_{(L+U)} = \begin{bmatrix} 0 & -\frac{1}{3} & \frac{1}{3} \\ -\frac{1}{4} & 0 & \frac{1}{4} \\ \frac{1}{5} & \frac{2}{5} & 0 \end{bmatrix}$$

O vetor da iteração de Jacobi é:

$$c_J := D^{-1}b = \underbrace{\begin{bmatrix} \frac{1}{3} & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{1}{4} & 0 \\ 0 & 0 & -\frac{1}{5} \end{bmatrix}}_{D^{-1}} \underbrace{\begin{bmatrix} 2 \\ -10 \\ 10 \end{bmatrix}}_b = \begin{bmatrix} \frac{2}{3} \\ \frac{5}{2} \\ -2 \end{bmatrix}.$$

No Scilab, podemos computar  $T_J$  e  $c_J$  da seguinte forma:

```
-->TJ = -inv(D)*(L+U);  
-->cJ = inv(D)*b;
```



## Iteração de Gauss-Seidel

A forma matricial da iteração do método de Gauss-Seidel também pode ser construída com base na decomposição  $A = L + D + U$ . Para tanto, fazemos:

$$\begin{aligned} Ax = b &\Leftrightarrow (L + D + U)x = b \\ &\Leftrightarrow (L + D)x = -Ux + b \\ &\Leftrightarrow x = \underbrace{-(L + D)^{-1}U}_{=:T_G} x + \underbrace{(L + D)^{-1}b}_{=:c_G} \end{aligned}$$

Ou seja, a iteração do método de Gauss-Seidel escrita na forma matricial é:

$$x^{(k+1)} = T_G x^{(k)} + c_G, \quad k \geq 1,$$

com  $x^{(1)}$  uma aproximação inicial dada, sendo  $T_G := -(L + D)^{-1}U$  a matriz de iteração e  $c_G = (L + D)^{-1}b$  o vetor da iteração.

**Exemplo 67.** Construa a matriz de iteração  $T_G$  e o vetor de iteração  $c_G$  do método de Gauss-Seidel para o sistema dado no Exemplo 65.

**Solução.** A matriz de iteração é dada por:

$$T_G := -(L+D)^{-1}U = -\underbrace{\begin{bmatrix} 3 & 0 & 0 \\ -1 & -4 & 0 \\ 1 & -2 & -5 \end{bmatrix}}_{(L+D)^{-1}}^{-1} \underbrace{\begin{bmatrix} 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}}_U = \begin{bmatrix} 0 & -\frac{1}{3} \\ 0 & \frac{1}{12} \\ 0 & -\frac{1}{10} \end{bmatrix}$$

O vetor da iteração de Gauss-Seidel é:

$$c_G := (L+D)^{-1}b = \underbrace{\begin{bmatrix} 3 & 0 & 0 \\ -1 & -4 & 0 \\ 1 & -2 & -5 \end{bmatrix}}_{(L+D)^{-1}}^{-1} \underbrace{\begin{bmatrix} 2 \\ -10 \\ 10 \end{bmatrix}}_b = \begin{bmatrix} \frac{2}{3} \\ \frac{7}{3} \\ -\frac{28}{10} \end{bmatrix}.$$

No **Scilab**, podemos computar  $T_G$  e  $c_G$  da seguinte forma:



$$\rightarrow TG = -\text{inv}(L+D)*U;$$

$$\rightarrow cG = \text{inv}(L+D)*b;$$



## Condições de convergência

Aqui, vamos discutir condições necessárias e suficientes para a convergência de métodos iterativos. Isto é, dado um sistema  $Ax = b$  e uma iteração:

$$x^{(k+1)} = Tx^{(k)} + c, \quad k \geq 1,$$

$x^{(1)}$  dado, estabelecemos condições nas quais  $x^{(k)} \rightarrow x^*$ , onde  $x^*$  é a solução do sistema dado, i.e.  $x^* = Tx^* + c$  ou, equivalentemente,  $Ax^* = b$ .

**Lema 1.** *Seja  $T$  uma matriz real  $n \times n$ . O limite  $\lim_{k \rightarrow \infty} \|T^k\|_p = 0$ ,  $1 \leq p \leq \infty$ , se, e somente se,  $\rho(T) < 1$ .*

*Demonstração.* Aqui, fazemos apenas um esboço da demonstração. Para mais detalhes, veja [8], Teorema 4, pág. 14. Primeiramente, suponhamos que  $\|T\|_p < 1$ ,  $1 \leq p \leq \infty$ . Como (veja [8], Lema 2, pág. 12):

$$\rho(T) \leq \|T\|_p,$$

temos  $\rho(T) < 1$ , o que mostra a implicação.

Agora, suponhamos que  $\rho(T) < 1$  e seja  $0 < \epsilon < 1 - \rho(T)$ . Então, existe  $1 \leq p \leq \infty$  tal que (veja [8], Teorema 3, página 12):

$$\|T\|_p \leq \rho(T) + \epsilon < 1.$$

Assim, temos:

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \|T^k\|_p \leq \lim_{k \rightarrow \infty} \|T\|_p^m = 0.$$

Da equivalência entre as normas segue a recíproca. □

*Observação 14.* Observamos que:

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \|T^k\|_p = 0, \quad 1 \leq p \leq \infty, \Leftrightarrow \lim_{k \rightarrow \infty} t_{ij}^k = 0, \quad 1 \leq i, j \leq n.$$

**Lema 2.** Se  $\rho(T) < 1$ , então existe  $(I - T)^{-1}$  e:

$$(I - T)^{-1} = \sum_{k=0}^{\infty} T^k.$$

*Demonstração.* Primeiramente, provamos a existência de  $(I - T)^{-1}$ . Seja  $\lambda$  um autovalor de  $T$  e  $x$  um autovetor associado, i.e.  $Tx = \lambda x$ . Então,  $(I - T)x = (1 - \lambda)x$ . Além disso, temos  $|\lambda| < \rho(T) < 1$ , logo  $(1 - \lambda) \neq 0$ , o que garante que  $(I - T)$  é não singular. Agora, mostramos que  $(I - T)^{-1}$  admite a expansão acima. Do Lema 1 e da Observação 14 temos:

$$(I - T) \sum_{k=0}^{\infty} T^k = \lim_{m \rightarrow \infty} (I - T) \sum_{k=0}^m T^k = \lim_{m \rightarrow \infty} (I - T^{m+1}) = I,$$

o que mostra que  $(I - T)^{-1} = \sum_{k=0}^{\infty} T^k$ . □

**Teorema 6.** A sequência recursiva  $\{x^{(k)}\}_{k \in \mathbb{N}}$  dada por:

$$x^{(k+1)} = Tx^{(k)} + c$$

converge para solução de  $x = Tx + c$  para qualquer escolha de  $x^{(1)}$  se, e somente se,  $\rho(T) < 1$ .

*Demonstração.* Primeiramente, assumimos que  $\rho(T) < 1$ . Observamos que:

$$\begin{aligned}x^{(k+1)} &= Tx^{(k)} + c = T(Tx^{(k-1)} + c) + c \\&= T^2x^{(k-1)} + (I + T)c \\&\vdots \\&= T^{(k)}x^{(1)} + \left(\sum_{k=0}^{k-1} T^k\right)c.\end{aligned}$$

Daí, do Lema 1 e do Lema 2 temos:

$$\lim_{k \rightarrow \infty} x^{(k)} = (I - T)^{(-1)}c.$$

Ora, se  $x^*$  é a solução de  $x = Tx + c$ , então  $(I - T)x^* = c$ , i.e.  $x^* = (I - T)^{-1}c$ . Logo, temos demonstrado que  $x^{(k)}$  converge para a solução de  $x = Tx + c$ , para qualquer escolha de  $x^{(1)}$ .

Agora, suponhamos que  $x^{(k)}$  converge para  $x^*$  solução de  $x = Tx + c$ , para qualquer escolha de  $x^{(1)}$ . Seja, então,  $y$  um vetor arbitrário e  $x^{(1)} = x^* - y$ . Observamos que:

$$\begin{aligned}x^* - x^{(k+1)} &= (Tx^* + c) - (Tx^{(k)} + c) \\&= T(x^* - x^{(k)}) \\&\vdots \\&= T^{(k)}(x^* - x^{(1)}) = T^{(k)}y.\end{aligned}$$

Logo, para qualquer  $1 \leq p \leq \infty$ , temos, :

$$0 = \lim_{k \rightarrow \infty} x^* - x^{(k+1)} = \lim_{k \rightarrow \infty} T^{(k)}y.$$

Como  $y$  é arbitrário, da Observação 14 temos  $\lim_{k \rightarrow \infty} \|T^{(k)}\|_p = 0$ ,  $1 \leq p \leq \infty$ . Então, o Lema 1 garante que  $\rho(T) < 1$ .  $\square$

*Observação 15.* Pode-se mostrar que tais métodos iterativos tem taxa de convergência super linear com:

$$\|x^{(k+1)} - x^*\| \approx \rho(T)^k \|x^{(1)} - x^*\|.$$

Para mais detalhes, veja [8], pág. 61-64.

**Exemplo 68.** Mostre que, para qualquer escolha da aproximação inicial, ambos os métodos de Jacobi e Gauss-Seidel são convergentes quando aplicados ao sistema linear dado no Exemplo 65.

**Solução.** Do Teorema 6, vemos que é necessário e suficiente que  $\rho(T_J) < 1$  e  $\rho(T_G) < 1$ . Computando estes raios espectrais, obtemos  $\rho(T_J) \approx 0,32$  e  $\rho(T_G) \approx 0,13$ . Isto mostra que ambos os métodos serão convergentes.  $\diamond$

## Condição suficiente

Uma condição suficiente porém não necessária para que os métodos de Gauss-Seidel e Jacobi converjam é a que a matriz seja **estritamente diagonal dominante**.

**Definição 7.** *Uma matriz  $A$  é **estritamente diagonal dominante** quando:*

$$|a_{ii}| > \sum_{\substack{j=1 \\ j \neq i}}^n |a_{ij}|, i = 1, \dots, n$$



**Definição 8.** Uma matriz  $A$  é **diagonal dominante** quando

$$|a_{ii}| \geq \sum_{\substack{j=1 \\ j \neq i}}^n |a_{ij}|, i = 1, \dots, n$$

e para ao menos um  $i$ ,  $a_{ii}$  é estritamente maior que a soma dos elementos fora da diagonal.

**Teorema 7.** Se a matriz  $A$  for diagonal dominante<sup>a</sup>, então os métodos de Jacobi e Gauss-Seidel serão convergentes independente da escolha inicial  $x^{(1)}$ .

---

<sup>a</sup>E consequentemente estritamente diagonal dominante.

Se conhecermos a solução exata  $x$  do problema, podemos calcular o

erro relativo em cada iteração como:

$$\frac{\|x - x^{(k)}\|}{\|x\|}.$$

Em geral não temos  $x$ , entretanto podemos estimar o vetor **resíduo**  $r^{(k)} = b - Ax^{(k)}$ . Note que quando o erro tende a zero, o resíduo também tende a zero.

**Teorema 8.** *O erro relativo e o resíduo estão relacionados como (veja [3])*

$$\frac{\|x - x^{(k)}\|}{\|x\|} \leq \kappa(A) \frac{\|r\|}{\|b\|}$$

onde  $\kappa(A)$  é o número de condicionamento.

**Exemplo 69.** Ambos os métodos de Jacobi e Gauss-Seidel são convergentes para o sistema dado no Exemplo 65, pois a matriz dos coeficientes deste é uma matriz estritamente diagonal dominante.

# Exercícios

**E 4.6.1.** Considere o problema de 5 incógnitas e cinco equações dado por

$$\begin{aligned}x_1 - x_2 &= 1 \\-x_1 + 2x_2 - x_3 &= 1 \\-x_2 + (2 + \varepsilon)x_3 - x_4 &= 1 \\-x_3 + 2x_4 - x_5 &= 1 \\x_4 - x_5 &= 1\end{aligned}$$

- a) Escreva na forma  $Ax = b$  e resolva usando Eliminação Gaussiana para  $\varepsilon = 10^{-3}$  no **Scilab**.
- b) Obtenha o vetor incógnita  $x$  com  $\varepsilon = 10^{-3}$  usando o comando  $A \backslash b$ .

- c) Obtenha o vetor incógnita  $x$  com  $\varepsilon = 10^{-3}$  usando Jacobi com tolerância  $10^{-2}$ . Compare o resultado com o resultado obtido no item d.
- d) Obtenha o vetor incógnita  $x$  com  $\varepsilon = 10^{-3}$  usando Gauss-Seidel com tolerância  $10^{-2}$ . Compare o resultado com o resultado obtido no item d.
- e) Discuta com base na relação esperada entre tolerância e exatidão conforme estudado na primeira área para problemas de uma variável.

**E 4.6.2.** Resolva o seguinte sistema pelo método de Jacobi e Gauss-Seidel:

$$\begin{cases} 5x_1 + x_2 + x_3 &= 50 \\ -x_1 + 3x_2 - x_3 &= 10 \\ x_1 + 2x_2 + 10x_3 &= -30 \end{cases}$$

Use como critério de paragem tolerância inferior a  $10^{-3}$  e inicialize com  $x^0 = y^0 = z^0 = 0$ .

**E 4.6.3.** Refaça a questão 4.1.6 construindo um algoritmo que implemente os métodos de Jacobi e Gauss-Seidel.

**E 4.6.4.** Considere o seguinte sistema de equações lineares:

$$\begin{aligned}x_1 - x_2 &= 0 \\ -x_{j-1} + 5x_j - x_{j+1} &= \cos(j/10), \quad 2 \leq j \leq 10 \\ x_{11} &= x_{10}/2\end{aligned}\tag{4.25}$$

Construa a iteração para encontrar a solução deste problema pelos métodos de Gauss-Seidel e Jacobi. Usando esses métodos, encontre uma solução aproximada com erro absoluto inferior a  $10^{-5}$ .

**E 4.6.5.** Resolva o problema 4.8.1 pelos métodos de Jacobi e Gauss-Seidel.

**E 4.6.6.** Faça uma permutação de linhas no sistema abaixo e

resolva pelos métodos de Jacobi e Gauss-Seidel:

$$x_1 + 10x_2 + 3x_3 = 27$$

$$4x_1 + x_3 = 6$$

$$2x_1 + x_2 + 4x_3 = 12$$

## 4.7 Método da potência para cálculo de autovalores

Consideremos uma matriz  $A \in \mathbb{R}^{n,n}$  diagonalizável, isto é, existe um conjunto  $\{v_j\}_{j=1}^n$  de autovetores de  $A$  tais que qualquer elemento  $x \in \mathbb{R}^n$  pode ser escrito como uma combinação linear dos  $v_j$ . Sejam  $\{\lambda_j\}_{j=1}^n$  o conjunto de autovalores associados aos autovetores tal que um deles seja dominante, ou seja,

$$|\lambda_1| > |\lambda_2| \geq |\lambda_3| \geq \cdots |\lambda_n| > 0$$

Como os autovetores são LI, todo vetor  $x \in \mathbb{R}^n$ ,  $x = (x_1, x_2, \dots, x_n)$ , pode ser escrito com combinação linear dos autovetores da seguinte forma:

$$x = \sum_{j=1}^n \beta_j v_j. \quad (4.26)$$

O método da potência permite o cálculo do autovetor dominante com base no comportamento assintótico (i.e. "no infinito") da sequên-

cia

$$x, Ax, A^2x, A^3x, \dots$$

.

Por questões de convergência, consideramos a seguinte sequência semelhante à anterior, porém normalizada:

$$\frac{x}{\|x\|}, \frac{Ax}{\|Ax\|}, \frac{A^2x}{\|A^2x\|}, \frac{A^3x}{\|A^3x\|}, \dots,$$

que pode ser obtida pelo seguinte processo iterativo:

$$x^{(k+1)} = \frac{A^k x}{\|A^k x\|}$$

Observamos que se  $x$  está na forma (4.26), então  $A^k x$  pode ser escrito como

$$A^k x = \sum_{j=1}^n \beta_j A^k v_j = \sum_{j=1}^n \beta_j \lambda_j^k v_j = \beta_1 \lambda_1^k \left( v_1 + \sum_{j=2}^n \frac{\beta_j}{\beta_1} \left( \frac{\lambda_j}{\lambda_1} \right)^k v_j \right)$$



Como  $\left| \frac{\lambda_j}{\lambda_1} \right| < 1$  para todo  $j \geq 2$ , temos

$$\sum_{j=2}^n \frac{\beta_j}{\beta_1} \left( \frac{\lambda_j}{\lambda_1} \right)^k v_j \rightarrow 0.$$

Assim

$$\frac{A^k x}{\|A^k x\|} = \frac{\beta_1 \lambda_1^k}{\|A^k x\|} \left( v_1 + O \left( \left| \frac{\lambda_2}{\lambda_1} \right|^k \right) \right) \quad (4.27)$$

Como a norma de  $\frac{A^k x}{\|A^k x\|}$  é igual a um, temos

$$\left\| \frac{\beta_1 \lambda_1^k}{\|A^k x\|} v_1 \right\| \rightarrow 1$$

e, portanto,

$$\left| \frac{\beta_1 \lambda_1^k}{\|A^k x\|} \right| \rightarrow \frac{1}{\|v_1\|}$$

Ou seja, se definimos  $\alpha^{(k)} = \frac{\beta_1 \lambda_1^k}{\|A^k x\|}$ , então

$$|\alpha^{(k)}| \rightarrow 1$$

Retornando a (4.27), temos:

$$\frac{A^k x}{\|A^k x\|} - \alpha^{(k)} v_1 \rightarrow 0$$

Observe que um múltiplo de autovetor também é um autovetor e, portanto,

$$\frac{A^k x}{\|A^k x\|}$$

é um esquema que oscila entre os autovetores ou converge para o autovetor  $v_1$ .

Uma vez que temos o autovetor  $v_1$  de  $A$ , podemos calcular  $\lambda_1$  da seguinte forma:

$$Av_1 = \lambda_1 v_1 \implies v_1^T Av_1 = v_1^T \lambda_1 v_1 \implies \lambda_1 = \frac{v_1^T Av_1}{v_1^T v_1}$$

Observe que a última identidade é válida, pois  $\|v_1\| = 1$  por construção.

# Exercícios

**E 4.7.1.** Calcule o autovalor dominante e o autovetor associado da matriz

$$\begin{bmatrix} 4 & 41 & 78 \\ 48 & 28 & 21 \\ 26 & 13 & 11 \end{bmatrix}$$

Expresse sua resposta com seis dígitos significativos

**E 4.7.2.** Calcule o autovalor dominante e o autovetor associado da matriz

$$\begin{bmatrix} 3 & 4 \\ 2 & -1 \end{bmatrix}$$

usando o método da potência iniciando com o vetor  $x = [1 \ 1]^T$

**E 4.7.3.** A norma  $L_2$  de uma matriz  $A$  é dada pela raiz quadrada do autovalor dominante da matriz  $A^*A$ , isto é:

$$\|A\|_2 = \sqrt{\max\{|\lambda| : \lambda \in \sigma(A^*A)\}} :$$

Use o método da potência para obter a norma  $L_2$  da seguinte matriz:

$$A = \begin{bmatrix} 69 & 84 & 88 \\ 15 & -40 & 11 \\ 70 & 41 & 20 \end{bmatrix}$$

Expresse sua resposta com seis dígitos significativos

**E 4.7.4.** Os autovalores de uma matriz triangular são os elementos da diagonal principal. Verifique o método da potência aplicada à

seguinte matriz:

$$\begin{bmatrix} 2 & 3 & 1 \\ 0 & 3 & -1 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}.$$


## 4.8 Exercícios finais

**E 4.8.1.** O circuito linear da figura 4.8.1 pode ser modelado pelo sistema (??). Escreva esse sistema na forma matricial sendo as tensões  $V_1, V_2, V_3, V_4$  e  $V_5$  as cinco incógnitas. Resolva esse problema quando  $V = 127$  e

a)  $R_1 = R_2 = R_3 = R_4 = 2$  e  $R_5 = R_6 = R_7 = 100$  e  $R_8 = 50$

b)  $R_1 = R_2 = R_3 = R_4 = 2$  e  $R_5 = 50$  e  $R_6 = R_7 = R_8 = 100$

$$\begin{aligned}
 V_1 &= V \\
 \frac{V_1 - V_2}{R_1} + \frac{V_3 - V_2}{R_2} - \frac{V_2}{R_5} &= 0 \\
 \frac{V_2 - V_3}{R_2} + \frac{V_4 - V_3}{R_3} - \frac{V_3}{R_6} &= 0 \\
 \frac{V_3 - V_4}{R_3} + \frac{V_5 - V_4}{R_4} - \frac{V_4}{R_7} &= 0 \\
 \frac{V_4 - V_5}{R_4} - \frac{V_5}{R_8} &= 0
 \end{aligned}$$



Complete a tabela abaixo representado a solução com 4 algarismos significativos:

Caso	$V_1$	$V_2$	$V_3$	$V_4$	$V_5$
a					
b					

Então, refaça este problema reduzindo o sistema para apenas 4 incógnitas ( $V_2$ ,  $V_3$ ,  $V_4$  e  $V_5$ ).

**E 4.8.2.** Resolva os seguintes problemas:

- Encontre o polinômio  $P(x) = ax^2 + bx + c$  que passa pelos pontos  $(-1, -3)$ ,  $(1, -1)$  e  $(2,9)$ .
- Encontre os coeficientes  $A$  e  $B$  da função  $f(x) = A \sin(x) + B \cos(x)$  tais que  $f(1) = 1.4$  e  $f(2) = 2.8$ .



- c) Encontre a função  $g(x) = A_1 \sin(x) + B_1 \cos(x) + A_2 \sin(2x) + B_2 \cos(2x)$  tais que  $f(1) = 1$ ,  $f(2) = 2$ ,  $f(3) = 3$  e  $f(4) = 4$ .

# Capítulo 5

## Solução de sistemas de equações não lineares

O método de Newton aplicado a encontrar a raiz  $x^*$  da função  $y = f(x)$  estudado na primeira área de nossa disciplina consiste em um processo iterativo. Em cada passo deste processo, dispomos

de uma aproximação  $x^{(k)}$  para  $x^*$  e construímos uma aproximação  $x^{(k+1)}$ . Cada passo do método de Newton envolve os seguintes procedimentos:

- Linearização da função  $f(x)$  no ponto  $x^{(k)}$ :

$$f(x) = f(x^{(k)}) + (x - x^{(k)})f'(x^{(k)}) + O(|x - x^{(k)}|^2)$$

- A aproximação  $x^{(k+1)}$  é definida como o valor de  $x$  em que a linearização  $f(x^{(k)}) + (x - x^{(k)})f'(x^{(k)})$  passa por zero.

**Observação:**  $y = f(x^{(k)}) + (x - x^{(k)})f'(x^{(k)})$  é a equação da reta que tangencia a curva  $y = f(x)$  no ponto  $(x^{(k)}, f(x^{(k)}))$ .

Queremos, agora, generalizar o método de Newton a fim de resolver problemas de várias equações e várias incógnitas, ou seja, encontrar  $x_1, x_2, \dots, x_n$  que satisfazem as seguinte equações:

$$\begin{aligned}
f_1(x_1, x_2, \dots, x_n) &= 0 \\
f_2(x_1, x_2, \dots, x_n) &= 0 \\
&\vdots \\
f_n(x_1, x_2, \dots, x_n) &= 0
\end{aligned}$$

Podemos escrever este problema na forma vetorial definindo o vetor  $x = [x_1, x_2, \dots, x_n]^T$  e a função vetorial

$$F(x) = \begin{bmatrix} f_1(x_1, x_2, \dots, x_n) \\ f_2(x_1, x_2, \dots, x_n) \\ \vdots \\ f_n(x_1, x_2, \dots, x_n) \end{bmatrix}$$

**Exemplo 70.** Suponha que queiramos resolver numericamente os

seguinte sistema de duas equações e duas incógnitas:

$$\frac{x_1^2}{3} + x_2^2 = 1$$

$$x_1^2 + \frac{x_2^2}{4} = 1$$

Então definimos

$$F(x) = \begin{bmatrix} \frac{x_1^2}{3} + x_2^2 - 1 \\ x_1^2 + \frac{x_2^2}{4} - 1 \end{bmatrix}$$

Neste momento, dispomos de um problema na forma  $F(x) = 0$  e precisamos desenvolver uma técnica para linearizar a função  $F(x)$ . Para tal, precisamos de alguns conceitos do Cálculo II. Observe que  $F(x) - F(x^{(0)})$  pode ser escrito como

$$F(x) - F(x^{(0)}) = \begin{bmatrix} f_1(x_1, x_2, \dots, x_n) - f_1(x_1^{(0)}, x_2^{(0)}, \dots, x_n^{(0)}) \\ f_2(x_1, x_2, \dots, x_n) - f_2(x_1^{(0)}, x_2^{(0)}, \dots, x_n^{(0)}) \\ \vdots \\ f_n(x_1, x_2, \dots, x_n) - f_n(x_1^{(0)}, x_2^{(0)}, \dots, x_n^{(0)}) \end{bmatrix}$$

Usamos a regra da cadeia

$$df_i = \frac{\partial f_i}{\partial x_1} dx_1 + \frac{\partial f_i}{\partial x_2} dx_2 + \dots + \frac{\partial f_i}{\partial x_n} dx_n = \sum_{j=1}^n \frac{\partial f_i}{\partial x_j} dx_j$$

e aproximamos as diferenças por derivadas parciais:

$$f_i(x_1, x_2, \dots, x_n) - f_i(x_1^{(0)}, x_2^{(0)}, \dots, x_n^{(0)}) \approx \sum_{j=1}^n \frac{\partial f_i}{\partial x_j} (x_j - x_j^{(0)})$$

Portanto,

$$F(x) - F(x^{(0)}) \approx \begin{bmatrix} \frac{\partial f_1}{\partial x_1} & \frac{\partial f_1}{\partial x_2} & \cdots & \frac{\partial f_1}{\partial x_n} \\ \frac{\partial f_2}{\partial x_1} & \frac{\partial f_2}{\partial x_2} & \cdots & \frac{\partial f_2}{\partial x_n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \frac{\partial f_n}{\partial x_1} & \frac{\partial f_n}{\partial x_2} & \cdots & \frac{\partial f_n}{\partial x_n} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 - x_1^{(0)} \\ x_2 - x_2^{(0)} \\ \vdots \\ x_n - x_n^{(0)} \end{bmatrix} \tag{5.1}$$

Definimos então a matriz jacobiana por

$$J_F = \frac{\partial(f_1, f_2, \dots, f_n)}{\partial(x_1, x_2, \dots, x_n)} = \begin{bmatrix} \frac{\partial f_1}{\partial x_1} & \frac{\partial f_1}{\partial x_2} & \cdots & \frac{\partial f_1}{\partial x_n} \\ \frac{\partial f_2}{\partial x_1} & \frac{\partial f_2}{\partial x_2} & \cdots & \frac{\partial f_2}{\partial x_n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \frac{\partial f_n}{\partial x_1} & \frac{\partial f_n}{\partial x_2} & \cdots & \frac{\partial f_n}{\partial x_n} \end{bmatrix}$$

A matriz jacobiana de uma função ou simplesmente, o Jacobiano de uma função  $F(x)$  é a matriz formada pelas suas derivadas parciais:

$$(J_F)_{ij} = \frac{\partial f_i}{\partial x_j}$$



Nestes termos podemos reescrever (5.1) como

$$F(x) \approx F(x^{(0)}) + J_F(x^{(0)})(x - x^{(0)})$$

Esta expressão é chama de linearização de  $F(x)$  no ponto  $x^{(0)}$  e generaliza a linearização em uma dimensão dada por  $f(x) \approx f(x^{(0)}) + f'(x^{(0)})(x - x^{(0)})$

## 5.1 O método de Newton para sistemas

Vamos agora construir o método de Newton-Raphson, ou seja, o método de Newton generalizado para sistemas. Assumimos, portanto, que a função  $F(x)$  é diferenciável e que existe um ponto  $x^*$  tal que  $F(x^*) = 0$ . Seja  $x^{(k)}$  uma aproximação para  $x^*$ , queremos construir uma nova aproximação  $x^{(k+1)}$  através da linearização de  $F(x)$  no ponto  $x^{(k)}$ .

- Linearização da função  $F(x)$  no ponto  $x^{(k)}$ :

$$F(x) = F(x^{(k)}) + J_F(x^{(k)}) (x - x^{(k)}) + O(\|x - x^{(k)}\|^2)$$

- A aproximação  $x^{(k)}$  é definida como o ponto  $x$  em que a linearização  $F(x^{(k)}) + J_F(x^{(k)}) (x - x^{(k)})$  é nula, ou seja:

$$F(x^{(k)}) + J_F(x^{(k)}) (x^{(k+1)} - x^{(k)}) = 0$$

Supondo que a matriz jacobina seja inversível no ponto  $x^{(k)}$ , temos:

$$\begin{aligned}J_F \left( x^{(k)} \right) \left( x^{(k+1)} - x^{(k)} \right) &= -F(x^{(k)}) \\x^{(k+1)} - x^{(k)} &= -J_F^{-1} \left( x^{(k)} \right) F(x^{(k)}) \\x^{(k+1)} &= x^{(k)} - J_F^{-1} \left( x^{(k)} \right) F(x^{(k)})\end{aligned}$$

Desta forma, o método iterativo de Newton-Raphson para encontrar as raízes de  $F(x) = 0$  é dado por:

$$\begin{cases} x^{(k+1)} &= x^{(k)} - J_F^{-1} \left( x^{(k)} \right) F(x^{(k)}), \quad n \geq 0 \\ x^{(0)} &= \text{dado inicial} \end{cases}$$

*Observação 16.* Usamos subíndices para indicar o elemento de um vetor e super-índices para indicar o passo da iteração. Assim  $x^{(k)}$  se refere à iteração  $k$  e  $x_i^{(k)}$  se refere à componente  $i$  no vetor  $x^{(k)}$ .

*Observação 17.* A notação  $J_F^{-1} \left( x^{(k)} \right)$  enfatiza que a jacobiana deve ser calculada a cada passo.

*Observação 18.* Podemos definir o passo  $\Delta^{(k)}$  como

$$\Delta^{(k)} = x^{(k+1)} - x^{(k)}$$

Assim,  $\Delta^{(k)} = -J_F^{-1} \left( x^{(k)} \right) F(x^{(k)})$ , ou seja,  $\Delta^{(k)}$  resolve o problema linear:

$$J_F \left( x^{(k)} \right) \Delta^{(k)} = -F(x^{(k)})$$

Em geral, é menos custoso resolver o sistema acima do que calcular o inverso da jacobiana e multiplicar pelo vetor  $F(x^{(k)})$ .

**Exemplo 71.** Retornamos ao nosso exemplo inicial, isto é, resolver numericamente os seguinte sistema não-linear:

$$\frac{x_1^2}{3} + x_2^2 = 1$$

$$x_1^2 + \frac{x_2^2}{4} = 1$$

Para tal, definimos a função  $F(x)$ :

$$F(x) = \begin{bmatrix} \frac{x_1^2}{3} + x_2^2 - 1 \\ x_1^2 + \frac{x_2^2}{4} - 1 \end{bmatrix}$$

cuja jacobiana é:

$$J_F = \begin{bmatrix} \frac{2x_1}{3} & 2x_2 \\ 2x_1 & \frac{x_2}{2} \end{bmatrix}$$

Faremos a implementação numérica no **Scilab**. Para tal definimos as funções que implementarão  $F(x)$  e a  $J_F(x)$

```
function y=F(x)
    y(1)=x(1)^2/3+x(2)^2-1
    y(2)=x(1)^2+x(2)^2/4-1
endfunction
```

```
function y=JF(x)
    y(1,1)=2*x(1)/3
    y(1,2)=2*x(2)
    y(2,1)=2*x(1)
    y(2,2)=x(2)/2
endfunction
```

Alternativamente, estas funções poderiam ser escritas como

```
function y=F(x)
    y=[x(1)^2/3+x(2)^2-1; x(1)^2+x(2)^2/4-1]
endfunction
```

```
function y=JF(x)
    y=[2*x(1)/3  2*x(2); 2*x(1) x(2)/2]
endfunction
```

Desta forma, se  $x$  é uma aproximação para a raiz, pode-se calcular a próxima aproximação através dos comandos:

$\text{delta} = -JF(x) \backslash F(x)$   
 $x = x + \text{delta}$

Ou simplesmente

$x = x - JF(x) \backslash F(x)$

Observe que as soluções exatas desse sistema são  $(\pm \sqrt{\frac{9}{11}}, \pm \sqrt{\frac{8}{11}})$ .

**Exemplo 72.** Encontre uma aproximação para a solução do sistema

$$\begin{aligned}x_1^2 &= \cos(x_1 x_2) + 1 \\ \sin(x_2) &= 2 \cos(x_1)\end{aligned}$$

que fica próxima ao ponto  $x_1 = 1.5$  e  $x_2 = .5$ .

**Resp:** (1,3468109, 0,4603195).



**Solução.** Vamos, aqui, dar as principais ideias para se obter a solução. Começamos definindo a função  $F(x)$  por:

$$F(x) = \begin{bmatrix} x_1^2 - \cos(x_1 x_2) - 1 \\ \sin(x_2) - 2 \cos(x_1) \end{bmatrix}$$

cuja jacobiana é:

$$J_F(x) = \begin{bmatrix} 2x_1 + x_2 \sin(x_1 x_2) & x_1 \sin(x_1 x_2) \\ 2 \sin(x_2) & \cos(x_2) \end{bmatrix}$$

No Scilab, podemos implementá-las com o seguinte código:

```
function y=F(x)
    y(1) = x(1)^2-cos(x(1)*x(2))-1
    y(2) = sin(x(2))-2*cos(x(1))
endfunction
```

```
function y=JF(x)
    y(1,1) = 2*x(1)+x(2)*sin(x(1)*x(2))
    y(1,2) = x(1)*sin(x(1)*x(2))

    y(2,1) = 2*sin(x(1))
    y(2,2) = cos(x(2))
endfunction
```

E agora, basta iterar:

```
x=[1.5; .5]
x=x-JF(x)\F(x) (5 vezes)
```



## 5.1.1 Código Scilab: Newton para Sistemas

```
function [x] = newton(F,JF,x0,TOL,N)
    x = x0
    k = 1
    //iteracoes
    while (k <= N)
        //iteracao de Newton
        delta = -inv(JF(x))*F(x)
        x = x + delta
        //criterio de parada
        if (norm(delta,'inf')<TOL) then
            return x
        end
        k = k+1
    end
    error('Num. de iter. max. atingido!')
endfunction
```

# Exercícios

**E 5.1.1.** Encontre uma aproximação numérica para o seguinte problema não-linear de três equações e três incógnitas:

$$\begin{aligned}2x_1 - x_2 &= \cos(x_1) \\ -x_1 + 2x_2 - x_3 &= \cos(x_2) \\ -x_2 + x_3 &= \cos(x_3)\end{aligned}$$

Partindo das seguintes aproximações iniciais:

- a)  $x^{(0)} = [1, 1, 1]^T$
- b)  $x^{(0)} = [-0,5, -2, -3]^T$
- c)  $x^{(0)} = [-2, -3, -4]^T$
- d)  $x^{(0)} = [0, 0, 0]^T$

## 5.2 Linearização de uma função de várias variáveis

## 5.2.1 O gradiente

Considere primeiramente uma função  $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ , ou seja, uma função que mapeia  $n$  variáveis reais em um único real, por exemplo:

$$f(x) = x_1^2 + x_2^2/4$$

Para construirmos a linearização, fixemos uma direção no espaço  $\mathbb{R}^n$ , ou seja um vetor  $v$ :

$$v = [v_1, v_2, \dots, v_n]^T$$

Queremos estudar como a função  $f(x)$  varia quando “andamos” na direção  $v$  a partir do ponto  $x^{(0)}$ . Para tal, inserimos um parâmetro real pequeno  $h$ , dizemos que

$$x = x^{(0)} + hv$$

e definimos a função auxiliar

$$g(h) = f(x^{(0)} + hv).$$

Observamos que a função  $g(h)$  é uma função de  $\mathbb{R}$  em  $\mathbb{R}$ .  
A linearização de  $g(h)$  em torno de  $h = 0$  é dada por

$$g(h) = g(0) + hg'(0) + O(h^2)$$

Observamos que  $g(h) = f(x^{(0)} + hv)$  e  $g(0) = f(x^{(0)})$ . Precisamos calcular  $g'(0)$ :

$$g'(h) = \frac{d}{dh}g(h) = \frac{d}{dh}f(x^{(0)} + hv)$$

Pela regra da cadeia temos:

$$\frac{d}{dh}f(x^{(0)} + hv) = \sum_{j=1}^n \frac{\partial f}{\partial x_j} \frac{dx_j}{dh}$$

Observamos que  $x_j = x_j^{(0)} + hv_j$ , portanto

$$\frac{dx_j}{dh} = v_j$$

Assim:

$$\frac{d}{dh}f(x^{(0)} + hv) = \sum_{j=1}^n \frac{\partial f}{\partial x_j} v_j$$

Observamos que esta expressão pode ser vista como o produto interno entre o gradiente de  $f$  e o vetor  $v$ :

$$\nabla f = \begin{bmatrix} \frac{\partial f}{\partial x_1} \\ \frac{\partial f}{\partial x_2} \\ \vdots \\ \frac{\partial f}{\partial x_n} \end{bmatrix} \quad v = \begin{bmatrix} v_1 \\ v_2 \\ \vdots \\ v_n \end{bmatrix}$$

Na notação cálculo vetorial escrevemos este produto interno como  $\nabla f \cdot v = v \cdot \nabla f$  na notação de produto matricial, escrevemos  $(\nabla f)^T v = v^T \nabla f$ . Esta quantidade é conhecida como **derivada direcional** de  $f$  no ponto  $x^{(0)}$  na direção  $v$ , sobretudo quando  $\|v\| = 1$ .



Podemos escrever a linearização  $g(h) = g(0) + hg'(0) + O(h^2)$  como

$$f(x^{(0)} + hv) = f(x^{(0)}) + h\nabla^T f(x^{(0)})v + O(h^2)$$

Finalmente, escrevemos  $x = x^{(0)} + hv$ , ou seja,  $hv = x - x^{(0)}$

$$f(x) = f(x^{(0)}) + \nabla^T f(x^{(0)}) (x - x^{(0)}) + O(\|x - x^{(0)}\|^2)$$

*Observação 19.* Observe a semelhança com a linearização no caso em uma dimensão. A notação  $\nabla^T f(x^{(0)})$  é o transposto do vetor gradiente associado à função  $f(x)$  no ponto  $x^{(0)}$ :

$$\nabla^T f(x^{(0)}) = \left[ \frac{\partial f(x^{(0)})}{\partial x_1}, \frac{\partial f(x^{(0)})}{\partial x_2}, \dots, \frac{\partial f(x^{(0)})}{\partial x_n} \right]$$

## 5.2.2 A matriz jacobiana

Interessamo-nos, agora, pela linearização da função  $F : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$ . Lembramos que  $F(x)$  pode ser escrita como um vetor de funções  $f_j : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ :

$$F(x) = \begin{bmatrix} f_1(x) \\ f_2(x) \\ \vdots \\ f_n(x) \end{bmatrix}$$

Linearizando cada uma das funções  $f_j$ , temos:

$$F(x) = \underbrace{\begin{bmatrix} f_1(x^{(0)}) + \nabla^T f_1(x^{(0)}) (x - x^{(0)}) + O(\|x - x^{(0)}\|^2) \\ f_2(x^{(0)}) + \nabla^T f_2(x^{(0)}) (x - x^{(0)}) + O(\|x - x^{(0)}\|^2) \\ \vdots \\ f_n(x^{(0)}) + \nabla^T f_n(x^{(0)}) (x - x^{(0)}) + O(\|x - x^{(0)}\|^2) \end{bmatrix}}_{\text{Vetor coluna}}$$

ou, equivalentemente:

$$F(x) = \underbrace{\begin{bmatrix} f_1(x^{(0)}) \\ f_2(x^{(0)}) \\ \vdots \\ f_n(x^{(0)}) \end{bmatrix}}_{\text{Vetor coluna}} + \underbrace{\begin{bmatrix} \nabla^T f_1(x^{(0)}) \\ \nabla^T f_2(x^{(0)}) \\ \vdots \\ \nabla^T f_n(x^{(0)}) \end{bmatrix}}_{\text{Matriz jacobiana}} \underbrace{(x - x^{(0)})}_{\text{Vetor coluna}} + O(\|x - x^{(0)}\|^2)$$

Podemos escrever a linearização de  $F(x)$  na seguinte forma mais enxuta:

$$F(x) = F(x^{(0)}) + J_F(x^{(0)}) (x - x^{(0)}) + O(\|x - x^{(0)}\|^2)$$

A matriz jacobiana  $J_F$  é matriz cujas linhas são os gradientes transpostos de  $f_j$ , ou seja:

$$J_F = \frac{\partial(f_1, f_2, \dots, f_n)}{\partial(x_1, x_2, \dots, x_n)} = \begin{bmatrix} \frac{\partial f_1}{\partial x_1} & \frac{\partial f_1}{\partial x_2} & \dots & \frac{\partial f_1}{\partial x_n} \\ \frac{\partial f_2}{\partial x_1} & \frac{\partial f_2}{\partial x_2} & \dots & \frac{\partial f_2}{\partial x_n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \frac{\partial f_n}{\partial x_1} & \frac{\partial f_n}{\partial x_2} & \dots & \frac{\partial f_n}{\partial x_n} \end{bmatrix}$$

A matriz jacobiana de uma função ou simplesmente, o Jacobiano de

uma função  $F(x)$  é a matriz formada pelas suas derivadas parciais:

$$(J_F)_{ij} = \frac{\partial f_i}{\partial x_j}$$

**Exemplo 73.** Calcule a matriz jacobiana da função

$$F(x) = \begin{bmatrix} \frac{x_1^2}{3} + x_2^2 - 1 \\ x_1^2 + \frac{x_2^2}{4} - 1 \end{bmatrix}$$

$$J_F = \begin{bmatrix} \frac{\partial f_1}{\partial x_1} & \frac{\partial f_1}{\partial x_2} \\ \frac{\partial f_2}{\partial x_1} & \frac{\partial f_2}{\partial x_2} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{2x_1}{3} & 2x_2 \\ 2x_1 & \frac{x_2}{2} \end{bmatrix}$$

# Capítulo 6

## Aproximação de funções

O problema geral de interpolação pode ser definido como:

Seja  $\{(x_i, y_i)\}_{i=1}^n$  um conjunto de pares ordenados tais que  $x_i \neq x_j$  se  $i \neq j$ , encontre uma função  $f \in \mathcal{F}$  (uma família de funções) tal que

$$f(x_i) = y_i, \quad i = 1, \dots, n$$

**Exemplo 74.** Encontrar uma função  $f(x)$  da forma  $f(x) = ae^{bx}$  onde  $a$  e  $b$  são constantes tal que  $f(1) = 1$  e  $f(2) = 5$ . Este problema equivale a resolver o seguinte sistema de equações:

$$\begin{aligned}ae^b &= 1 \\ ae^{2b} &= 5\end{aligned}$$

Dividindo a segunda equação pela primeira, temos  $e^b = 5$ , logo,  $b = \ln(5)$ . Substituindo este valor em qualquer das equações, temos  $a = \frac{1}{5}$ . Assim

$$f(x) = \frac{1}{5}e^{\ln(5)x} = \frac{1}{5}5^x = 5^{x-1}.$$

**Exemplo 75.** Encontrar a função polinomial do tipo  $f(x) = a + bx + cx^2$  que passe pelos pontos  $(-1,2)$ ,  $(0,1)$ ,  $(1,6)$ . Observamos que podemos encontrar os coeficientes  $a$ ,  $b$  e  $c$  através do seguinte



sistema linear:

$$a - b + c = 2$$

$$a = 1$$

$$a + b + c = 6$$

cuja solução é dada por  $a = 1$ ,  $b = 2$  e  $c = 3$ . Portanto

$$f(x) = 1 + 2x + 3x^2.$$

## 6.1 Interpolação polinomial

Interpolação polinomial é o caso particular do problema geral de interpolação quando a família de funções é constituída de polinômios.

**Teorema 9.** *Seja  $\{(x_i, y_i)\}_{i=1}^n$  um conjunto de  $n$  pares ordenados de números reais tais que  $x_i \neq x_j$  se  $i \neq j$ . Existe um único polinômio  $p(x)$  de grau  $n - 1$  ou inferior que passa por todos os pontos dados.*

*Demonstração.* Observe que o problema de encontrar os coeficientes  $a_1, a_2, \dots, a_n$  do polinômio

$$p(x) = a_1 + a_2x + a_3x^2 + \dots + a_nx^{n-1} = \sum_{k=1}^n a_kx^{k-1}$$

tal que  $p(x_i) = y_i$  é equivalente a resolver o sistema linear com  $n$

equações e  $n$  incógnitas:

$$\begin{aligned}a_1 + a_2x_1 + a_3x_1^2 + \cdots + a_nx_1^{n-1} &= y_1 \\a_1 + a_2x_2 + a_3x_2^2 + \cdots + a_nx_2^{n-1} &= y_2 \\&\vdots \\a_1 + a_2x_n + a_3x_n^2 + \cdots + a_nx_n^{n-1} &= y_n\end{aligned}$$

que pode ser escrito na forma matricial como

$$\begin{bmatrix} 1 & x_1 & x_1^2 & \cdots & x_1^{n-1} \\ 1 & x_2 & x_2^2 & \cdots & x_2^{n-1} \\ 1 & x_3 & x_3^2 & \cdots & x_3^{n-1} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 1 & x_n & x_n^2 & \cdots & x_n^{n-1} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} a_1 \\ a_2 \\ a_3 \\ \vdots \\ a_n \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} y_1 \\ y_2 \\ y_3 \\ \vdots \\ y_n \end{bmatrix}$$

A matriz envolvida é uma matriz de Vandermonde de ordem  $n$  cujo

determinante é dado por

$$\prod_{1 \leq i < j \leq n} (x_j - x_i)$$

É fácil ver que se as abscissas são diferentes dois a dois, então o determinante é não-nulo. Disto decorre que o sistema possui uma solução e que esta solução é única.  $\square$

**Exemplo 76.** Encontre o polinômio da forma  $p(x) = a_1 + a_2x + a_3x^2 + a_4x^3$  que passa pelos pontos

$$(0,1), (1,2), (2,4), (3,8).$$

Para encontrar os coeficientes devemos resolver o sistema linear

$$a_1 = 1$$

$$a_1 + a_2 + a_3 + a_4 = 2$$

$$a_1 + 2a_2 + 4a_3 + 8a_4 = 4$$

$$a_1 + 3a_2 + 9a_3 + 27a_4 = 8$$

cujas soluções são  $a_1 = 1$ ,  $a_2 = \frac{5}{6}$ ,  $a_3 = 0$  e  $a_4 = \frac{1}{6}$ . Portanto

$$p(x) = 1 + \frac{5}{6}x + \frac{1}{6}x^3$$

Esta abordagem direta que fizemos ao calcular os coeficientes do polinômio na base canônica se mostra ineficiente quando o número de pontos é grande e quando existe grande discrepância nas abscissas. Neste caso a matriz de Vandermonde é mal-condicionada (ver [6]), acarretando um aumento dos erros de arredondamento na solução do sistema.

Uma maneira de resolver este problema é escrever o polinômio em uma base que produza um sistema bem-condicionado.

## 6.2 Diferenças divididas de Newton

O método das diferenças divididas de Newton consiste em construir o polinômio interpolador da forma

$$\begin{aligned} p(x) &= a_1 + a_2(x - x_1) + a_3(x - x_1)(x - x_2) + \cdots \\ &+ a_n(x - x_1)(x - x_2) \cdots (x - x_{n-1}). \end{aligned}$$

Podemos encontrar os coeficientes  $a_i$  resolvendo o sistema linear

$$\begin{aligned} a_1 &= y_1 \\ a_1 + a_2(x_2 - x_1) &= y_2 \\ a_1 + a_2(x_3 - x_1) + a_3(x_3 - x_1)(x_3 - x_2) &= y_3 \\ &\vdots \\ a_1 + a_2(x_n - x_1) + \cdots + a_n(x_n - x_1) \cdots (x_n - x_{n-1}) &= y_n \end{aligned}$$

que pode ser escrito na forma matricial como

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & \cdots & 0 \\ 1 & (x_2 - x_1) & 0 & \cdots & 0 \\ 1 & (x_3 - x_1) & (x_3 - x_1)(x_3 - x_2) & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 1 & (x_n - x_1) & (x_n - x_1)(x_n - x_2) & \cdots & (x_n - x_1) \cdots (x_n - x_{n-1}) \end{bmatrix} \begin{bmatrix} a_1 \\ a_2 \\ a_3 \\ \vdots \\ a_n \end{bmatrix} =$$

Este é um sistema triangular inferior que pode ser facilmente resolvido conforme:

$$\begin{aligned} a_1 &= y_1 \\ a_2 &= \frac{y_2 - a_1}{x_2 - x_1} = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1} \\ a_3 &= \frac{y_3 - a_2(x_3 - x_1) - a_1}{(x_3 - x_1)(x_3 - x_2)} = \frac{\frac{y_3 - y_2}{(x_3 - x_2)} - \frac{y_2 - y_1}{(x_2 - x_1)}}{(x_3 - x_1)} \\ &\dots \end{aligned}$$

A solução deste sistema pode ser escrita em termos das Diferenças Divididas de Newton, definidas recursivamente conforme:

$$\begin{aligned}f[x_j] &= y_j \\f[x_j, x_{j+1}] &= \frac{f[x_{j+1}] - f[x_j]}{x_{j+1} - x_j} \\f[x_j, x_{j+1}, x_{j+2}] &= \frac{f[x_{j+1}, x_{j+2}] - f[x_j, x_{j+1}]}{x_{j+2} - x_j} \\&\vdots\end{aligned}$$

Nesta notação, temos  $a_k = f[x_1, x_2, \dots, x_k]$



Podemos esquematizar o método na seguinte tabela:

$j$	$x_j$	$f[x_j]$	$f[x_{j-1}, x_j]$	$f[x_{j-2}, x_{j-1}, x_j]$
1	$x_1$	$f[x_1]$	$f[x_1, x_2] = \frac{f[x_2] - f[x_1]}{x_2 - x_1}$  $f[x_2, x_3] = \frac{f[x_3] - f[x_2]}{x_3 - x_2}$	$f[x_1, x_2, x_3] = \frac{f[x_2, x_3] - f[x_1, x_2]}{x_3 - x_1}$
2	$x_2$	$f[x_2]$		
3	$x_2$	$f[x_2]$		

**Exemplo 77.** Encontrar o polinômio que passe pelos seguintes pontos

$$(-1, 3), (0, 1), (1, 3), (3, 43)$$

$j$	$x_j$	$f[x_j]$	$f[x_{j-1}, x_j]$	$f[x_{j-2}, x_{j-1}, x_j]$	$f[x_{j-3}, x_{j-2}, x_{j-1}, x_j]$
1	-1	3			
2	0	1	$\frac{1-3}{0-(-1)} = -2$	$\frac{2-(-2)}{1-(-1)} = 2$	
3	1	3	$\frac{3-1}{1-0} = 2$	$\frac{20-2}{3-0} = 6$	$\frac{6-2}{3-(-1)} = 1$
4	3	43	$\frac{43-3}{3-1} = 20$		

Portanto

$$\begin{aligned}
 P(x) &= 3 - 2(x+1) + 2(x+1)x + (x+1)x(x-1) \\
 &= x^3 + 2x^2 - x + 1
 \end{aligned}$$

## Exercícios

**E 6.2.1.** Considere o seguinte conjunto de pontos:

$$(-2, -47), (0, -3), (1, 4), (2, 41)$$

. Encontre o polinômio interpolador usando os métodos vistos.

**E 6.2.2.** No `Scilab`, faça um gráfico com os pontos e o polinômio interpolador do Exercício 6.2.1.

## 6.3 Polinômios de Lagrange

Outra maneira clássica de resolver o problema da interpolação polinomial é através dos polinômios de Lagrange. Dado um conjunto de pontos  $\{x_j\}_{j=1}^n$  distintos dois a dois, definimos os polinômios de Lagrange como os polinômios de grau  $n - 1$  que satisfazem

$$L_k(x_j) = \begin{cases} 1, & \text{se } k = j \\ 0, & \text{se } k \neq j \end{cases}$$

Assim, o polinômio de grau  $n - 1$  que interpola os pontos dados, tais  $p(x_j) = y_j, j = 1, \dots, n$  é dado por

$$p(x) = y_1 L_1(x) + y_2 L_2(x) + \cdots + y_n L_n(x) = \sum_{k=1}^n y_k L_k(x)$$

Para construir os polinômios de Lagrange, podemos analisar a sua

forma fatorada, ou seja:

$$L_k(x) = c_k \prod_{\substack{j=1 \\ j \neq i}}^n (x - x_j)$$

onde o coeficiente  $c_k$  é obtido da condição  $L_k(x_k) = 1$ :

$$L_k(x_k) = c_k \prod_{\substack{j=1 \\ j \neq i}}^n (x_k - x_j) \implies c_k = \frac{1}{\prod_{\substack{j=1 \\ j \neq i}}^n (x_k - x_j)}$$

Portanto,

$$L_k(x) = \prod_{\substack{j=1 \\ j \neq i}}^n \frac{(x - x_j)}{(x_k - x_j)}$$

*Observação 20.* O problema de interpolação quando escrito usando como base os polinômios de Lagrange produz um sistema linear diagonal.

**Exemplo 78.** Encontre o polinômio da forma  $p(x) = a_1 + a_2x + a_3x^2 + a_4x^3$  que passa pelos pontos

$$(0,0), (1,1), (2,4), (3,9)$$

Escrevemos:

$$L_1(x) = \frac{(x-1)(x-2)(x-3)}{(0-1)(0-2)(0-3)} = -\frac{1}{6}x^3 + x^2 - \frac{11}{6}x + 1$$

$$L_2(x) = \frac{x(x-2)(x-3)}{1(1-2)(1-3)} = \frac{1}{2}x^3 - \frac{5}{2}x^2 + 3x$$

$$L_3(x) = \frac{x(x-1)(x-3)}{2(2-1)(2-3)} = -\frac{1}{2}x^3 + 2x^2 - \frac{3}{2}x$$

$$L_4(x) = \frac{x(x-1)(x-2)}{3(3-1)(3-2)} = \frac{1}{6}x^3 - \frac{1}{2}x^2 + \frac{1}{3}x$$

Assim temos:

$$P(x) = 0 \cdot L_1(x) + 1 \cdot L_2(x) + 4 \cdot L_3(x) + 9 \cdot L_4(x) = x^2$$

**Exemplo 79.** Encontre o polinômio da forma  $p(x) = a_1 + a_2x + a_3x^2 + a_4x^3$  que passa pelos pontos

$$(0,0), (1,1), (2,0), (3,1)$$

Como as abscissas são as mesmas do exemplo anterior, podemos utilizar os mesmos polinômios de Lagrange, assim temos:

$$p(x) = 0 \cdot L_1(x) + 1 \cdot L_2(x) + 0 \cdot L_3(x) + 1 \cdot L_4(x) = \frac{2}{3}x^3 - 3x^2 + \frac{10}{3}x$$





## 6.4 Aproximação de funções reais por polinômios interpoladores

**Teorema 10.** *Dados  $n + 1$  pontos distintos,  $x_0, x_1, \dots, x_n$ , dentro de um intervalo  $[a, b]$  e uma função  $f$  com  $n + 1$  derivadas contínuas nesse intervalo ( $f \in C^{n+1}[a, b]$ ), então para cada  $x$  em  $[a, b]$ , existe um número  $\xi(x)$  em  $(a, b)$  tal que*

$$f(x) = P(x) + \frac{f^{(n+1)}(\xi(x))}{(n+1)!} (x - x_0)(x - x_1) \cdots (x - x_n),$$

onde  $P(x)$  é o polinômio interpolador. Em especial, pode-se dizer que

$$|f(x) - P(x)| \leq \frac{M}{(n+1)!} |(x - x_0)(x - x_1) \cdots (x - x_n)|,$$

onde

$$M = \max_{\xi \in [a, b]} |f^{(n+1)}(\xi(x))|$$

**Exemplo 80.** Considere a função  $f(x) = \cos(x)$  e o polinômio  $P(x)$  de grau 2 tal que  $P(0) = \cos(0) = 1$ ,  $P(\frac{1}{2}) = \cos(\frac{1}{2})$  e  $P(1) = \cos(1)$ . Use a fórmula de Lagrange para encontrar  $P(x)$ . Encontre o erro máximo que se assume ao aproximar o valor de  $\cos(x)$  pelo de  $P(x)$  no intervalo  $[0,1]$ . Trace os gráficos de  $f(x)$  e  $P(x)$  no intervalo  $[0,1]$  no mesmo plano cartesiano e, depois, trace o gráfico da diferença  $\cos(x) - P(x)$ . Encontre o erro efetivo máximo  $|\cos(x) - P(x)|$ .

$$\begin{aligned}
 P(x) &= 1 \frac{(x - \frac{1}{2})(x - 1)}{(0 - \frac{1}{2})(0 - 1)} + \cos\left(\frac{1}{2}\right) \frac{(x - 0)(x - 1)}{(\frac{1}{2} - 0)(\frac{1}{2} - 1)} + \cos(1) \frac{(x - 0)(x - \frac{1}{2})}{(1 - 0)(1 - \frac{1}{2})} \\
 &\approx 1 - 0,0299720583066x - 0,4297256358252x^2
 \end{aligned}$$

```

L1=poly([.5 1], 'x');L1=L1/horner(L1,0)
L2=poly([0 1], 'x');L2=L2/horner(L2,0.5)
L3=poly([0 .5], 'x');L3=L3/horner(L3,1)
P=L1+cos(.5)*L2+cos(1)*L3
x=[0:.05:1]

```

```
plot(x,cos)
plot(x,horner(P,x),'red')
plot(x,horner(P,x)-cos(x))
```

Para encontrar o erro máximo, precisamos estimar  $|f'''(x)| = |\sin(x)| \leq \sin(1) < 0,85$  e

$$\max_{x \in [0,1]} \left| x \left( x - \frac{1}{2} \right) (x - 1) \right|$$

O polinômio de grau três  $Q(x) = x \left( x - \frac{1}{2} \right) (x - 1)$  tem um mínimo (negativo) em  $x_1 = \frac{3+\sqrt{3}}{6}$  e um máximo (positivo) em  $x_2 = \frac{3-\sqrt{3}}{6}$ . Logo:

$$\max_{x \in [0,1]} \left| x \left( x - \frac{1}{2} \right) (x - 1) \right| \leq \max\{|Q(x_1)|, |Q(x_2)|\} \approx 0,0481125.$$

Portanto:

$$|f(x) - P(x)| < \frac{0,85}{3!} 0,0481125 \approx 0,0068159 < 7 \cdot 10^{-3}$$

Para encontrar o erro efetivo máximo, basta encontrar o máximo de  $|P(x) - \cos(x)|$ . O mínimo (negativo) de  $P(x) - \cos(x)$  acontece em  $x_1 = 4,29 \cdot 10^{-3}$  e o máximo (positivo) acontece em  $x_2 = 3,29 \cdot 10^{-3}$ . Portanto, o erro máximo efetivo é  $4,29 \cdot 10^{-3}$ .

**Exemplo 81.** Considere o problema de aproximar o valor da integral  $\int_0^1 f(x)dx$  pelo valor da integral do polinômio  $P(x)$  que coincide com  $f(x)$  nos pontos  $x_0 = 0$ ,  $x_1 = \frac{1}{2}$  e  $x_2 = 1$ . Use a fórmula de Lagrange para encontrar  $P(x)$ . Obtenha o valor de  $\int_0^1 f(x)dx$  e encontre uma expressão para o erro de truncamento.

O polinômio interpolador de  $f(x)$  é

$$\begin{aligned} P(x) &= f(0) \frac{(x - \frac{1}{2})(x - 1)}{(0 - \frac{1}{2})(0 - 1)} + f\left(\frac{1}{2}\right) \frac{(x - 0)(x - 1)}{(\frac{1}{2} - 0)(\frac{1}{2} - 1)} + f(1) \frac{(x - 0)(x - \frac{1}{2})}{(1 - 0)(1 - \frac{1}{2})} \\ &= f(0)(2x^2 - 3x + 1) + f\left(\frac{1}{2}\right)(-4x^2 + 4x) + f(1)(2x^2 - x) \end{aligned}$$

e a integral de  $P(x)$  é:

$$\begin{aligned}\int_0^1 P(x)dx &= \left[ f(0) \left( \frac{2}{3}x^3 - \frac{3}{2}x^2 + x \right) \right]_0^1 + \left[ f\left(\frac{1}{2}\right) \left( -\frac{4}{3}x^3 + 2x^2 \right) \right]_0^1 \\ &\quad + \left[ f(1) \left( \frac{2}{3}x^3 - \frac{1}{2}x^2 \right) \right]_0^1 \\ &= f(0) \left( \frac{2}{3} - \frac{3}{2} + 1 \right) + f\left(\frac{1}{2}\right) \left( -\frac{4}{3} + 2 \right) + f(1) \left( \frac{2}{3} - \frac{1}{2} \right) \\ &= \frac{1}{6}f(0) + \frac{2}{3}f\left(\frac{1}{2}\right) + \frac{1}{6}f(1)\end{aligned}$$

Para fazer a estimativa de erro usando o Teorema 10, e temos

$$\begin{aligned}\left| \int_0^1 f(x)dx - \int_0^1 P(x)dx \right| &= \left| \int_0^1 f(x) - P(x)dx \right| \\ &\leq \int_0^1 |f(x) - P(x)|dx \\ &\leq \frac{M}{6} \int_0^1 \left| x \left( x - \frac{1}{2} \right) (x - 1) \right| dx \\ &= \frac{M}{6} \left[ \int_0^{1/2} x \left( x - \frac{1}{2} \right) (x - 1) dx \right. \\ &\quad \left. - \int_{1/2}^1 x \left( x - \frac{1}{2} \right) (x - 1) dx \right] \\ &= \frac{M}{6} \left[ \frac{1}{64} - \left( -\frac{1}{64} \right) \right] = \frac{M}{192}.\end{aligned}$$

Lembramos que  $M = \max_{x \in [0,1]} |f'''(x)|$ .

*Observação 21.* Existem estimativas melhores para o erro de truncamento para este esquema de integração numérica. Veremos com mais detalhes tais esquemas na teoria de integração numérica.

**Exemplo 82.** Use o resultado do exemplo anterior para aproximar o valor das seguintes integrais:

a)  $\int_0^1 \ln(x+1)dx$

b)  $\int_0^1 e^{-x^2}dx$

**Solução.** Usando a fórmula obtida, temos que

$$\int_0^1 \ln(x+1)dx \approx 0,39 \pm \frac{1}{96}$$

$$\int_0^1 e^{-x^2}dx \approx 0,75 \pm \frac{3,87}{192}$$





## Exercícios

**E 6.4.1.** Use as mesmas técnicas usadas o resultado do Exemplo 81 para obter uma aproximação do valor de:

$$\int_0^1 f(x)dx$$

através do polinômio interpolador que coincide com  $f(x)$  nos pontos  $x = 0$  e  $x = 1$ .

## 6.5 Ajuste de curvas

**Definição 9.** *O problema de **ajuste de curvas** consiste em dado um conjunto de  $N$  pontos  $(x_j, y_j)$ , encontre a função  $f(x)$  de uma família de funções que melhor aproxima os pontos dados.*

Por exemplo, dado um conjunto de 15 pontos como na figura 6.1 encontre a reta que melhor se ajusta aos pontos.

Geralmente o critério mais usado consiste em minimizar a soma do quadrado das distâncias entre a coordenadas  $y_j$  e a função desejada em  $f(x_j)$ . Ou seja, encontre a função  $f(x)$  tal que

$$\begin{aligned} R &= (f(x_1) - y_1)^2 + (f(x_2) - y_2)^2 + \cdots + (f(x_N) - y_N)^2 \\ &= \sum_{j=1}^N (f(x_j) - y_j)^2 \end{aligned}$$

seja o menor possível, que fornece o nome do método como **método**




Figura 6.1: A reta que melhor se ajusta aos 15 pontos dados utilizando o critério dos mínimos quadrados.

**dos mínimos quadrados.** Note que o **resíduo** em  $x_j$  é definido como  $r_j = |f(x_j) - y_j|$ .

## 6.5.1 O problema linear

Dado um conjunto de  $N$  pontos, desejamos encontrar a *reta* que melhor se ajusta a esses pontos de tal forma a minimizar o resíduo. Ou seja, encontre a curva  $f(x) = a_1 + a_2x$  tal que

$$R(a_1, a_2) = \sum_{j=1}^N (f(x_j) - y_j)^2 = \sum_{j=1}^N (a_1 + a_2x_j - y_j)^2$$

seja o menor possível.

O objetivo é encontrar  $a_1, a_2$  e geralmente temos muito mais equações do que incógnitas, i.e.,

$$\begin{array}{rcl} a_1 + a_2x_1 & = & y_1 \\ a_1 + a_2x_2 & = & y_2 \\ a_1 + a_2x_3 & = & y_3 \\ & \vdots & \\ a_N + a_2x_N & = & y_N \end{array}$$

ou simplesmente  $V\vec{a} = \vec{y}$ .

O mínimo de  $R$  ocorre quando quando a derivada primeira é igual a zero:

$$\frac{\partial R}{\partial a_1} = \frac{\partial}{\partial a_1} \sum_{j=1}^N (a_1 + a_2 x_j - y_j)^2 = 0$$

$$\frac{\partial R}{\partial a_2} = \frac{\partial}{\partial a_2} \sum_{j=1}^N (a_1 + a_2 x_j - y_j)^2 = 0$$

ou seja,

$$2 \sum_{j=1}^N (a_1 + a_2 x_j - y_j) \cdot 1 = 0$$

$$2 \sum_{j=1}^N (a_1 + a_2 x_j - y_j) \cdot x_j = 0$$

e isolando as incógnitas temos

$$\begin{aligned}a_1 \sum_{j=1}^N 1 + a_2 \sum_{j=1}^N x_j &= \sum_{j=1}^N y_j \\a_1 \sum_{j=1}^N x_j + a_2 \sum_{j=1}^N x_j^2 &= \sum_{j=1}^N y_j x_j\end{aligned}$$

Na forma matricial obtemos

$$\begin{bmatrix} \sum_{j=1}^N 1 & \sum_{j=1}^N x_j \\ \sum_{j=1}^N x_j & \sum_{j=1}^N x_j^2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} a_1 \\ a_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \sum_{j=1}^N y_j \\ \sum_{j=1}^N x_j y_j \end{bmatrix} \quad (6.1)$$

Observe que é equivalente ao problema matricial

$$Ma := V^T V a = V^T y \quad (6.2)$$

**Teorema 11.** *A matriz  $M = V^T V$  é quadrada de ordem 2 e é inversível sempre que o posto da matriz  $V$  é igual a número de colunas  $m$ .*

*Demonstração.* Para provar que  $M$  é invertível precisamos mostrar que  $Mv = 0$  implica  $v = 0$ :

$$Mv = 0 \implies V^T Vv = 0$$

tomando o produto interno da expressão  $0 = V^T Vv$  com  $v$ , temos:

$$0 = \langle V^T Vv, v \rangle = \langle Vv, Vv \rangle = \|Vv\|^2$$

Então se  $Mv = 0$ ,  $Vv = 0$ , como o posto de  $V$  é igual ao número de colunas,  $v = 0$ . □

**Lema 3.** A matrix  $M = V^T V$  é simétrica.

*Demonstração.* Isso é facilmente provado pelo seguinte argumento:

$$M^T = (V^T V)^T = (V)^T (V^T)^T = V^T V = M$$

□



**Exemplo 83.** Encontre a função do tipo  $f(x) = ax$  que melhor se aproxima dos seguintes pontos:

$$(0, -0,1), (1, 2), (2, 3,7) \text{ e } (3, 7).$$

**Solução.** Defina

$$E_q = [f(x_1) - y_1]^2 + [f(x_2) - y_2]^2 + [f(x_3) - y_3]^2 + [f(x_4) - y_4]^2$$

temos que

$$\begin{aligned} E_q &= [f(0) - 0,1]^2 + [f(1) - 2]^2 + [f(2) - 3,7]^2 + [f(3) - 7]^2 \\ &= [0,1]^2 + [a - 2]^2 + [2a - 3,7]^2 + [3a - 7]^2 \end{aligned}$$

Devemos encontrar o parâmetro  $a$  que minimiza o erro, portanto, calculamos:

$$\frac{\partial E_q}{\partial a} = 2[a - 2] + 4[2a - 3,7] + 6[3a - 7] = 28a - 60,8$$

Portanto o valor de  $a$  que minimiza o erro é  $a = \frac{60,8}{28}$ .

```
x=[0 1 2 3] '  
y=[-.1 2 3.7 7] '  
plot2d(x,y,style=-4)
```



**Exemplo 84.** Encontre a função do tipo  $f(x) = bx + a$  que melhor aproxima os pontos:

$$(0, -0,1), (1, 2), (2, 3,7) \text{ e } (3, 7).$$

**Solução.**

$$\begin{aligned} E_q &= [f(0) + 0,1]^2 + [f(1) - 2]^2 + [f(2) - 3,7]^2 + [f(3) - 7]^2 \\ &= [a + 0,1]^2 + [a + b - 2]^2 + [a + 2b - 3,7]^2 + [a + 3b - 7]^2 \end{aligned}$$

Devemos encontrar os parâmetros  $a$   $b$  que minimizam o erro, por isso, calculamos as derivadas parciais:

$$\begin{aligned} \frac{\partial E_q}{\partial a} &= 2[a + 0,1] + 2[a + b - 2] + 2[a + 2b - 3,7] + 2[a + 3b - 7] \\ \frac{\partial E_q}{\partial b} &= 2[a + b - 2] + 4[a + 2b - 3,7] + 6[a + 3b - 7] \end{aligned}$$

O erro mínimo acontece quando as derivadas são nulas, ou seja:

$$8a + 12b = 25,2$$

$$12a + 28b = 60,8$$

Cuja solução é dada por  $a = -0,3$  e  $b = 2,3$ . Portanto a função que procuramos é  $f(x) = -0,3 + 2,3x$ .  $\diamond$

## 6.5.2 Ajuste polinomial

Dado um conjunto de  $n$  pontos, desejamos encontrar o *polinômio* de grau  $p$  que melhor se ajusta a esses pontos de tal forma a minimizar o resíduo, ou seja, encontrar a curva  $f(x) = a_1 + a_2x + \dots + a_{p+1}x^p$  tal que

$$\begin{aligned} R(a_1, \dots, a_{p+1}) &= \sum_{j=1}^N (f(x_j) - y_j)^2 \\ &= \sum_{j=1}^N (a_1 + a_2x_j + \dots + a_{p+1}x_j^p - y_j)^2 \end{aligned}$$

seja o menor possível.

O objetivo é encontrar as incógnitas  $a_i$  que minimizam a soma do quadrado do resíduo.

O mínimo de  $R$  encontra-se quando a derivada primeira é igual a

zero:

$$\frac{\partial R}{\partial a_1} = \frac{\partial}{\partial a_1} \sum_{j=1}^n (a_1 + a_2 x_j + \dots + a_{p+1} x_j^p - y_j)^2 = 0$$

$$\vdots = \vdots$$

$$\frac{\partial R}{\partial a_{p+1}} = \frac{\partial}{\partial a_{p+1}} \sum_{j=1}^n (a_1 + a_2 x_j + \dots + a_{p+1} x_j^p - y_j)^2 = 0$$

ou seja,

$$2 \sum_{j=1}^n (a_1 + a_2 x_j + \dots + a_{p+1} x_j^p - y_j) \cdot 1 = 0$$

$$\vdots = \vdots$$

$$2 \sum_{j=1}^n (a_1 + a_2 x_j + \dots + a_{p+1} x_j^p - y_j) \cdot x_j^p = 0$$

e isolando as incógnitas temos

$$\begin{aligned}
 a_1 \sum_{j=1}^n 1 + a_2 \sum_{j=1}^N x_j + \dots + a_{p+1} \sum_{j=1}^N x_j^p &= \sum_{j=1}^N y_j \\
 &\vdots \\
 a_1 \sum_{j=1}^n x_j^p + a_2 \sum_{j=1}^N x_j^{p+1} + \dots + a_{p+1} \sum_{j=1}^N x_j^{2p} &= \sum_{j=1}^N y_j x_j^p
 \end{aligned}$$

Na forma matricial obtemos

$$\begin{bmatrix} \sum 1 & \sum x_j & \cdots & \sum x_j^p \\ \sum x_j & \sum x_j^2 & & \sum x_j^{p+1} \\ \vdots & & \ddots & \vdots \\ \sum x_j^p & \sum x_j^{p+1} & \cdots & \sum x_j^{2p} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} a_1 \\ a_2 \\ \vdots \\ a_{p+1} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \sum y_j \\ \sum x_j y_j \\ \vdots \\ \sum x_j^p y_j \end{bmatrix} \quad (6.3)$$

Na forma matricial temos

$$Ma := V^T V a = V^T y \quad (6.4)$$

### 6.5.3 Ajuste linear de curvas

Seja  $f_1(x), f_2(x), \dots, f_m(x)$  um conjunto de  $m$  funções e  $(x_i, y_i)$  um conjunto de  $n$  pontos. Procuram-se os coeficientes  $a_1, a_2, \dots, a_m$  tais que a função dada por

$$f(x) = a_1 f_1(x) + a_2 f_2(x) + \dots + a_m f_m(x)$$

minimiza o resíduo dado por

$$R = \sum_{j=1}^n [f(x_i) - y_i]^2$$

como  $f(x) = \sum_{j=1}^m a_j f_j(x)$ , temos

$$R = \sum_{j=1}^n \left[ \sum_{j=1}^m a_j f_j(x_i) - y_i \right]^2$$

Este problema é equivalente a resolver pelo métodos dos mínimos

quadrados o seguinte sistema linear:

$$\begin{bmatrix} f_1(x_1) & f_2(x_1) & \cdots & f_m(x_1) \\ f_1(x_2) & f_2(x_2) & \cdots & f_m(x_2) \\ f_1(x_3) & f_2(x_3) & \cdots & f_m(x_3) \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ f_1(x_n) & f_2(x_n) & \cdots & f_m(x_n) \end{bmatrix} \begin{bmatrix} a_1 \\ a_2 \\ \vdots \\ a_m \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} y_1 \\ y_2 \\ y_3 \\ \vdots \\ y_n \end{bmatrix}$$

**Exemplo 85.** Encontre a reta que melhor aproxima o seguinte conjunto de dados:



$x_i$	$y_i$
0,01	1,99
1,02	4,55
2,04	7,20
2,95	9,51
3,55	10,82

**Solução.** Desejamos encontrar os valores de  $a$  e  $b$  tais que a função  $f(x) = ax + b$  melhor se ajusta aos pontos da tabela. Afim de usar o critério dos mínimos quadrados, escrevemos o problema na forma

matricial dada por:

$$\begin{bmatrix} 0,01 & 1 \\ 1,02 & 1 \\ 2,04 & 1 \\ 2,95 & 1 \\ 3,55 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} a \\ b \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1,99 \\ 4,55 \\ 7,2 \\ 9,51 \\ 10,82 \end{bmatrix}$$

Multiplicamos agora ambos os lados pela transposta:

$$\begin{bmatrix} 0,01 & 1,02 & 2,04 & 2,95 & 3,55 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \end{bmatrix}$$

o que fornece:

$$\begin{bmatrix} 0,01 & 1,02 & 2,04 & 2,95 & 3,55 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0,01 & 1 \\ 1,02 & 1 \\ 2,04 & 1 \\ 2,95 & 1 \\ 3,55 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} a \\ b \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 0,01 & 1,02 & 2,04 \\ 1 & 1 & 1 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 26,5071 & 9,57 \\ 9,57 & 5 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} a \\ b \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 85,8144 \\ 34,07 \end{bmatrix}$$

A solução desse sistema é  $a = 2,5157653$  e  $b = 1,9988251$

A tabela abaixo mostra os valores dados e os valores ajustados:

$x_i$	$y_i$	$ax_i + b$	$ax_i + b - y_i$
0,01	1,99	2,0239828	0,0339828
1,02	4,55	4,5649057	0,0149057
2,04	7,2	7,1309863	-0,0690137
2,95	9,51	9,4203327	-0,0896673
3,55	10,82	10,929792	0,1097919



## Exercícios

**E 6.5.1.** Encontrar a parábola  $y = ax^2 + bx + c$  que melhor aproxima o seguinte conjunto de dados:

$x_i$	$y_i$
0,01	1,99
1,02	4,55
2,04	7,2
2,95	9,51
3,55	10,82

e complete a tabela:

$x_i$	$y_i$	$ax_i^2 + bx_i + c$	$ax_i^2 + bx_i + c - y_i$
0,01	1,99		
1,02	4,55		
2,04	7,20		
2,95	9,51		
3,55	10,82		



**E 6.5.2.** Dado o seguinte conjunto de dados

$x_i$	$y_i$
0,0	31
0,1	35
0,2	37
0,3	33
0,4	28
0,5	20
0,6	16
0,7	15
0,8	18
0,9	23
1,0	31



- Encontre a função do tipo  $f(x) = a + b \sin(2\pi x) + c \cos(2\pi x)$  que melhor aproxima os valores dados.
- Encontre a função do tipo  $f(x) = a + bx + cx^2 + dx^3$  que melhor aproxima os valores dados.

## 6.6 Aproximando problemas não lineares por problemas lineares

Eventualmente, problemas de ajuste de curvas podem recair num sistema não linear. Por exemplo, para ajustar função  $y = Ae^{bx}$  ao conjunto de pontos  $(x_1, y_1)$ ,  $(x_2, y_2)$  e  $(x_3, y_3)$ , temos que minimizar o resíduo<sup>1</sup>

$$R = (Ae^{x_1b} - y_1)^2 + (Ae^{x_2b} - y_2)^2 + (Ae^{x_3b} - y_3)^2$$

ou seja, resolver o sistema

$$\begin{aligned}\frac{\partial R}{\partial A} &= 2(Ae^{x_1b} - y_1)e^{x_1b} + 2(Ae^{x_2b} - y_2)e^{x_2b} + 2(Ae^{x_3b} - y_3)e^{x_3b} = 0 \\ \frac{\partial R}{\partial b} &= 2Ax_1(Ae^{x_1b} - y_1)e^{x_1b} + 2Ax_2(Ae^{x_2b} - y_2)e^{x_2b} \\ &\quad + 2Ax_3(Ae^{x_3b} - y_3)e^{x_3b} = 0\end{aligned}$$

---

<sup>1</sup>A soma do quadrado dos resíduos.

que é não linear em  $A$  e  $b$ . Esse sistema pode ser resolvido pelo método de Newton-Raphson, o que pode se tornar custoso, ou mesmo inviável quando não dispomos de uma boa aproximação da solução para inicializar o método.

Felizmente, algumas famílias de curvas admitem uma transformação que nos leva a um problema linear. No caso da curva  $y = Ae^{bx}$ , observe que  $\ln y = \ln A + bx$ . Assim, em vez de ajustar a curva original  $y = Ae^{bx}$  a tabela de pontos, ajustamos a curva submetida a transformação logarítmica

$$\tilde{y} := a_1 + a_2 \tilde{x} = \ln A + bx.$$

Usamos os pontos  $(\tilde{x}_j, \tilde{y}_j) := (x_j, \ln y_j)$ ,  $j = 1, 2, 3$  e resolvemos o sistema linear

$$V^T V \begin{bmatrix} a_1 \\ a_2 \end{bmatrix} = V^T \begin{bmatrix} \tilde{y}_1 \\ \tilde{y}_2 \\ \tilde{y}_3 \end{bmatrix},$$

onde

$$A = \begin{bmatrix} 1 & x_1 \\ 1 & x_2 \\ 1 & x_3 \end{bmatrix}$$

**Exemplo 86.** Encontre uma curva da forma  $y = Ae^x$  que melhor ajusta os pontos  $(1, 2)$ ,  $(2, 3)$  e  $(3, 5)$ .

Temos

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 2 \\ 1 & 3 \end{bmatrix}$$

e a solução do sistema leva em  $B = 0,217442$  e  $b = 0,458145$ .  
Portanto,  $A = e^{0,217442} = 1,24289$ .

*Observação 22.* Os coeficientes obtidos a partir dessa linearização são aproximados, ou seja, são diferentes daqueles obtidos quando aplicamos mínimos quadrados não linear. Observe que estamos minimizando  $\sum_i [\ln y_i - \ln(f(x_i))]^2$  em vez de  $\sum_i [y_i - f(x_i)]^2$ . No exemplo resolvido, a solução do sistema não linear original seria  $A = 1,19789$  e  $B = 0,474348$

*Observação 23.* Mesmo quando se deseja resolver o sistema não linear, a solução do problema linearizado pode ser usada para construir condições iniciais.

A próxima tabela apresenta algumas curvas e transformações que

linearizam o problema de ajuste.

curva	transformação	problema linearizado
$y = ae^{bx}$	$\tilde{y} = \ln y$	$\tilde{y} = \ln a + bx$
$y = ax^b$	$\tilde{y} = \ln y$	$\tilde{y} = \ln a + b \ln x$
$y = ax^b e^{cx}$	$\tilde{y} = \ln y$	$\tilde{y} = \ln a + b \ln x + cx$
$y = ae^{(b+cx)^2}$	$\tilde{y} = \ln y$	$\tilde{y} = \ln a + b^2 + bcx + c^2 x^2$
$y = \frac{a}{b+cx}$	$\tilde{y} = \frac{1}{y}$	$\tilde{y} = \frac{b}{a} + \frac{1}{a}x$
$y = A \cos(\omega x + \phi)$ $\omega$ conhecido	—	$y = a \cos(\omega x) - b \sin(\omega x)$ $a = A \cos(\phi), b = A \sin(\phi)$

**Exemplo 87.** Encontre a função  $f$  da forma  $y = f(x) = A \cos(2\pi x +$

$\phi$ ) que ajusta a tabela de pontos

$x_i$	$y_i$
0,0	9,12
0,1	1,42
0,2	- 7,76
0,3	- 11,13
0,4	- 11,6
0,5	- 6,44
0,6	1,41
0,7	11,01
0,8	14,73
0,9	13,22
1,0	9,93

**Solução.** Usando o fato que  $y = A \cos(2\pi x + \phi) = a \cos(2\pi x) - b \sin(2\pi x)$ , onde  $a = A \cos(\phi)$  e  $b = A \sin(\phi)$ ,  $z = [ \ a \ b \ ]^T$  é solução do problema

$$B^T B z = B^T y,$$



onde

$$B = \begin{bmatrix} \cos(2\pi x_0) & -\sin(2\pi x_0) \\ \cos(2\pi x_1) & -\sin(2\pi x_1) \\ \vdots & \\ \cos(2\pi x_{10}) & -\sin(2\pi x_{10}) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1. & 0. \\ 0,8090170 & -0,5877853 \\ 0,3090170 & -0,9510565 \\ -0,3090170 & -0,9510565 \\ -0,8090170 & -0,5877853 \\ -1,0000000 & 0,0000000 \\ -0,8090170 & 0,5877853 \\ -0,3090170 & 0,9510565 \\ 0,3090170 & 0,9510565 \\ 0,8090170 & 0,5877853 \\ 1,0000000 & 0,0000000 \end{bmatrix}.$$

Assim,  $a = 7,9614704$  e  $b = 11,405721$  e obtemos o seguinte sistema:

$$\begin{cases} A \cos(\phi) = 7,9614704 \\ A \sin(\phi) = 11,405721 \end{cases}.$$

Observe que

$$A^2 = 7,9614704^2 + 11,405721^2$$

e, escolhendo  $A > 0$ ,  $A = 13,909546$  e

$$\sin(\phi) = \frac{11,405721}{13,909546} = 0,8199923$$

Assim, como  $\cos \phi$  também é positivo,  $\phi$  é um ângulo do primeiro quadrante:

$$\phi = 0,9613976$$

Portanto  $f(x) = 13,909546 \cos(2\pi x + 0,9613976)$ . Observe que nesse exemplo a solução do problema linear é a mesma do problema não linear.  $\diamond$

**Exemplo 88.** Encontre a função  $f$  da forma  $y = f(x) = \frac{a}{b+x}$  que ajusta a tabela de pontos

$x_i$	$y_i$
0,0	101
0,2	85
0,4	75
0,6	66
0,8	60
1,0	55

usando uma das transformações tabeladas.

**Solução.** Usando o fato que  $Y = \frac{1}{y} = \frac{b}{a} + \frac{1}{a}x$ ,  $z = \begin{bmatrix} \frac{b}{a} & \frac{1}{a} \end{bmatrix}^T$  é solução do problema

$$A^T A z = A^T Y,$$

onde

$$A = \begin{bmatrix} 1 & x_1 \\ 1 & x_2 \\ 1 & x_3 \\ 1 & x_4 \\ 1 & x_5 \\ 1 & x_6 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0,0 \\ 1 & 0,2 \\ 1 & 0,4 \\ 1 & 0,6 \\ 1 & 0,8 \\ 1 & 1,0 \end{bmatrix}$$

e

$$Y = \begin{bmatrix} 1/y_1 \\ 1/y_2 \\ 1/y_3 \\ 1/y_4 \\ 1/y_5 \\ 1/y_6 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0,0099010 \\ 0,0117647 \\ 0,0133333 \\ 0,0151515 \\ 0,0166667 \\ 0,0181818 \end{bmatrix}$$

Assim,  $\frac{1}{a} = 0,0082755$  e  $\frac{b}{a} = 0,0100288$  e, então,  $a = 120,83924$  e  $b = 1,2118696$ , ou seja,  $f(x) = \frac{120,83924}{1,2118696+x}$ .  $\diamond$

## 6.7 Interpolação linear segmentada

Considere o conjunto  $(x_i, y_i)_{i=1}^n$  de  $n$  pontos. Assumiremos que  $x_{i+1} > x_i$ , ou seja, as abscissas são distintas e estão em ordem crescente. A função linear que interpola os pontos  $x_i$  e  $x_{i+1}$  no intervalo  $i$  é dada por

$$P_i(x) = y_i \frac{(x_{i+1} - x)}{(x_{i+1} - x_i)} + y_{i+1} \frac{(x - x_i)}{(x_{i+1} - x_i)}$$

O resultado da interpolação linear segmentada é a seguinte função contínua definida por partes no intervalo  $[x_1, x_n]$ :

$$f(x) = P_i(x), \quad x \in [x_i, x_{i+1}]$$

**Exemplo 89.** Construa uma função linear por partes que interpola os pontos  $(0,0)$ ,  $(1,4)$ ,  $(2,3)$ ,  $(3,0)$ ,  $(4,2)$ ,  $(5,0)$ .

A função procurada pode ser construída da seguinte forma:

$$f(x) = \begin{cases} 0\frac{x-1}{0-1} + 1\frac{x-0}{1-0} & , 0 \leq x < 1 \\ 4\frac{x-2}{1-2} + 3\frac{x-1}{2-1} & , 1 \leq x < 2 \\ 3\frac{x-3}{2-3} + 0\frac{x-2}{3-2} & , 2 \leq x \leq 3 \end{cases}$$

Simplificando, obtemos:

$$f(x) = \begin{cases} x & , 0 \leq x < 1 \\ -x + 5 & , 1 \leq x < 2 \\ -3x + 9 & , 2 \leq x \leq 3 \end{cases}$$

A Figura 6.2 é um esboço da função  $f(x)$  obtida. Ela foi gerada no Scilab usando os comandos:

```
//pontos fornecidos  
xi = [0;1;2;3;4;5]
```

```

yi = [0;4;3;0;2;0]
//numero de pontos
n = 6
//funcao interpoladora
function [y] = f(x)
    for i=1:n-2
        if ((x>=xi(i)) & (x<xi(i+1))) then
            y = yi(i)*(x-xi(i+1))/(xi(i) - xi(i+1)) ...
                + yi(i+1)*(x-xi(i))/(xi(i+1) - xi(i));
        end
    end

    if ((x>=xi(n-1)) & (x<=xi(n))) then
        y = yi(n-1)*(x-xi(n))/(xi(n-1) - xi(n)) ...
            + yi(n)*(x-xi(n-1))/(xi(n) - xi(n-1));
    end
endfunction
//graficando

```



```
xx = linspace(xi(1),xi(n),500)';  
clear yy  
for i=1:max(size(xx))  
    yy(i) = f(xx(i))  
end  
plot(xi,yi,'r.',xx,yy,'b-')
```




Figura 6.2: Interpolação linear segmentada.

## 6.8 Interpolação cúbica segmentada - spline

Dado um conjunto de  $n$  pontos  $(x_j, y_j)_{j=1}^n$  tais que  $x_{j+1} > x_j$ , ou seja, as abscissas são distintas e estão em ordem crescente; um spline cúbico que interpola estes pontos é uma função  $s(x)$  com as seguintes propriedades:

- i Em cada segmento  $[x_j, x_{j+1}]$ ,  $j = 1, 2, \dots, n-1$   $s(x)$  é um polinômio cúbico.
- ii para cada ponto,  $s(x_j) = y_j$ , i.e., o spline interpola os pontos dados.
- iii  $s(x) \in C^2$ , i.e., é função duas vezes continuamente diferenciável.

Da primeira hipótese, escrevemos

$$s(x) = s_j(x), x \in [x_j, x_{j+1}], \quad j = 1, \dots, n-1$$

com

$$s_j(x) = a_j + b_j(x - x_j) + c_j(x - x_j)^2 + d_j(x - x_j)^3$$

O problema agora consiste em obter os 4 coeficientes de cada um desses  $n - 1$  polinômios cúbicos.

Veremos que a simples definição de spline produz  $4n - 6$  equações linearmente independentes:

$$\begin{aligned} s_j(x_j) &= y_j, & j &= 1, \dots, n-1 \\ s_j(x_{j+1}) &= y_{j+1}, & j &= 1, \dots, n-1 \\ s'_j(x_{j+1}) &= s'_{j+1}(x_{j+1}), & j &= 1, \dots, n-2 \\ s''_j(x_{j+1}) &= s''_{j+1}(x_{j+1}), & j &= 1, \dots, n-2 \end{aligned}$$

Como

$$s'_j(x) = b_j + 2c_j(x - x_j) + 3d_j(x - x_j)^2 \quad (6.5)$$

e

$$s''_j(x) = 2c_j + 6d_j(x - x_j), \quad (6.6)$$

temos, para  $j = 1, \dots, n - 1$ , as seguintes equações

$$\begin{aligned}a_j &= y_j, \\a_j + b_j(x_{j+1} - x_j) + c_j(x_{j+1} - x_j)^2 + d_j(x_{j+1} - x_j)^3 &= y_{j+1}, \\b_j + 2c_j(x_{j+1} - x_j) + 3d_j(x_{j+1} - x_j)^2 &= b_{j+1}, \\c_j + 3d_j(x_{j+1} - x_j) &= c_{j+1},\end{aligned}$$

Por simplicidade, definimos

$$h_j = x_{j+1} - x_j$$

e temos

$$\begin{aligned}a_j &= y_j, \\a_j + b_j h_j + c_j h_j^2 + d_j h_j^3 &= y_{j+1}, \\b_j + 2c_j h_j + 3d_j h_j^2 &= b_{j+1}, \\c_j + 3d_j h_j &= c_{j+1},\end{aligned}\tag{6.7}$$

que podem ser escrita da seguinte maneira

$$a_j = y_j, \quad (6.8)$$

$$d_j = \frac{c_{j+1} - c_j}{3h_j}, \quad (6.9)$$

$$\begin{aligned} b_j &= \frac{y_{j+1} - y_j - c_j h_j^2 - \frac{c_{j+1} - c_j}{3h_j} h_j^3}{h_j}, \\ &= \frac{3y_{j+1} - 3y_j - 3c_j h_j^2 - c_{j+1} h_j^2 + c_j h_j^2}{3h_j} \\ &= \frac{3y_{j+1} - 3y_j - 2c_j h_j^2 - c_{j+1} h_j^2}{3h_j} \end{aligned} \quad (6.10)$$

Trocando o índice  $j$  por  $j-1$  na terceira equação (6.7),  $j = 2, \dots, n-1$

$$b_{j-1} + 2c_{j-1}h_{j-1} + 3d_{j-1}h_{j-1}^2 = b_j \quad (6.11)$$

e, portanto,

$$\begin{aligned} \frac{3y_j - 3y_{j-1} - 2c_{j-1}h_{j-1}^2 - c_j h_{j-1}^2}{3h_{j-1}} + 2c_{j-1}h_{j-1} + c_j h_{j-1} - c_{j-1}h_{j-1} \\ = \frac{3y_{j+1} - 3y_j - 2c_j h_j^2 - c_{j+1}h_j^2}{3h_j}. \end{aligned} \quad (6.12)$$

Fazendo as simplificações, obtemos:

$$c_{j-1}h_{j-1} + c_j(2h_j + 2h_{j-1}) + c_{j+1}h_j = 3\frac{y_{j+1} - y_j}{h_j} - 3\frac{y_j - y_{j-1}}{h_{j-1}}. \quad (6.13)$$

É costumeiro acrescentar a incógnita  $c_n$  ao sistema. A incógnita  $c_n$  não está relacionada a nenhum dos polinômios interpoladores. Ela é uma construção artificial que facilita o cálculo dos coeficientes do spline. Portanto, a equação acima pode ser resolvida para  $j = 2, \dots, n-1$ .

Para determinar unicamente os  $n$  coeficientes  $c_n$  precisamos acrescentar duas equações linearmente independentes às  $n-2$  equações

dadas por (6.13). Essas duas equações adicionais definem o tipo de spline usado.



## 6.8.1 Spline natural

Uma forma de definir as duas equações adicionais para completar o sistema (6.13) é impor condições de fronteira livres (ou naturais), ou seja,

$$S''(x_1) = S''(x_n) = 0. \quad (6.14)$$

Substituindo na equação (6.6)

$$s_1''(x_1) = 2c_1 + 6d_1(x_1 - x_1) = 0 \implies c_1 = 0.$$

e

$$s_{n-1}''(x_n) = 2c_{n-1} + 6d_{n-1}(x_n - x_{n-1}) = 0.$$

Usando o fato que

$$c_{n-1} + 3d_{n-1}h_{n-1} = c_n$$

temos que

$$c_n = -3d_{n-1}(x_n - x_{n-1}) + 3d_{n-1}h_{n-1} = 0.$$

Essa duas equações para  $c_1$  e  $c_n$  juntamente com as equações (6.13) formam um sistema de  $n$  equações  $Ac = z$ , onde

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ h_1 & 2h_2 + 2h_1 & h_2 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & h_2 & 2h_3 + 2h_2 & h_3 & \cdots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & h_{n-2} & 2h_{n-2} + 2h_{n-1} & h_{n-1} \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \tag{6.15}$$

$$c = \begin{bmatrix} c_1 \\ c_2 \\ \vdots \\ c_n \end{bmatrix} \quad \text{e} \quad z = \begin{bmatrix} 0 \\ 3\frac{y_3-y_2}{h_2} - 3\frac{y_2-y_1}{h_1} \\ 3\frac{y_4-y_3}{h_3} - 3\frac{y_3-y_2}{h_2} \\ \vdots \\ 3\frac{y_{n-1}-y_{n-2}}{h_{n-2}} - 3\frac{y_{n-2}-y_{n-3}}{h_{n-3}} \\ 0 \end{bmatrix} \quad (6.16)$$

Observe que a matriz  $A$  é diagonal dominante estrita e, portanto, o sistema  $Ac = z$  possui solução única. Calculado  $c$ , os valores dos  $a_n$ ,  $b_n$  e  $d_n$  são obtidos diretamente pelas expressões (6.8), (6.10) e (6.9), respectivamente.

**Exemplo 90.** Construa um spline cúbico natural que passe pelos pontos  $(2, 4,5)$ ,  $(5, -1,9)$ ,  $(9, 0,5)$  e  $(12, -0,5)$ .

**Solução.** O spline desejado é uma função definida por partes da

forma:

$$S(x) = \begin{cases} a_1 + b_1(x-2) + c_1(x-2)^2 + d_1(x-2)^3 & , 2 \leq x < 5 \\ a_2 + b_2(x-5) + c_2(x-5)^2 + d_2(x-5)^3 & , 5 \leq x < 9 \\ a_3 + b_3(x-9) + c_3(x-9)^2 + d_3(x-9)^3 & , 9 \leq x \leq 12 \end{cases} . \quad (6.17)$$

Os coeficientes  $c_1$ ,  $c_2$  e  $c_3$  resolvem o sistema  $Ac = z$ , onde

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 3 & 2 \cdot 3 + 2 \cdot 4 & 4 & 0 \\ 0 & 4 & 2 \cdot 4 + 2 \cdot 3 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 3 & 14 & 4 & 0 \\ 0 & 4 & 14 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$c = \begin{bmatrix} c_1 \\ c_2 \\ c_3 \\ c_4 \end{bmatrix} \quad \text{e} \quad z = \begin{bmatrix} 0 \\ 3^{\frac{0,5-(-1,9)}{4}} - 3^{\frac{(-1,9)-4,5}{3}} \\ 3^{\frac{-0,5-0,5}{3}} - 3^{\frac{0,5-(-1,9)}{4}} \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 8,2 \\ -2,8 \\ 0 \end{bmatrix}$$

Observe que  $c_4$  é um coeficiente artificial para o problema. A solução é  $c_1 = 0$ ,  $c_2 = 0,7$ ,  $c_3 = -0,4$  e  $c_4 = 0$ . Calculamos os demais coeficientes usando as expressões (6.8), (6.10) e (6.9):

$$a_1 = y_1 = 4,5$$

$$a_2 = y_2 = -1,9$$

$$a_3 = y_3 = 0,5$$

$$d_1 = \frac{c_2 - c_1}{3h_1} = \frac{0,7 - 0}{3 \cdot 3} = 0,07777778$$

$$d_2 = \frac{c_3 - c_2}{3h_2} = \frac{-0,4 - 0,7}{3 \cdot 4} = -0,09166667$$

$$d_3 = \frac{c_4 - c_3}{3h_3} = \frac{0 + 0,4}{3 \cdot 3} = 0,04444444$$

$$\begin{aligned} b_1 &= \frac{y_2 - y_1}{h_1} - \frac{h_1}{3}(2c_1 + c_2) \\ &= \frac{-1,9 - 4,5}{3} - \frac{3}{3}(2 \cdot 0 - 0,7) = -2,83333333 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} b_2 &= \frac{y_3 - y_2}{h_2} - \frac{h_2}{3}(2c_2 + c_3) \\ &= \frac{0,5 - (-1,9)}{4} - \frac{4}{3}(2 \cdot 0,7 + 0,4) = -0,73333333 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} b_3 &= \frac{y_4 - y_3}{h_3} - \frac{h_3}{3}(2c_3 + c_4) \\ &= \frac{-0,5 - 0,5}{3} - \frac{3}{3}(2 \cdot (-0,4) + 0) = 0,46666667 \end{aligned}$$

Portanto:

$$S(x) = \begin{cases} 4,5 - 2,833(x - 2) + 0,078(x - 2)^3 & , 2 \leq x < 5 \\ -1,9 - 0,733(x - 5) + 0,7(x - 5)^2 - 0,092(x - 5)^3 & , 5 \leq x < 9 \\ 0,5 + 0,467(x - 9) - 0,4(x - 9)^2 + 0,044(x - 9)^3 & , 9 \leq x \leq 12 \end{cases}$$

No Scilab, podemos utilizar:

```
X = [2 5 9 12] '  
Y = [4.5 -1.9 0.5 -0.5] '  
h = X(2:4)-X(1:3)  
A = [1 0 0 0;h(1) 2*h(1)+2*h(2) h(2) 0; ...  
      0 h(2) 2*h(2)+2*h(3) h(3);0 0 0 1 ]  
z = [0, 3*(Y(3)-Y(2))/h(2)-3*(Y(2)-Y(1))/h(1), ...  
      3*(Y(4)-Y(3))/h(3)-3*(Y(3)-Y(2))/h(2), 0] '  
c = A\z  
for i=1:3  
    a(i) = Y(i)
```

```
d(i) = (c(i+1)-c(i))/(3*h(i))  
b(i) = (Y(i+1)-Y(i))/h(i)-h(i)/3*(2*c(i)+c(i+1))  
end  
  
for i=1:3  
    P(i) = poly([a(i) b(i) c(i) d(i)], 'x', 'coeff')  
    z = [X(i):.01:X(i+1)]  
    plot(z, horner(P(i), z-X(i)))  
end
```





## 6.8.2 Spline fixado

Alternativamente, para completar o sistema (6.13), podemos impor condições de contorno fixadas, ou seja,

$$\begin{aligned}S'(x_1) &= f'(x_1) \\S'(x_n) &= f'(x_n).\end{aligned}$$

Substituindo na equação (6.5)

$$s'_1(x_1) = b_1 + 2c_1(x_1 - x_1) + 3d_1(x_1 - x_1)^2 = f'(x_1) \implies b_1 = f'(x_1) \quad (6.18)$$

e

$$\begin{aligned}s'_{n-1}(x_n) &= b_{n-1} + 2c_{n-1}(x_n - x_{n-1}) + 3d_{n-1}(x_n - x_{n-1})^2 \\&= b_{n-1} + 2c_{n-1}h_{n-1} + 3d_{n-1}h_{n-1}^2 = f'(x_n)\end{aligned} \quad (6.19)$$

Usando as equações (6.9) e (6.10) para  $j = 1$  e  $j = n - 1$ , temos:

$$2c_1h_1 + c_2h_1 = 3\frac{y_2 - y_1}{h_1} - 3f'(x_1) \quad (6.20)$$

e

$$c_{n-1}h_{n-1} + c_nh_{n-1} = 3f'(x_n) - 3\frac{y_n - y_{n-1}}{h_{n-1}} \tag{6.21}$$

Essas duas equações juntamente com as equações (6.13) formam um sistema de  $n$  equações  $Ac = z$ , onde

$$A = \begin{bmatrix} 2h_1 & h_1 & 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ h_1 & 2h_2 + 2h_1 & h_2 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & h_2 & 2h_3 + 2h_2 & h_3 & \cdots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & h_{n-2} & 2h_{n-2} + 2h_{n-1} & h_{n-1} \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 & h_{n-1} & 2h_{n-1} \end{bmatrix}$$

$$c = \begin{bmatrix} c_1 \\ c_2 \\ \vdots \\ c_n \end{bmatrix} \quad \text{e} \quad z = \begin{bmatrix} 3\frac{y_2-y_1}{h_1} - 3f'(x_1) \\ 3\frac{y_3-y_2}{h_2} - 3\frac{y_2-y_1}{h_1} \\ 3\frac{y_4-y_3}{h_3} - 3\frac{y_3-y_2}{h_2} \\ \vdots \\ 3\frac{y_{n-1}-y_{n-2}}{h_{n-2}} - 3\frac{y_{n-2}-y_{n-3}}{h_{n-3}} \\ 3f'(x_n) - 3\frac{y_n-y_{n-1}}{h_{n-1}} \end{bmatrix}$$

Observe que a matriz  $A$  é diagonal dominante estrita e, portanto, o sistema  $Ac = z$  possui solução única. Calculado  $c$ , os valores dos  $a_n$ ,  $b_n$  e  $d_n$  são obtidos diretamente pelas expressões (6.8), (6.10) e (6.9), respectivamente.

**Exemplo 91.** Construa um spline cúbico com fronteira fixada que interpola a função  $y = \sin(x)$  nos pontos  $x = 0$ ,  $x = \frac{\pi}{2}$ ,  $x = \pi$ ,  $x = \frac{3\pi}{2}$  e  $x = 2\pi$ .

O spline desejado passa pelos pontos  $(0,0)$ ,  $(\pi/2,1)$ ,  $(\pi,0)$ ,  $(3\pi/2,-1)$

e  $(2\pi, 0)$  e tem a forma:

$$S(x) = \begin{cases} a_1 + b_1x + c_1x^2 + d_1x^3 & , 0 \leq x < \frac{\pi}{2} \\ a_2 + b_2(x - \frac{\pi}{2}) + c_2(x - \frac{\pi}{2})^2 + d_2(x - \frac{\pi}{2})^3 & , \frac{\pi}{2} \leq x < \pi \\ a_3 + b_3(x - \pi) + c_3(x - \pi)^2 + d_3(x - \pi)^3 & , \pi \leq x < \frac{3\pi}{2} \\ a_4 + b_4(x - \frac{3\pi}{2}) + c_4(x - \frac{3\pi}{2})^2 + d_4(x - \frac{3\pi}{2})^3 & , \frac{3\pi}{2} \leq x \leq 2\pi \end{cases}$$

Observe que ele satisfaz as condição de contorno  $f'(0) = \cos(0) = 1$  e  $f'(2\pi) = \cos(2\pi) = 1$ .

Os coeficientes  $c_1$ ,  $c_2$ ,  $c_3$  e  $c_4$  resolvem o sistema  $Ac = z$ , onde:

$$A = \begin{bmatrix} \pi & \pi/2 & 0 & 0 & 0 \\ \pi/2 & 2\pi & \pi/2 & 0 & 0 \\ 0 & \pi/2 & 2\pi & \pi/2 & 0 \\ 0 & 0 & \pi/2 & 2\pi & \pi/2 \\ 0 & 0 & 0 & \pi/2 & \pi \end{bmatrix}$$

$$c = \begin{bmatrix} c_1 \\ c_2 \\ c_3 \\ c_4 \\ c_5 \end{bmatrix} \quad \text{e} \quad z = \begin{bmatrix} 3\frac{1-0}{\pi/2} - 3 \cdot 1 \\ 3\frac{0-1}{\pi/2} - 3\frac{1-0}{\pi/2} \\ 3\frac{-1-0}{\pi/2} - 3\frac{0-1}{\pi/2} \\ 3\frac{0-(-1)}{\pi/2} - 3\frac{(-1)-0}{\pi/2} \\ 3 \cdot 1 - 3\frac{0-(-1)}{\pi/2} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 6/\pi - 3 \\ -12/\pi \\ 0 \\ 12/\pi \\ 3 - 6/\pi \end{bmatrix}$$

Aqui  $c_5$  é um coeficiente artificial para o problema. A solução é  $c_1 = -0,0491874$ ,  $c_2 = -0,5956302$ ,  $c_3 = 0$ ,  $c_4 = 0,5956302$  e  $c_5 = 0,0491874$ . Calculamos os demais coeficientes usando as expressões (6.8), (6.10) e (6.9):

$$a_1 = y_1 = 0$$

$$a_2 = y_2 = 1$$

$$a_3 = y_3 = 0$$

$$a_4 = y_3 = -1$$

$$d_1 = \frac{c_2 - c_1}{3h_1} = \frac{-0,5956302 - (-0,0491874)}{3 \cdot \pi/2} = -0,1159588$$

$$d_2 = \frac{c_3 - c_2}{3h_2} = \frac{0 - (-0,5956302)}{3 \cdot \pi/2} = 0,1263967$$

$$d_3 = \frac{c_4 - c_3}{3h_3} = \frac{0,5956302 - 0}{3 \cdot \pi/2} = 0,1263967$$

$$d_4 = \frac{c_5 - c_4}{3h_4} = \frac{0,0491874 - 0,5956302}{3 \cdot \pi/2} = -0,1159588$$

$$\begin{aligned}
 b_1 &= \frac{y_2 - y_1}{h_1} - \frac{h_1}{3}(2c_1 + c_2) \\
 &= \frac{1 - 0}{\pi/2} - \frac{\pi/2}{3}(2 \cdot (-0,0491874) - 0,5956302) = 1
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 b_2 &= \frac{y_3 - y_2}{h_2} - \frac{h_2}{3}(2c_2 + c_3) \\
 &= \frac{0 - 1}{\pi/2} - \frac{\pi/2}{3}(2 \cdot (-0,5956302) + 0) = -0,0128772
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 b_3 &= \frac{y_4 - y_3}{h_3} - \frac{h_3}{3}(2c_3 + c_4) \\
 &= \frac{-1 - 0}{\pi/2} - \frac{\pi/2}{3}(2 \cdot 0 + 0,5956302) = -0,9484910
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 b_4 &= \frac{y_5 - y_4}{h_4} - \frac{h_4}{3}(2c_4 + c_5) \\
 &= \frac{0 - (-1)}{\pi/2} - \frac{\pi/2}{3}(2 \cdot 0,5956302 + 0,0491874) = -0,0128772
 \end{aligned}$$

Portanto,

$$S(x) = \begin{cases} x - 0,049x^2 - 0,12x^3 & , 0 \leq x < \frac{\pi}{2} \\ 1 + -0,01(x - \frac{\pi}{2}) - 0,6(x - \frac{\pi}{2})^2 + 0,13(x - \frac{\pi}{2})^3 & , \frac{\pi}{2} \leq x < \pi \\ -0,95(x - \pi) + 0,13(x - \pi)^3 & , \pi \leq x < \frac{3\pi}{2} \\ -1 - 0,01(x - \frac{3\pi}{2}) + 0,6(x - \frac{3\pi}{2})^2 - 0,12(x - \frac{3\pi}{2})^3 & , \frac{3\pi}{2} \leq x \leq 2\pi \end{cases}$$

No Scilab, podemos resolver este problema fazendo:

```
//limpa memoria
clear A, B, a, b, c, d
//pontos fornecidos
xi = [0; %pi/2; %pi; 3*%pi/2; 2*%pi]
yi = sin(xi)
//numero de pontos
n = 5
disp('Pontos fornecidos:')
```



```
disp([xi, yi])
//vetor h
h = xi(2:n) - xi(1:n-1);
//matriz A
for i=1:n
    for j=1:n
        if ((j==1) & (i==1)) then
            A(i,j) = 2*h(1);
        elseif (j == i-1) then
            A(i,j) = h(i-1);
        elseif ((i>1) & (i<n) & (i==j)) then
            A(i,j) = 2*(h(i) + h(i-1));
        elseif (j==i+1) then
            A(i,j) = h(i);
        elseif ((j==n) & (i==n)) then
            A(i,j) = 2*h(n-1);
        else
            A(i,j) = 0;
```

end

end

end

disp('Matriz A:')

disp(A)

//vetor z

for i=1:n

if ((i==1)) then

z(i) = 3\*(yi(2)-yi(1))/h(1) - 3\*cos(xi(1));

elseif ((i>1) & (i < n)) then

z(i) = 3\*(yi(i+1)-yi(i))/h(i) ...

- 3\*(yi(i) - yi(i-1))/h(i-1);

elseif (i == n) then

z(i) = 3\*cos(xi(n)) - 3\*(yi(n) - yi(n-1))/h(n-1);

end

end

disp('Vetor z:')

disp(z)

```

//coeficientes c
c = inv(A)*z
disp('Coeficientes c:')
disp(c)
//coeficientes a
a = yi(1:n-1);
disp('Coeficientes a:')
disp(a)
//coeficientes b
for j=1:n-1
    b(j) = (3*yi(j+1) - 3*yi(j) - 2*c(j)*h(j)^2 ...
        - c(j+1)*h(j)^2)/(3*h(j));
end
disp('Coeficientes b:')
disp(b)
//coeficientes d
for j=1:n-1
    d(j) = (c(j+1) - c(j))/(3*h(j));

```

```
end
disp('Coeficientes d:')
disp(d)
//spline cubico obtenido
function [y] = s(x)
    for i=1:n-2
        if ((x>=xi(i)) & (x<xi(i+1))) then
            y = a(i) + b(i)*(x-xi(i)) ...
                + c(i)*(x-xi(i))^2 + d(i)*(x-xi(i))^3;
        end
    end
    if ((x>=xi(n-1)) & (x<=xi(n))) then
        y = a(n-1) + b(n-1)*(x-xi(n-1)) ...
            + c(n-1)*(x-xi(n-1))^2 + d(n-1)*(x-xi(n-1))^3;
    end
endfunction
```

### 6.8.3 Resumo sobre Splines

Dado um conjunto de pontos  $(x_i, y_i)$ ,  $i = 1, 2, \dots, n$ , um spline cúbico é a seguinte função interpoladora definida por partes:

$$S(x) = \begin{cases} a_1 + b_1(x - x_1) + c_1(x - x_1)^2 + d_1(x - x_1)^3 & , x_1 \leq x < x_2 \\ a_2 + b_2(x - x_2) + c_2(x - x_2)^2 + d_2(x - x_2)^3 & , x_2 \leq x < x_3 \\ \vdots & \vdots \\ a_{n-1} + b_{n-1}(x - x_{n-1}) + c_{n-1}(x - x_{n-1})^2 + d_{n-1}(x - x_{n-1})^3 & , x_{n-1} \leq x \leq x_n \end{cases}$$

Definindo-se  $h_j = x_{j+1} - x_j$ , os coeficientes  $c_j$ ,  $j = 1, 2, \dots, n$ , são

solução do sistema linear  $Ac = z$ , onde:

Spline Natural	Spline Fixado
$s_1''(x_1) = 0$ e $s_{n-1}''(x_n) = 0$	$s_1'(x_1) = f'(x_1)$ e $s_{n-1}'(x_n) = f'(x_n)$
$a_{i,j} = \begin{cases} 1 & , j = i = 1 \\ h_{i-1} & , j = i - 1, i < n \\ 2(h_i + h_{i-1}) & , j = i, 1 < i < n \\ h_i & , j = i + 1, i > 1 \\ 1 & , j = i = n \\ 0 & , \text{caso contrário.} \end{cases}$	$a_{i,j} = \begin{cases} 2h_1 & , j = i = 1 \\ h_{i-1} & , j = i - 1, i < n \\ 2(h_i + h_{i-1}) & , j = i, 1 < i < n \\ h_i & , j = i + 1, i > 1 \\ 2h_{n-1} & , j = i = n \\ 0 & , \text{caso contrário.} \end{cases}$
$z_i = \begin{cases} 0 & , i = 1 \\ 3\frac{y_{i+1}-y_i}{h_i} - 3\frac{y_i-y_{i-1}}{h_{i-1}} & , 1 < i < n \\ 0 & , i = n \end{cases}$	$z_i = \begin{cases} 3\frac{y_2-y_1}{h_1} - 3f'(x_1) & , i = 1 \\ 3\frac{y_{i+1}-y_i}{h_i} - 3\frac{y_i-y_{i-1}}{h_{i-1}} & , 1 < i < n \\ 3f'(x_n) - 3\frac{y_n-y_{n-1}}{h_{n-1}} & , i = n \end{cases}$

os coeficientes  $a_j$ ,  $b_j$  e  $d_j$ ,  $j = 1, 2, \dots, n-1$ , são calculados conforme segue:

$$a_j = y_j$$

$$b_j = \frac{3y_{j+1} - 3y_j - 2c_j h_j^2 - c_{j+1} h_j^2}{3h_j}$$

$$d_j = \frac{c_{j+1} - c_j}{3h_j}$$

# Capítulo 7

## Derivação e integração numérica



## 7.1 Derivação Numérica

Dado um conjunto de pontos  $(x_i, y_i)_{i=1}^n$ , a derivada  $\left(\frac{dy}{dx}\right)_i$  pode ser calculada de várias formas. Na próxima seção trabalharemos com diferenças finitas, que é mais adequada quando as abcissas estão próximas e os dados não sofrem perturbações significativas. Na seção subsequente trataremos os casos quando os dados oscilam via ajuste ou interpolações de curvas.

## 7.1.1 Aproximação da derivada por diferenças finitas

A derivada  $f'(x_0)$  de uma função  $f(x)$  no ponto  $x_0$  é

$$f'(x_0) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + h) - f(x_0)}{h}.$$

Da definição, se  $h \neq 0$  é pequeno (não muito pequeno para evitar o cancelamento catastrófico), é esperado que uma aproximação para a derivada no ponto  $x_0$  seja dada por:

$$f'(x_0) \approx \frac{f(x_0 + h) - f(x_0)}{h}. \quad (7.1)$$

**Exemplo 92.** Calcule a derivada numérica da função  $f(x) = \cos(x)$  no ponto  $x = 1$  usando  $h = 0,1$ ,  $h = 0,01$ ,  $h = 0,001$  e  $h = 0,0001$ .

**Solução.** Usando a fórmula de diferenças dada pela Equação (7.1), devemos calcular:

$$f'(x) \approx \frac{\cos(1 + h) - \cos(1)}{h}$$

$h$	$\frac{f(1+h) - f(1)}{h}$
0,1	$\frac{0,4535961 - 0,5403023}{0,1} = -0,8670618$
0,01	$\frac{0,5318607 - 0,5403023}{0,01} = -0,8441584$
0,001	$\frac{0,5403023 - 0,5403023}{0,001} = -0,841741$
0,0001	$\frac{0,5403023 - 0,5403023}{0,0001} = -0,841498$

Tabela 7.1: Exercício 92.

para cada valor de  $h$  solicitado, obtemos a Tabela ??.

No **Scilab**, podemos calcular a aproximação da derivada  $f'(1)$  com  $h = 0,1$  usando as seguintes linhas de código:

```
deff('y = f(x)', 'y = cos(x)')
x0 = 1
h = 0.1
```

$$dp = (f(x_0+h) - f(x_0))/h$$

E, similarmente, para outros valores de  $x_0$  e  $h$ .



Observe que, no exemplo anterior, quanto menor  $h$ , melhor é a aproximação, visto que o valor exato para a derivada é  $f'(1) = -\sin(1) = -0,8414710$ . Porém, quando  $h = 10^{-13}$ , a derivada numérica é  $-0,8404388$  (usando aritmética **double**), resultado pior que aquele para  $h = 0,0001$ . Além disso, na mesma aritmética, quando  $h = 10^{-16}$  a derivada numérica calculada é zero (cancelamento catastrófico). Isso nos motiva a pensar qual é o melhor  $h$ .

Essa aproximação para a derivada é denominada diferenças progressivas. A derivada numérica também pode ser aproximada usando definições equivalentes:

$$f'(x_0) \approx \frac{f(x_0) - f(x_0 - h)}{h} = \frac{y_i - y_{i-1}}{h}$$

que é denominada diferenças regressivas ou

$$f'(x_0) \approx \frac{f(x_0 + h) - f(x_0 - h)}{2h} = \frac{y_{i+1} - y_{i-1}}{2h}$$

que é denominada diferenças centrais.

**Exemplo 93.** Calcule a derivada numérica da função  $f(x) = \cos(x)$  no ponto  $x = 1$  usando diferenças progressivas, diferenças regressivas e diferenças centrais com  $h = 0,1$ ,  $h = 0,01$  e  $h = 0,001$ .

**Solução.** A tabela abaixo mostra a derivada numérica para cada valor de  $h$ .

Diferenças	h=0,1
Progressivas	-0,8670618
Regressivas	$\frac{\cos(1) - \cos(0,9)}{0,1} = -0,8130766$
Centrais	$\frac{\cos(1,1) - \cos(0,9)}{0,2} = -0,8400692$
Diferenças	h=0,01
Progressivas	-0,8441584
Regressivas	$\frac{\cos(1) - \cos(0,99)}{0,01} = -0,8387555$
Centrais	$\frac{\cos(1,01) - \cos(0,99)}{0,02} = -0,8414570$
Diferenças	h=0,01
Progressivas	-0,841741
Regressivas	$\frac{\cos(1) - \cos(0,999)}{0,001} = -0,8412007$
	$\frac{\cos(1,001) - \cos(0,999)}{0,002} = -0,8416507$



## 7.1.2 Erros de truncamento

Seja  $D_{+,h}f(x_0)$  a aproximação da derivada de  $f$  em  $x_0$  por diferenças progressivas,  $D_{-,h}f(x_0)$  a aproximação por diferenças regressivas e  $D_{0,h}f(x_0)$  a aproximação por diferenças centrais, então

$$\begin{aligned} D_{+,h}f(x_0) - f'(x_0) &= \frac{f(x_0 + h) - f(x_0)}{h} - f'(x_0) \\ &= \frac{f(x_0) + hf'(x_0) + \frac{h^2}{2}f''(x_0) + O(h^3) - f(x_0)}{h} \\ &= \frac{h}{2}f''(x_0) + O(h^2) = O(h). \end{aligned}$$



Analogamente:

$$\begin{aligned}D_{-,h}f(x_0) - f'(x_0) &= \frac{f(x_0) - f(x_0 - h)}{h} - f'(x_0) \\&= \frac{f(x_0) - \left(f(x_0) - hf'(x_0) + \frac{h^2}{2}f''(x_0) + O(h^3)\right)}{h} \\&= -\frac{h}{2}f''(x_0) + O(h^2) = O(h).\end{aligned}$$

Também:

$$\begin{aligned}D_{0,h}f(x_0) - f'(x_0) &= \frac{f(x_0 + h) - f(x_0 - h)}{2h} - f'(x_0) \\&= \frac{f(x_0) + hf'(x_0) + \frac{h^2}{2}f''(x_0) + O(h^3)}{2h} \\&\quad - \frac{f(x_0) - hf'(x_0) + \frac{h^2}{2}f''(x_0) + O(h^3)}{2h} - f'(x_0) \\&= O(h^2).\end{aligned}$$

**Exemplo 94.** Calcule a derivada numérica e o erro de truncamento de  $f(x) = e^{-x}$  em  $x = 1,5$  pela fórmula de diferença progressiva para  $h = 0,1$ ,  $h = 0,01$  e  $h = 0,001$ .

**Solução.** Como  $|f''(x)| = |e^{-x}| < 1$ , então  $|f'_+(x_0) - f'(x_0)| < \frac{h}{2}$ .

$h$	diferenças progressivas	erro = $\frac{h}{2}$
0,1	-0,2123364	0,05
0,01	-0,2220182	0,005
0,001	-0,2230186	0,0005

O valor exato da derivada é  $f'(1,5) = -0,2231302$ .



### 7.1.3 Erros de arredondamento

Para entender como os erros de arredondamento se propagam ao calcular as derivadas numéricas vamos considerar o operador de diferenças finitas progressivas

$$D_{+,h}f(x) = \frac{f(x+h) - f(x)}{h}.$$

Nesse contexto temos o valor exato  $f'(x)$  para a derivada, a sua aproximação numérica  $D_{+,h}f(x)$  e a representação em número de máquina do operador  $D_{+,h}f(x)$  que denotaremos por  $\overline{D_{+,h}f(x)}$ . Seja  $\varepsilon(x,h)$  o erro de arredondamento ao calcularmos a derivada e consideremos

$$\overline{D_{+,h}f(x)} = D_{+,h}f(x)(1 + \varepsilon(x,h)) = \frac{\overline{f(x+h)} - \overline{f(x)}}{h}(1 + \varepsilon(x,h)).$$

Também, consideremos

$$|\overline{f(x+h)} - f(x+h)| = \delta(x,h) \leq \delta$$

e

$$|\overline{f(x)} - f(x)| = \delta(x,0) \leq \delta,$$

onde  $\overline{f(x+h)}$  e  $\overline{f(x)}$  são as representação em ponto flutuante dos números  $f(x+h)$  e  $f(x)$ , respectivamente. A diferença do valor da derivada e sua aproximação representada em ponto flutuante pode

ser estimada da seguinte forma:

$$\begin{aligned}
 \left|f'(x) - \overline{D_{+,h}f(x)}\right| &= \left|f'(x) - \frac{\overline{f(x+h)} - \overline{f(x)}}{h}(1 + \varepsilon(x,h))\right| \\
 &= \left|f'(x) - \left(\frac{\overline{f(x+h)} - \overline{f(x)}}{h} + \frac{f(x+h) - f(x)}{h}\right.\right. \\
 &\quad \left.\left.+ \frac{f(x) - \overline{f(x)}}{h}\right)(1 + \varepsilon)\right| \\
 &= \left|f'(x) + \left(-\frac{f(x+h) - f(x)}{h} - \frac{\overline{f(x+h)} - \overline{f(x)}}{h}\right.\right. \\
 &\quad \left.\left.+ \frac{\overline{f(x)} - f(x)}{h}\right)(1 + \varepsilon)\right| \\
 &\leq \left|f'(x) - \frac{f(x+h) - f(x)}{h}\right| + \left(\left|\frac{\overline{f(x+h)} - \overline{f(x)}}{h}\right| \right. \\
 &\quad \left.+ \left|\frac{\overline{f(x)} - f(x)}{h}\right|\right) |1 + \varepsilon| + \left|\frac{f(x+h) - f(x)}{h}\right| \varepsilon \\
 &\leq Mh + \left(\left|\delta\right| + \left|\delta\right|\right) |1 + \varepsilon| + \left|\frac{f'(x)}{h}\right| \varepsilon
 \end{aligned}$$

onde

$$M = \frac{1}{2} \max_{x \leq y \leq x+h} |f''(y)|$$

está relacionado com o erro de truncamento.

Esta estimativa mostra que se o valor de  $h$  for muito pequeno o erro ao calcular a aproximação numérica cresce. Isso nos motiva a procurar o valor ótimo de  $h$  que minimiza o erro.

**Exemplo 95.** Estude o comportamento da derivada de  $f(x) = e^{-x^2}$  no ponto  $x = 1,5$  quando  $h$  fica pequeno.

**Solução.** Segue a tabela com os valores da derivada para vários valores de  $h$ .

$h$	$10^{-2}$	$10^{-4}$	$10^{-6}$	$10^{-7}$	$10^{-8}$	$10^{-9}$
$D_{+,h}f(1,5)$	-0,3125246	-0,3161608	-0,3161973	-0,3161976	-0,3161977	-0,3161977

$h$	$10^{-10}$	$10^{-11}$	$10^{-12}$	$10^{-13}$	$10^{-14}$	$10^{-15}$
$D_{+,h}f(1,5)$	-0,3161976	-0,3161971	-0,3162332	-0,3158585	-0,3178013	-0,3747003

$h$	$10^{-2}$	$10^{-4}$	$10^{-6}$	$10^{-7}$	$10^{-8}$	$10^{-9}$
$D_{+,h}f(1,5)$	-0,3125246	-0,3161608	-0,3161973	-0,3161976	-0,3161977	-0,3161977

Observe que o valor exato é  $-0,3161977$  e o  $h$  ótimo é algo entre  $10^{-8}$  e  $10^{-9}$ .  $\diamond$

## 7.1.4 Aproximações de alta ordem

Para aproximar a derivada de uma função  $f(x)$  em  $x_0$ ,  $x_1$  ou  $x_2$  usaremos os três pontos vizinhos  $(x_0, f(x_0))$ ,  $(x_1, f(x_1))$  e  $(x_2, f(x_2))$ . Uma interpolação usando polinômios de Lagrange para esses três pontos é da forma:

$$\begin{aligned} f(x) &= f(x_0) \frac{(x - x_1)(x - x_2)}{(x_0 - x_1)(x_0 - x_2)} + f(x_1) \frac{(x - x_0)(x - x_2)}{(x_1 - x_0)(x_1 - x_2)} \\ &+ f(x_2) \frac{(x - x_0)(x - x_1)}{(x_2 - x_0)(x_2 - x_1)} + \frac{f'''(\xi(x))}{6} (x - x_0)(x - x_1)(x - x_2) \end{aligned}$$



A derivada de  $f(x)$  é

$$\begin{aligned}f'(x) &= f(x_0) \frac{2x - x_1 - x_2}{(x_0 - x_1)(x_0 - x_2)} + f(x_1) \frac{2x - x_0 - x_2}{(x_1 - x_0)(x_1 - x_2)} \\&\quad + f(x_2) \frac{2x - x_0 - x_1}{(x_2 - x_0)(x_2 - x_1)} \\&\quad + \frac{f'''(\xi(x))}{6} ((x - x_1)(x - x_2) + (x - x_0)(2x - x_1 - x_2)) \\&\quad + D_x \left( \frac{f'''(\xi(x))}{6} \right) (x - x_0)(x - x_1)(x - x_2).\end{aligned}\tag{7.2}$$

Trocando  $x$  por  $x_0$ , temos

$$\begin{aligned}f'(x_0) &= f(x_0) \frac{2x_0 - x_1 - x_2}{(x_0 - x_1)(x_0 - x_2)} + f(x_1) \frac{2x_0 - x_0 - x_2}{(x_1 - x_0)(x_1 - x_2)} \\&+ f(x_2) \frac{2x_0 - x_0 - x_1}{(x_2 - x_0)(x_2 - x_1)} \\&+ \frac{f'''(\xi(x_0))}{6} ((x_0 - x_1)(x_0 - x_2) + (x_0 - x_0)(2x_0 - x_1 - x_2)) \\&+ D_x \left( \frac{f'''(\xi(x_0))}{6} \right) (x_0 - x_0)(x_0 - x_1)(x_0 - x_2).\end{aligned}$$

Considerando uma malha equiespaçada onde  $x_1 = x_0 + h$  e  $x_2 = x_0 + 2h$ , temos:

$$\begin{aligned}f'(x_0) &= f(x_0) \frac{-3h}{(-h)(-2h)} + f(x_1) \frac{-2h}{(h)(-h)} \\&+ f(x_2) \frac{-h}{(2h)(h)} + \frac{f'''(\xi(x_0))}{6} ((-h)(-2h)) \\&= \frac{1}{h} \left[ -\frac{3}{2}f(x_0) + 2f(x_1) - \frac{1}{2}f(x_2) \right] + h^2 \frac{f'''(\xi(x_0))}{3}\end{aligned}$$

Similarmente, trocando  $x$  por  $x_1$  ou trocando  $x$  por  $x_2$  na expressão (7.2), temos outras duas expressões

$$\begin{aligned}f'(x_1) &= \frac{1}{h} \left[ -\frac{1}{2}f(x_0) + \frac{1}{2}f(x_2) \right] + h^2 \frac{f'''(\xi(x_1))}{6} \\f'(x_2) &= \frac{1}{h} \left[ \frac{1}{2}f(x_0) - 2f(x_1) + \frac{3}{2}f(x_2) \right] + h^2 \frac{f'''(\xi(x_2))}{3}\end{aligned}$$

Podemos reescrever as três fórmulas da seguinte forma:

$$\begin{aligned}f'(x_0) &= \frac{1}{h} \left[ -\frac{3}{2}f(x_0) + 2f(x_0 + h) - \frac{1}{2}f(x_0 + 2h) \right] + h^2 \frac{f'''(\xi(x_0))}{3} \\f'(x_0 + h) &= \frac{1}{h} \left[ -\frac{1}{2}f(x_0) + \frac{1}{2}f(x_0 + 2h) \right] + h^2 \frac{f'''(\xi(x_0 + h))}{6} \\f'(x_0 + 2h) &= \frac{1}{h} \left[ \frac{1}{2}f(x_0) - 2f(x_0 + h) + \frac{3}{2}f(x_0 + 2h) \right] + h^2 \frac{f'''(\xi(x_0 + 2h))}{3}\end{aligned}$$

ou ainda

$$f'(x_0) = \frac{1}{2h} [-3f(x_0) + 4f(x_0 + h) - f(x_0 + 2h)] + h^2 \frac{f'''(\xi(x_0))}{3} \quad (7.3)$$

$$f'(x_0) = \frac{1}{2h} [f(x_0 + h) - f(x_0 - h)] + h^2 \frac{f'''(\xi(x_0))}{6} \quad (7.4)$$

$$f'(x_0) = \frac{1}{2h} [f(x_0 - 2h) - 4f(x_0 - h) + 3f(x_0)] + h^2 \frac{f'''(\xi(x_0))}{3} \quad (7.5)$$

Observe que uma das fórmulas é exatamente as diferenças centrais obtida anteriormente.

Analogamente, para construir as fórmulas de cinco pontos tomamos o polinômio de Lagrange para cinco pontos e chegamos a cinco fórmulas, sendo uma delas a seguinte:

$$f'(x_0) = \frac{1}{12h} [f(x_0 - 2h) - 8f(x_0 - h) + 8f(x_0 + h) - f(x_0 + 2h)] + \frac{h^4}{30} f^{(5)}(\xi(x_0)) \quad (7.6)$$

**Exemplo 96.** Calcule a derivada numérica de  $f(x) = e^{-x^2}$  em

$x = 1,5$  pela fórmula de três e cinco pontos para  $h = 0,1$ ,  $h = 0,01$  e  $h = 0,001$ .

**Solução.** A tabela mostra os resultados:

$h$	$h = 0,1$	$h = 0,01$	$h = 0,001$
diferenças progressivas	$-0,2809448$	$-0,3125246$	$-0,3159844$
diferenças regressivas	$-0,3545920$	$-0,3199024$	$-0,3160156$
três pontos usando (7.3)	$-0,3127746$	$-0,3161657$	$-0,3161666$
três pontos usando (7.4)	$-0,3177684$	$-0,3162135$	$-0,3161666$
três pontos usando (7.5)	$-0,3135824$	$-0,3161665$	$-0,3161666$
cinco pontos usando (7.6)	$-0,3162384$	$-0,316197677$	$-0,3161976736856$

O valor exato da derivada é  $f'(1,5) = -0,3161976736856$ .



## 7.1.5 Aproximação para a segunda derivada

Para aproximar a derivada segunda, considere as expansões em série de Taylor

$$f(x_0 + h) = f(x_0) + hf'(x_0) + \frac{h^2}{2}f''(x_0) + \frac{h^3}{6}f'''(x_0) + O(h^4)$$

$$f(x_0 - h) = f(x_0) - hf'(x_0) + \frac{h^2}{2}f''(x_0) - \frac{h^3}{6}f'''(x_0) + O(h^4).$$

Somando as duas expressões, temos:

$$f(x_0 + h) + f(x_0 - h) = 2f(x_0) + h^2f''(x_0) + O(h^4)$$

ou seja, uma aproximação de segunda ordem para a derivada segunda em  $x_0$  é

$$f''(x_0) = \frac{f(x_0 + h) - 2f(x_0) + f(x_0 - h)}{h^2} + O(h^2) := D_{0,h}^2 f(x_0) + O(h^2)$$

onde

$$D_{0,h}^2 f(x_0) = \frac{f(x_0 + h) - 2f(x_0) + f(x_0 - h)}{h^2}.$$

**Exemplo 97.** Calcule a derivada segunda numérica de  $f(x) = e^{-x^2}$  em  $x = 1,5$  para  $h = 0,1$ ,  $h = 0,01$  e  $h = 0,001$ .

**Solução.** A tabela mostra os resultados:

$h$	$h = 0,1$	$h = 0,01$	$h = 0,001$
$D_{0,h}^2 f(1,5)$	0,7364712	0,7377814	0,7377944

Observe que  $f''(x) = (4x^2 - 2)e^{-x^2}$  e  $f''(1,5) = 0,7377946$ .



## 7.1.6 Derivada via ajuste ou interpolação

Dado os valores de uma função em pontos  $\{(x_i, y_i)\}_{i=1}^N$ , as derivadas  $\left(\frac{dy}{dx}\right)_i$  podem ser obtidas através da derivada de uma curva que melhor ajusta ou interpola os pontos. Esse tipo de técnica é necessário quando os pontos são muito espaçados entre si ou quando a função oscila muito. Por exemplo, dado os pontos (0,1), (1,2), (2,5), (3,9), a parábola que melhor ajusta os pontos é

$$Q(x) = 0,95 + 0,45x + 0,75x^2.$$

Usando esse ajuste para calcular as derivadas, temos:

$$Q'(x) = 0,45 + 1,5x$$


e

$$\begin{array}{ll} y'(x_1) \approx Q'(x_1) = 0,45, & y'(x_2) \approx Q'(x_2) = 1,95, \\ y'(x_3) \approx Q'(x_3) = 3,45 & \text{e} \quad y'(x_4) \approx Q'(x_4) = 4,95 \end{array}$$



Agora olhe o gráfico da seguinte tabela de pontos.

$x$	$y$
0	1,95
1	1,67
2	3,71
3	3,37
4	5,12
5	5,79
6	7,50
7	7,55
8	9,33
9	9,41
10	11,48



Observe que as derivadas calculadas por diferenças finitas oscilam

entre um valor pequeno e um grande em cada intervalo e além disso, a fórmula progressiva difere da regressiva significativamente. Por exemplo, por diferenças regressivas  $f'(7) \approx \frac{(7,55-7,50)}{1} = 0,05$  e por diferenças progressivas  $f'(7) \approx \frac{(9,33-7,55)}{1} = 1,78$ . A melhor forma de calcular a derivada aqui é fazer um ajuste de curva. A reta que melhor ajusta os dados da tabela é  $y = f(x) = 1,2522727 + 0,9655455x$ . Usando esse ajuste, temos  $f'(7) \approx 0,9655455$ .

# Exercícios

**E 7.1.1.** Expanda a função suave  $f(x)$  em um polinômio de Taylor adequado para obter as seguintes aproximações:

a)  $f'(x) = \frac{f(x+h)-f(x)}{h} + O(h)$

b)  $f'(x) = \frac{f(x)-f(x-h)}{h} + O(h)$

c)  $f'(x) = \frac{f(x+h)-f(x-h)}{2h} + O(h^2)$

d)  $f''(x) = \frac{f(x+h)-2f(x)+f(x-h)}{h^2} + O(h^2)$

**E 7.1.2.** Use os esquemas numéricos do exercício 7.1.1 para aproximar as seguintes derivadas:

a)  $f'(x)$  onde  $f(x) = \sin(x)$  e  $x = 2$ .

b)  $f'(x)$  onde  $f(x) = e^{-x}$  e  $x = 1$ .

c)  $f''(x)$  onde  $f(x) = e^{-x}$  e  $x = 1$ .

Use  $h = 10^{-2}$  e  $h = 10^{-3}$  e compare com os valores obtidos através da avaliação numérica das derivadas exatas.

**E 7.1.3.** Use a expansão da função  $f(x)$  em torno de  $x = 0$  em polinômios de Taylor para encontrar os coeficientes  $a_1$ ,  $a_2$  e  $a_3$  tais que

a)  $f'(0) = a_1f(0) + a_2f(h) + a_3f(2h) + O(h^2)$

b)  $f'(0) = a_1f(0) + a_2f(-h) + a_3f(-2h) + O(h^2)$

c)  $f'(0) = a_1f(-h_1) + a_2f(0) + a_3f(h_2) + O(h^2)$ ,  $|h_1|, |h_2| = O(h)$

d)  $f''(0) = a_1f(0) + a_2f(h) + a_3f(2h) + O(h)$

e)  $f''(0) = a_1f(0) + a_2f(-h) + a_3f(-2h) + O(h)$

**E 7.1.4.** As tensões na entrada,  $v_i$ , e saída,  $v_o$ , de um amplificador foram medidas em regime estacionário conforme tabela abaixo.

0.	0.5	1.	1.5	2.	2.5	3.	3.5	4.	4.5	5.
0.	1.05	1.83	2.69	3.83	4.56	5.49	6.56	6.11	7.06	8.29

onde a primeira linha é a tensão de entrada em volts e a segunda linha é tensão de saída em volts. Sabendo que o ganho é definido como

$$\frac{\partial v_o}{\partial v_i}.$$

Calcule o ganho quando  $v_i = 1$  e  $v_i = 4.5$  usando as seguintes técnicas:

- Derivada primeira numérica de primeira ordem usando o próprio ponto e o próximo.
- Derivada primeira numérica de primeira ordem usando o próprio ponto e o anterior.

- c) Derivada primeira numérica de segunda ordem usando o ponto anterior e o próximo.
- d) Derivada primeira analítica da função do tipo  $v_0 = a_1 v_i + a_3 v_i^3$  que melhor se ajusta aos pontos pelo critério dos mínimos quadrados.

<i>Caso</i>	<i>a</i>	<i>b</i>	<i>c</i>	<i>d</i>
$v_i = 1$				
$v_i = 4.5$				

Dica:

y=[0 1.05 1.83 2.69 3.83 4.56 5.49 6.56 6.11 7.06 8.29]

## 7.2 Problemas de valor contorno

Nesta seção usaremos a aproximação numérica da derivada para resolver problemas de valor de contorno da forma

$$\left\{ \begin{array}{l} -u_{xx} = f(x,u), \quad a < x < b. \\ u(a) = u_a \\ u(b) = u_b \end{array} \right.$$

Resolver numericamente o problema acima exige uma discretização do domínio  $[a,b]$ , ou seja, dividir o domínio em  $N$  partes iguais, definindo

$$h = \frac{b - a}{N}$$

O conjunto de abcissas  $x_i$ ,  $i = 1, \dots, N + 1$  formam uma malha para o problema discreto. Nosso objetivo é encontrar as ordenadas  $u_i =$



$u(x_i)$  que satisfazem a versão discreta:

$$\begin{cases} -\frac{u_{i+1}-2u_i+u_{i-1}}{h^2} = f(x_i, u_i), & 2 \leq i \leq N. \\ u_1 = u_a \\ u_{N+1} = u_b \end{cases}$$

O vetor solução  $(u_i)_{i=1}^{N+1}$  do problema é solução do sistema acima, que é linear se  $f$  for linear em  $u$  e não linear caso contrário.

**Exemplo 98.** Encontre uma solução numérica para o problema de contorno:

$$\begin{cases} -u_{xx} + u = e^{-x}, & 0 < x < 1. \\ u(0) = 1 \\ u(1) = 2 \end{cases}$$

**Solução.** Observe que

$$h = \frac{1}{N}$$

e a versão discreta da equação é

$$\left\{ \begin{array}{l} -\frac{u_{i+1}-2u_i+u_{i-1}}{h^2} + u_i = e^{-x_i}, \quad 2 \leq i \leq N. \\ u_1 = 1 \\ u_{N+1} = 2 \end{array} \right.$$

ou seja,

$$\left\{ \begin{array}{l} u_1 = 1 \\ -u_{i+1} + (2 + h^2)u_i - u_{i-1} = h^2 e^{-x_i}, \quad 2 \leq i \leq N. \\ u_{N+1} = 2 \end{array} \right.$$

que é um sistema linear. A sua forma matricial é:

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 & 0 \\ -1 & 2+h^2 & -1 & \cdots & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 2+h^2 & \cdots & 0 & 0 & 0 \\ \vdots & & & \ddots & & & \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & -1 & 2+h^2 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} u_1 \\ u_2 \\ u_3 \\ \vdots \\ u_N \\ u_{N+1} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ h^2e^{-x_2} \\ h^2e^{-x_3} \\ \vdots \\ h^2e^{-x_N} \\ 2 \end{bmatrix}$$

Para  $N = 10$ , temos a seguinte solução:

$$\begin{bmatrix} 1,000000 \\ 1,0735083 \\ 1,1487032 \\ 1,2271979 \\ 1,3105564 \\ 1,4003172 \\ 1,4980159 \\ 1,6052067 \\ 1,7234836 \\ 1,8545022 \\ 2,000000 \end{bmatrix}$$



# Exercícios

**E 7.2.1.** Considere o seguinte problema de valor de contorno para a equação de calor no estado estacionário:

$$\begin{cases} -u_{xx} = 32, & 0 < x < 1. \\ u(0) = 5 \\ u(1) = 10 \end{cases}$$

Defina  $u_j = u(x_j)$  onde  $x_j = (j - 1)h$  e  $j = 1, \dots, 5$ . Aproxime a derivada segunda por um esquema de segunda ordem e transforme a equação diferencial em um sistema de equações lineares. Escreva este sistema linear na forma matricial e resolva-o. Faça o mesmo com o dobro de subintervalos, isto é, com malha de 9 pontos.

**E 7.2.2.** Considere o seguinte problema de valor de contorno para a equação de calor no estado estacionário:

$$\begin{cases} -u_{xx} = 200e^{-(x-1)^2}, & 0 < x < 2. \\ u(0) = 120 \\ u(2) = 100 \end{cases}$$

Defina  $u_j = u(x_j)$  onde  $x_j = (j-1)h$  e  $j = 1, \dots, 21$ . Aproxime a derivada segunda por um esquema de segunda ordem e transforme a equação diferencial em um sistema de equações lineares. Resolva o sistema linear obtido.

**E 7.2.3.** Considere o seguinte problema de valor de contorno para a equação de calor no estado estacionário:

$$\begin{cases} -u_{xx} = 200e^{-(x-1)^2}, & 0 < x < 2. \\ u'(0) = 0 \\ u(2) = 100 \end{cases}$$

Defina  $u_j = u(x_j)$  onde  $x_j = (j-1)h$  e  $j = 1, \dots, 21$ . Aproxime a derivada segunda por um esquema de segunda ordem, a derivada primeira na fronteira por um esquema de primeira ordem e transforme a equação diferencial em um sistema de equações lineares. Resolva o sistema linear obtido.

**E 7.2.4.** Considere o seguinte problema de valor de contorno para a equação de calor no estado estacionário com um termo não-linear



de radiação:

$$\begin{cases} -u_{xx} = 100 - \frac{u^4}{10000}, & 0 < x < 2. \\ u(0) = 0 \\ u(2) = 10 \end{cases}$$

Defina  $u_j = u(x_j)$  onde  $x_j = (j - 1)h$  e  $j = 1, \dots, 21$ . Aproxime a derivada segunda por um esquema de segunda ordem e transforme a equação diferencial em um sistema de equações não lineares. Resolva o sistema obtido. Expresse a solução com dois algarismos depois do separador decimal. Dica: Veja problema 38 da lista 2, seção de sistemas não lineares.

**E 7.2.5.** Considere o seguinte problema de valor de contorno para a equação de calor no estado estacionário com um termo não-linear

de radiação e um termo de convecção:

$$\left\{ \begin{array}{l} -u_{xx} + 3u_x = 100 - \frac{u^4}{10000}, \quad 0 < x < 2. \\ u'(0) = 0 \\ u(2) = 10 \end{array} \right.$$

Defina  $u_j = u(x_j)$  onde  $x_j = (j - 1)h$  e  $j = 1, \dots, 21$ . Aproxime a derivada segunda por um esquema de segunda ordem, a derivada primeira na fronteira por um esquema de primeira ordem, a derivada primeira no interior por um esquema de segunda ordem e transforme a equação diferencial em um sistema de equações não lineares. Resolva o sistema obtido.

**E 7.2.6.** Considere o seguinte problema de valor de contorno:

$$\begin{cases} -u'' + 2u' = e^{-x} - \frac{u^2}{100}, & 1 < x < 4. \\ u'(1) + u(1) = 2 \\ u'(4) = -1 \end{cases}$$

Defina  $u_j = u(x_j)$  onde  $x_j = 1 + (j - 1)h$  e  $j = 1, \dots, 101$ . Aproxime a derivada segunda por um esquema de segunda ordem, a derivada primeira na fronteira por um esquema de primeira ordem, a derivada primeira no interior por um esquema de segunda ordem e transforme a equação diferencial em um sistema de equações não lineares. Resolva o sistema obtido.

## 7.3 Integração numérica

Considere o problema de calcular a área entre uma função positiva, o eixo  $x$  e as retas  $x = a$  e  $x = b$ . O valor exato dessa área é calculada fazendo uma aproximação por retângulos com bases iguais e depois tomando o limite quando o número de retângulos tende ao infinito:

$$A = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^n f(x_i) h_n,$$

onde  $h_n = \frac{b-a}{n}$  é o tamanho da base dos retângulo e  $f(x_i)$ ,  $1 \leq i \leq n$ ,  $a + (i-1)h \leq x_i \leq a + ih$ , é a altura dos retângulos. Essa definição é generalizada para cálculo de integrais num intervalo  $[a, b]$ :

$$\int_a^b f(x) dx = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^n f(x_i) h_n.$$

A Figura 7.1 mostra um exemplo quando  $f(x) = x^2 + 1$ ,  $0 \leq x \leq 2$ . Temos a aproximação por um retângulo com base  $h_1 = 2$ , depois


com dois retângulos de base  $h_2 = 1$  e, finalmente com quatro retângulo de bases  $h_3 = 0,5$ .

Os valores aproximados para a integral são dados na seguinte tabela:

	$h_1 = 2$	$h_2 = 1$	$h_3 = 0,5$	$h_4 = 0,25$
$\int_0^2 (x^2 + 1) dx$	$h_1 f(1) = 4$	$h_2 f(0,5) + h_2 f(1,5) = 4,5$	4,625	4,66666667

Observe que:

$$\int_0^2 (x^2 + 1) dx = \left[ \frac{x^3}{3} + x \right]_0^2 = \frac{8}{3} + 2 = 4,66666667$$



### 7.3.1 Regras de Newton-Cotes

A integral de uma função num intervalo  $[a, b]$ , também chamada de quadratura numérica, é aproximada pela soma:

$$\int_a^b f(x) dx \approx \sum_{i=1}^n a_i f(x_i),$$

onde  $x_i$ ,  $1 \leq i \leq n$ , são pontos distintos do intervalo  $[a, b]$ . Nesta definição, a integral  $\int_0^2 (x^2 + 1) dx$  usando uma aproximação por retângulo usa apenas um ponto, o ponto médio do intervalo ( $x_1 = 1$ ), e a soma se reduz a uma parcela  $((2 - 0)f(1))$ . A fórmula geral para esse caso, chamado de regra do ponto médio é:

$$\int_a^b f(x) dx \approx (b - a) f\left(\frac{a + b}{2}\right) := hf(x_1). \quad (7.7)$$

## Regra do ponto médio

A regra do ponto médio (7.7) pode ser deduzida mais formalmente usando a expansão de Taylor

$$f(x) = f(x_1) + f'(x_1)(x - x_1) + \frac{f''(\xi(x))}{2}(x - x_1)^2$$

que leva a integral

$$\int_a^b f(x)dx = \int_a^b f(x_1)dx + f'(x_1) \int_a^b (x - x_1)dx + \int_a^b \frac{f''(\xi(x))}{2}(x - x_1)^2 dx$$



Usando o teorema do valor médio para integrais e que  $h = b - a$  e  $x_1 = (a + b)/2$ , temos:

$$\begin{aligned}\int_a^b f(x)dx &= hf(x_1) + f'(x_1) \int_a^b (x - x_1)dx + f''(\eta) \int_a^b \frac{1}{2}(x - x_1)^2 dx \\&= hf(x_1) + f'(x_1) \left[ \frac{(x - x_1)^2}{2} \right]_a^b + f''(\eta) \left[ \frac{1}{6}(x - x_1)^3 \right]_a^b \\&= hf(x_1) + f'(x_1) \left[ \frac{(b - x_1)^2}{2} - \frac{(a - x_1)^2}{2} \right] \\&\quad + f''(\eta) \left[ \frac{1}{6}(b - x_1)^3 - \frac{1}{6}(a - x_1)^3 \right] \\&= hf(x_1) + \frac{h^3 f''(\eta)}{3}.\end{aligned}$$

para  $a \leq \eta \leq b$ .

**Exemplo 99.** Use a regra do ponto médio para aproximar a integral

$$\int_0^1 e^{-x^2} dx.$$

Depois divida a integral em duas

$$\int_0^{1/2} e^{-x^2} dx + \int_{1/2}^1 e^{-x^2} dx.$$

e aplique a regra do ponto médio em cada uma delas. Finalmente, repita o processo dividindo em quatro integrais.

Usando o intervalo  $[0,1]$ , temos  $h = 1$  e  $x_1 = 1/2$ . A regra do ponto médio resulta em

$$\int_0^1 e^{-x^2} dx \approx 1 \cdot e^{-1/4} = 0,7788008$$

Usando dois intervalos,  $[0,1/2]$  e  $[1/2,1]$  e usando a regra do ponto médio em cada um dos intervalos, temos:

$$\int_0^1 e^{-x^2} dx \approx 0,5 \cdot e^{-1/16} + 0,5 \cdot e^{-9/16} = 0,4697065 + 0,2848914 = 0,7545979$$

Agora, usando quatro intervalos, temos

$$\int_0^1 e^{-x^2} dx \approx 0,25 \cdot e^{-1/64} + 0,25 \cdot e^{-9/64} + 0,25 \cdot e^{-25/64} + 0,25 \cdot e^{-49/64} = 0,7468241$$

Observe que o valor da integral é

$$\int_0^1 e^{-x^2} dx = 0,7468241330.$$

A forma natural de obter as regras de integração é usar o polinômio de Lagrange que passa pelo pontos  $\{(x_i, f(x_i))\}_{i=1}^n$

$$f(x) = P_n(x) + \text{termo de erro} = \sum_{i=1}^n f(x_i) L_i(x) + \prod_{i=1}^n (x - x_i) \frac{f^{(n+1)}(\xi(x))}{(n+1)!}$$

e integramos

$$\int_a^b f(x) dx = \sum_{i=1}^n \left[ f(x_i) \int_a^b L_i(x) dx \right] + \frac{1}{(n+1)!} \int_a^b \prod_{i=1}^n (x - x_i) f^{(n+1)}(\xi(x)) dx$$

A fórmula de quadratura então é

$$\int_a^b f(x) dx \approx \sum_{i=1}^n a_i f(x_i),$$


onde

$$a_i = \int_a^b L_i(x) dx$$

## Regra do Trapézio

A regra do trapézio consiste em aproximar a integral por um trapézio em vez de um retângulo, como fizemos. Para isso, o polinômio de Lagrange deve ser uma reta, como mostra a figura.

$f(x)$



O polinômio de Lagrange de primeira ordem que passa por  $(x_0, f(x_0))$  :  $(a, f(a))$  e  $(x_1, f(x_1)) := (b, f(b))$  é dado por

$$P_1(x) = f(x_0) \frac{(x - x_1)}{(x_0 - x_1)} + f(x_1) \frac{(x - x_0)}{(x_1 - x_0)} = f(x_0) \frac{(x - x_1)}{h} - f(x_1) \frac{(x - x_0)}{h}$$

onde  $h = x_1 - x_0$ . Podemos integrar a função  $f(x)$  aproximando-a por esse polinômio:

$$\begin{aligned} \int_a^b f(x) dx &= f(x_0) \int_a^b \frac{(x - x_1)}{h} dx - f(x_1) \int_a^b \frac{(x - x_0)}{h} dx \\ &\quad + \frac{1}{2!} \int_a^b (x - x_0)(x - x_1) f''(\xi(x)) dx. \end{aligned}$$

Pelo teorema do valor médio, existe  $a \leq \eta \leq b$  tal que  $\int_a^b f(\xi(x))g(x)dx = f(\eta) \int_a^b g(x)dx$  e, portanto,

$$\begin{aligned}
 \int_a^b f(x)dx &= f(x_0) \left[ \frac{(x-x_0)^2}{2h} \right]_{x_0}^{x_1} - f(x_1) \left[ \frac{(x-x_1)^2}{2h} \right]_{x_0}^{x_1} \\
 &+ \frac{f''(\eta)}{2} \left[ \frac{x^3}{3} - \frac{x^2}{2}(x_1+x_0) + x_0x_1x \right]_{x_0}^{x_1} \\
 &= f(x_0) \frac{(x_1-x_0)^2}{2h} + f(x_1) \frac{(x_0-x_1)^2}{2h} \\
 &+ \frac{f''(\eta)}{2} \left( \frac{x_1^3}{3} - \frac{x_1^2}{2}(x_1+x_0) + x_0x_1x_1 - \frac{x_0^3}{3} + \frac{x_0^2}{2}(x_1+x_0) - x_0x_1x_0 \right) \\
 &= f(x_0) \frac{h^2}{2h} + f(x_1) \frac{h^2}{2h} \\
 &+ \frac{f''(\eta)}{2} \frac{2x_1^3 - 3x_1^2(x_1+x_0) + 6x_1^2x_0 - 2x_0^3 + 3x_0^2(x_1+x_0) - 6x_0^2x_1}{6} \\
 &= \frac{h}{2}(f(x_0) + f(x_1)) + \frac{f''(\eta)}{12} (x_0^3 - 3x_0^2x_1 + 3x_1^2x_0 - x_1^3) \\
 &= \frac{h}{2}(f(x_0) + f(x_1)) - \frac{h^3 f''(\eta)}{12}
 \end{aligned}$$



**Exemplo 100.** Use a regra do trapézio para aproximar a integral

$$\int_0^1 e^{-x^2} dx.$$

Depois divida a integral em duas

$$\int_0^{1/2} e^{-x^2} dx + \int_{1/2}^1 e^{-x^2} dx.$$

e aplica a regra do trapézio em cada uma delas. Finalmente, repita o processo dividindo em quatro integrais.

Usando o intervalo  $[0,1]$ , temos  $h = 1$ ,  $x_0 = 0$  e  $x_1 = 1$ . A regra do trapézio resulta em

$$\int_0^1 e^{-x^2} dx \approx \frac{1}{2}(e^0 + e^{-1}) = 0,6839397$$

Usando dois intervalos,  $[0,1/2]$  e  $[1/2,1]$  e usando a regra do trapézio em cada um dos intervalos, temos:

$$\begin{aligned}\int_0^1 e^{-x^2} dx &\approx \frac{0,5}{2} (e^0 + e^{-1/4}) + \frac{0,5}{2} (e^{-1/4} + e^{-1}) \\ &= 0,4447002 + 0,2866701 = 0,7313703.\end{aligned}$$

Agora, usando quatro intervalos, temos

$$\begin{aligned}\int_0^1 e^{-x^2} dx &\approx \frac{0,25}{2} (e^0 + e^{-1/16}) + \frac{0,25}{2} (e^{-1/16} + e^{-1/4}) \\ &+ \frac{0,25}{2} (e^{-1/4} + e^{-9/16}) + \frac{0,25}{2} (e^{-9/16} + e^{-1}) \\ &= 0,7429841\end{aligned}$$

## Regra de Simpson

A regra de Simpson consiste em aproximar a integral usando três pontos do intervalo:

$$x_0 = a, \quad x_1 := \frac{a+b}{2} = x_0 + h \quad \text{e} \quad x_2 := b = x_1 + h.$$

com  $h = (b - a)/2$ . Para isso, o polinômio de Lagrange deve ser uma parábola:

$$\begin{aligned} P_2(x) = & f(x_0) \frac{(x - x_1)(x - x_2)}{(x_0 - x_1)(x_0 - x_2)} + f(x_1) \frac{(x - x_0)(x - x_2)}{(x_1 - x_0)(x_1 - x_2)} \\ & + f(x_2) \frac{(x - x_0)(x - x_1)}{(x_2 - x_0)(x_2 - x_1)}. \end{aligned}$$

Se usarmos a mesma metodologia da regra dos trapézios, calcularemos

$$\int_a^b f(x)dx = \int_a^b P_2(x)dx + \int_a^b \frac{(x - x_0)(x - x_1)(x - x_2)}{6} f'''(\xi(x))dx$$

e obteremos o fórmula de Simpson com um erro de quarta ordem. O fato é que a regra de Simpson tem ordem cinco e, para isso, usaremos uma abordagem alternativa. Considere o polinômio de Taylor

$$f(x) = f(x_1) + f'(x_1)(x - x_1) + \frac{f''(x_1)}{2}(x - x_1)^2 + \frac{f'''(x_1)}{6}(x - x_1)^3 + \frac{f^{(4)}(\xi)}{24}(x - x_1)^4$$

onde  $x_0 \leq \xi(x) \leq x_2$  e integre no intervalo  $[a, b] = [x_0, x_2]$ :

$$\begin{aligned} \int_a^b f(x) dx &= \left[ f(x_1)(x - x_1) + f'(x_1) \frac{(x - x_1)^2}{2} + \frac{f''(x_1)}{6}(x - x_1)^3 \right. \\ &\quad \left. + \frac{f'''(x_1)}{24}(x - x_1)^4 \right]_{x_0}^{x_2} \\ &\quad + \frac{1}{24} \int_{x_0}^{x_2} f^{(4)}(\xi(x))(x - x_1)^4 dx, \end{aligned}$$

Pelo teorema do valor médio, existe  $x_0 \leq \eta \leq x_2$  tal que

$$\begin{aligned}\int_a^b f(x)dx &= \left[ f(x_1)(x - x_1) + f'(x_1)\frac{(x - x_1)^2}{2} + \frac{f''(x_1)}{6}(x - x_1)^3 \right. \\ &\quad \left. + \frac{f'''(x_1)}{24}(x - x_1)^4 \right]_{x_0}^{x_2} \\ &\quad + \frac{f^{(4)}(\eta)}{24} \int_{x_0}^{x_2} (x - x_1)^4 dx \\ &= \left[ f(x_1)(x - x_1) + f'(x_1)\frac{(x - x_1)^2}{2} + \frac{f''(x_1)}{6}(x - x_1)^3 \right. \\ &\quad \left. + \frac{f'''(x_1)}{24}(x - x_1)^4 \right]_{x_0}^{x_2} \\ &\quad + \frac{f^{(4)}(\eta)}{120} \left[ (x - x_1)^5 \right]_{x_0}^{x_2}\end{aligned}$$

Usando o fato que

$$(x_2 - x_1)^3 - (x_0 - x_1)^3 = 2h^3,$$

$$(x_2 - x_1)^4 - (x_0 - x_1)^4 = 0$$

e

$$(x_2 - x_1)^5 - (x_0 - x_1)^5 = 2h^5,$$

temos

$$\int_a^b f(x)dx = 2hf(x_1) + \frac{h^3}{3}f''(x_1) + \frac{h^5 f^{(4)}(\eta)}{60}.$$

Usando as diferenças finitas centrais para a derivada segunda:

$$f''(x_1) = \frac{f(x_0) - 2f(x_1) + f(x_2)}{h^2} + \frac{h^2}{12}f^{(4)}(\eta_1),$$

$x_0 \leq \eta_1 \leq x_2$ , temos

$$\begin{aligned} \int_a^b f(x)dx &= 2hf(x_1) + \frac{h^3}{3} \left( \frac{f(x_0) - 2f(x_1) + f(x_2)}{h^2} + \frac{h^2}{12}f^{(4)}(\eta_1) \right) \\ &+ \frac{h^5 f^{(4)}(\eta)}{60} \\ &= \frac{h}{3} (f(x_0) + 4f(x_1) + f(x_2)) - \frac{h^5}{12} \left( \frac{1}{3}f^{(4)}(\eta_1) - \frac{1}{5}f^{(4)}(\eta) \right) \end{aligned}$$

Pode-se mostrar que é possível escolher  $\eta_2$  que substitua  $\eta$  e  $\eta_1$  com a seguinte estimativa

$$\int_a^b f(x)dx = \frac{h}{3} (f(x_0) + 4f(x_1) + f(x_2)) - \frac{h^5}{90} f^{(4)}(\eta_2).$$

**Exemplo 101.** Use a regra de Simpson para aproximar a integral

$$\int_0^1 e^{-x^2} dx.$$

Depois divida a integral em duas

$$\int_0^{1/2} e^{-x^2} dx + \int_{1/2}^1 e^{-x^2} dx.$$

e aplica a regra de Simpson em cada uma delas.

Usando o intervalo  $[0,1]$ , temos  $h = 1/2$ ,  $x_0 = 0$ ,  $x_1 = 1/2$  e  $x_2 = 1$ . A regra de Simpson resulta em

$$\int_0^1 e^{-x^2} dx \approx \frac{0,5}{3} (e^0 + 4e^{-1/4} + e^{-1}) = 0,7471804$$

Usando dois intervalos,  $[0,1/2]$  e  $[1/2,1]$  e usando a regra do trapézio em cada um dos intervalos, temos:

$$\int_0^1 e^{-x^2} dx \approx \frac{0,25}{3}(e^0 + 4e^{-1/16} + e^{-1/4}) + \frac{0,25}{3}(e^{-1/4} + 4e^{-9/16} + e^{-1}) = 0,7853981634$$



### 7.3.2 Regras compostas

Vimos que em todas as estimativas de erro que derivamos, o erro depende do tamanho do intervalo de integração. Uma estratégia para reduzir o erro consiste em particionar o intervalo de integração em diversos subintervalos menores:

$$\int_a^b f(x)dx = \sum_{i=1}^n \int_{x_i}^{x_{i+1}} f(x)dx$$

onde  $x_i = a + (i - 1)h$ ,  $h = (b - a)/n$  e  $i = 1, 2, \dots, n + 1$ , sendo  $n$  o número de subintervalos da partição do intervalo de integração. Depois, aplica-se um método simples de integração em cada subintervalo.

## Método composto dos trapézios

A **regra composta dos trapézios** assume a seguinte forma:

$$\begin{aligned}\int_a^b f(x) dx &= \sum_{i=1}^n \int_{x_i}^{x_{i+1}} f(x) dx \\ &\approx \sum_{i=1}^n \frac{x_{i+1} - x_i}{2} [f(x_i) + f(x_{i+1})]\end{aligned}$$

Como  $h = x_{i+1} - x_i$ , temos:

$$\begin{aligned}\int_a^b f(x) dx &\approx \frac{h}{2} \sum_{k=1}^{N_i} [f(x_k) + f(x_{k+1})] \\ &= \frac{h}{2} [f(x_1) + 2f(x_2) + 2f(x_3) + \cdots + 2f(x_{N_i}) + f(x_{N_i+1})] \\ &= \frac{h}{2} [f(x_1) + f(x_{N_i+1})] + h \sum_{i=2}^{N_i} f(x_i)\end{aligned}$$

## Código Scilab: Trapézio Composto

O código Scilab abaixo é uma implementação do método do trapézio composto para calcular:

$$\int_a^b f(x) dx = \frac{h}{2} [f(x_1) + f(x_{n+1})] + h \sum_{i=2}^n f(x_i) + O(h^3),$$

onde  $h = (b - a)/n$  e  $x_i = a + (i - 1)h$ ,  $i = 1, 2, \dots, n + 1$ . Os parâmetros de entrada são: **f** o integrando definido como uma função no Scilab, **a** o limite inferior de integração, **b** o limite superior de integração, **n** o número de subintervalos desejado. A variável de saída é **y** e corresponde a aproximação calculada de  $\int_a^b f(x) dx$ .

```
function [y] = trap_comp(f,a,b,n)
    h = (b-a)/n
    x = linspace(a,b,n+1)
    y = h*(f(x(1)) + f(x(n+1)))/2
    for i = 2:n
```

```
y = y + h*f(x(i))
```

```
end
```

```
endfunction
```

## Método composto de Simpson

Já a regra composta de Simpson assume a seguinte forma:

$$\begin{aligned}\int_a^b f(x) dx &= \sum_{k=1}^n \int_{x_k}^{x_{k+1}} f(x) dx \\ &\approx \sum_{k=1}^n \frac{x_{k+1} - x_k}{6} \left[ f(x_k) + 4f\left(\frac{x_{k+1} + x_k}{2}\right) + f(x_{k+1}) \right]\end{aligned}$$

onde, como anteriormente,  $x_k = a + (k - 1)h$ ,  $h = (b - a)/n$  e  $i = 1, 2, \dots, n + 1$ , sendo  $n$  o número de subintervalos da partição do intervalo de integração. Podemos simplificar o somatório acima, escrevendo:

$$\int_a^b f(x) dx \approx \frac{h}{3} \left[ f(x_1) + 2 \sum_{i=1}^{n-1} f(x_{2i+1}) + 4 \sum_{i=1}^n f(x_{2i}) + f(x_{2n+1}) \right] + O(\dots)$$

onde, agora,  $h = (b - a)/(2n)$ ,  $x_i = a + (i - 1)h$ ,  $i = 1, 2, \dots, 2n + 1$ .

## Código Scilab: Simpson Composto

O código Scilab abaixo é uma implementação do método de Simpson composto para calcular:

$$\int_a^b f(x) dx = \frac{h}{3} \left[ f(x_1) + 2 \sum_{i=1}^{n-1} f(x_{2i+1}) + 4 \sum_{i=1}^n f(x_{2i}) + f(x_{2n+1}) \right] + O(h^4)$$

onde  $h = (b - a)/(2n)$  e  $x_i = a + (i - 1)h$ ,  $i = 1, 2, \dots, 2n + 1$ . Os parâmetros de entrada são: **f** o integrando definido como uma função no Scilab, **a** o limite inferior de integração, **b** o limite superior de integração, **n** o número de subintervalos desejado. A variável de saída é **y** e corresponde a aproximação calculada de  $\int_a^b f(x) dx$ .

**Exemplo 102.** Calcule numericamente a integral

$$\int_0^2 x^2 e^{x^2} dx$$

pelos regras compostas do ponto médio, trapézio e Simpson variando o número de intervalos

$N_i = 1, 2, 3, 6, 12, 24, 48, 96$ .

**Solução.**

$n$	Ponto Médio	Trapézios	Simpson
1	5,4365637	218,3926	76,421909
2	21,668412	111,91458	51,750469
3	31,678746	80,272022	47,876505
6	41,755985	55,975384	46,495785
12	45,137529	48,865685	46,380248
24	46,057757	47,001607	46,372373
48	46,292964	46,529682	46,37187
96	46,352096	46,411323	46,371838



### 7.3.3 O método de Romberg

O método de Romberg é um método simplificado para construir quadraturas de alta ordem.

Considere o método de trapézios composto aplicado à integral

$$\int_a^b f(x)dx$$

Defina  $I(h)$  a aproximação desta integral pelo método dos trapézios composto com malha de largura constante igual a  $h$ . Aqui  $h = \frac{b-a}{N_i}$  para algum  $N_i$  inteiro, i.e.:

$$I(h) = \frac{h}{2} \left[ f(a) + 2 \sum_{j=2}^{N_i} f(x_j) + f(b) \right], \quad N_i = \frac{b-a}{h}$$

**Teorema 12.** *Se  $f(x)$  é uma função analítica no intervalo  $(a,b)$ , então a função  $I(h)$  admite uma representação na forma*

$$I(h) = I_0 + I_2 h^2 + I_4 h^4 + I_6 h^6 + \dots$$



Para uma demonstração, veja [4]. Em especial observamos que

$$\int_a^b f(x)dx = \lim_{h \rightarrow 0} I(h) = I_0$$

Ou seja, o valor exato da integral procurada é dado pelo coeficiente  $I_0$ .

A ideia central do método de Romberg, agora, consiste em usar a extrapolação de Richardson para construir métodos de maior ordem a partir dos métodos dos trapézios para o intervalo  $(a,b)$

**Exemplo 103.** Construção do método de quarta ordem.

$$I(h) = I_0 + I_2h^2 + I_4h^4 + I_6h^6 + \dots$$

$$I\left(\frac{h}{2}\right) = I_0 + I_2\frac{h^2}{4} + I_4\frac{h^4}{16} + I_6\frac{h^6}{64} + \dots$$

Usamos agora uma eliminação gaussiana para obter o termo  $I_0$ :

$$\frac{4I(h/2) - I(h)}{3} = I_0 - \frac{1}{4}I_4h^4 - \frac{5}{16}I_6h^6 + \dots$$

Vamos agora aplicar a fórmula para  $h = b - a$ ,

$$\begin{aligned} I(h) &= \frac{h}{2} [f(a) + f(b)] \\ I(h/2) &= \frac{h}{4} [f(a) + 2f(c) + f(b)], \quad c = \frac{a+b}{2} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \frac{4I(h/2) - I(h)}{3} &= \frac{h}{3} [f(a) + 2f(c) + f(b)] - \frac{h}{6} [f(a) + f(b)] \\ &= \frac{h}{6} [f(a) + 4f(c) + f(b)] \end{aligned}$$

Observe que esquema coincide com o método de Simpson.

A partir de agora, usaremos a seguinte notação

$$\begin{aligned}R_{1,1} &= I(h) \\R_{2,1} &= I(h/2) \\R_{3,1} &= I(h/4) \\&\vdots \\R_{n,1} &= I(h/2^{n-1})\end{aligned}$$

Observamos que os pontos envolvidos na quadratura  $R_{k,1}$  são os mesmos pontos envolvidos na quadratura  $R(k-1,1)$  acrescidos dos pontos centrais, assim, temos a seguinte fórmula de recorrência:

$$R_{k,1} = \frac{1}{2}R_{k-1,1} + \frac{h}{2^{k-1}} \sum_{i=1}^{2^{k-2}} f\left(a + (2i-1)\frac{h}{2^{k-1}}\right)$$

Definimos  $R_{k,2}$  para  $k \geq 2$  como o esquema de ordem quatro obtido da fórmula do exemplo 103:

$$R_{k,2} = \frac{4R_{k,1} - R_{k-1,1}}{3}$$

Os valores  $R_{k,2}$  representam então os valores obtidos pelo método de Simpson composto aplicado a uma malha composta de  $2^{k-1} + 1$  pontos.

Similarmente os valores de  $R_{k,j}$  são os valores obtidos pela quadratura de ordem  $2j$  obtida via extrapolação de Richardson. Pode-se mostrar que

$$R_{k,j} = R_{k,j-1} + \frac{R_{k,j-1} - R_{k-1,j-1}}{4^{j-1} - 1}.$$

**Exemplo 104.** Construa o esquema de Romberg para aproximar o valor de  $\int_0^2 e^{-x^2} dx$  com erro de ordem 8.

O que nos fornece os seguintes resultados:

55,59815	0,000000	0
30,517357	22,157092	0
20,644559	17,353626	17
17,565086	16,538595	16

Ou seja, temos:

$$\int_0^2 e^{x^2} dx \approx 16,475543$$

usando uma aproximação de ordem 8.

**Exemplo 105.** Construa o esquema de Romberg para aproximar o valor de  $\int_0^2 x^2 e^{x^2} dx$  com erro de ordem 12.

O que nos fornece:

218,3926				
111,91458	76,421909			
66,791497	51,750469	50,105706		
51,892538	46,926218	46,604601	46,549028	
47,782846	46,412949	46,378731	46,375146	4
46,72661	46,374531	46,37197	46,371863	

Ou seja, temos:

$$\int_0^2 x^2 e^{x^2} dx \approx 46,371847$$

com uma aproximação de ordem 12.

### 7.3.4 Ordem de precisão

Todos os métodos de quadratura que vimos até o momento são da forma

$$\int_a^b f(x)dx \approx \sum_{j=1}^N w_j f(x_j)$$

**Exemplo 106.** (a) Método do trapézio

$$\begin{aligned}\int_a^b f(x)dx &\approx [f(a) + f(b)] \frac{b-a}{2} \\ &= \frac{b-a}{2} f(a) + \frac{b-a}{2} f(b) \\ &:= w_1 f(x_1) + w_2 f(x_2) = \sum_{j=1}^2 w_j f(x_j)\end{aligned}$$

(b) Método do trapézio com dois intervalos

$$\begin{aligned}\int_a^b f(x)dx &\approx \left[ f(a) + 2f\left(\frac{a+b}{2}\right) + f(b) \right] \frac{b-a}{4} \\ &= \frac{b-a}{4}f(a) + \frac{b-a}{2}f\left(\frac{a+b}{2}\right) + \frac{b-a}{4}f(b) \\ &:= w_1f(x_1) + w_2f(x_2) + w_3f(x_3) = \sum_{j=1}^3 w_jf(x_j)\end{aligned}$$

(c) Método de Simpson

$$\begin{aligned}\int_a^b f(x)dx &\approx \left[ f(a) + 4f\left(\frac{a+b}{2}\right) + f(b) \right] \frac{b-a}{6} \\ &= \frac{b-a}{6}f(a) + \frac{2(b-a)}{3}f\left(\frac{a+b}{2}\right) + \frac{b-a}{6}f(b) \\ &:= \sum_{j=1}^3 w_jf(x_j)\end{aligned}$$



(d) Método de Simpson com dois intervalos

$$\begin{aligned}\int_a^b f(x)dx &\approx \left[ f(a) + 4f\left(\frac{3a+b}{4}\right) + 2f\left(\frac{a+b}{2}\right) \right. \\ &\quad \left. + 4f\left(\frac{a+3b}{4}\right) + f(b) \right] \frac{b-a}{12} \\ &= \frac{b-a}{12}f(a) + \frac{b-a}{3}f\left(\frac{3a+b}{4}\right) + \frac{b-a}{6}f\left(\frac{a+b}{2}\right) \\ &\quad + \frac{b-a}{3}f\left(\frac{a+3b}{4}\right) + \frac{b-a}{12}f(b) \\ &:= \sum_{j=1}^5 w_j f(x_j)\end{aligned}$$

A principal técnica que temos usado para desenvolver os métodos numéricos é o **polinômio de Taylor**:

$$f(x) = a_0 + a_1x + a_2x^2 + \dots + a_nx^n + R_n(x)$$

Integrando termo a termo, temos:

$$\begin{aligned}\int_a^b f(x)dx &= \int_a^b a_0 dx + \int_a^b a_1 x dx + \int_a^b a_2 x^2 dx + \dots + \\ &\quad \int_a^b a_n x^n dx + \int_a^b R_n(x) dx \\ &= a_0(b-a) + a_1 \frac{b^2 - a^2}{2} + a_2 \frac{b^3 - a^3}{3} + \dots + \\ &\quad a_n \frac{b^{n+1} - a^{n+1}}{n+1} + \int_a^b R_n(x) dx\end{aligned}$$

Neste momento, é natural investigar o desempenho de um esquema numérico aplicado a funções do tipo  $f(x) = x^n$ .

**Definição 10.** *A ordem de precisão ou ordem de exatidão de um esquema de quadratura numérica como o maior inteiro positivo  $n$  para o qual o esquema é exato para todas as funções do tipo  $x^k$  com  $0 \leq k \leq n$ , ou seja, Um esquema é dito de ordem  $n$  se*

$$\sum_{j=1}^n w_j f(x_j) = \int_a^b f(x) dx, \quad f(x) = x^k, \quad k = 0, 1, \dots, n$$

*ou, equivalentemente:*

$$\sum_{j=1}^n w_j x_j^k = \int_a^b x^k dx = \frac{b^{k+1} - a^{k+1}}{k+1}, \quad k = 0, 1, \dots, n$$

*Observação 24.* Se o método tem ordem 0 ou mais, então

$$\sum_{j=1}^n w_j = b - a$$

**Exemplo 107.** A ordem de precisão do esquema de trapézios é 1:

$$\int_a^b f(x)dx \approx [f(a) + f(b)] \frac{b-a}{2} = \sum_{j=1}^2 w_j f(x_j)$$

onde  $w_j = \frac{b-a}{2}$ ,  $x_1 = a$  e  $x_2 = b$ .

$$(k = 0) : \quad \sum_{j=1}^n w_j = b - a$$

$$(k = 1) : \quad \sum_{j=1}^n w_j x_j = (a + b) \frac{b-a}{2} = \frac{b^2 - a^2}{2}$$

$$(k = 2) : \quad \sum_{j=1}^n w_j x_j^2 = (a^2 + b^2) \frac{b-a}{2} \neq \frac{b^3 - a^3}{3}$$

**Exemplo 108.** A ordem de precisão do esquema de Simpson é 3:

$$\int_a^b f(x)dx \approx \left[ f(a) + 4f\left(\frac{a+b}{2}\right) + f(b) \right] \frac{b-a}{6} = \sum_{j=1}^3 w_j f(x_j)$$

onde  $w_1 = w_3 = \frac{b-a}{6}$ ,  $w_2 = 4\frac{b-a}{6}$ ,  $x_1 = a$ ,  $x_2 = \frac{a+b}{2}$  e  $x_3 = b$

$$(k=0): \quad \sum_{j=1}^n w_j = (1 + 4 + 1)\frac{b-a}{6} = b - a$$

$$(k=1): \quad \sum_{j=1}^n w_j x_j = (a + 4\frac{a+b}{2} + b)\frac{b-a}{6} = (a+b)\frac{b-a}{2} = \frac{b^2-a^2}{2}$$

$$(k=2): \quad \sum_{j=1}^n w_j x_j^2 = (a^2 + 4\left(\frac{a+b}{2}\right)^2 + b^2)\frac{b-a}{6} = \frac{b^3-a^3}{3}$$

$$(k=3): \quad \sum_{j=1}^n w_j x_j^3 = (a^3 + 4\left(\frac{a+b}{2}\right)^3 + b^3)\frac{b-a}{6} = \frac{b^4-a^4}{4}$$

$$(k=4): \quad \sum_{j=1}^n w_j x_j^4 = (a^4 + 4\left(\frac{a+b}{2}\right)^4 + b^4)\frac{b-a}{6} \neq \frac{b^5-a^5}{5}$$

**Exemplo 109.** Encontre os pesos  $w_j$  e as abscissas  $x_j$  tais que o esquema de dois pontos

$$\int_{-1}^1 f(x)dx = w_1 f(x_1) + w_2 f(x_2)$$

é de ordem 3.

**Solução.** Temos um sistema de quatro equações e quatro incógnitas dado por:

$$\begin{aligned}w_1 + w_2 &= 2 \\x_1 w_1 + x_2 w_2 &= 0 \\x_1^2 w_1 + x_2^2 w_2 &= \frac{2}{3} \\x_1^3 w_1 + x_2^3 w_2 &= 0\end{aligned}$$

Da segunda e quarta equação, temos:

$$\frac{w_1}{w_2} = -\frac{x_2}{x_1} = -\frac{x_2^3}{x_1^3}$$

Como  $x_1 \neq x_2$ , temos  $x_1 = -x_2$  e  $w_1 = w_2$ . Da primeira equação, temos  $w_1 = w_2 = 1$ . Da terceira equação, temos  $-x_1 = x_2 = \frac{\sqrt{3}}{3}$ .

Esse esquema de ordem de precisão três e dois pontos chama-se quadratura de Gauss-Legendre com dois pontos:

$$\int_{-1}^1 f(x)dx = f\left(\frac{\sqrt{3}}{3}\right) + f\left(-\frac{\sqrt{3}}{3}\right)$$



**Exemplo 110.** Comparação

$f(x)$	Exato	Trapézio	Simpson	Gauss-L
$e^x$	$e - e^{-1}$ $\approx 2,35040$	$e^{-1} + e$ $\approx 3,08616$	$\frac{e^{-1} + 4e^0 + e^1}{3}$ $\approx 2,36205$	$e^{-\frac{\pi}{3}}$ $\approx 2$
$x^2 \sqrt{3+x^3}$	$\frac{16}{9} - \frac{4}{9}\sqrt{2}$ $\approx 1,14924$	3,41421	1,13807	1,
$x^2 e^{x^3}$	$\frac{e-e^{-1}}{3} \approx 0,78347$	3,08616	1,02872	0,



### 7.3.5 Quadratura de Gauss-Legendre

A quadratura de Gauss-Legendre de  $n$  pontos é o esquema numérico

$$\int_{-1}^1 f(x)dx = \sum_{j=1}^n w_j f(x_j)$$

cuja ordem de exatidão é  $2n - 1$ .

- O problema de encontrar os  $n$  pesos e  $n$  abscissas é equivalente a um sistema não linear com  $2n$  equações e  $2n$  incógnitas.
- Pode-se mostrar que este problema sempre tem solução e que a solução é única se  $x_1 < x_2 < \dots < x_n$
- As abscissas são das pelos zeros do enésimo polinômio de Legendre,  $P_n(x)$ .
- Os pesos são dados por

$$w_j = \frac{2}{\left(1 - x_j^2\right) \left[P'_n(x_j)\right]^2}.$$

- Estes dados são tabelados e facilmente encontrados.

n	$x_j$	$w_j$
1	0	2
2	$\pm \frac{\sqrt{3}}{3}$	1
3	0	$\frac{8}{9}$
	$\pm \sqrt{\frac{3}{5}}$	$\frac{5}{9}$
4	$\pm \sqrt{\left(3 - 2\sqrt{6/5}\right)/7}$	$\frac{18+\sqrt{30}}{36}$
	$\pm \sqrt{\left(3 + 2\sqrt{6/5}\right)/7}$	$\frac{18-\sqrt{30}}{36}$

**Exemplo 111.** Aproximar

$$\int_{-1}^1 \sqrt{1+x^2} dx$$

pelo método de Gauss-Legendre com 3 pontos.

**Solução.**

$$I_3 = \frac{5}{9}f\left(-\sqrt{\frac{3}{5}}\right) + \frac{8}{9}f(0) + \frac{5}{9}f\left(\sqrt{\frac{3}{5}}\right) \approx 2,2943456$$

No Scilab:



**Exemplo 112.** Aproximar

$$\int_{-1}^1 \sqrt{1+x^2} dx$$

pelo método de Gauss-Legendre com 4 pontos.

**Solução.**  $I_4=f(x_4(1))*w_4(1)+f(-x_4(1))*w_4(1)+f(x_4(2))*w_4(2)+f(-x_4(2))*w_4(2)$



**Exemplo 113.** Aproximar

$$\int_0^1 \sqrt{1+x^2} dx$$

pelo método de Gauss-Legendre com 3, 4 e 5 pontos.

**Solução.** Para tanto, fazemos a mudança de variáveis  $u = 2x - 1$ :

$$\int_0^1 \sqrt{1+x^2} dx = \frac{1}{2} \int_{-1}^1 \sqrt{1 + \left(\frac{u+1}{2}\right)^2} du$$

E, então aplicamos a quadratura gaussiana nesta última integral.

```
def f('y=f(u)', 'y=sqrt(1+(u+1)^2/4)/2')
```

```
I3=f(0)*w3(1)+f(x3(2))*w3(2)+f(-x3(2))*w3(2)
```

```
I4=f(x4(1))*w4(1)+f(-x4(1))*w4(1)+f(x4(2))*w4(2)+f(-x4(2))
```

```
I5=f(0)*w5(1)+f(x5(2))*w5(2)+f(-x5(2))*w5(2)+f(x5(3))*w5(3)  
+f(-x5(3))*w5(3)
```



# Exercícios

**E 7.3.1.** Calcule numericamente as seguintes integrais usando os métodos simples do Ponto médio, Trapézio e Simpson. Calcule também o valor exato usando seus conhecimentos de Cálculo I. Complete a tabela abaixo conforme modelo:

	exato	Ponto médio	Trapézio
$\int_0^1 e^{-x} dx$	$1 - e^{-1} \approx 0.6321206$	$e^{-1/2} \approx 0.6065307$	$\frac{1+e^{-1}}{2} \approx 0.68$
$\int_0^1 x^2 dx$			
$\int_0^1 x^3 dx$			
$\int_0^1 x e^{-x^2} dx$			
$\int_0^1 \frac{1}{x^2+1} dx$			
$\int_0^1 \frac{x}{x^2+1} dx$			

**E 7.3.2.** Dados os valores da função  $f(x)$ ,  $f(2) = 2$ ,  $f(3) = 4$  e  $f(4) = 8$ , calcule o valor aproximado de

$$\int_2^4 f(x)dx$$

pelos métodos simples de ponto médio, trapézio e Simpson.

**E 7.3.3.** Dê a interpretação geométrica dos métodos do ponto médio, trapézio e Simpson. A partir desta construção geométrica, deduza as fórmulas para aproximar

$$\int_a^b f(x)dx.$$

Verifique o método de Simpson pode ser entendido como uma média aritmética ponderada entre os métodos de trapézio e ponto médio. Encontre os pesos envolvidos. Explique o que são os métodos compostos.

**E 7.3.4.** Calcule numericamente o valor de  $\int_2^5 e^{4-x^2} dx$  usando os métodos compostos do ponto médio, trapézio e Simpson. Obtenha os resultados utilizando, em cada quadratura, o número de pontos indicado.

n	Ponto médio	Trapézios	Simpson
3			
5			
7			
9			

**E 7.3.5.** Use as rotinas construídas em aula e calcule numericamente o valor das seguintes integrais usando o método composto



dos trapézios para os seguintes números de pontos:

$n$	$h$	$\int_0^1 e^{-4x^2} dx$	$\int_0^1 \frac{1}{1+x^2} dx$	$\int_0^1 x^4(1-x)^4 dx$	$\int_0^1 e$
17		0.4409931			
33		0.4410288			
65		0.4410377			
129		0.4410400			
257		0.4410405			
513		0.4410406			
1025		0.4410407	0.7853981	$1.5873015873016 \cdot 10^{-3}$	4.6191723

Para cada integrando encontre o função  $I(h) = a_0 + a_1h + a_2h^2 + a_3h^3 + a_4h^4$  que melhor se ajusta aos dados, onde  $h = \frac{1}{n-1}$ . Discuta os resultados com base no teorema envolvido na construção do método de Romberg.

**E 7.3.6.** Calcule os valores da quadratura de Romberg de  $R_{1,1}$  até  $R_{4,4}$  para  $\int_0^\pi \sin(x)dx$ . Não use rotinas prontas neste problema.


**E 7.3.7.** Sem usar rotinas prontas, use o método de integração de Romberg para obter a aproximação  $R_{3,3}$  das seguintes integrais:

a)  $\int_0^1 e^{-x^2} dx$

b)  $\int_0^2 \sqrt{2 - \cos(x)} dx$

c)  $\int_0^2 \frac{1}{\sqrt{2 - \cos(x)}} dx$

**E 7.3.8.** Encontre uma expressão para  $R_{2,2}$  em termos de  $f(x)$  e verifique o método de Romberg  $R_{2,2}$  é equivalente ao método de Simpson.

**E 7.3.9.** Considere o problema de aproximar numericamente o valor de

$$\int_0^{100} \left( e^{\frac{1}{2} \cos(x)} - 1 \right) dx$$

pelo método de Romberg. Usando rotinas prontas, faça o que se pede.

- Calcule  $R(6,k)$ ,  $k = 1, \dots, 6$  e observe os valores obtidos.
- Calcule  $R(7,k)$ ,  $k = 1, \dots, 6$  e observe os valores obtidos.
- Calcule  $R(8,k)$ ,  $k = 1, \dots, 6$  e observe os valores obtidos.
- Discuta os resultados anteriores e proponha uma estratégia mais eficiente para calcular o valor da integral.

**E 7.3.10.** Encontre os pesos  $w_1$ ,  $w_2$  e  $w_3$  tais que o esquema de quadratura dado por

$$\int_0^1 f(x)dx \approx w_1 f(0) + w_2 f(1/2) + w_3 f(1)$$

apresente máxima ordem de exatidão. Qual a ordem obtida?

**E 7.3.11.** Encontre a ordem de exatidão do seguinte método de integração:

$$\int_{-1}^1 f(x)dx \approx \frac{2}{3} \left[ f\left(\frac{-\sqrt{2}}{2}\right) + f(0) + f\left(\frac{\sqrt{2}}{2}\right) \right]$$

**E 7.3.12.** Encontre a ordem de exatidão do seguinte método de integração:

$$\int_{-1}^1 f(x)dx = -\frac{1}{210}f'(-1) + \frac{136}{105}f(-1/2) - \frac{62}{105}f(0) + \frac{136}{105}f(1/2) + \frac{1}{210}f'(1)$$

**E 7.3.13.** Encontre os pesos  $w_1$ ,  $w_2$  e  $w_3$  tal que o método de integração

$$\int_0^1 f(x)dx \approx w_1 f(1/3) + w_2 f(1/2) + w_3 f(2/3)$$

tenha ordem de exatidão máxima. Qual é ordem obtida?

**E 7.3.14.** Explique por quê quando um método simples tem estimativa de erro de truncamento local de ordem  $h^n$ , então o método composto associado tem estimativa de erro de ordem  $h^{n-1}$ .

**E 7.3.15.** Quantos pontos são envolvidos no esquema de quadratura  $R_{3,2}$ ? Qual a ordem do erro deste esquema de quadratura? Qual a ordem de exatidão desta quadratura?

**E 7.3.16.** Encontre os pesos  $w_1$  e  $w_2$  e as abscissas  $x_1$  e  $x_2$  tais que

$$\int_{-1}^1 f(x) = w_1 f(x_1) + w_2 f(x_2)$$

quando  $f(x) = x^k$ ,  $k = 0, 1, 2, 3$ , isto é o método apresenta máxima ordem de exatidão possível com dois pontos.

Use esse método para avaliar o valor da integral das seguintes integrais e compare com os valores obtidos para Simpson e trapézio, bom como com o valor exato.

a)  $\int_{-1}^1 (2 + x - 5x^2 + x^3) dx$

b)  $\int_{-1}^1 e^x dx$

c)  $\int_{-1}^1 \frac{dx}{\sqrt{x^2+1}}$

**E 7.3.17.** Encontre os pesos  $w_1$ ,  $w_2$  e  $w_3$  tal que o método de integração

$$\int_{-1}^1 f(x) dx \approx w_1 f\left(-\frac{\sqrt{3}}{3}\right) + w_2 f(0) + w_3 f\left(\frac{\sqrt{3}}{3}\right)$$

tenha ordem de exatidão máxima. Qual é ordem obtida?

**E 7.3.18.** Encontre aproximações para a seguinte integral via Gauss-Legendre com 2, 3, 4, 5, 6 e 7 pontos e compare com o valor exato

$$\int_{-1}^1 x^4 e^{x^5} dx.$$

**E 7.3.19.** Encontre aproximações para as seguintes integrais via Gauss-Legendre com 4 e 5 pontos:

a)  $\int_0^1 e^{-x^4} dx$

b)  $\int_1^4 \log(x + e^x) dx$

c)  $\int_0^1 e^{-x^2} dx$

**E 7.3.20.** Calcule numericamente o valor das seguintes integrais usando a quadratura de Gauss-Legendre para os seguintes valores de  $n$ :

n	$\int_0^1 e^{-4x^2} dx$	$\int_0^1 \frac{1}{1+x^2} dx$	$\int_0^1 x^4(1-x)^4 dx$	$\int_0^1 e^{-\frac{1}{x^2+1}} dx$
2				
3				
4				
5				
8				
10				
12				
14				
16	0.4410407	0.7853982	0.0015873	0.4619172



## 7.4 Exercícios finais

**E 7.4.1.** O valor exato da integral imprópria  $\int_0^1 x \ln(x) dx$  é dado por

$$\int_0^1 x \ln(x) dx = \left( \frac{x^2}{2} \ln x - \frac{x^2}{4} \right) \bigg|_0^1 = -1/4$$

Aproxime o valor desta integral usando a regra de Simpson para  $n = 3$ ,  $n = 5$  e  $n = 7$ . Como você avalia a qualidade do resultado obtido? Por que isso acontece.

**E 7.4.2.** O valor exato da integral imprópria  $\int_0^\infty e^{-x^2} dx$  é dado por  $\frac{\sqrt{\pi}}{2}$ . Escreva esta integral como

$$I = \int_0^1 e^{-x^2} dx + \int_0^1 u^{-2} e^{-1/u^2} du = \int_0^1 \left( e^{-x^2} + x^{-2} e^{-1/x^2} \right) dx$$

e aproxime seu valor usando o esquema de trapézios e Simpson para  $n = 5$ ,  $n = 7$  e  $n = 9$ .

**E 7.4.3.** Estamos interessados em avaliar numericamente a seguinte integral:

$$\int_0^1 \ln(x) \sin(x) dx$$

cujo valor com 10 casas decimais corretas é  $-.2398117420$ .

a) Aproxime esta integral via Gauss-Legendre com  $n = 2, n = 3, n = 4, n = 5, n = 6$  e  $n = 7$ .

b) Use a identidade

$$\begin{aligned} \int_0^1 \ln(x) \sin(x) dx &= \int_0^1 \ln(x) x dx + \int_0^1 \ln(x) [\sin(x) - x] dx \\ &= \left( \frac{x^2}{2} \ln x - \frac{x^2}{4} \right) \Big|_0^1 + \int_0^1 \ln(x) [\sin(x) - x] dx \\ &= -\frac{1}{4} + \int_0^1 \ln(x) [\sin(x) - x] dx \end{aligned}$$

e aproxime a integral  $\int_0^1 \ln(x) [\sin(x) - x] dx$  numericamente

via Gauss-Legendre com  $n = 2$ ,  $n = 3$ ,  $n = 4$ ,  $n = 5$ ,  $n = 6$  e  $n = 7$ .

- c) Compare os resultados e discuta levando em consideração as respostas às seguintes perguntas: 1) Qual função é mais bem-comportada na origem? 2) Na segunda formulação, qual porção da solução foi obtida analiticamente e, portanto, sem erro de truncamento?

**E 7.4.4.** Considere o problema de calcular numericamente a integral  $I = \int_{-1}^1 f(x)dx$  quando  $f(x) = \frac{\cos(x)}{\sqrt{|x|}}$ .

- a) O que acontece quando se aplica diretamente a quadratura gaussiana com um número ímpar de abscissas?
- b) Calcule o valor aproximado por quadratura gaussiana com  $n = 2$ ,  $n = 4$ ,  $n = 6$  e  $n = 8$ .

- c) Calcule o valor aproximado da integral removendo a singularidade

$$\begin{aligned} I &= \int_{-1}^1 \frac{\cos(x)}{\sqrt{|x|}} dx = \int_{-1}^1 \frac{\cos(x) - 1}{\sqrt{|x|}} dx + \int_{-1}^1 \frac{1}{\sqrt{|x|}} dx \\ &= \int_{-1}^1 \frac{\cos(x) - 1}{\sqrt{|x|}} dx + 2 \int_0^1 \frac{1}{\sqrt{x}} dx = \int_{-1}^1 \frac{\cos(x) - 1}{\sqrt{|x|}} dx + 4 \end{aligned}$$

e aplicando quadratura gaussiana com  $n = 2$ ,  $n = 4$ ,  $n = 6$  e  $n = 8$ .

- d) Calcule o valor aproximado da integral removendo a singularidade, considerando a paridade da função

$$I = 4 + \int_{-1}^1 \frac{\cos(x) - 1}{\sqrt{|x|}} dx = 4 + 2 \int_0^1 \frac{\cos(x) - 1}{\sqrt{x}} dx = 4 + \sqrt{2}$$

e aplicando quadratura gaussiana com  $n = 2$ ,  $n = 4$ ,  $n = 6$  e  $n = 8$ .

- e) Expandindo a função  $\cos(x)$  em série de Taylor, truncando a série depois do  $n$ -ésimo termos não nulo e integrando analiticamente.
- f) Aproximando a função  $\cos(x)$  pelo polinômio de Taylor de grau 4 dado por

$$P_4(x) = 1 - \frac{x^2}{2} + \frac{x^4}{24}$$

e escrevendo

$$\begin{aligned} I &= \int_{-1}^1 \frac{\cos(x)}{\sqrt{|x|}} dx = \int_{-1}^1 \frac{\cos(x) - P_4(x)}{\sqrt{|x|}} dx + \int_{-1}^1 \frac{P_4(x)}{\sqrt{|x|}} dx \\ &= 2 \underbrace{\int_0^1 \frac{\cos(x) - P_4(x)}{\sqrt{x}} dx}_{\text{Resolver numericamente}} + 2 \underbrace{\int_0^1 \left( x^{-1/2} - \frac{x^{3/2}}{2} + \frac{x^{7/2}}{24} \right) dx}_{\text{Resolver analiticamente}} \end{aligned}$$

**E 7.4.5.** Calcule numericamente o valor das seguintes integrais com um erro relativo inferior a  $10^{-4}$ .

a)  $\int_0^1 \frac{\sin(\pi x)}{x} dx$

b)  $\int_0^1 \frac{\sin(\pi x)}{x(1-x)} dx$

c)  $\int_0^1 \frac{\sin\left(\frac{\pi}{2}x\right)}{\sqrt{x(1-x)}} dx$

d)  $\int_0^1 \ln(x) \cos(x) dx$

**E 7.4.6.** Calcule as integrais  $\int_0^1 \frac{e^x}{|x|^{1/4}} dx$  e  $\int_0^1 \frac{e^{-x}}{|x|^{4/5}} dx$  usando procedimentos analíticos e numéricos.

**E 7.4.7.** Use a técnica de integração por partes para obter a seguinte identidade envolvendo integrais impróprias:

$$I = \int_0^{\infty} \frac{\cos(x)}{1+x} dx = \int_0^{\infty} \frac{\sin(x)}{(1+x)^2} dx.$$

Aplique as técnicas estudadas para aproximar o valor de  $I$  e explique por que a integral da direita é mais bem comportada.

**E 7.4.8.** Resolva a equação

$$x + \int_0^x e^{-y^2} dy = 5$$

com 5 dígitos significativos.

**E 7.4.9.** O calor específico (molar) de um sólido pode ser aproximado pela teoria de Debye usando a seguinte expressão

$$C_V = 9Nk_B \left( \frac{T}{T_D} \right)^3 \int_0^{T_D/T} \frac{y^4 e^y}{(e^y - 1)^2} dy$$

onde  $N$  é a constante de Avogrado dado por  $N = 6.022 \times 10^{23}$  e  $k_B$  é a constante de Boltzmann dada por  $k_B = 1.38 \times 10^{-23}$ .  $T_D$  é temperatura de Debye do sólido.

- a) Calcule o calor específico do ferro em quando  $T = 200K$ ,  $T = 300K$  e  $T = 400K$  supondo  $T_D = 470K$ .
- b) Calcule a temperatura de Debye de um sólido cujo calor específico a temperatura de  $300K$  é  $24J/K/mol$ . Dica: aproxime a integral por um esquema numérico com um número fixo de pontos.
- c) Melhore sua cultura geral: A lei de Dulong-Petit para o calor específico dos sólidos precede a teoria de Debye. Verifique que a equação de Debye é consistente com Dulong-Petit, ou seja:

$$\lim_{T \rightarrow \infty} C_v = 3Nk_B.$$

Dica: use  $e^y \approx 1 + y$  quando  $y \approx 0$



# Capítulo 8

## Problemas de valor inicial

Neste capítulo, desenvolveremos técnicas numérica para aproximar a solução de problemas de valor inicial da forma

$$y'(t) = f(y(t), t) \tag{8.1a}$$

$$y(t_0) = y_0 \text{ (condição inicial)}. \tag{8.1b}$$

A ingógnita de um problema de valor inicial é uma função que satisfaz a equação diferencial (8.1a) e a condição inicial (8.1b).

**Exemplo 114.** Considere o seguinte problema de valor inicial

$$y'(t) = 2y(t), \quad (8.2a)$$

$$y(t_0) = 1. \quad (8.2b)$$

A solução desta equação é dada pela função  $y(t) = e^{2y}$  pois  $y'(t) = 2e^{2t} = 2y(t)$  e  $y(0) = e^0 = 1$ .

Muito problemas de valor inicial da forma (8.1) não podem ser resolvidos exatamente, ou seja, sabe-se que a solução existe e é única, porém não podemos expressá-la em termos de funções elementares. Por isso é necessário calcular aproximações numéricas. Diversos métodos completamente diferentes estão disponíveis para aproximar uma função real.

Aqui nos limitaremos a estudar métodos que se fundamentam em tentar calcular  $y(t)$  em um conjunto finito de valores de  $t$ . Esse conjunto de valores para  $t$  será denotado por  $\{t_i\}_{i=1}^N$ , isto é  $\{t_1, t_2, t_3, \dots, t_N\}$ .

e calculamos o valor aproximado da função solução  $y(t_i)$  em cada ponto da malha usando esquemas numéricos.

## 8.1 Método de Euler

Retornemos ao problema de valor inicial (8.1) dado por:

$$y'(t) = f(y(t), t) \quad (8.3a)$$

$$y(0) = y_0 \text{ (condição inicial)} \quad (8.3b)$$

O Método de Euler aplicado à solução desse problema consiste em aproximar a derivada  $y'(t)$  por um esquema de primeira ordem do tipo

$$y'(t) = \frac{y(t+h) - y(t)}{h} + O(h), \quad h > 0.$$

Aqui  $h$  é o passo do método, que consideraremos uma constante. Assim temos (8.3) se transforma em:

$$\begin{aligned} \frac{y(t+h) - y(t)}{h} &= f(y(t), t) + O(h) \\ y(t+h) &= y(t) + hf(y(t), t) + O(h^2). \end{aligned} \quad (8.4)$$

Definimos, então,  $t^{(k)} = (k - 1)h$  e  $y^{(k)}$  como a aproximação para  $y(t^{(k)})$  produzida pelo Método de Euler. Assim, obtemos

$$y^{(k+1)} = y^{(k)} + hf(y^{(k)}, t^{(k)}) \text{ (aproximação da EDO)}, \quad (8.5)$$

$$y^{(1)} = y_0 \text{ (condição inicial)}. \quad (8.6)$$

O problema (8.5) consiste em um esquema iterativo, isto é,  $y^{(1)}$  é a condição inicial;  $y^{(2)}$  pode ser obtido de  $y^{(1)}$ ;  $y^{(3)}$ , de  $y^{(2)}$  e assim por diante, calculamos o termo  $y^{(n)}$  a partir do anterior  $y^{(n-1)}$ .

**Exemplo 115.** Retornemos ao o problema de valor inicial do exemplo (8.2):

$$y'(t) = 2y(t)$$

$$y(0) = 1$$

Cuja solução é  $y(t) = e^{2t}$ . O método de Euler aplicado a este problema produz o seguinte esquema:

$$y^{(k+1)} = y^{(k)} + 2hy^{(k)} = (1 + 2h)y^{(k)}$$

$$y^{(1)} = 1,$$

cujas soluções são dadas por

$$y^{(k)} = (1 + 2h)^{k-1}.$$

Como  $t = (k - 1)h$ , a solução aproximada pelo Método de Euler é

$$y(t) \approx \tilde{y}(t) = (1 + 2h)^{\frac{t}{h}}.$$

Observe que  $\tilde{y}(t) \neq y(t)$ , mas se  $h$  é pequeno, a aproximação é boa, pois

$$\lim_{h \rightarrow 0+} (1 + 2h)^{\frac{t}{h}} = e^{2t}.$$

Vamos agora, analisar o desempenho do Método de Euler usando um exemplo mais complicado, porém ainda simples suficiente para que possamos obter a solução exata:

**Exemplo 116.** Considere o problema de valor inicial relacionado à equação logística:

$$\begin{aligned}y'(t) &= y(t)(1 - y(t)) \\ y(0) &= 1/2\end{aligned}$$

Podemos obter a solução exata desta equação usando o método de separação de variáveis e o método das frações parciais. Para tal escrevemos:

$$\frac{dy(t)}{y(t)(1-y(t))} = dt$$

O termo  $\frac{1}{y(1-y)}$  pode ser decomposto em frações parciais como  $\frac{1}{y} - \frac{1}{1-y}$  e chegamos na seguinte equação diferencial:

$$\left( \frac{1}{y} + \frac{1}{1-y} \right) dy = dt.$$

Integrando termo-a-termo, temos a seguinte equação algébrica relacionando  $y(t)$  e  $t$ :

$$\ln(y) - \ln(1-y) = t + C$$

Onde  $C$  é a constante de integração, que é definida pela condição inicial, isto é,  $y = 1/2$  em  $t = 0$ . Substituindo, temos  $C = 0$ . O que

resulta em:

$$\ln \left( \frac{y}{1-y} \right) = t$$

Equivalente a

$$\frac{y}{1-y} = e^t$$

e

$$y = (1-y)e^t$$

Colocando o termo  $y$  em evidência, encontramos:

$$(1 + e^t)y = e^t \tag{8.7}$$

E, finalmente, encontramos a solução exata dada por  $y(t) = \frac{e^t}{1+e^t}$ .  
Vejamos, agora, o esquema iterativo produzido pelo método de Euler:

$$\begin{aligned} y^{(k+1)} &= y^{(k)} + hy^{(k)}(1 - y^{(k)}), \\ y^{(1)} &= 1/2. \end{aligned}$$



Tabela 8.1: Tabela comparativa entre Método de Euler e solução exata para problema 116.

$t$	Exato	Euler $h = 0,1$	Euler $h = 0,01$
0	1/2	0,5	0,5
1/2	$\frac{e^{1/2}}{1+e^{1/2}} \approx 0,6224593$	0,6231476	0,6225316
1	$\frac{e}{1+e} \approx 0,7310586$	0,7334030	0,7312946
2	$\frac{e^2}{1+e^2} \approx 0,8807971$	0,8854273	0,8812533
3	$\frac{e^3}{1+e^3} \approx 0,9525741$	0,9564754	0,9529609

Para fins de comparação, calculamos a solução de 116 e de (??) para alguns valores de  $t$  e de passo  $h$  e resumimos na Tabela 8.1.

No exemplo a seguir, apresentamos um problema envolvendo uma equação não-autônoma, isto é, quando a função  $f(y,t)$  depende explicitamente do tempo.

**Exemplo 117.** Resolva o problema de valor inicial

$$\begin{aligned}y' &= -y + t \\ y(0) &= 1,\end{aligned}$$

cuja solução exata é  $y(t) = 2e^{-t} + t - 1$ .

O esquema recursivo de Euler fica:

$$\begin{aligned}y^{(k+1)} &= y(k) - hy(k) + ht^{(k)} \\ y(0) &= 1\end{aligned}$$

Comparação

$t$	Exato	Euler $h = 0,1$	Euler $h = 0,01$
0	1	1	1
1	$2e^{-1} \approx 0,7357589$	0,6973569	0,7320647
2	$2e^{-2} + 1 \approx 1,2706706$	1,2431533	1,2679593
3	$2e^{-3} + 2 \approx 2,0995741$	2,0847823	2,0980818

No exemplo 118, mostramos como o Método de Euler pode ser facilmente estendido para problemas envolvendo sistemas de equações diferenciais..

**Exemplo 118.** Escreva o processo iterativo de Euler para resolver numericamente o seguinte sistema de equações diferenciais

$$\begin{aligned}x' &= -y \\y' &= x \\x(0) &= 1 \\y(0) &= 0,\end{aligned}$$

cuja solução exata é  $x(t) = \cos(t)$  e  $y(t) = \sin(t)$ .

Par aplicar o Método de Euler a um sistema, devemos encarar as diversas incógnitas do sistema como formando um vetor, neste caso,

encrevemos:

$$z(t) = \begin{bmatrix} x(t) \\ y(t) \end{bmatrix}.$$

O sistema é igualmente escrito na forma vetorial:

$$\begin{bmatrix} x^{(k+1)} \\ y^{(k+1)} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x^{(k)} \\ y^{(k)} \end{bmatrix} + h \begin{bmatrix} -y^{(k)} \\ x^{(k)} \end{bmatrix}.$$

Observe que este processo iterativo é equivalente a:

$$\begin{aligned} x^{(k+1)} &= x^{(k)} - hy^{(k)} \\ y^{(k+1)} &= y^{(k)} + hx^{(k)}. \end{aligned}$$

**Exemplo 119.** Escreva o problema de valor inicial de segunda ordem dado por

$$\begin{aligned} y'' + y' + y &= \cos(t), \\ y(0) &= 1, \\ y'(0) &= 0, \end{aligned}$$

como um problema envolvendo um sistema de primeira ordem.

A fim de transformar a equação diferencial dada em um sistema de equações de primeira ordem, introduzimos a substituição  $w = y'$ , de forma que obtermos o sistema:

$$\begin{aligned}y' &= w \\w' &= -w - y + \cos(t) \\y(0) &= 1 \\w(0) &= 0\end{aligned}$$

Portanto, o Método de Euler produz o seguinte processo iterativo:

$$\begin{aligned}y^{(k+1)} &= y^{(k)} + hw^{(k)}, \\w^{(k+1)} &= w^{(k)} - hw^{(k)} - hy^{(k)} + h \cos(t^{(k)}), \\y^{(1)} &= 1, \\w^{(1)} &= 0.\end{aligned}$$

# Exercícios

**E 8.1.1.** Resolva o problema de valor inicial dado por

$$\begin{aligned}y' &= -2y + \sqrt{y} \\ y(0) &= 1\end{aligned}$$

com passo  $h = 0.1$  e  $h = 0.1$  para obter aproximações para  $y(1)$ . Compare com a solução exata dada por  $y(t) = (1 + 2e^{-t} + e^{-2t}) / 4$

**E 8.1.2.** Resolva o problema de valor inicial dado por

$$\begin{aligned}y' &= -2y + \sqrt{z} \\ z' &= -z + y \\ y(0) &= 0 \\ z(0) &= 2\end{aligned}$$

com passo  $h = 0.2$ ,  $h = 0.1$ ,  $h = 0.02$  e  $h = 0.002$  para obter aproximações para  $y(2)$  e  $z(2)$ .

**E 8.1.3.** Resolva o problema de valor inicial dado por

$$\begin{aligned}y' &= \cos(ty(t)) \\ y(0) &= 1\end{aligned}$$

com passo  $h = 0.1$ ,  $h = 0.01$ ,  $h = 0.001$ ,  $h = 0.0001$  e  $0.00001$  para obter aproximações para  $y(2)$ .

## 8.2 Método de Euler melhorado

O método de Euler foi o primeiro método que estudamos e sua principal virtude é a simplicidade. Outros métodos, no entanto, podem apresentar resultados superiores. Vamos apresentar agora uma pequena modificação ao Método de Euler, dando origem a um novo método chamado de Método de Euler Modificado ou Método de Euler Melhorado.

No método de Euler, usamos a seguinte iteração:

$$\begin{aligned}y^{(k+1)} &= y^{(k)} + hf(y^{(k)}, t^{(k)}) \\ y^{(1)} &= y_0 \text{ (condição inicial)}\end{aligned}$$

A ideia do método de Euler Melhorado é substituir a declividade  $f(y^{(k)}, t^{(k)})$  pela média aritmética entre  $f(y^{(k)}, t^{(k)})$  e  $f(y^{(k+1)}, t^{(k+1)})$ , isto é, as declividades avaliadas no início e no fim do intervalo  $[t^{(k)}, t^{(k+1)}]$ .

No entanto, não dispomos do valor de  $y^{(k+1)}$  antes de executar o passo. Assim aproximamos esta grandeza pelo valor produzido pelo



Método de Euler original:

$$\tilde{y}^{(k+1)} = y^{(k)} + hf(y^{(k)}, t^{(k)}).$$

De posse desta aproximação, calculamos a média aritmética e, finalmente, com esta média, realizamos o passo do Método de Euler Melhorado. O processo iterativo de Euler Melhorado é, portanto, dado por:

$$\begin{aligned}\tilde{y}^{(k+1)} &= y^{(k)} + hf(y^{(k)}, t^{(k)}) \\ y^{(k+1)} &= y^{(k)} + \frac{h}{2} [f(y^{(k)}, t^{(k)}) + f(\tilde{y}^{(k+1)}, t^{(k+1)})] \\ y^{(1)} &= y_0 \text{ (condição inicial)}\end{aligned}$$

Podemos reescrever este mesmo processo iterativo da seguinte forma:

$$\begin{aligned}k_1 &= hf(y^{(k)}, t^{(k)}), \\ k_2 &= hf(y^{(k)} + k_1, t^{(k+1)}), \\ y^{(k+1)} &= y^{(k)} + \frac{k_1 + k_2}{2}, \\ y^{(1)} &= y_0 \text{ (condição inicial)}.\end{aligned}$$

Aqui  $k_1$  e  $k_2$  são variáveis auxiliares que representam as inclinações e devem ser calculadas a cada passo. Esta notação é compatível com a notação usada nos métodos de Runge-Kutta, uma família de esquemas iterativos para aproximar problemas de valor inicial, da qual o Método de Euler e o Método de Euler Melhorado são casos particulares. Veremos os métodos de Runge-Kutta na seção 8.5.

# Exercícios

**E 8.2.1.** Use o Método de Euler melhorado para obter uma aproximação numérica do valor de  $y(1)$  quando  $y(t)$  satisfaz o seguinte problema de valor inicial

$$\begin{aligned}y'(t) &= -y(t) + e^{y(t)}, \\ y(0) &= 0,\end{aligned}$$

usando passos  $h = 0,1$  e  $h = 0,01$ .

**E 8.2.2.** Use o Método de Euler e o Método de Euler melhorado para obter aproximações numéricas para a solução do seguinte problema de valor inicial para  $t \in [0,1]$ :

$$\begin{aligned}y'(t) &= -y(t) - y(t)^2, \\ y(0) &= 1,\end{aligned}$$

usando passo  $h = 0,1$ . Compare os valores da solução exata dada

por  $y(t) = \frac{1}{2e^t - 1}$  com os numéricos nos pontos  $t = 0, t = 0.1, t = 0.2, t = 0.3, t = 0.4, t = 0.5, t = 0.6, t = 0.7, t = 0.8, t = 0.9, t = 1.0$ .

## 8.3 Ordem de precisão

Considere o problema de valor inicial dado por

$$\begin{aligned}y'(t) &= f(y(t), t), \\ y(0) &= y_0.\end{aligned}$$

Nessa seção vamos definir a precisão de um método numérico pela ordem do erro acumulado ao calcular o valor da função em um ponto  $t_N$  em função do espaçamento da malha  $h$ . Se  $y(t_n)$  pode ser aproximado por uma expressão que depende de  $f$ ,  $h$ ,  $y(t_0)$ ,  $y(t_1)$ ,  $\dots$ ,  $y(t_n)$ , com erro da ordem de  $O(h^{p+1})$ , ou seja,

$$y(t_{n+1}) = \mathcal{F}(f, h, y(t_n), y(t_{n-1}), \dots, y_0) + O(h^{p+1}) \quad (8.8)$$

para cada função analítica  $f$ , dizemos que o método tem erro de truncamento da ordem de  $O(h^p)$  ou **ordem de precisão**  $p$ . Essa afirmação faz sentido quando fazemos a seguinte análise informal: para aproximar  $y_1$ , acumulamos erros da ordem  $O(h^{p+1})$ , para calcular  $y_2$  acumulamos os erros de  $y_1$  e novos erros  $O(h^{p+1})$ . Para

calcular  $y_N$ , acumulamos todos os erros até  $t_N$ , ou seja,  $N$  vezes  $O(h^{p+1})$ . Como  $N = O(1/h)$ , temos que os erros ao calcular  $y_N$  são da ordem  $O(h^p)$ . É verdade que essa análise só vale quando impomos condições de suavidade para  $f$  e condições adequada para a expressão  $\mathcal{F}(f, h, y(t_n), y(t_{n-1}), \dots, y_0)$ . Para explicar melhor esse pequeno texto, fazemos em detalhes essa operação para o método de Euler na seção 8.3.1.

### 8.3.1 Ordem de precisão do Método de Euler

Primeiro lembramos da expressão (8.4) que origina a seguinte relação de recorrência:

$$y(t_{n+1}) = y(t_n) + hf(y(t_n), t_n) + O(h^2). \quad (8.9)$$

Para entender melhor o motivo de na expressão (8.9) aparecer  $O(h^2)$  e o método ser de precisão 1, vamos a seguinte análise informal: observemos que

$$\begin{aligned} y(t_1) &= y(t_0) + hf(y(t_0), t_0) + O(h^2) \\ &= y_0 + hf(y_0, t_0) + O(h^2) = y_1 + O(h^2) \end{aligned}$$

onde  $y_i$  é a aproximação pelo método de Euler para o valor exato  $y(t_i)$ . Subsequentemente, temos

$$\begin{aligned} y(t_2) &= y(t_1) + hf(y(t_1), t_1) + O(h^2) \\ &= y(t_1) + hf(y_1 + O(h^2), t_1) + O(h^2) \\ &= y(t_1) + hf(y_1, t_1) + O(h^2) \\ &= y_1 + O(h^2) + hf(y_1, t_1) + O(h^2) = y_2 + O(h^2) + O(h^2). \end{aligned}$$

onde usamos o primeiro termo da série de Taylor  $hf(y_1+O(h^2),t_1) = hf(y_1,t_1) + O(h^3)$  na passagem da segunda para terceira linha. Repetindo sucessivamente o passo anterior, obtemos uma expressão geral para o valor exato  $y(t_N)$  em termos do valor aproximado  $y_N$ :

$$y(t_N) = y_N + NO(h^2).$$

Como  $N = (t_f - t_0)/h$ , temos

$$y(t_N) = y_N + \frac{t - t_0}{h}O(h^2) = y_N + O(h), \quad (8.10)$$

ou seja, o erro entre o valor exato e o aproximado é de ordem  $h$ . Uma demonstração mais formal que garante que o erro é limitado por uma expressão que é proporcional a  $h$  está discutido na seção 8.4.1.



### 8.3.2 Ordem de precisão do Método de Euler Melhorado

Para obter o erro de precisão do método de Euler Melhorado vamos calcular o erro de truncamento do método, ou seja, precisamos demonstrar que:

$$y(t+h) = y(t) + \frac{h}{2}f(y(t),t) + \frac{h}{2}f(y(t) + hf(t,y(t))),t+h) + O(h^3) \quad (8.11)$$

De fato, tomando a diferença do termo da esquerda o os termos da direita, temos:

$$\begin{aligned} & y(t+h) - \left( y(t) + \frac{h}{2}f(y(t),t) + \frac{h}{2}f(y(t) + hf(t,y(t))),t+h) \right) \\ &= y(t) + hy'(t) + \frac{h^2}{2}y''(t) + O(h^3) \\ & - \left( y(t) + \frac{h}{2}y'(t) + \frac{h}{2}f(y(t) + hf(t,y(t))),t+h) \right), \end{aligned}$$

onde usamos uma expansão em série de Taylor para  $y(t+h)$  e a equação diferencial  $y'(t) = f(y(t),t)$ . Portanto,

$$\begin{aligned} & y(t+h) - \left( y(t) + \frac{h}{2}f(y(t),t) + \frac{h}{2}f(y(t) + hf(t,y(t))),t+h \right) \\ &= \frac{h}{2}y'(t) + \frac{h^2}{2}y''(t) - \frac{h}{2}f(y(t) + hf(t,y(t))),t+h + O(h^3). \end{aligned}$$

Agora, usamos a série de Taylor de  $f(y(t)+hf(y(t),t),t+h)$  e, torno de  $(y,t)$ :

$$\begin{aligned} & y(t+h) - \left( y(t) + \frac{h}{2}f(y(t),t) + \frac{h}{2}f(y(t) + hf(t,y(t))),t+h \right) \\ &= \frac{h}{2}y'(t) + \frac{h^2}{2}y''(t) + O(h^3) \\ & - \frac{h}{2} \left( f(y(t),t) + \frac{\partial f(y(t),t)}{\partial t}h + \frac{\partial f(t,y(t))}{\partial y}hf(t,y(t)) + O(h^2) \right). \end{aligned}$$

Usando a equação diferencial  $y'(t) = f(y(t),t)$  obtemos

$$y''(t) = \frac{f(y(t),t)}{\partial t} + \frac{f(y(t),t)}{\partial y} y'(t) = \frac{f(y(t),t)}{\partial t} + \frac{f(y(t),t)}{\partial y} f(y(t),t).$$

Logo,

$$\begin{aligned} & y(t+h) - \left( y(t) + \frac{h}{2} f(y(t),t) + \frac{h}{2} f(y(t) + hf(t,y(t))),t+h \right) \\ &= \frac{h}{2} y'(t) + \frac{h^2}{2} y''(t) + O(h^3) \\ & - \frac{h}{2} \left( f(y(t),t) + hy''(t) + O(h^2) \right) \\ &= \frac{h}{2} y'(t) + \frac{h^2}{2} y''(t) \\ & - \frac{h}{2} (y'(t) + hy''(t)) + O(h^3) = O(h^3) \end{aligned}$$

Portanto, a expressão (8.11) é válida. Logo, usando uma discussão análoga aquela feita na seção 8.3.1 para o método de Euler, concluímos que o método de Euler Melhorado possui ordem de precisão 2.

## 8.4 Convergência

Em desenvolvimento

## 8.4.1 Convergência do método de Euler

Em desenvolvimento

## 8.4.2 Convergência do método de Euler Melhorado

Em desenvolvimento

## 8.5 Métodos de Runge-Kutta

Os métodos de Runge-Kutta consistem em iterações do tipo:

$$y^{(k+1)} = y^{(k)} + w_1 k_1 + \dots + w_n k_n$$

onde

$$\begin{aligned}k_1 &= hf(y^{(k)}, t^{(k)}) \\k_2 &= hf(y^{(k)} + \alpha_{2,1} k_1, t^{(k)} + \beta_2 h) \\k_3 &= hf(y^{(k)} + \alpha_{3,1} k_1 + \alpha_{3,2} k_2, t^{(k)} + \beta_3 h) \\&\vdots \\k_n &= hf(y^{(k)} + \alpha_{n,1} k_1 + \alpha_{n,2} k_2 + \dots + \alpha_{n,n-1} k_{n-1}, t^{(k)} + \beta_n h)\end{aligned}$$

Os coeficientes são escolhidos de forma que a expansão em Taylor de  $y^{(k+1)}$  e  $y^{(k)} + w_1 k_1 + \dots + w_n k_n$  coincidam até ordem  $n + 1$ .

**Exemplo 120.** O método de Euler melhorado é um exemplo de Runge-Kutta de segunda ordem

$$y^{(n+1)} = y^{(n)} + \frac{k_1 + k_2}{2}$$

onde  $k_1 = hf(y^{(n)}, t^{(n)})$  e  $k_2 = hf(y^{(n)} + k_1, t^{(n)} + h)$



## 8.5.1 Métodos de Runge-Kutta - Quarta ordem

$$y^{(n+1)} = y^{(n)} + \frac{k_1 + 2k_2 + 2k_3 + k_4}{6}$$

onde

$$\begin{aligned}k_1 &= hf(y^{(n)}, t^{(n)}) \\k_2 &= hf(y^{(n)} + k_1/2, t^{(n)} + h/2) \\k_3 &= hf(y^{(n)} + k_2/2, t^{(n)} + h/2) \\k_4 &= hf(y^{(n)} + k_3, t^{(n)} + h)\end{aligned}$$

Este método tem ordem de precisão 4. Uma discussão heurística usando método de Simpson pode ajudar a compreender os estranhos

coeficientes:

$$\begin{aligned}y(t^{(n+1)}) - y(t^{(n)}) &= \int_{t^{(n)}}^{t^{(n+1)}} f(y(s),s)ds \\&\approx \frac{h}{6} \left[ f\left(y(t^{(n)}),t^{(n)}\right) + 4f\left(y(t^{(n)} + h/2),t^{(n)} + h/2\right) \right. \\&\quad \left. + f\left(y(t^{(n)} + h),t^{(n)} + h\right) \right] \\&\approx \frac{k_1 + 4(\frac{k_2+k_3}{2}) + k_4}{6}\end{aligned}$$

onde  $k_1$  e  $k_4$  representam as inclinações nos extremos e  $k_2$  e  $k_3$  são duas aproximações diferentes para a inclinação no meio do intervalo.

## 8.6 Métodos de passo múltiplo - Adams-Bashforth

O método de Adams-Bashforth consiste de um esquema recursivo do tipo:

$$y^{(n+1)} = y^{(n)} + \sum_{j=0}^k w_j f(y^{(n-j)}, t^{(n-j)})$$

**Exemplo 121.** Adams-Bashforth de segunda ordem

$$y^{(n+1)} = y^{(n)} + \frac{h}{2} \left[ 3f(y^{(n)}, t^{(n)}) - f(y^{(n-1)}, t^{(n-1)}) \right]$$

**Exemplo 122.** Adams-Bashforth de terceira ordem

$$y^{(n+1)} = y^{(n)} + \frac{h}{12} \left[ 23f(y^{(n)}, t^{(n)}) - 16f(y^{(n-1)}, t^{(n-1)}) + 5f(y^{(n-2)}, t^{(n-2)}) \right]$$

**Exemplo 123.** Adams-Bashforth de quarta ordem

$$y^{(n+1)} = y^{(n)} + \frac{h}{24} \left[ 55f\left(y^{(n)}, t^{(n)}\right) - 59f\left(y^{(n-1)}, t^{(n-1)}\right) \right. \\ \left. + 37f\left(y^{(n-2)}, t^{(n-2)}\right) - 9f\left(y^{(n-3)}, t^{(n-3)}\right) \right]$$

Os métodos de passo múltiplo evitam os múltiplos estágios do método de Runge-Kutta, mas exigem ser "iniciados" com suas condições iniciais.

## 8.7 Métodos de passo múltiplo - Adams-Moulton

O método de Adams-Moulton consiste de um esquema recursivo do tipo:

$$y^{(n+1)} = y^{(n)} + \sum_{j=-1}^k w_j f(y^{(n-j)}, t^{(n-j)})$$

**Exemplo 124.** Adams-Moulton de quarta ordem

$$y^{(n+1)} = y^{(n)} + \frac{h}{24} \left[ 9f(y^{(n+1)}, t^{(n+1)}) + 19f(y^{(n)}, t^{(n)}) \right. \\ \left. - 5f(y^{(n-1)}, t^{(n-1)}) + f(y^{(n-2)}, t^{(n-2)}) \right]$$

O método de Adams-Moulton é implícito, ou seja, exige que a cada passo, uma equação em  $y^{(n+1)}$  seja resolvida.

## 8.8 Estabilidade

Consideremos o seguinte problema de teste:

$$\begin{cases} y' &= -\alpha y \\ y(0) &= 1 \end{cases}$$

cuja solução exata é dada por  $y(t) = e^{-\alpha t}$ .

Considere agora o método de Euler aplicado a este problema com passo  $h$ :

$$\begin{cases} y^{(k+1)} &= y^{(k)} - \alpha h y^{(k)} \\ y^{(1)} &= 1 \end{cases}$$

A solução exata do esquema de Euler é dada por

$$y^{(k+1)} = (1 - \alpha h)^k$$

e, portanto,

$$\tilde{y}(t) = y^{(k+1)} = (1 - \alpha h)^{t/h}$$

Fixamos um  $\alpha > 0$ , de forma que  $y(t) \rightarrow 0$ . Mas observamos que  $\tilde{y}(t) \rightarrow 0$  somente quando  $|1 - \alpha h| < 1$  e solução positivas somente quando  $\alpha h < 1$ .

**Conclusão:** Se o passo  $h$  for muito grande, o método pode se tornar instável, produzindo solução espúrias.

# Exercícios

**E 8.8.1.** Resolva o problema 1 pelos diversos métodos e verifique heurísticamente a estabilidade para diversos valores de  $h$ .



## 8.9 Exercícios finais

**E 8.9.1.** Considere o seguinte modelo para o crescimento de uma colônia de bactérias:

$$\frac{dy}{dt} = \alpha y(A - y)$$

onde  $y$  indica a densidade de bactérias em unidades arbitrárias na colônia e  $\alpha$  e  $A$  são constantes positivas. Pergunta-se:

- a) Qual a solução quando a condição inicial  $y(0)$  é igual a 0 ou  $A$ ?
- b) O que acontece quando a condição inicial  $y(0)$  é um número entre 0 e  $A$ ?
- c) O que acontece quando a condição inicial  $y(0)$  é um número negativo?
- d) O que acontece quando a condição inicial  $y(0)$  é um número positivo maior que  $A$ ?

- e) Se  $A = 10$  e  $\alpha = 1$  e  $y(0) = 1$ , use métodos numéricos para obter tempo necessário para que a população dobre?
- f) Se  $A = 10$  e  $\alpha = 1$  e  $y(0) = 4$ , use métodos numéricos para obter tempo necessário para que a população dobre?

**E 8.9.2.** Considere o seguinte modelo para a evolução da velocidade de um objeto em queda (unidades no SI):

$$v' = g - \alpha v^2$$

Sabendo que  $g = 9,8$  e  $\alpha = 10^{-2}$  e  $v(0) = 0$ . Pede-se a velocidade ao tocar o solo, sabendo que a altura inicial era 100.

**E 8.9.3.** Considere o seguinte modelo para o oscilador não-linear de Van der Pol:

$$y''(t) - \alpha(A - y(t)^2)y'(t) + w_0^2 y(t) = 0$$

onde  $A$ ,  $\alpha$  e  $w_0$  são constantes positivas.

- Encontre a frequência e a amplitude de oscilações quando  $w_0 = 1$ ,  $\alpha = .1$  e  $A = 10$ . (Teste diversas condições iniciais)
- Estude a dependência da frequência e da amplitude com os parâmetros  $A$ ,  $\alpha$  e  $w_0$ . (Teste diversas condições iniciais)
- Que diferenças existem entre esse oscilador não-linear e o oscilador linear?

**E 8.9.4.** Considere o seguinte modelo para um oscilador não-linear:

$$\begin{aligned} y''(t) - \alpha(A - z(t))y'(t) + w_0^2 y(t) &= 0 \\ Cz'(t) + z(t) &= y(t)^2 \end{aligned}$$

onde  $A$ ,  $\alpha$ ,  $w_0$  e  $C$  são constantes positivas.

- Encontre a frequência e a amplitude de oscilações quando  $w_0 = 1$ ,  $\alpha = .1$ ,  $A = 10$  e  $C = 10$ . (Teste diversas condições iniciais)

- Estude a dependência da frequência e da amplitude com os parâmetros  $A$ ,  $\alpha$ ,  $w_0$  e  $C$ . (Teste diversas condições iniciais)

**E 8.9.5.** Considere o seguinte modelo para o controle de temperatura em um processo químico:

$$\begin{aligned} CT'(t) + T(t) &= \kappa P(t) + T_{ext} \\ P'(t) &= \alpha(T_{set} - T(t)) \end{aligned}$$

onde  $C$ ,  $\alpha$  e  $\kappa$  são constantes positivas e  $P(t)$  indica o potência do aquecedor. Sabendo que  $T_{set}$  é a temperatura desejada, interprete o funcionamento desse sistema de controle.

- Calcule a solução quando a temperatura externa  $T_{ext} = 0$ ,  $T_{set} = 1000$ ,  $C = 10$ ,  $\kappa = .1$  e  $\alpha = .1$ . Considere condições iniciais nulas.
- Quanto tempo demora o sistema para atingir a temperatura 900K?

- Refaça os dois primeiros itens com  $\alpha = 0.2$  e  $\alpha = 1$
- Faça testes para verificar a influência de  $T_{ext}$ ,  $\alpha$  e  $\kappa$  na temperatura final.

**E 8.9.6.** Considere a equação do pêndulo dada por:

$$\frac{d^2\theta(t)}{dt^2} + \frac{g}{l} \sin(\theta(t)) = 0$$

onde  $g$  é o módulo da aceleração da gravidade e  $l$  é o comprimento da haste.

- Mostre analiticamente que a energia total do sistema dada por

$$\frac{1}{2} \left( \frac{d\theta(t)}{dt} \right)^2 - \frac{g}{l} \cos(\theta(t))$$

é mantida constante.

- Resolva numericamente esta equação para  $g = 9,8m/s^2$  e  $l = 1m$  e as seguintes condições iniciais:

$$\theta(0) = 0.5 \text{ e } \theta'(0) = 0.$$

$$\theta(0) = 1.0 \text{ e } \theta'(0) = 0.$$

$$\theta(0) = 1.5 \text{ e } \theta'(0) = 0.$$

$$\theta(0) = 2.0 \text{ e } \theta'(0) = 0.$$

$$\theta(0) = 2.5 \text{ e } \theta'(0) = 0.$$

$$\theta(0) = 3.0 \text{ e } \theta'(0) = 0.$$

Em todos os casos, verifique se o método numérico reproduz a lei de conservação de energia e calcule período e amplitude.

**E 8.9.7.** Considere o modelo simplificado de FitzHugh-Nagumo

para o potencial elétrico sobre a membrana de um neurônio:

$$\begin{aligned}\frac{dV}{dt} &= V - V^3/3 - W + I \\ \frac{dW}{dt} &= 0.08(V + 0.7 - 0.8W)\end{aligned}$$

onde  $I$  é a corrente de excitação.

- Encontre o único estado estacionário  $(V_0, W_0)$  com  $I = 0$ .
- Resolva numericamente o sistema com condições iniciais dadas por  $(V_0, W_0)$  e

$$I = 0$$

$$I = 0.2$$

$$I = 0.4$$

$$I = 0.8$$

$$I = e^{-t/200}$$

**E 8.9.8.** Considere o problema de valor inicial dado por

$$\begin{aligned}\frac{du(t)}{dt} &= -u(t) + e^{-t} \\ u(0) &= 0\end{aligned}$$

Resolva analiticamente este problema usando as técnicas elementares de equações diferenciais ordinárias. A seguir encontre aproximações numéricas usando os métodos de Euler, Euler modificado, Runge-Kutta Clássico e Adams-Bashforth de ordem 4 conforme pedido nos itens.

- a) Construa uma tabela apresentando valores com 7 algarismos significativos para comparar a solução analítica com as aproximações numéricas produzidas pelos métodos sugeridos. Construa também uma tabela para o erro absoluto obtido por cada método numérico em relação à solução analítica. Nesta última tabela, expresse o erro com 2 algarismos significativos em formato científico. Dica: *format('e',8)* para a segunda tabela.



	0.5	1.0	1.5	2.0	2.5
Analítico					
Euler					
Euler modificado					
Runge-Kutta Clássico					
Adams-Bashforth ordem 4					

	0.5	1.0	1.5	2.0	2.5
Euler					
Euler modificado					
Runge-Kutta Clássico					
Adams-Bashforth ordem 4					

- b) Calcule o valor produzido por cada um desses métodos para  $u(1)$  com passo  $h = 0.1$ ,  $h = 0.05$ ,  $h = 0.01$ ,  $h = 0.005$  e  $h = 0.001$ . Complete a tabela com os valores para o erro absoluto encontrado.

	0.1	0.05	0.01	0.005	0.001
Euler					
Euler modificado					
Runge-Kutta Clássico					
Adams-Bashforth ordem 4					

# Apêndice A

## Rápida Introdução ao Scilab

## A.1 Sobre o Scilab

Scilab é uma linguagem de programação associada com uma rica coleção de algoritmos numéricos que cobrem muitos aspectos de problemas de computação científica. Do ponto de vista de *software*, Scilab é uma linguagem interpretada. A linguagem Scilab permite a compilação dinâmica e ligação com outras linguagens como Fortran e C. Do ponto de vista de licença, Scilab é um software gratuito no sentido que o usuário não paga por ele. Além disso, Scilab é um software de código aberto disponível sobre a licença Cecill [1]. Scilab está disponível para Linux, Mac Os e Windows. Ajuda *online* está disponível em português e muitas outras línguas. Do ponto de vista científico, Scilab começou focado em soluções computacionais para problemas de álgebra linear, mas, rapidamente, o número de aplicações se estendeu para muitas áreas da computação científica. As informações deste apêndice foram adaptadas do tutorial “Introduction to Scilab” [2], veja-o para maiores informações. Além disso, recomendamos visitar o sítio oficial do Scilab:

`www.scilab.org`

O manual oficial do Scilab em português pode ser obtido em:

`http://help.scilab.org/docs/5.5.2/pt\_BR/index.html`

## A.1.1 Instalação e Execução

O Scilab pode ser executado normalmente nos sistemas operacionais Linux, Mac Os e Windows. Muitas distribuições de Linux (Linux Mint, Ubuntu, etc.) têm o Scilab no seu sistema de pacotes (incluindo binário e documentação em várias línguas). Alternativamente, no sítio de internet oficial do Scilab pode-se obter mais versões de binários e documentação para instalação em sistemas Linux. Para a instalação em sistemas Mac Os e Windows, visite sítio de internet oficial do Scilab.

## A.1.2 Usando o Scilab

O uso do Scilab pode ser feito de três formas básicas:

- usando o **console** de modo iterativo;
- usando a função **exec** para executar um código Scilab digitado em um arquivo externo;
- usando processamento *bash*.

**Exemplo 125.** Considere o seguinte pseudocódigo:

```
s = "Olá Mundo!". (Sem imprimir na tela o resultado.)  
saída(s). (Imprime na tela.)
```

Implemente este pseudocódigo no Scilab: a) usando somente o console do Scilab; b) usando o editor do Scilab e executando o código com a função **exec**; c) usando processamento *bash*.

**Solução.** Seguem as soluções de cada item:

a) No console temos:

```
-->s = "Olá Mundo!";  
-->disp(s)
```

b) Para abrir o editor do Scilab pode-se digitar no prompt:

```
-->editor()
```

ou, alternativamente:

```
-->scinotes
```

Então, digita-se no editor o código:

```
s = "Olá Mundo!"  
disp(s)
```



salva-se em um arquivo de sua preferência (por exemplo, `~/foo.s`) e executa-se o código clicando no botão “*play*” disponível na barra de botões do Scinotes.

- c) Para executar o código em processamento *bash*, digita-se em um editor o código:

```
s = "Olá Mundo!"  
disp(s)
```

salva-se em um arquivo de sua preferência (por exemplo, `~/foo.s`) e executa-se em um console do sistema usando a linha de comando:

```
$ scilab -nw -f ~/foo.sce
```

Digite, então, `quit` para voltar ao prompt do sistema.



## A.2 Elementos da linguagem

Scilab é uma linguagem interpretada em que todas as variáveis são matrizes. Uma variável é criada quando um valor é atribuído a ela. Por exemplo:

```
-->x=1
x  =
    1.

-->y = x * 2
y  =
    2.
```

a variável `x` recebe o valor `double` 1 e, logo após, na segunda linha de comando, a variável `y` recebe o valor `double` 2. Observamos que o símbolo `=` significa o operador de atribuição não o de igualdade. O operador lógico de igualdade no Scilab é `==`.

Comentários e continuação de linha de comando são usados como no seguinte exemplo:

```
-->//Isto é um comentário
```

```
-->x = 1 ..
```

```
-->+ 2
```

```
x  =
```

```
3.
```

## A.2.1 Operações matemáticas elementares

No Scilab, os operadores matemáticos elementares são os seguintes:

- + adição
- subtração
- \* multiplicação
- / divisão
- ^ potenciação (igual a \*\*)
- ' transposto conjugado

## A.2.2 Funções e constantes elementares

Várias funções e constantes elementares já estão pré-definidas no Scilab. Por exemplo:

```
-->cos(%pi) //cosseno de pi  
ans  =  
    - 1.
```

```
-->exp(1) == %e //número de Euler  
ans  =  
    T
```

```
-->log(1) //logarítmo natual de 1  
ans  =  
    0.
```

Para mais informações sobre quais as funções e constantes pré-definidas no Scilab, consulte o manual, seções “Funções elementares” e o carácter especial “%”.

## A.2.3 Operadores lógicos

No Scilab, o valor lógico verdadeiro é escrito como %T e o valor lógico falso como %F. Temos os seguintes operadores lógicos disponíveis:

& e lógico  
| ou lógico  
~ negação  
== igualdade  
~= diferente  
< menor que  
> maior que  
<= menor ou igual que  
>= maior ou igual que

**Exemplo 126.** Se  $x = 2$ , então  $x$  é maior ou igual a 1 e menor que 3?

**Solução.** No Scilab, temos:

```
-->x=2;
```

```
-->(x >= 1) & (x < 3)
```

```
ans  =
```

T



## A.3 Matrizes

No Scilab, matriz é o tipo básico de dados, a qual é definida por seu número de linhas, colunas e tipo de dado (real, inteiro, lógico, etc.). Uma matriz  $A = [a_{i,j}]_{i,j=1}^{m,n}$  no Scilab é definida usando-se a seguinte sintaxe:

$A = [ \text{a11} , \text{a12} , \dots , \text{a1n} ; \dots ; \text{am1} , \text{am2} , \dots , \text{amn} ]$

**Exemplo 127.** Defina a matriz:

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \end{bmatrix}$$

**Solução.** No Scilab, digitamos:

```
-->A = [1 , 2 , 3 ; 4 , 5 , 6]  
A =
```



1.      2.      3.
4.      5.      6.



A seguinte lista contém uma série de funções que geram matrizes particulares:

eye	matrix identidade
linspace	vetor de elementos linearmente espaçados
ones	matriz cheia de uns
zeros	matriz nula

## A.3.1 O operador “:”

O operador “:” cria um vetor linha de elementos. A sintaxe:

`v = i:s:j`

cria um vetor linha:

$$v = [i, i + s, i + 2s, \dots, i + ns]$$

onde  $n$  é o maior inteiro tal que  $i + ns < j$ .

**Exemplo 128.** Veja as seguintes linhas de comando:

```
-->v = 10:-2:3
```

```
v =
```

```
10.    8.    6.    4.
```

```
-->u = 2:6
```

```
u =
```

```
2.    3.    4.    5.    6.
```

## A.3.2 Obtendo dados de uma matriz

A função `size` retorna o tamanho de uma matriz, por exemplo:

```
-->A = ones(3,2)
```

```
A =
```

```
1.    1.
```

```
1.    1.
```

```
1.    1.
```

```
-->[nl, nc] = size(A)
```

```
nc =
```

```
2.
```

```
nl =
```

```
3.
```

informando que a matriz `A` tem três linhas e duas colunas.

Existem vários métodos para se acessar os elementos de uma matriz dada  $A$ :

- a matriz inteira acessa-se com a sintaxe:

$A$

- o elemento da  $i$ -ésima linha e  $j$ -ésima coluna acessa-se usando a sintaxe:

$A(i, j)$

- o bloco formado pelas linhas  $i_1, i_2$  e pelas colunas  $j_1, j_2$  obtém-se usando a sintaxe:

$A(i1:i2, j1:j2)$

**Exemplo 129.** Veja as seguintes linhas de comando:

```
-->A = rand(3,4) //gera uma matriz randômica
```

```
A =
```

0.2113249	0.3303271	0.8497452	0.0683740
0.7560439	0.6653811	0.6857310	0.5608486
0.0002211	0.6283918	0.8782165	0.6623569

```
-->A //mostra toda a matriz A
```

```
ans =
```

0.2113249	0.3303271	0.8497452	0.0683740
0.7560439	0.6653811	0.6857310	0.5608486
0.0002211	0.6283918	0.8782165	0.6623569

```
-->A(2,3) //acessa o elemento a23
```

```
ans =
```

0.6857310

```
-->A(2:3,2:4) //acessa um bloco de A  
ans  =
```

```
0.6653811    0.6857310    0.5608486  
0.6283918    0.8782165    0.6623569
```

Definida uma matriz  $A$  no Scilab, as seguintes sintaxes são bastante úteis:

```
A(:, :)    toda a matriz  
A(i:j,k)   os elementos das linhas i até j (inclusive) da k-ésima coluna  
A(i,j:k)   os elementos da i-ésima linha das colunas j até k  
A(i, :)    a i-ésima linha da matriz  
A(:, j)    a j-ésima coluna da matriz  
A(i, $)    o elemento da i-ésima linha e da última coluna  
A($, j)    o elemento da última linha e da j-ésima coluna
```

**Exemplo 130.** Veja as seguintes linhas de comando:

```
-->B = rand(4,4)
```

```
B =
```

0.2113249	0.6653811	0.8782165	0.7263507
0.7560439	0.6283918	0.0683740	0.1985144
0.0002211	0.8497452	0.5608486	0.5442573
0.3303271	0.6857310	0.6623569	0.2320748

```
-->aux = B(:,2); B(:,2) = B(:,3); B(:,3) = aux
```

```
B =
```

0.2113249	0.8782165	0.6653811	0.7263507
0.7560439	0.0683740	0.6283918	0.1985144
0.0002211	0.5608486	0.8497452	0.5442573
0.3303271	0.6623569	0.6857310	0.2320748

### A.3.3 Operações matriciais e elemento-a-elemento

As operações matriciais elementares seguem a mesma sintaxe que as operações elementares de números. Agora, no Scilab, também podemos fazer operações elemento-a-elemento colocando um ponto “.” antes da operação desejada.

Aqui, temos as sintaxes análogas entre operações matriciais e operações elemento-a-elemento:

+ adição	.+ adição elemento-a-elemento
- subtração	.- subtração elemento-a-elemento
* multiplicação	.* multiplicação elemento-a-elemento
	./ divisão elemento-a-elemento
^ potenciação	.^ potenciação elemento-a-elemento
' transposta conjugada	.' transposta (não conjugada)

**Exemplo 131.** Veja as seguintes linhas de comando:

```
-->A = ones (2 ,2)  
A =
```



1.      1.

1.      1.

-->B = 2 \* ones (2 ,2)

B =

2.      2.

2.      2.

-->A \* B

ans =

4.      4.

4.      4.

-->A .\* B

ans =

2. 2.

2. 2.

## A.4 Estruturas de ramificação e repetição

O Scilab contém estruturas de repetição e ramificação padrões de linguagens estruturadas.

## A.4.1 A instrução de ramificação “if”

A instrução “if” permite executar um pedaço do código somente se uma dada condição for satisfeita.

**Exemplo 132.** Veja o seguinte código Scilab:

```
i = 2
if ( i == 1 ) then
    disp ( " Hello ! " )
elseif ( i == 2 ) then
    disp ( " Goodbye ! " )
elseif ( i == 3 ) then
    disp ( " Tchau ! " )
else
    disp ( " Au Revoir ! " )
end
```

Qual é a saída apresentada no console do Scilab? Porquê?

## A.4.2 A instrução de repetição “for”

A instrução `for` permite que um pedaço de código seja executado repetidamente.

**Exemplo 133.** Veja o seguinte código:

```
for i = 1:5  
    disp(i)  
end
```

O que é mostrado no console do Scilab?

**Exemplo 134.** Veja o seguinte código:

```
for j = 1:2:8  
    disp(j)  
end
```

O que é mostrado no console do Scilab?

**Exemplo 135.** Veja o seguinte código:

```
for k = 10:-3:1
    disp(k)
end
```

O que é mostrado no console do Scilab?

**Exemplo 136.** Veja o seguinte código:

```
for i = 1:3
    for j = 1:3
        disp([i,j])
    end
end
```

O que é mostrado no console do Scilab?

### A.4.3 A instrução de repetição “while”

A instrução `while` permite que um pedaço de código seja executado repetidamente até que uma dada condição seja satisfeita.

**Exemplo 137.** Veja o seguinte código Scilab:

```
s = 0
i = 1
while ( i <= 10 )
    s = s + i
    i = i + 1
end
```

Qual é o valor de `s` ao final da execução? Porquê?

## A.5 Funções

Além das muitas funções já pré-definidas no Scilab, o usuário podemos definir nossas próprias funções. Para tanto, existem duas instruções no Scilab:

- `deff`
- `function`

A instrução `deff` é apropriada para definirmos funções com poucas computações. Quando a função exige um grande quantidade de código para ser definida, a melhor opção é usar a instrução `function`. Veja os seguintes exemplos:

**Exemplo 138.** O seguinte código:

```
-->deff('y = f(x)', 'y = x + sin(x)')
```

define, no Scilab, a função  $f(x) = x + \sin x$ .

Observe que  $f(\pi) = \pi$ . Confirme isso computando:



```
-->f(%pi)
```

no Scilab.

Alternativamente, definimos a mesma função com o código:

```
function [y] = f(x)
    y = x + sin(x)
endfunction
```

Verifique!

**Exemplo 139.** O seguinte código Scilab:

```
function [z] = h(x,y)
    if (x < y) then
        z = y - x
    else
        z = x - y
    end
endfunction
```

define a função:

$$h(x,y) = \begin{cases} y - x & , x < y \\ x - y & , x \geq y \end{cases}$$

**Exemplo 140.** O seguinte código:

```
function [y] = J(x)
    y(1,1) = 2*x(1)
    y(1,2) = 2*x(2)

    y(2,1) = -x(2)*sin(x(1)*x(2))
    y(2,2) = -x(1)*sin(x(1)*x(2))
endfunction
```

define a matriz jacobiana  $J(x_1, x_2) := \frac{\partial(f_1, f_2)}{\partial(x_1, x_2)}$  da função:

$$\mathbf{f}(x_1, x_2) = (x_1^2 + x_2^2, \cos(x_1 x_2)).$$

## A.6 Gráficos

Para criar um esboço do gráfico de uma função de uma variável real  $y = f(x)$ , podemos usar a função `plot`. Esta função faz uma representação gráfica de pontos  $(x_i, y_i)$  fornecidos. O Scilab oferece uma série de opções para esta função de forma que o usuário pode ajustar várias questões de visualização. Consulte sobre a função `plot` no manual do Scilab.

**Exemplo 141.** Veja as seguintes linhas de código:

```
-->deff('y = f(x)', 'y = x .^ 3 + 1')  
-->x = linspace(-2, 2, 100);  
-->plot(x, f(x)); xgrid
```

# Resposta dos Exercícios

Recomendamos ao leitor o uso criterioso das respostas aqui apresentadas. Devido a ainda muito constante atualização do livro, as respostas podem conter imprecisões e erros.

**E 2.1.1.** a) 4; b) 9; c)  $b^2$ ; d) 7; e) 170; f) 7,125; g) 3,28

**E 2.1.5.**  $(101,1)_2$

**E 2.1.6.**  $(11,1C)_{16}$

**E 2.1.7.** 50; 18

**E 2.1.8.** 10,5;  $(1010,1)_2$

**E 2.3.2.** a) 1,7889; b) 1788,9; c) 0,0017889; d) 0,0045966; e)  $2,1755 \times 10^{-10}$ ; f)  $2,1755 \times 10^{10}$

**E 2.3.6.** a)  $\delta_{\text{abs}} = 3,46 \times 10^{-7}$ ,  $\delta_{\text{rel}} = 1,10 \times 10^{-7}$ ; b)  $\delta_{\text{abs}} = 1,43 \times 10^{-4}$ ,  $\delta_{\text{rel}} = 1,00 \times 10^{-3}$

**E 2.6.1.** 2%

**E 2.6.2.** 3,2% pela aproximação ou 3,4% pela segundo método ( $0,96758 \leq I \leq 1,0342$ ).

**E 2.7.1.** Quando  $\mu$  é pequeno,  $e^{1/\mu}$  é um número grande. A primeira expressão produz um "overflow" (número maior que o máximo representável) quando  $\mu$  é pequeno. A segunda expressão, no entanto, reproduz o limite 1 quando  $\mu \rightarrow 0+$ .

**E 2.7.2.** a)  $\frac{1}{2} + \frac{x^2}{4!} + O(x^4)$ ; b)  $x/2 + O(x^2)$ ; c)  $5 \cdot 10^{-4}x + O(x^2)$ ; d)  $\frac{\sqrt{2}}{4}y + O(y^2) = \frac{\sqrt{2}}{4}x + O(x^2)$

**E 2.7.5.**  $4,12451228 \times 10^{-16}$  J; 0,002%;  $0,26654956 \times 10^{-14}$  J; 0,002%;  $4,98497440 \times 10^{-13}$  J; 0,057%;  $1,74927914 \times 10^{-12}$  J; 0,522%.

**E 2.7.6.** Em ambos casos, temos a seguinte estrutura:

$$\begin{bmatrix} S_{11} & S_{12} \\ S_{21} & S_{22} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} [A] \\ [B] \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} v_1 \\ v_2 \end{bmatrix}$$

De forma que

$$\begin{bmatrix} [A] \\ [B] \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} S_{11} & S_{12} \\ S_{21} & S_{22} \end{bmatrix}^{-1} \begin{bmatrix} v_1 \\ v_2 \end{bmatrix} = \frac{1}{S_{11}S_{22} - S_{12}S_{21}} \begin{bmatrix} S_{22} & -S_{12} \\ -S_{21} & S_{11} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} v_1 \\ v_2 \end{bmatrix}$$

Portanto

$$\begin{aligned} [A] &= \frac{S_{22}v_1 - S_{12}v_2}{S_{11}S_{22} - S_{12}S_{21}} \\ [B] &= \frac{-S_{21}v_1 + S_{11}v_2}{S_{11}S_{22} - S_{12}S_{21}} \end{aligned}$$

Usando derivação logarítmica, temos

$$\begin{aligned} \frac{1}{[A]} \frac{\partial [A]}{\partial S_{11}} &= -\frac{S_{22}}{S_{11}S_{22} - S_{12}S_{21}} \\ \frac{1}{[A]} \frac{\partial [A]}{\partial S_{12}} &= -\frac{v_2}{S_{22}v_1 - S_{12}v_2} + \frac{S_{21}}{S_{11}S_{22} - S_{12}S_{21}} = -\frac{[A]}{[B]} \cdot \frac{S_{22}}{S_{11}S_{22} - S_{12}S_{21}} \\ \frac{1}{[A]} \frac{\partial [A]}{\partial S_{21}} &= \frac{S_{12}}{S_{11}S_{22} - S_{12}S_{21}} \\ \frac{1}{[A]} \frac{\partial [A]}{\partial S_{22}} &= \frac{v_1}{S_{22}v_1 - S_{12}v_2} - \frac{S_{11}}{S_{11}S_{22} - S_{12}S_{21}} = \frac{[A]}{[B]} \cdot \frac{S_{12}}{S_{11}S_{22} - S_{12}S_{21}} \end{aligned}$$

e

$$\begin{aligned}
 \frac{1}{[B]} \frac{\partial [B]}{\partial S_{11}} &= \frac{v_2}{-S_{21}v_1 + S_{11}v_2} - \frac{S_{22}}{S_{11}S_{22} - S_{12}S_{21}} = \frac{[B]}{[A]} \frac{S_{21}}{S_{11}S_{22} - S_{12}S_{21}} \\
 \frac{1}{[B]} \frac{\partial [B]}{\partial S_{12}} &= \frac{S_{21}}{S_{11}S_{22} - S_{12}S_{21}} \\
 \frac{1}{[B]} \frac{\partial [B]}{\partial S_{21}} &= -\frac{v_1}{-S_{21}v_1 + S_{11}v_2} + \frac{S_{21}}{S_{11}S_{22} - S_{12}S_{21}} = -\frac{[B]}{[A]} \frac{S_{11}}{S_{11}S_{22} - S_{12}S_{21}} \\
 \frac{1}{[B]} \frac{\partial [B]}{\partial S_{22}} &= -\frac{S_{11}}{S_{11}S_{22} - S_{12}S_{21}}
 \end{aligned}$$

E o erro associado às medidas pode ser aproximado por

$$\begin{aligned}
 \frac{1}{[A]} \delta_{[A]} &= \left| \frac{1}{[A]} \frac{\partial [A]}{\partial S_{11}} \right| \delta_{S_{11}} + \left| \frac{1}{[A]} \frac{\partial [A]}{\partial S_{12}} \right| \delta_{S_{12}} + \left| \frac{1}{[A]} \frac{\partial [A]}{\partial S_{21}} \right| \delta_{S_{21}} + \left| \frac{1}{[A]} \frac{\partial [A]}{\partial S_{22}} \right| \delta_{S_{22}} \\
 &= \frac{1}{|\det S|} \left[ S_{22} \delta_{S_{11}} + \frac{[A]}{[B]} S_{22} \delta_{S_{12}} + S_{12} \delta_{S_{21}} + \frac{[A]}{[B]} S_{12} \delta_{S_{22}} \right]
 \end{aligned}$$

Analogamente, temos:

$$\frac{1}{[B]} \delta_{[B]} = \frac{1}{|\det S|} \left[ \frac{[B]}{[A]} S_{21} \delta_{S_{11}} + S_{21} \delta_{S_{11}} + \frac{[B]}{[A]} S_{11} \delta_{S_{21}} + S_{11} \delta_{S_{22}} \right]$$

onde não se indicou  $|S_{ij}|$  nem  $|[\cdot]|$  pois são todos positivos.

Fazemos agora a aplicação numérica:

**Caso do par 1-2:**

$$\det S = \begin{vmatrix} 270 & 30 \\ 140 & 20 \end{vmatrix} = 1200$$

$$\begin{aligned}
\frac{1}{[A]} \delta_{[A]} &= \frac{1}{1200} [20 \times 270 \times 2\% + 20 \times 30 \times 2\% + 30 \times 140 \times 2\% + 30 \times 20 \times 2\%] \\
&= \frac{216}{1200} = 0.18 = 18\% \\
\frac{1}{[B]} \delta_{[B]} &= \frac{1}{1200} [140 \times 270 \times 2\% + 140 \times 30 \times 2\% + 270 \times 140 \times 2\% + 270 \times 20 \times 2\%] \\
&= \frac{426}{1200} = 0.355 = 35.5\%
\end{aligned}$$

**Caso do par 1-3:**

$$\det S = \begin{vmatrix} 270 & 30 \\ 15 & 200 \end{vmatrix} = 53550$$

$$\begin{aligned}
\frac{1}{[A]} \delta_{[A]} &= \frac{1}{53550} [200 \times 270 \times 2\% + 200 \times 30 \times 2\% + 30 \times 15 \times 10\% + 30 \times 200 \times 10\%] \\
&= \frac{1804,6}{52550} \approx 0.0337 = 3.37\% \\
\frac{1}{[B]} \delta_{[B]} &= \frac{1}{53550} [15 \times 270 \times 2\% + 15 \times 30 \times 2\% + 270 \times 15 \times 10\% + 270 \times 200 \times 10\%] \\
&= \frac{5895}{53550} \approx 0.11 = 11\%
\end{aligned}$$

Conclusão, apesar de o sensor 3 apresentar uma incerteza cinco vezes maior na sensibilidade, a escolha do sensor 3 para fazer par ao sensor 1 parece mais adequada.



**E 3.1.1.** Observamos que a equação é equivalente a  $\cos(x) - x = 0$ . Tomando, então,  $f(x) = \cos(x) - x$ , temos que  $f(x)$  é contínua em  $[0, \pi/2]$ ,  $f(0) = 1$  e  $f(\pi/2) = -\pi/2 < 0$ . Logo, do teorema de Bolzano 1, concluímos que a equação dada tem pelo menos uma solução no intervalo  $(0, \pi/2)$ .

**E 3.1.2.** No Exercício 3.1.1, mostramos que a função  $f(x) = \cos(x) - x$  tem um zero no intervalo  $[0, \pi/2]$ . Agora, observamos que  $f'(x) = -\sin(x) - 1$ . Como  $0 < \sin x < 1$  para todo  $x \in (0, \pi/2)$ , temos que  $f'(x) < 0$  em  $(0, \pi/2)$ , i.e.  $f(x)$  é monotonicamente decrescente neste intervalo. Logo, da Proposição 1, temos que existe um único zero da função neste intervalo.

**E 3.1.3.**  $k \approx 0,161228$

**E 3.1.5.** Escolhendo o intervalo  $[a, b] = [-1,841 - 10^{-3}, -1,841 + 10^{-3}]$ , temos  $f(a) \approx 5 \times 10^{-4} > 0$  e  $f(b) \approx -1,2 \times 10^{-3} < 0$ , i.e.  $f(a) \cdot f(b) < 0$ . Então, o teorema de Bolzano nos garante que o zero exato  $x^*$  de  $f(x)$  está no intervalo  $(a, b)$ . Logo, da escolha feita,  $|-1,841 - x^*| < 10^{-3}$ .

**E 3.1.6.** Basta aplicar as ideias da solução do Exercício 3.1.5.

**E 3.2.2.** A primeira raiz se encontra no intervalo  $(0,4,0,5)$ . A segunda raiz no intervalo  $(1,7,1,8)$ . A terceira raiz se encontra no intervalo  $(2,5,2,6)$ .

**E 3.2.3.** 1,390054; 1,8913954; 2,4895673; 3,1641544; 3,8965468

**E 3.2.4.**  $k\theta = \frac{lP}{2} \cos(\theta)$  com  $\theta \in (0, \pi/2)$ ; 1,030.

**E 3.2.5.** 19; 23; 26; 0,567143; 1,745528; 3,385630

**E 3.2.7.** a) 0,623; b) 0,559; c) 0,500; d) 0,300; e)  $-0,3$ ; f)  $-30$ ; g)  $-30$

**E 3.2.8.** a) 0,0294; b)  $2.44e - 3$ ; c)  $2.50e - 4$ ; d)  $1.09 \cdot 10^{-7}$ ; e)  $-10^{-12}$ ; f)  $-10^{-12}$ ; g)  $-10^{-12}$

**E 3.3.1.**  $-1,8414057$

**E 3.3.2.** 0,7391

**E 3.3.3.** Tomemos  $x^{(1)} = 1$  como aproximação inicial para a solução deste problema, iterando a primeira

sequência a), obtemos:

$$\begin{aligned}x^{(1)} &= 1 \\x^{(2)} &= \ln\left(\frac{10}{1}\right) = 2,3025851 \\x^{(3)} &= \ln\left(\frac{10}{2,3025851}\right) = 1,4685526 \\&\vdots \\x^{(21)} &= 1,7455151 \\x^{(31)} &= 1,745528 \\x^{(32)} &= 1,745528\end{aligned}$$

Iterando a segunda sequência b), obtemos:

$$\begin{aligned}x^{(1)} &= 1 \\x^{(2)} &= 10e^{-1} = 3,6787944 \\x^{(3)} &= 10e^{-3,6787944} = 0,2525340 \\x^{(4)} &= 10e^{-0,2525340} = 7,7682979 \\x^{(5)} &= 10e^{-7,7682979} = 0,0042293 \\x^{(6)} &= 10e^{-0,0042293} = 9,9577961\end{aligned}$$

Este experimento numérico sugere que a iteração a) converge para 1,745528 e a iteração b) não é convergente.

**E 3.3.9.**  $x > a$  com  $a \approx 0,4193648$ .

**E 3.3.12.** 0.0431266

**E 3.4.1.**

- a) Primeiramente, deve-se observar que a função  $\operatorname{tg}(x)$  não está definida quando  $x$  é um múltiplo ímpar de  $\frac{\pi}{2}$ , pelo que devemos cuidado nas singularidades. Traçamos o gráfico da função  $f(x) = \operatorname{tg}(x) - 2x^2$  no Scilab usando os seguintes comandos:

```
-->deff('y=f(x)', 'y=tan(x)-2*x^2')  
-->plot([0:.01:1.3],f)
```

Observamos facilmente uma raiz no intervalo  $(0,5, 0,6)$  e outra no intervalo  $(1,2, 1,3)$ . Como a função  $f(x)$  é contínua fora dos pontos de singularidade da tangente, é fácil verificar que existe pelo menos uma solução nos intervalos dados pelo teorema de Bolzano 1:

$$\begin{aligned}f(0,5) &\approx 0,046302 > 0 \\f(0,6) &\approx -0,035863 < 0 \\f(1,2) &\approx -0,30784e - 1 < 0 \\f(1,3) &\approx 0,22210e - 1 > 0\end{aligned}$$

Para provar a unicidade da solução em cada intervalo, precisamos mostra que a função é monótona, ou seja, a derivada não muda de sinal em cada intervalo:

$$\begin{aligned}f'(x) = \sec^2(x) - 4x &= \frac{1}{\cos^2(x)} - 4x \leq \frac{1}{\cos^2(0,6)} - 4 * 0,5 < 0, \quad x \in [0,5, 0,6] \\f'(x) = \sec^2(x) - 4x &= \frac{1}{\cos^2(x)} - 4x \geq \frac{1}{\cos^2(1,2)} - 4 * 1,3 > 0, \quad x \in [1,2, 1,3]\end{aligned}$$

- b) Já isolamos as raízes em intervalos de comprimento  $10^{-1}$  e a precisão requerida exige que as isolemos em intervalos de comprimento  $2 \times 10^{-8}$ . Como cada passo da bisseção, confina a raiz em um intervalo com comprimento igual à metade do comprimento do intervalo anterior, temos a seguinte condição para o número de passos  $N_p$ :

$$\frac{10^{-1}}{2^{N_p}} \leq 2 \times 10^{-8}$$

isso é equivalente a

$$N_p \geq \log_2 \frac{10^{-1}}{2 \times 10^{-8}} = \log_2 \frac{10^7}{2} = 7 \log_2 10 - 1 = \frac{7}{\log_1 02} - 1 \approx 22.22$$

Como  $N_p$  é inteiro, o menor  $N_p$  que satisfaz a condição é 23.

As raízes obtidas são 0.55970415 e 1.2703426.

- c) Para recalcular as raízes pelo método de Newton, basta executar a interação

$$x^{(n+1)} = x^{(n)} - \frac{f(x^{(n)})}{f'(x^{(n)})}$$

Em relação à observação, o erro se deveu à falta de cuidado em compreender o problema antes de tentar resolvê-lo, em especial, à falta de observar que a função é descontínua em múltiplos ímpares de  $\frac{\pi}{2}$ . Nestes pontos, a função  $f(x)$  troca de sinal, mas não passa por zero.

**E 3.4.2.** 0,65291864

**E 3.4.3.** 0.0198679; 0.533890; 0.735412; 1.13237; 1.38851.

**E 3.4.5.**  $-99.99970$ ,  $-0.3376513$ ;  $-1.314006$ .

**E 3.4.8.**  $x_0 > 1$ .

**E 3.6.5.** Seja  $f(x) \in C^2$  um função tal que  $f(x^*) = 0$  e  $f'(x^*) \neq 0$ . Considere o processo iterativo do método das secantes:

$$x^{(n+1)} = x^{(n)} - \frac{f(x^{(n)})}{f(x^{(n)}) - f(x^{(n-1)})} (x^{(n)} - x^{(n-1)})$$

Esta expressão pode ser escrita como:

$$\begin{aligned} x^{(n+1)} &= x^{(n)} - \frac{f(x^{(n)})(x^{(n)} - x^{(n-1)})}{f(x^{(n)}) - f(x^{(n-1)})} \\ &= \frac{x^{(n)} \left( f(x^{(n)}) - f(x^{(n-1)}) \right) - f(x^{(n)})(x^{(n)} - x^{(n-1)})}{f(x^{(n)}) - f(x^{(n-1)})} \\ &= \frac{x^{(n)} f(x^{(n-1)}) - x^{(n-1)} f(x^{(n)})}{f(x^{(n)}) - f(x^{(n-1)})} \end{aligned}$$

Subtraindo  $x^*$  de ambos os lados temos:

$$\begin{aligned}
 x^{(n+1)} - x^* &= \frac{x^{(n)}f(x^{(n-1)}) - x^{(n-1)}f(x^{(n)})}{f(x^{(n)}) - f(x^{(n-1)})} - x^* \\
 &= \frac{x^{(n)}f(x^{(n-1)}) - x^{(n-1)}f(x^{(n)}) - x^* \left( f(x^{(n)}) - f(x^{(n-1)}) \right)}{f(x^{(n)}) - f(x^{(n-1)})} \\
 &= \frac{(x^{(n)} - x^*)f(x^{(n-1)}) - (x^{(n-1)} - x^*)f(x^{(n)})}{f(x^{(n)}) - f(x^{(n-1)})}
 \end{aligned}$$

Definimos  $\epsilon_n = x_n - x^*$ , equivalente a  $x_n = x^* + \epsilon_n$

$$\epsilon_{n+1} = \frac{\epsilon_n f(x^* + \epsilon_{n-1}) - \epsilon_{n-1} f(x^* + \epsilon_n)}{f(x^* + \epsilon_n) - f(x^* + \epsilon_{n-1})}$$

Aproximamos a função  $f(x)$  no numerador por

$$f(x^* + \epsilon) \approx f(x^*) + \epsilon f'(x^*) + \epsilon^2 \frac{f''(x^*)}{2}$$

$$f(x^* + \epsilon) \approx \epsilon f'(x^*) + \epsilon^2 \frac{f''(x^*)}{2}$$

$$\begin{aligned}
 \epsilon_{n+1} &\approx \frac{\epsilon_n \left[ \epsilon_{n-1} f'(x^*) + \epsilon_{n-1}^2 \frac{f''(x^*)}{2} \right] - \epsilon_{n-1} \left[ \epsilon_n f'(x^*) + \epsilon_n^2 \frac{f''(x^*)}{2} \right]}{f(x^* + \epsilon_n) - f(x^* + \epsilon_{n-1})} \\
 &= \frac{\frac{f''(x^*)}{2} \left( \epsilon_n \epsilon_{n-1}^2 - \epsilon_{n-1} \epsilon_n^2 \right)}{f(x^* + \epsilon_n) - f(x^* + \epsilon_{n-1})} \\
 &= \frac{1}{2} \frac{f''(x^*) \epsilon_n \epsilon_{n-1} \left( \epsilon_{n-1} - \epsilon_n \right)}{f(x^* + \epsilon_n) - f(x^* + \epsilon_{n-1})}
 \end{aligned}$$

Observamos, agora, que

$$\begin{aligned} f(x^* + \epsilon_n) - f(x^* + \epsilon_{n-1}) &\approx \left[ f(x^*) + f'(x^*)\epsilon_n \right] - \left[ f(x^*) + f'(x^*)\epsilon_{n-1} \right] \\ &= f'(x^*)(\epsilon_n - \epsilon_{n-1}) \end{aligned} \tag{3.7}$$

Portanto:

$$\epsilon_{n+1} \approx \frac{1}{2} \frac{f''(x^*)}{f'(x^*)} \epsilon_n \epsilon_{n-1} \tag{3.8}$$

ou, equivalentemente:

$$x^{(n+1)} - x^* \approx \frac{1}{2} \frac{f''(x^*)}{f'(x^*)} \left( x^{(n)} - x^* \right) \left( x^{(n-1)} - x^* \right) \tag{3.9}$$

**E 3.7.1.**  $z_1 \approx 0.3252768, z_2 \approx 1.5153738, z_3 \approx 2.497846, z_4 \approx 3.5002901, z_j \approx j-1/2-(-1)^j \frac{e^{-2j+1}}{\pi}, \quad j >$

4

**E 3.7.2.** 150 W, 133 W, 87 W, 55 W, 6,5 W

**E 3.7.3.** a) 42 s e 8 min2 s, b) 14 min56 s.

**E 3.7.4.** 118940992



**E 3.7.5.** 7,7 cm

**E 3.7.6.** 4,32 cm

**E 3.7.7.** (0,652919, 0,426303)

**E 3.7.8.** 7,19% ao mês

**E 3.7.9.** 4,54% ao mês.

**E 3.7.10.** 500 K, 700 K em  $t = 3 \ln(2)$ , 26 min, 4 h27 min.

**E 3.7.11.**  $(\pm 1,1101388, -0,7675919)$ ,  $(\pm 1,5602111, 0,342585)$

**E 3.7.12.** 1,5318075

**E 3.7.13.** Aproximadamente 2500 reais por hora.

**E 3.7.14.** a) 332,74 K b) 359,33 K

**E 3.7.15.** 1,2285751, 4,76770758, 7,88704085

**E 4.1.1.** Escrevemos o sistema na forma matricial e resolvemos:

$$\begin{aligned} \left[ \begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 10 & -48 \\ 0 & 10 & 1 & 25 \end{array} \right] & \sim \left[ \begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & 9 & -48 \\ 0 & 10 & 1 & 25 \end{array} \right] \sim \left[ \begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 10 & 1 & 25 \\ 0 & -1 & 9 & -48 \end{array} \right] \sim \\ & \sim \left[ \begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 10 & 1 & 25 \\ 0 & 0 & 9.1 & -45.5 \end{array} \right] \sim \left[ \begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 10 & 1 & 25 \\ 0 & 0 & 1 & -5 \end{array} \right] \sim \\ & \sim \left[ \begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 0 & 5 \\ 0 & 10 & 0 & 30 \\ 0 & 0 & 1 & -5 \end{array} \right] \sim \left[ \begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 0 & 5 \\ 0 & 1 & 0 & 3 \\ 0 & 0 & 1 & -5 \end{array} \right] \sim \\ & \sim \left[ \begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & 0 & 3 \\ 0 & 0 & 1 & -5 \end{array} \right] \end{aligned}$$

Portanto  $x = 2$ ,  $y = 3$ ,  $z = -5$

**E 4.1.5.**

a)  $x = [4 \ 3 \ 2]^T$

b) O sistema é equivalente a

$$\begin{array}{rcccccc} \varepsilon x_1 & + & \varepsilon x_2 & + & (1 + \varepsilon)x_3 & = & 2 \\ \varepsilon x_1 & + & (1 + \varepsilon)x_2 & + & \varepsilon x_3 & = & 3 \\ (1 + \varepsilon)x_1 & + & \varepsilon x_2 & + & \varepsilon x_3 & = & 4 \end{array}$$

Somando as três equações temos

$$(1 + 3\varepsilon)(x_1 + x_2 + x_3) = 9 \implies x_1 + x_2 + x_3 = \frac{9}{1 + 3\varepsilon}$$

Subtraímos  $\varepsilon(x_1 + x_2 + x_3)$  da cada equação do sistema original e temos:

$$x_3 = 2 - \frac{9\varepsilon}{1+3\varepsilon}$$

$$x_2 = 3 - \frac{9\varepsilon}{1+3\varepsilon}$$

$$x_1 = 4 - \frac{9\varepsilon}{1+3\varepsilon}$$

Assim temos:

$$x_\varepsilon = [4 \quad 3 \quad 2]^T - \frac{9\varepsilon}{1 + 3\varepsilon} [1 \quad 1 \quad 1]^T$$

**E 4.1.6.**  $x = [1.6890368 \quad 1.6890368 \quad 1.5823257 \quad 1.2667776 \quad 0.6333888]^T$

**E 4.1.7.**

$$\begin{bmatrix} 1 & 1/2 & -1/2 \\ 1/3 & -1/2 & 1/6 \\ -1/3 & 0 & 1/3 \end{bmatrix}$$

**E 4.5.1.**  $\lambda = \frac{71 \times 30}{41} \approx 51.95122$ , para  $\lambda = 51$ :  $k_1 = k_\infty = 350.4$ ,  $k_2 = 262.1$ . Para  $\lambda = 52$ :  $k_1 = k_\infty = 6888$ ,  $k_2 = 5163$ .

**E 4.5.2.**  $k_1(A) = 36$ ,  $k_2(A) = 18,26$ ,  $K_\infty(A) = 20,8$ .

**E 4.5.3.**  $k_1 = k_\infty = 6888$ ,  $k_2 = \sqrt{26656567}$  e  $k_1 = 180$ ,  $k_2 = 128,40972$  e  $k_\infty = 210$

**E 4.5.4.**  $\frac{18}{\varepsilon} + 3$ . Quando  $\varepsilon \rightarrow 0+$ , a matriz converge para uma matriz singular e o número de condicionamento diverge para  $+\infty$ .

**E 4.5.5.** As soluções são  $[-0.0000990 \ 0.0000098]^T$  e  $[0.0098029 \ 0.0990294]^T$ . A grande variação na solução em função de pequena variação nos dados é devido ao mau condicionamento da matriz ( $k_1 \approx 1186274.3$ ). Exemplo de implementação:

```
A=[1e5 -1e4+1e-2; -1e4+1e-2 1000.1]
b1=[-10 1]'
b2=[-9.999 1.01]'
A\b1
A\b2
```

**E 4.5.6.** 0,695; 0,292; 0,188; 0,0237; 0,0123; 0,00967

Exemplo de implementação:

```
J=[1:1:10]
x=sin(J/10)
```

```

y=J/10
z=y-y.^3/6
e=abs(x-y)./x
f=abs(x-z)./x
norm(e,1)
norm(e,2)
norm(e,'inf')
norm(f,1)
norm(f,2)
norm(f,'inf')

```

#### E 4.6.1.

```

epsilon=1e-3;

A=[1 -1 0 0 0; -1 2 -1 0 0; 0 -1 (2+epsilon) -1 0; 0 0 -1 2 -1; 0 0 0 1 -1]

v=[1 1 1 1 1]'
xgauss=gauss([A v])

function x=q_Jacobi()
    x0=[0 0 0 0 0]'

    i=0
    controle=0
    while controle<3 & i<1000
        i=i+1

        x(1)=1+x0(2)
        x(2)=(1+x0(3)+x0(1))/2
        x(3)=(1+x0(2)+x0(4))/(2+epsilon)
        x(4)=(1+x0(3)+x0(5))/2
        x(5)=x0(4)-1
    end
end

```

```

delta=norm(x-x0,2)
if delta<1e-6 then
    controle=controle+1
else
    controle=0
end
fprintf('i=%d, x1=%f, x5=%f, tol=%.12f\n',i,x(1),x(5),delta)
x0=x;
end

```

endfunction

```

function x=q_Gauss_Seidel()
    x0=[0 0 0 0 0]'

    i=0
    controle=0
    while controle<3 & i<15000
        i=i+1

        x(1)=1+x0(2)
        x(2)=(1+x0(3)+x(1))/2
        x(3)=(1+x(2)+x0(4))/(2+epsilon)
        x(4)=(1+x(3)+x0(5))/2
        x(5)=x(4)-1

        delta=norm(x-x0,2)
        if delta<1e-2 then
            controle=controle+1
        else
            controle=0
        end
        fprintf('i=%d, x1=%f, x5=%f, tol=%.12f\n',i,x(1),x(5),delta)
        x0=x;
    end
end

```

```
endfunction
```

**E 4.6.4.** 0.324295, 0.324295, 0.317115, 0.305943, 0.291539, 0.274169, 0.253971, 0.230846, 0.203551, 0.165301, 0.082650

Exemplos de rotinas:

```
function x=jacobi()
    x0=zeros(11,1)
    k=0;
    controle=0;
    while controle<3 & k<1000
        k=k+1
        x(1)=x0(2)
        for j=2:10
            x(j)=(cos(j/10)+x0(j-1)+x0(j+1))/5
        end
        x(11)=x0(10)/2

        delta=norm(x-x0) //norma 2
        if delta<1e-5 then
            controle=controle+1
        else
            controle=0;
        end
        mprintf('k=%d, x=[%f,%f,%f], tol=%.12f\n',k,x(1),x(2),x(3),delta)
        x0=x;
    end

endfunction
```

```
function x=gs()
    x0=zeros(11,1)
```

```

k=0;
controle=0;
while controle<3 & k<1000
    k=k+1
    x(1)=x0(2)
    for j=2:10
        x(j)=(cos(j/10)+x(j-1)+x0(j+1))/5
    end
    x(11)=x0(10)/2

    delta=norm(x-x0) //norma 2
    if delta<1e-5 then
        controle=controle+1
    else
        controle=0;
    end
    mprintf('k=%d, x=[%f,%f,%f], tol=%.12f\n',k,x(1),x(2),x(3),delta)
    x0=x;
end
endfunction

```

**E 4.6.6.** Permute as linhas 1 e 2.

**E 4.7.1.**  $\lambda = 86.1785$  associado ao autovetor dado por  $v_1 = [0.65968 \ 0.66834 \ 0.34372]^T$ .

**E 4.7.3.** 158,726

**E 4.8.1.** a)  $V_5 = 98.44V$  b)  $V_5 = 103.4V$



O problema com cinco incógnitas pode ser escrito na forma matricial conforme a seguir:

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ \frac{1}{R_1} & -\left(\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_5}\right) & \frac{1}{R_2} & 0 & 0 \\ 0 & \frac{1}{R_2} & -\left(\frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3} + \frac{1}{R_6}\right) & \frac{1}{R_3} & 0 \\ 0 & 0 & \frac{1}{R_3} & -\left(\frac{1}{R_3} + \frac{1}{R_4} + \frac{1}{R_7}\right) & \frac{1}{R_4} \\ 0 & 0 & 0 & \frac{1}{R_4} & -\left(\frac{1}{R_4} + \frac{1}{R_8}\right) \end{bmatrix} \begin{bmatrix} V_1 \\ V_2 \\ V_3 \\ v_4 \\ V_5 \end{bmatrix}$$

Este problema pode ser implementado no Scilab (para o item a) com o seguinte código:

```
R1=2, R2=2, R3=2, R4=2, R5=100, R6=100, R7=100, R8=50, V=127

A=[1      0      0      0      0;
   1/R1  -(1/R1+1/R2+1/R5)  1/R2      0      0;
   0      1/R2  -(1/R2+1/R3+1/R6)  1/R3      0;
   0      0      1/R3  -(1/R3+1/R4+1/R7)  1/R4;
   0      0      0      1/R4  -(1/R4+1/R8)]

v=[V; 0; 0; 0; 0]
y=A\v
```

O problema com quatro incógnitas pode ser escrito na forma matricial conforme a seguir:

$$\begin{bmatrix} -\left(\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_5}\right) & \frac{1}{R_2} & 0 & 0 \\ \frac{1}{R_2} & -\left(\frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3} + \frac{1}{R_6}\right) & \frac{1}{R_3} & 0 \\ 0 & \frac{1}{R_3} & -\left(\frac{1}{R_3} + \frac{1}{R_4} + \frac{1}{R_7}\right) & \frac{1}{R_4} \\ 0 & 0 & \frac{1}{R_4} & -\left(\frac{1}{R_4} + \frac{1}{R_8}\right) \end{bmatrix} \begin{bmatrix} V_2 \\ V_3 \\ v_4 \\ V_5 \end{bmatrix} =$$

Cuja implementação pode ser feita conforme

$$A = \begin{bmatrix} -(1/R_1 + 1/R_2 + 1/R_5) & 1/R_2 & 0 & 0 \\ 1/R_2 & -(1/R_2 + 1/R_3 + 1/R_6) & 1/R_3 & 0 \\ 0 & 1/R_3 & -(1/R_3 + 1/R_4 + 1/R_7) & 1/R_4 \\ 0 & 0 & 1/R_4 & -(1/R_4 + 1/R_8) \end{bmatrix}$$

$$v = [-V/R_1; 0; 0; 0]$$

$$y = A \backslash v$$

**E 4.8.2.** Dica:  $P(-1) = -3$ ,  $P(1) = -1$  e  $P(2) = 9$  produzem três equações lineares para os coeficientes

$a$ ,  $b$  e  $c$ . Resp: a)  $P(x) = 3x^2 + x - 5$ , b)  $A \approx 2.49$  e  $B \approx -1.29$  c)  $A_1 \approx 1.2872058$ ,  $A_2 \approx -4.3033034$ ,

$B_1 \approx 2.051533$  e  $B_2 \approx -0.9046921$ .

**E 6.2.1.**  $5x^3 + 2x - 3$

**E 6.4.1.**  $\int_0^1 P(x)dx = \frac{f(0)+f(1)}{2}, \frac{1}{12} \max_{x \in [0,1]} |f''(x)|$

**E 6.5.1.**  $y = -0,0407898x^2 + 2,6613293x + 1,9364598$

$x_i$	$y_i$	$ax_i^2 + bx_i + c$	$ax_i^2 + bx_i + c - y_i$
0,01	1,99	1,963069	-0,0269310
1,02	4,55	4,6085779	0,0585779
2,04	7,2	7,1958206	-0,0041794
2,95	9,51	9,4324077	-0,0775923
3,55	10,82	10,870125	0,0501249

**E 6.5.2.**  $a = 25,638625, b = 9,8591874, c = 4,9751219$  e  $a = 31,475524, b = 65,691531, c = -272,84382,$

$d = 208,23621.$

**E 7.1.3.**

a)  $f'(0) = \frac{-3f(0)+4f(h)-f(2h)}{2h} + O(h^2)$

b)  $f'(0) = \frac{3f(0)-4f(-h)+f(-2h)}{2h} + O(h^2)$

$$\text{c) } f'(0) = \frac{1}{h_1+h_2}l \left[ -\frac{h_2}{h_1}f(-h_1) + \left( \frac{h_2}{h_1} - \frac{h_1}{h_2} \right) f(0) + \frac{h_1}{h_2}f(h_2) \right]$$

$$\text{d) } f''(0) = \frac{f(0)-2f(h)+f(2h)}{h^2} + O(h)$$

$$\text{e) } f''(0) = \frac{f(0)-2f(-h)+f(-2h)}{h^2} + O(h)$$

**E 7.1.4.**

<i>Caso</i>	<i>a</i>	<i>b</i>	<i>c</i>	<i>d</i>
$v_i = 1$	1.72	1.56	1.64	1.86
$v_i = 4.5$	2.46	1.90	2.18	1.14

**E 7.2.1.**

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ -1 & 2 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 2 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 2 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} u_1 \\ u_2 \\ u_3 \\ u_4 \\ u_5 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 5 \\ 2 \\ 2 \\ 2 \\ 10 \end{bmatrix}$$

Solução: [5, 9.25, 11.5, 11.75, 10]

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ -1 & 2 & -1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 2 & -1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 2 & -1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -1 & 2 & -1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -1 & 2 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -1 & 2 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -1 & 2 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} u_1 \\ u_2 \\ u_3 \\ u_4 \\ u_5 \\ u_6 \\ u_7 \\ u_8 \\ u_9 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 5 \\ 0.5 \\ 0.5 \\ 0.5 \\ 0.5 \\ 0.5 \\ 0.5 \\ 0.5 \\ 10 \end{bmatrix}$$

Solução: [5, 7.375, 9.25, 10.625, 11.5, 11.875, 11.75, 1.125, 10]

**E 7.2.2.** 120. 133.56 146.22 157.83 168.22 177.21 184.65 190.38 194.28 196.26 196.26 194.26 190.28 184.38  
176.65 167.21 156.22 143.83 130.22 115.56 100.

**E 7.2.3.** 391.13 391.13 390.24 388.29 385.12 380.56 374.44 366.61 356.95 345.38 331.82 316.27 298.73 279.27  
257.99 234.99 210.45 184.5 157.34 129.11 100.

**E 7.2.4.** 0., 6.57, 12.14, 16.73, 20.4, 23.24, 25.38, 26.93 , 28, 28.7, 29.06, 29.15, 28.95, 28.46, 27.62 , 26.36,  
24.59, 22.18, 19.02, 14.98, 10.

**E 7.2.5.** u(0)=31.62, u(1)=31.50, u(1.9)=18.17

**E 7.2.6.**  $u(1)=1.900362$ ,  $u(2.5)=1.943681$ ,  $u(4)=1.456517$

**E 7.3.1.**

	exato	Ponto médio	Trapézio	Simpson
$\int_0^1 e^{-x} dx$	$1 - e^{-1} \approx 0.6321206$	$e^{-1/2} \approx 0.6065307$	$\frac{1+e^{-1}}{2} \approx 0.6839397$	$\frac{1+4e^{-1/2}+e^{-1}}{6} \approx 0.6321206$
$\int_0^1 x^2 dx$	$1/3 \approx 0.3333333$	0.25	0.5	0.3333333
$\int_0^1 x^3 dx$	$1/4 = 0.25$	0.125	0.5	0.25
$\int_0^1 x e^{-x^2} dx$	$\frac{1}{2} (1 - e^{-1}) \approx 0.3160603$	0.3894004	0.1839397	0.3200000
$\int_0^1 \frac{1}{x^2+1} dx$	$\tan^{-1}(1) \approx 0.7853982$	0.8	0.75	0.7853982
$\int_0^1 \frac{x}{x^2+1} dx$	$\frac{1}{2} \ln(2) \approx 0.3465736$	0.4	0.25	0.3465736
$\int_0^1 \frac{1}{x+1} dx$	$\ln(2) \approx 0.6931472$	0.6666667	0.75	0.6940000

**E 7.3.2.** Resp: 8, 10 e 8.666667.

**E 7.3.3.**

$$I_{Simpson} = \frac{1}{3} I_{Trap} + \frac{2}{3} I_{PM}$$

**E 7.3.4.**

n	Ponto médio	Trapézios	Simpson
3	0.1056606	0.7503919	0.5005225
5	0.1726140	0.3964724	0.2784992
7	0.1973663	0.3062023	0.2393551
9	0.2084204	0.2721145	0.2306618

**E 7.3.5.**

$$a) I(h) = 4.41041 \cdot 10^{-1} - 8.49372 \cdot 10^{-12}h - 1.22104 \cdot 10^{-2}h^2 - 1.22376 \cdot 10^{-7}h^3 + 8.14294 \cdot 10^{-3}h^4$$

$$b) I(h) = 7.85398 \cdot 10^{-1} - 1.46294 \cdot 10^{-11}h - 4.16667 \cdot 10^{-2}h^2 - 2.16110 \cdot 10^{-7}h^3 + 4.65117 \cdot 10^{-6}h^4$$

$$c) I(h) = 1.58730 \cdot 10^{-3} - 9.68958 \cdot 10^{-10}h + 2.03315 \cdot 10^{-7}h^2 - 1.38695 \cdot 10^{-5}h^3 + 2.97262 \cdot 10^{-4}h^4$$

$$d) I(h) = 4.61917 \cdot 10^{-1} + 3.83229 \cdot 10^{-12}h + 2.52721 \cdot 10^{-2}h^2 + 5.48935 \cdot 10^{-8}h^3 + 5.25326 \cdot 10^{-4}h^4$$

**E 7.3.6.**

1.5707963	2.0943951		
1.8961189	2.0045598	1.9985707	
1.9742316	2.0002692	1.9999831	2.0000055

**E 7.3.7.** 0.7468337, 2.4606311, 1.6595275.

**E 7.3.9.**  $R(6,6) = -10.772065$ ,  $R(7,7) = 5.2677002$ ,  $R(8,8) = 6.1884951$ ,  $R(9,9) = 6.0554327$ ,  $R(10,10) = 6.0574643$ . O valor desta integral com oito dígitos corretos é aproximado por 6.0574613.

**E 7.3.10.**  $w_1 = 1/6$ ,  $w_2 = 2/3$ ,  $w_3 = 1/6$ . O esquema construído é o de Simpson e a ordem de exatidão é 3.

**E 7.3.11.** 3

**E 7.3.12.** 5

**E 7.3.13.**  $\int_0^1 f(x)dx \approx \frac{3}{2}f(1/3) - 2f(1/2) + \frac{3}{2}f(2/3)$  com ordem 3.

**E 7.3.15.** 5, 4, 3



**E 7.3.16.**  $\int_{-1}^1 f(x)dx = f\left(-\frac{\sqrt{3}}{3}\right) + f\left(\frac{\sqrt{3}}{3}\right)$

**E 7.3.17.**  $w_1 = w_3 = 1$  e  $w_2 = 0$  com ordem 3.

**E 7.4.1.** -0.2310491, -0.2452073, - 0.2478649.

**E 7.4.3.** a)-0.2472261, -0.2416451, -0.2404596, -0.2400968, -0.2399563, -0.2398928. b)-0.2393727, -0.2397994, -0.2398104, -0.2398115, -0.2398117, -0.2398117.

**E 7.4.4.**

n	b	c	d	e	f
2	2.205508	3.5733599	3.6191866	3.6185185	3.618146
4	2.5973554	3.6107456	3.6181465	3.6180970	3.6180970
6	2.7732372	3.6153069	3.6181044	3.6180970	3.6180970
8	2.880694	3.6166953	3.6180989	3.6180970	3.6180970

**Solução do item e:** Como

$$\cos(x) = 1 + \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{x^{2n}}{(2n)!}$$

temos

$$\frac{1 - \cos(x)}{\sqrt{x}} = - \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{x^{2n-1/2}}{(2n)!}, \quad x \geq 0$$

Logo, podemos integrar

$$\begin{aligned} I &= 4 + 2 \int_0^1 \frac{\cos(x) - 1}{\sqrt{|x|}} dx = 4 - 2 \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \int_0^1 \frac{x^{2n-1/2}}{(2n)!} dx \\ &= 4 - 2 \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{1}{(2n)!(2n+1/2)} \end{aligned}$$

**Solução do item f)**

$$2 \int_0^1 \left( x^{-1/2} - \frac{x^{3/2}}{2} + \frac{x^{7/2}}{24} \right) dx = 2 \left( 2 - \frac{1}{5} + \frac{1}{54} \right) = \frac{977}{270}$$

$$2 \int_0^1 \frac{\cos(x) - P_4(x)}{\sqrt{x}} dx = \sqrt{2} \int_{-1}^1 \frac{\cos\left(\frac{1+u}{2}\right) - P_4\left(\frac{1+u}{2}\right)}{\sqrt{1+u}} du$$

**E 7.4.8.** 4.1138

**E 7.4.9.** a)19.2, 22.1, 23.3 b)513.67K

**E 8.1.1.** 0,4496 com  $h = 0,1$  e 0,4660 com  $h = 0,01$ . A solução exata vale  $y(1) = \frac{1+2e^{-1}+e^{-2}}{4} =$

$$\left(\frac{1+e^{-1}}{2}\right)^2 \approx 0,4678$$

**E 8.1.2.**  $y(2) \approx 0,430202$  e  $z(2) = 0,617294$  com  $h = 0,2$ ,  $y(2) \approx 0,435506$  e  $z(2) = 0,645776$  com  $h = 0,02$ ,

$y(2) \approx 0,435805$  e  $z(2) = 0,648638$  com  $h = 0,002$  e  $y(2) \approx 0,435832$  e  $z(2) = 0,648925$  com  $h = 0,0002$ .

**E 8.1.3.**  $y(2) \approx 1,161793$  com  $h = 0,1$ ,  $y(2) \approx 1,139573$  com  $h = 0,01$ ,  $y(2) \approx 1,137448$  com  $h = 0,001$ ,

$y(2) \approx 1,137237$  com  $h = 0,0001$ ,  $y(2) \approx 1,137216$  com  $h = 0,00001$

**E 8.2.1.**  $y(1) \approx 1,317078$  quando  $h = 0,1$  e  $y(1) \approx 1,317045$ .

**E 8.2.2.**

$t$	Exato	Euler	Euler Melhorado	Erro Euler	Erro Euler Melhorado
0.0	1.	1.	1.	0.	0.
0.1	0.826213	0.8	0.828	0.026213	0.001787
0.2	0.693094	0.656	0.695597	0.037094	0.002502
0.3	0.588333	0.547366	0.591057	0.040967	0.002724
0.4	0.504121	0.462669	0.506835	0.041453	0.002714
0.5	0.435267	0.394996	0.437861	0.040271	0.002594
0.6	0.378181	0.339894	0.380609	0.038287	0.002428
0.7	0.330305	0.294352	0.332551	0.035953	0.002246
0.8	0.289764	0.256252	0.291828	0.033512	0.002064
0.9	0.255154	0.224061	0.257043	0.031093	0.001889
1.0	0.225400	0.196634	0.227126	0.028766	0.001726

No Scilab, esta tabela pode ser produzida com o código:

```
deff('dy=f(y,t)','dy=-y-y^2')
sol_Euler=Euler(f,0,1,10,1)
sol_Euler_mod=Euler_mod(f,0,1,10,1)
deff('y=y_exata(t)','y=1/(2*exp(t)-1)')
t=[0:.1:1]
sol_exata=feval(t,y_exata)
tabela=[t sol_exata sol_Euler sol_Euler_mod abs(sol_exata-sol_Euler) abs(sol_exata-sol_Euler_mod)]
```

**E 8.9.1.** Os valores exatos para os itens e e f são:  $\frac{1}{10} \ln \left( \frac{9}{4} \right)$  e  $\frac{1}{10} \ln(6)$

**E 8.9.2.** O valor exato é  $\sqrt{\frac{g}{\alpha} \left[ 1 - e^{-200\alpha} \right]}$  em  $t = \frac{1}{\sqrt{g\alpha}} \tanh^{-1} \left( \sqrt{1 - e^{-200\alpha}} \right)$

**E 8.9.8.**

	0.5	1.0	1.5	2.0	2.5
Analítico	0.3032653	0.3678794	0.3346952	0.2706706	0.2052125
Euler	0.3315955	0.3969266	0.3563684	0.2844209	0.2128243
Euler modificado	0.3025634	0.3671929	0.3342207	0.2704083	0.2051058
Runge-Kutta Clássico	0.3032649	0.3678790	0.3346949	0.2706703	0.2052124
Adams-Bashforth ordem 4	0.3032421	0.3678319	0.3346486	0.2706329	0.2051848

	0.5	1.0	1.5	2.0	2.5
Euler	2.8D-02	2.9D-02	2.2D-02	1.4D-02	7.6D-03
Euler modificado	7.0D-04	6.9D-04	4.7D-04	2.6D-04	1.1D-04
Runge-Kutta Clássico	4.6D-07	4.7D-07	3.5D-07	2.2D-07	1.2D-07
Adams-Bashforth ordem 4	2.3D-05	4.8D-05	4.7D-05	3.8D-05	2.8D-05

	0.1	0.05	0.01	0.005	0.001
Euler	2.9D-02	5.6D-03	2.8D-03	5.5D-04	2.8D-04
Euler modificado	6.9D-04	2.5D-05	6.2D-06	2.5D-07	6.1D-08
Runge-Kutta Clássico	4.7D-07	6.9D-10	4.3D-11	6.8D-14	4.4D-15
Adams-Bashforth ordem 4	4.8D-05	9.0D-08	5.7D-09	9.2D-12	5.8D-13

# Referências Bibliográficas

- [1] Cecill and free software. <http://www.cecill.info>. Acessado em 30 de julho de 2015.
- [2] M. Baudin. Introduction to scilab. <http://forge.scilab.org/index.php/p/docintrotoscilab/>. Acessado em 30 de julho de 2015.
- [3] R.L. Burden and J.D. Faires. *Análise Numérica*. Cengage Learning, 8 edition, 2013.

- [4] J. P. Demailly. *Analyse Numérique et Équations Différentielles*. EDP Sciences, Grenoble, nouvelle Édition edition, 2006.
- [5] W Gautschi. Numerical analysis: An introduction birkhauser. *Barton, Mass, USA*, 1997.
- [6] Walter Gautschi and Gabriele Inglese. Lower bounds for the condition number of vandermonde matrices. *Numerische Mathematik*, 52(3):241–250, 1987/1988.
- [7] L.F. Guidi. Notas da disciplina cálculo numérico. [http://www.mat.ufrgs.br/~guidi/grad/MAT01169/calculo\\_numerico.pdf](http://www.mat.ufrgs.br/~guidi/grad/MAT01169/calculo_numerico.pdf). Acessado em julho de 2016.
- [8] E. Isaacson and H.B. Keller. *Analysis of numerical methods*. Dover, Ontário, 1994.
- [9] R. Rannacher. Einführung in die numerische mathematik (numerik 0). <http://numerik.uni-hd.de/~lehre/notes/num0/numerik0.pdf>. Acessado em 10.08.2014.

# Colaboradores

Até o momento não temos registro de colaborações externas ao corpo de organizadores. Ajude-nos a mudar isso editando você mesmo este livro. Seja o primeiro a ter o registro de sua colaboração neste espaço. O código fonte está disponível no repositório GitHub:

<https://github.com/livroscolaborativos/CalculoNumerico>

Dúvidas, escreva para a lista de emails:

[livro\\_colaborativo@googlegroups.com](mailto:livro_colaborativo@googlegroups.com)



# Índice Remissivo

ajuste

    derivação, 465

ajuste de curvas, 371

aproximação

    de funções, 344

    por polinômios, 362

aritmética

    de máquina, 6

autovalores, 304

cancelamento catastrófico, 61

contração, 135

critério de parada, 112

derivação numérica, 442

diferenças divididas de Newton,  
    351

eliminação gaussiana, 214

equação

    logística, 559

equação diferencial

não autônoma, 562

equações

- de uma variável, 100

erro

- absoluto, 47
- relativo, 47

erros, 46

- absoluto, 146
- arredondamento, 452
- de arredondamento, 53
- truncamento, 449

estabilidade, 591

fórmula de diferenças finitas, 443

- alta ordem, 457
- central, 463

função, 102

- raiz de, 101

zero, 102

zero de, 101

integração numérica, 485

- método composto

  - de Simpson, 510
  - dos trapézios, 507

- método de Romberg, 513
- ordem de precisão, 520
- regra de Simpson, 500
- regra do ponto médio, 489
- regra do trapézio, 494
- regras compostas, 506
- regras de Newton-Cotes, 488

interpolação

- cúbica segmentada, 412
- derivação, 465
- linear segmentada, 407

- polinomial, 347
- iteração do
  - ponto fixo, 128
- iteração do ponto fixo, 101
  - convergência, 143
  - estabilidade, 143
- método
  - da bisseção, 110
  - de Euler, 557
    - ordem de precisão, 574
  - de Euler melhorado, 569
  - de passo múltiplo
    - Adams-Bashforth, 588
  - de Runge-Kutta, 584
    - de quarta ordem, 586
  - de separação de variáveis, 560
  - dos mínimos quadrados, 371
  - método da bisseção, 101
  - método da potência, 304
  - método das frações parciais, 560
  - método das secantes, 101, 179
    - convergência, 184
  - método de
    - Gauss-Seidel, 275
    - Jacobi, 270
    - Newton, 162
    - Newton-Raphson, 162
  - Método de Jacobi
    - matriz de iteração, 285
    - vetor de iteração, 285
  - método de Newton, 101
    - para sistemas, 323
  - método de Newton-Raphson, 162
    - convergência, 167
  - método de passo múltiplo

- Adams-Moulton, 590
- métodos iterativos
  - sistemas lineares, 269
  - convergência, 280
- matriz
  - condicionamento, 253
  - diagonal dominante, 297
  - jacobiana, 339
- matriz de
  - iteração, 280
- medida
  - de erro, 47
  - de exatidão, 47
- mudança de base, 7
- número de condicionamento, 263
- norma
  - $L^\infty$ , 256

- $L^p$ , 256
- norma de
  - matrizes, 260
  - vetores, 256
- ordem de precisão, 574
- polinômios
  - de Lagrange, 357
- ponto fixo, 128
- porção áurea, 191
- problema de
  - ponto fixo, 128
- problema de valor de contorno,  
473
- problema de valor inicial, 554
- quadratura numérica
  - Gauss-Legendre, 530

- representação
  - de números, 21
  - números inteiros, 22
- representação de números inteiros
  - bit de sinal, 25
  - complemento de dois, 27
  - sem sinal, 23
- Scilab, 604
  - elementos da linguagem, 611
  - funções, 633
  - funções e constantes, 614
  - gráficos, 636
  - instalação e execução, 607
  - matrizes, 617
  - operações matemáticas, 613
  - operador :, 619
  - operadores lógicos, 615
  - ramificação e repetição, 628
  - sobre, 605
  - usando, 608
- sequência de Fibonacci, 191
- simulação
  - computacional, 2
  - numérica, 2
- sistema de equações
  - não lineares, 315
- sistema de numeração, 7
- sistema linear, 211
  - condicionamento, 253
- sistema numérico
  - de ponto fixo, 30
  - de ponto flutuante, 35
  - ponto fixo

normalização, 32

sistemas

de equações diferenciais, 564

spline, 412

fixado, 426

natural, 418

teorema de

Bolzano, 102

Teorema do

ponto fixo, 135

teorema do

ponto fixo, 162

teorema do valor intermediário,

102

tolerância, 146

vetor de

iteração, 280