ICS 65.020
CCS B 16

NY

中华人民共和国农业行业标准

NY/T 2156—2025

代替 NY/T 2156—2012

水稻主要病害防治技术规程

Technical code of practice for control of the major rice diseases

纸质版文本为正式文本
参考件

2025-12-09 发布　　2026-05-01 实施

中华人民共和国农业农村部 发布

前　言

本文件按照 GB/T 1.1—2020《标准化工作导则　第 1 部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件代替 NY/T 2156—2012《水稻主要病害防治技术规程》，与 NY/T 2156—2012 相比，除结构调整和编辑性改动外，主要技术变化如下：

a）　删除了术语和定义（见 2012 年版的第 3 章）；

b）　增加了真菌病害、细菌和植原体病害、病毒病害、线虫病害等防治对象（见第 4 章）；

c）　更改了防治策略的相关规定（见第 5 章，2012 年版的第 4 章）；

d）　增加了防治程序的相关规定（见第 6 章）；

e）　更改了防治生育期的相关规定（见 7.2，7.3，7.4，2012 年版的 5.2，5.3，5.4，5.5）；

f）　更改了品种选择、种子检疫、秧田选择、田园卫生等播种前的相关规定（见 7.1，2012 年版的 5.1）；

g）　更改了种子处理、物理阻隔、培育壮秧、药剂防治、带药移栽等播种至苗期的相关规定（见 7.2，2012 年版的 5.2，5.3）；

h）　更改了农业防治、药剂防治等分蘖至孕穗期的相关规定（见 7.3，2012 年版的 5.4）；

i）　更改了农业防治、药剂防治等抽穗至成熟期的相关规定（见 7.4，2012 年版的 5.5）；

j）　更改了防效评价的相关规定（见第 8 章，2012 年版的第 6 章）；

k）　增加了档案记录的相关规定（见第 9 章）。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由农业农村部种植业管理司提出并归口。

本文件起草单位：江苏省农业科学院、全国农业技术推广服务中心、贵州大学、贵州省植保植检站、云南省红河州农科院、上海交通大学、广东省农业科学院植物保护研究所、安徽省农业科学院植物保护与农产品质量安全研究所、湖北省植物保护总站、江苏省植物保护植物检疫站、黑龙江省植检植保站、浙江新农化工股份有限公司。

本文件主要起草人：刘凤权、刘慧、赵延存、李开怀、周阳、雷强、陈功友、陈深、江兆春、谷春艳、孙伟波、冯晓东、卓富彦、陆明红、马娇、赵杨扬、王勇、李诚、徐会永、龚伟荣、张求东、宋显东、李勇成、魏方林、徐仲奎。

本文件及其所代替文件的历次版本发布情况为：

——2012 年首次发布为 NY/T 2156—2012；

——本次为第一次修订。

纸质文本为试读
参考件
联系电话010-59194426

水稻主要病害防治技术规程

1 范围

本文件确立了水稻主要病害防治的对象、策略和程序，规定了播种前、播种至苗期、分蘖至孕穗期、抽穗至成熟期等阶段的操作指示，描述了防效评价和档案记录等追溯方法。

本文件适用于水稻主要病害的防治。

2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 8321（所有部分） 农药合理使用准则

GB 8371 水稻种子产地检疫规程

GB 15569 农业植物调运检疫规程

GB/T 15790 稻瘟病测报调查规范

GB/T 15791 稻纹枯病测报技术规范

GB/T 17980（所有部分） 农药 田间药效试验准则

NY/T 1464（所有部分） 农药田间药效试验准则

NY/T 2386 水稻黑条矮缩病防治技术规程

NY/T 2918 南方水稻黑条矮缩病防治技术规程

3 术语和定义

本文件没有需要界定的术语和定义。

4 防治对象

4.1 真菌病害

重点防治稻瘟病（*Magnaporthe oryzae*）、水稻纹枯病（*Rhizoctonia solani*）、稻曲病（*Ustilaginoidea virens*）、水稻穗腐病（*Fusarium proliferatum*、*Bipolaris australiensis*、*Curvularia lunata*、*Alternaria tenuis*），兼防水稻恶苗病（*Fusarium verticillioides*）、水稻胡麻斑病（*Cochliobolus miyabeanus*）、水稻立枯病（*Fusarium* spp.、*Pythium* spp.、*Rhizoctonia solani*、*Achlya* spp.）、水稻叶鞘腐败病（*Sarocladium oryzae*）、稻粒黑粉病（*Tilletia horrida*）、水稻谷枯病（*Phoma glumarum*）等。

4.2 细菌和植原体病害

重点防治水稻白叶枯病（*Xanthomonas oryzae* pv. *oryzae*）和水稻细菌性条斑病（*Xanthomonas oryzae* pv. *oryzicola*）、兼防水稻细菌性基腐病（*Dickeya zeae*）、水稻橙叶病（*Candidatus Phytoplasma asteris*）、水稻细菌性褐条病（*Acidovorax avenae* subsp. *avenae*）和水稻细菌性穗枯病（*Burkholderia glumae*）等。

4.3 病毒病害

重点防治南方水稻黑条矮缩病（*Southern rice black-streaked dwarf virus*，SRBSDV）和水稻黑条矮缩病（*Rice black-streak dwarf virus*，RBSDV），兼防水稻条纹叶枯病（*Rice stripe virus*，RSV）和水稻锯齿叶矮缩病（*Rice ragged stunt virus*，RRSV）等。

4.4 线虫病害

重点防治水稻根结线虫病(*Meloidogyne graminicola*)和水稻干尖线虫病(*Aphelenchoides besseyi*)。

5 防治策略

采取“预防为主,综合防治,统防统治,绿色安全”的策略。以稻田生态系统为中心,以生育期为主线,以预测预报为前提,以选用抗(耐)病品种和健身栽培为基础,以主要病害防治为重点,因地制宜采用检疫措施、农业防治、生物防治、物理防治和化学防治相融合的系统解决方案。

6 防治程序

水稻主要病害防治程序包括4个阶段,其中,播种前阶段分为4个步骤,播种至苗期阶段分为5个步骤,分蘖至孕穗期阶段分为2个步骤,抽穗至成熟期阶段分为2个步骤。相关步骤中的农药施用应按GB/T 8321中有关要求执行,推荐药剂及用量见附录A。程序流程如图1所示。




图1 水稻主要病害防治程序流程

7 防治措施

7.1 播种前

7.1.1 品种选择

因地制宜选择高产、优质、抗(耐)病品种,并进行合理布局与轮换种植。

7.1.2 种子检疫

按照GB 8371和GB 15569中有关要求,开展水稻种子产地检疫和调运检疫。

7.1.3 秧田选择

应选择病害发生轻或未发生的田块作为秧田；病毒病传毒介体稻飞虱、叶蝉重发区，秧田应远离麦田；病毒病和细菌病害发生区，中稻和晚稻秧田应远离发病的早稻田。

7.1.4 田园卫生

应及时清理、销毁田头或田间病稻草及稻田周边杂草；冬闲稻田宜深翻晒田或种植绿肥，双季早稻收获后应及时翻耕沤田；水稻纹枯病重发田块，翻耕平田后应打捞浪渣（菌核），并带出田外销毁。

7.2 播种至苗期

7.2.1 种子处理

针对稻瘟病、纹枯病、恶苗病、胡麻斑病、立枯病、细菌性条斑病、干尖线虫病等种传病害和病毒病传毒介体，可在播种前选用福美双、噻呋酰胺、嘧菌酯、咪鲜胺、咯菌腈、噻唑锌、氯溴异氰尿酸、杀螟丹、噻虫嗪等药剂进行浸种、拌种或使用种子包衣剂进行包衣。

7.2.2 物理阻隔

针对南方水稻黑条矮缩病、黑条矮缩病等病毒病，可采用 20 目～40 目防虫网或 15 g/m^2～20 g/m^2 无纺布全程覆盖秧田育秧，阻隔介体昆虫传毒。

7.2.3 培育壮秧

播前应增施有机肥，秧苗期应合理调控水肥，或喷施芸薹素内酯、氨基寡糖素等药剂 1 次。

7.2.4 药剂防治

7.2.4.1 在南方水稻黑条矮缩病常发区，当春季（4 月—5 月）迁入白背飞虱带毒率大于 1% 或早稻中后期 20%以上田块矮缩及矮化病株率大于 3%时，应在中、晚稻苗期和分蘖初期选用内吸性、持效期长的三氟苯嘧啶、吡虫啉、噻虫嗪或吡蚜酮等防治白背飞虱，并联合使用毒氟磷或宁南霉素等防治病毒病。

7.2.4.2 在水稻黑条矮缩病常发区，当一代灰飞虱成虫每 667 m^2 带毒虫量达到 6 700 头或二代若虫每 667 m^2 带毒虫量达到 10 000 头时，应喷药防治 1 次～2 次，药后保持 3 cm～5 cm 水层 3 d～5 d。药剂参照南方水稻黑条矮缩病。

7.2.4.3 当苗期出现水稻立枯病和胡麻斑病症状时，应及时选用噁霉灵、蛇床子素、福美双或丙森锌等叶面喷雾 1 次～2 次。

7.2.5 带药移栽

针对稻瘟病、胡麻斑病、立枯病、细菌性病害、病毒病等苗期病害，应结合田间病害发生情况，在秧苗移栽前 2 d～3 d 选用三环唑、戊唑醇、井冈霉素 A、宁南霉素、噻唑锌、噻菌铜、高地芽孢杆菌 ST15、吡虫啉、噻虫嗪、噻虫胺等喷施。

7.3 分蘖至孕穗期

7.3.1 农业防治

应加强水肥管理，实行浅水勤灌，在足蘖前及时晒田。宜平衡施肥，避免重施、偏施氮肥，合理增施磷、钾肥。病毒病发病较重田块，应及时拔除感病株。

7.3.2 药剂防治

7.3.2.1 稻瘟病

应重点防治叶瘟。当水稻分蘖期田间初见病斑时，可轮换选用三环唑、稻瘟灵、戊唑醇、氟环唑或春雷霉素、多抗霉素、沼泽红假单胞菌等喷施 1 次～2 次。

7.3.2.2 水稻纹枯病

当分蘖期田间病丛率达到 15%～20%时，可轮换选用井冈霉素 A、井冈·蜡芽菌、申嗪霉素或枯草芽孢杆菌、噻呋酰胺、己唑醇、苯甲·丙环唑、氟环唑或咪铜·氟环唑等喷施 1 次～2 次。

7.3.2.3 稻曲病、穗腐病和叶鞘腐败病

在水稻破口前 7 d～10 d（10%水稻剑叶叶枕与倒二叶叶枕齐平时），可轮换选用井冈·蜡芽菌、氟环唑、咪铜·氟环唑、申嗪霉素、苯甲·丙环唑或肟菌·戊唑醇等喷施预防 1 次。

7.3.2.4 水稻白叶枯病和细菌性条斑病

当田间出现发病中心时应及时喷药封锁。可轮换选用噻唑锌、氯溴异氰尿酸、噻菌铜或中生菌素等围绕发病中心由外而内喷药，间隔 7 d 再喷施 1 次。施药后 24 h 内遇雨水天气应及时补治。

7.3.2.5 其他措施

分蘖初期可喷施芸薹素内酯或氨基寡糖素等药剂 1 次。

7.4 抽穗至成熟期

7.4.1 农业防治

7.4.1.1 科学管水

水稻抽穗后应适时排水晒田；灌浆期宜保持田内有水层，防止断水；灌浆后采取浅、湿、干间歇灌溉。对于水稻纹枯病、白叶枯病、细菌性条斑病、细菌性基腐病和根结线虫病等病害发生田，宜排、灌分开，不应串灌、漫灌；当遇暴雨时，应及时排涝，防止涝渍。

7.4.1.2 合理施肥

可根据水稻品种类型、产量目标、植株长势和土壤肥力状况，确定穗肥施用时间和施用量。宜使用复合肥作穗肥，合理增施磷、钾肥，喷施硅肥。

7.4.1.3 收获管理

水稻成熟后应采取低茬收割，宜稻草离田或处理后还田。

7.4.2 药剂防治

7.4.2.1 稻瘟病

应重点防治穗瘟。孕穗期剑叶发病田块或破口初期遇适温高湿，应在 5%破口期和齐穗期各施药 1 次；如齐穗期后气候条件仍适宜，7 d 后可再施药 1 次。药剂见 7.3.2.1。

7.4.2.2 水稻纹枯病

病丛率达到 20%以上的重病田块，应在破口抽穗初期施药 1 次。药剂见 7.3.2.2。

7.4.2.3 稻粒黑粉病

三系制种田应在母本抽穗 30%～50%时施药 1 次，两系制种田在母本抽穗 30%时和齐穗期各施药 1 次。药剂可选用烯唑·多菌灵。

7.4.2.4 稻曲病、穗腐病和叶鞘腐败病

遇多雨天气或多露，应在破口抽穗初期施药 1 次。药剂见 7.3.2.3。

7.4.2.5 水稻白叶枯病和细菌性条斑病

在病害常发区或老病区，或在台风、暴雨前后应施药 1 次～2 次，药剂见 7.3.2.4。在病害流行期，不宜使用植保无人机施药。

7.4.2.6 其他措施

破口期可喷施芸薹素内酯或氨基寡糖素等药剂 1 次。当水稻胡麻斑病、谷枯病、细菌性基腐病和穗枯病等病害发生严重时，可结合主要病害防治进行兼防。

8 防效评价

8.1 调查时间

以调查病害的发生和防治期为依据，一般在水稻分蘖末期或收获前进行调查。施药处理前应调查病情基数，在末次施药后 7 d～14 d 进行第 1 次药效调查，施药后 14 d～21 d 进行第 2 次药效调查，并记录相关信息。

8.2 调查方法

病害田间调查方法和病情分级方法应按 GB/T 15790、GB/T 15791、GB/T 17980、NY/T 1464、NY/T 2386、NY/T 2918 相关规定执行。

8.3 效果评价

应根据施药处理田与非处理田(对照田)调查结果,按 GB/T 17980、NY/T 1464、NY/T 2386、NY/T 2918 中有关规定计算病情指数和防治效果,并记录相关信息。

9 档案记录

应及时收集、记录、整理水稻主要病害发生与防治过程中的相关信息和资料,建立专门档案,定期归档,档案保存时间不少于 2 年。水稻主要病害防治信息档案表见附录 B。

附 录 A
（资料性）
水稻主要病害防治适期、防治指标和使用药剂

水稻主要病害防治适期、防治指标和使用药剂见表 A.1。

表 A.1 水稻主要病害防治适期、防治指标和使用药剂

病害名称	防治适期或防治指标	使用方法	推荐药剂及用量
稻瘟病	播种至苗期：种子处理和带药移栽 分蘖至孕穗期：在田间初见病斑时即施药 1 次～2 次 抽穗至成熟期：在 5%破口期和齐穗期各施药 1 次；如齐穗期后气候条件仍适宜，7 d 后可再施药 1 次	拌种	50%福美双可湿性粉剂 1∶200（药种比）或 24.1%肟菌·异噻胺悬浮剂 15 mL/kg～25 mL/kg 种子等
		种子包衣	20%多·福悬浮种衣剂 1∶(40～50)（药种比）
		喷雾	20%三环唑可湿性粉剂 75 g～100 g、40%稻瘟灵乳油 75 mL～100 mL、50%多菌灵可湿性粉剂 90 g～120 g、9%吡唑醚菌酯微囊悬浮剂 56 mL～73 mL、6%春雷霉素可溶液剂 40 mL～50 mL、10%嘧菌酯微囊悬浮剂 65 mL～80 mL、30%肟菌·戊唑醇悬浮剂 36 mL～45 mL 或 2 亿 CFU/mL 沼泽红假单胞菌用量 300 mL～600 mL 等
纹枯病	播种至苗期：种子处理和带药移栽 分蘖至孕穗期：田间病丛率达到 15%～20%时施药 1 次～2 次 抽穗至成熟期：病丛率达到 20%以上时，在破口抽穗初期再施药 1 次	拌种	19%噻呋酰胺干拌种剂 1 000 g/100 kg～1 600 g/100 kg 种子或 28%噻虫嗪·噻呋酰胺种子处理悬浮剂 360 g/100 kg～570 g/100 kg 种子
		种子包衣	30 g/L 苯醚甲环唑悬浮种衣剂 300 mL/100 kg～400 mL/100 kg 种子或 26%苯甲·吡虫啉悬浮种衣剂 1∶125（药种比）
		喷雾	5%井冈霉素水剂 200 mL～250 mL、50%多菌灵可湿性粉剂 90 g～120 g、10%己唑醇悬浮剂 30 mL～50 mL、300 g/L 苯甲·丙环唑乳油 15 mL～20 mL、125 g/L 氟环唑悬浮剂 50 mL～60 mL、15%井冈·戊唑醇悬浮剂 72 mL～88 mL、240 g/L 噻呋酰胺悬浮剂 15 mL～25 mL 或 50%戊唑·嘧菌酯悬浮剂 12 mL～18 mL 等
稻曲病	分蘖至孕穗期：破口前 7 d～10 d 施药 1 次预防 抽穗至成熟期：遇多雨天气，在破口抽穗初期再施药 1 次	喷雾	430 g/L 戊唑醇悬浮剂 10 mL～15 mL、30%肟菌·戊唑醇悬浮剂 36 mL～45 mL、125 g/L 氟环唑悬浮剂 40 mL～50 mL、36%丙环·咪鲜胺悬浮剂 40 g～50 g、19%啶氧·丙环唑微乳剂 50 mL～70 mL、14%井冈·戊唑醇可湿性粉剂 45 g～65 g 或 2 亿 CFU/mL 嗜硫小红卵菌 HNI-1 悬浮剂 200 mL～400 mL 等
穗腐病和叶鞘腐败病	参照稻曲病	喷雾	无登记药剂，参照稻曲病
水稻恶苗病	播种至苗期：种子处理	浸种	25%咪鲜胺乳油 2 000 倍液～4 000 倍液或 25 g/L 咯菌腈悬浮种衣剂 200 mL～300 mL/100 kg 种子等
		种子包衣	25 g/L 咯菌腈悬浮种衣剂 400 mL～600 mL/100 kg 种子、27%苯醚·咯·噻虫悬浮种衣剂 400 g～500 g/100 kg 种子、11%精甲·咯·嘧菌悬浮种衣剂 375 mL/100 kg～500 mL/100 kg 种子或 25%噻虫·咯·霜灵悬浮种衣剂 400 mL/100 kg～600 mL/100 kg 种子等
水稻胡麻斑病	播种至苗期：种子处理；苗期出现症状即喷药防治	拌种	50%福美双可湿性粉剂 1∶200（药种比）
		喷雾	70%丙森锌可湿性粉剂 100 g～150 g

表 A.1（续）

病害名称	防治适期或防治指标	使用方法	推荐药剂及用量
水稻立枯病	播种至苗期：种子处理；老病区可苗床浇灌；苗期出现症状即喷药防治	种子包衣	20%多·咪鲜·甲霜悬浮种衣剂 1 250 g/100 kg～1 665 g/100 kg 种子或 6%精甲·咯·嘧菌种子处理悬浮剂 667 mL/100 kg～1 000 mL/100 kg 种子等
		拌种	0.8%精甲·戊唑醇种子处理乳剂 1∶(25～75)(药种比)或 3.5%咪鲜·甲霜灵粉剂 1∶(80～100)(药种比)等
		浸种	0.3%四霉素水剂 500 倍液～750 倍液或 15%噁霉灵可湿性粉剂 1 000 倍液～1 600 倍液等
		苗床浇灌	15%噁霉灵水剂 6 g/m²～12 g/m²或 30%噁霉灵水剂 3 g/m²～6 g/m²等
		喷雾	30%噁霉灵水剂 3 g/m²～6 g/m²、3%甲霜·噁霉灵水剂 12 g/m²～18 g/m²或 1%蛇床子素水乳剂 0.225 mL/m²～0.3 mL/m²等
稻粒黑粉病	抽穗至成熟期：三系制种田在母本抽穗 30%～50%时喷药 1 次，两系制种田在母本抽穗 30%时和齐穗期各喷药 1 次	喷雾	18.7%烯唑·多菌灵可湿性粉剂 32 g～42.8 g
水稻细菌性条斑病	播种至苗期：种子处理和带药移栽 分蘖至孕穗期：当田间出现发病中心时立即施药防治 1 次，间隔 7 d 再施药 1 次 抽穗至成熟期：在病害常发区或老病区，或在台风、暴雨前后施药 1 次～2 次	浸种	20%噻唑锌悬浮剂 200 倍液～400 倍液或 40%三氯异氰尿酸可湿性粉剂 300 倍液～600 倍液
		喷雾	20%噻唑锌悬浮剂 100 mL～125 mL、30%噻唑锌悬浮剂 67 mL～100 mL、50%氯溴异氰尿酸可溶粉剂 50 g～60 g、3%辛菌胺醋酸盐可湿性粉剂 213 g～267 g、20%噻菌铜悬浮剂 125 g～160 g、2 亿 CFU/mL 嗜硫小红卵菌 HNI-1 悬浮剂 200 mL～400 mL 或 20 亿芽孢/mL 高地芽孢杆菌 ST15 悬浮剂 750 mL～1 000 mL 等
水稻白叶枯病	播种至苗期：种子处理和带药移栽 分蘖至孕穗期：当田间出现发病中心时立即施药防治 1 次，间隔 7 d 再施药 1 次 抽穗至成熟期：在病害常发区或老病区，或在台风、暴雨前后施药 1 次～2 次	浸种	无登记药剂，参照水稻细菌性条斑病
		喷雾	50%氯溴异氰尿酸可溶粉剂 40 g～60 g、45%代森铵水剂 50 mL、6%中生菌素可溶液剂 30 mL～40 mL、20%噻菌铜悬浮剂 100 g～130 g、20%噻森铜悬浮剂 100 mL～125 mL 或 60 亿芽孢/mL 解淀粉芽孢杆菌 LX-11 悬浮剂 500 g～650 g 等
南方水稻黑条矮缩病	播种至苗期：内吸性杀虫剂拌种和带药移栽；春季(4 月—5 月)迁入白背飞虱带毒率大于 1%，苗期用内吸性杀虫剂和防病毒制剂防治 1 次 分蘖至孕穗期：早稻中后期 20%以上田块矮缩及矮化病株率大于 3%时，中稻和晚稻在苗期和分蘖初期各防治 1 次	拌种	50%吡蚜酮种子处理可分散粉剂 150 g/100 kg～200 g/100 kg 种子或 10%呋虫胺干拌种剂 1 500 g/100 kg～2 260 g/100 kg 种子等
		喷雾	10%三氟苯嘧啶悬浮剂 10 mL～16 mL、10%吡虫啉可湿性粉剂 10 g～20 g、25%噻虫嗪水分散粒剂 2 g～4 g、30%噻虫胺悬浮剂 15 mL～25 mL 等防治白背飞虱；30%毒氟磷可湿性粉剂 45 g～75 g、0.06%甾烯醇微乳剂 30 mL～40 mL、2%香菇多糖水剂 100 mL～120 mL、8%宁南霉素可溶液剂 60 mL～70 mL 或 5.9%辛菌·吗啉胍水剂 150 mL～250 mL 等防治病毒病
水稻黑条矮缩病	播种至苗期：一代灰飞虱成虫每亩带毒虫量 6 700 头或二代若虫每亩带毒虫量 10 000 头防治 1 次～2 次	喷雾	参照南方水稻黑条矮缩病

表 A.1（续）

病害名称	防治适期或防治指标	使用方法	推荐药剂及用量
水稻条纹叶枯病	播种至苗期：杂交稻秧田每亩灰飞虱带毒虫量 1 000 头，大田初期每亩灰飞虱带毒虫量 3 000 头，其他品种类型田可适当放宽指标	拌种	50%吡蚜酮种子处理可分散粉剂 150 g/100 kg～200 g/100 kg 种子、10%呋虫胺干拌种剂 1 500 g/100 kg～2 260 g/100 kg 种子等
		喷雾	25%噻虫嗪水分散粒剂 2 g～4 g 或 25%吡蚜酮可湿性粉剂 16 g～20 g 等防治灰飞虱；2%香菇多糖水剂 50 mL～60 mL、8%宁南霉素可溶液剂 67 mL～83 mL、20%吗胍·乙酸铜可湿性粉剂 120 g～150 g 或 0.36%苦参碱可溶液剂 45 g～60 g 等防治病毒病
水稻根结线虫病	播种至苗期：灌根和土壤处理	灌根	无登记药剂，可选用 41.7%氟吡菌酰胺悬浮剂 60 mL～80 mL 等
		土壤处理	无登记药剂，可选用 10%噻唑膦颗粒剂 1 500 g～2 000 g 或 5 亿孢子/g 淡紫拟青霉颗粒剂 3 000 g～3 500 g 等
水稻干尖线虫病	播种至苗期：种子处理	浸种	12%咪鲜·杀螟丹可湿性粉剂 400 倍液～800 倍液、6%杀螟丹水剂 1 000 倍液～2 000 倍液或 12%氟啶·戊·杀螟可分散粉剂 87 g/100 kg～130 g/100 kg 种子等
注 1：此表引用自中国农药信息网（http://www.chinapesticide.org.cn/）。 注 2：药剂喷雾、灌根、土壤处理用量为每 667 m^2 用量。			

附　录　B
（资料性）
水稻主要病害防治信息档案表

水稻主要病害防治信息档案见表 B.1。

表 B.1　水稻主要病害防治信息档案表

稻田位置					水稻品种				
生育期					发病情况				
序号	病害名称	发病日期	施药日期	药剂名称	施用剂量及浓度	施药前病情基数	第一次调查日期及防效	第二次调查日期及防效	记录人
1									
2									
3									
4									
5									
……									
注：施用剂量是指每 667 m^2 施用的商品药剂量。									