

自由度是由线性代数中借用的术语。

- **定义1.** 若存在一组不全为零的常数  $C_1$ 、 $C_2$ 、...、 $C_n$  使得  $C_1X_1+C_2X_2+\dots+C_nX_n=0$ ，则称变量  $X_1$ 、 $X_2$ 、...、 $X_n$  之间存在一个约束条件。

- **定义2.** 若存在  $k$  个约束条件

$$C_{i1}X_1+C_{i2}X_2+\dots+C_{in}X_n=0, \quad i=1, 2, \dots, k$$

其中系数矩阵  $(C_{ij})_{kn}$  的秩为  $k$ ，且对于任何  $m$  ( $k \leq m$ ) 个约束：

$$C_{i1}'X_1+C_{i2}'X_2+\dots+C_{in}'X_n=0, \quad i=1, 2, \dots, m$$

矩阵  $(C_{ij}')_{mn}$  的秩总不大于  $k$ ，则称变量  $X_1$ 、 $X_2$ 、...、 $X_n$  之间存在  $k$  个独立的线性约束条件。

易知， $X_1$ 、 $X_2$ 、...、 $X_n$  中只有  $(n-k)$  个独立变量。



- **定义3.** 若在平方和  $\sum X_i^2$  中,  $X_1$ 、 $X_2$ 、...、 $X_n$ 之间存在着  $k$  个独立的线性约束条件, 则称平方和  $\sum X_i^2$  的自由度为  $n-k$  (即其中独立变量为  $n-k$  个)。

## 例 统计量的分布(之一)

设  $X_1, X_2, \dots, X_n$  是来自正态总体  $X \sim N(\mu, \sigma^2)$  的容量为  $n$  的样本, 求下列统计量的概率分布:

$$1. \quad \bar{X} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i$$

$$2. \quad Y = \frac{1}{\sigma^2} \sum_{i=1}^n (X_i - \mu)^2$$

解

$$1. \quad X_i \sim N(\mu, \sigma^2) \Rightarrow \sum_{i=1}^n X_i \sim N(n\mu, n\sigma^2)$$

$$\text{故} \quad \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i \sim N\left(\mu, \frac{\sigma^2}{n}\right)$$

$$2. \quad \frac{X_i - \mu}{\sigma} \sim N(0, 1) \Rightarrow \sum_{i=1}^n \left( \frac{X_i - \mu}{\sigma} \right)^2 \sim \chi^2(n)$$

$$\text{故} \quad Y = \frac{1}{\sigma^2} \sum_{i=1}^n (X_i - \mu)^2 \sim \chi^2(n)$$

# 例 查表计算概率

1. 若  $X \sim N(0,1)$        $P\{-1.58 \leq X \leq 1.96\} = ?$

2. 若  $\chi^2 \sim \chi^2(15)$        $P\{6.262 \leq \chi^2(15) \leq 24.996\} = ?$

解: 1.  $\because X \sim N(0,1)$

$$\begin{aligned}\therefore P\{-1.58 \leq X \leq 1.96\} &= P\{X \leq 1.96\} - P\{X \leq -1.58\} \\ &= P\{X \leq 1.96\} - [1 - P\{X \leq 1.58\}] \\ &= \Phi(1.96) - [1 - \Phi(1.58)] = 0.975 - (1 - 0.943) \\ &= 0.918\end{aligned}$$

2.  $\because \chi^2 \sim \chi^2(15)$

$$\begin{aligned}\therefore P\{6.262 \leq \chi^2(15) \leq 24.996\} \\ &= P\{\chi^2(15) \geq 6.262\} - P\{\chi^2(15) \geq 24.996\} \\ &= 0.975 - 0.05 = 0.925\end{aligned}$$

$$\chi_{0.975}^2(15) = 6.262$$

$$\chi_{0.005}^2(15) = 24.996$$

**注意：查表时应注意分布表的定义与查法！**

## 例 统计量的分布(之二)

设  $X_1, X_2, \dots, X_{n+m}$  是来自正态总体  $X \sim N(0, \sigma^2)$  的容量为  $n+m$  的样本, 求下列统计量的概率分布:

$$1. \quad Y = \frac{1}{\sigma^2} \sum_{i=1}^{n+m} X_i^2 \quad 2. \quad Z = \sqrt{\frac{m}{n}} \sum_{i=1}^n X_i / \sqrt{\sum_{i=n+1}^{n+m} X_i^2} \quad 3. \quad \frac{1}{Z^2}$$

解 1.  $\frac{X_i}{\sigma} \sim N(0,1)$  且所有  $\frac{X_i}{\sigma}$  相互独立 ( $i = 1, 2, \dots, n+m$ )

$$\text{故 } Y = \frac{1}{\sigma^2} \sum_{i=1}^{n+m} X_i^2 = \sum_{i=1}^{n+m} \left( \frac{X_i}{\sigma} \right)^2 \sim \chi^2(n+m)$$

$$2. \quad \text{因} \sum_{i=1}^n X_i \sim N(0, n\sigma^2) \Rightarrow U = \sum_{i=1}^n X_i / \sqrt{n\sigma^2} \sim N(0,1)$$

$$\text{同时} \quad V = \sum_{i=n+1}^{n+m} \frac{X_i^2}{\sigma^2} \sim \chi^2(m), \quad U \text{与} V \text{相互独立}$$

$$\text{从而有} \quad Z = \sqrt{\frac{m}{n}} \sum_{i=1}^n X_i / \sqrt{\sum_{i=n+1}^{n+m} X_i^2} = \frac{U}{\sqrt{V/m}} \sim t(m)$$

$$3. \quad U \sim N(0,1) \Rightarrow U^2 \sim \chi^2(1)$$

$$V \sim \chi^2(m), \quad U \text{与} V \text{相互独立}$$

$$\text{故} \quad \frac{1}{Z^2} = \frac{V/m}{U^2/1} \sim F(m,1)$$