

事件的独立性——掷四面体试验

例1 设同时掷两个均匀的四面体一次，每一个四面体的四面分别标有号码1, 2, 3, 4。

令 $A = \{\text{甲四面体向下的一面是偶数}\}$,

$B = \{\text{乙四面体向下的一面是奇数}\}$,

$C = \{\text{两个四面体向下的一面同为奇数或偶数}\}$ 。

由古典概率定义有

$$P(A) = P(B) = P(C) = 8/16 = 1/2$$

$$P(AB) = P(AC) = P(BC) = 1/4$$

$$P(ABC) = P(\phi) = 0$$

从而有 $P(AB) = P(A)P(B)$

$$P(AC) = P(A)P(C) \quad (*)$$

$$P(BC) = P(B)P(C)$$

电子科技大学成都学院 杜翔飞 bangfida@163.com

事件的独立性

即 A 、 B 、 C 中任意两个都是相互独立的，称 A 、 B 、 C 两两独立。

另一方面 $P(A|BC) = 0 \neq 1/2 = P(A)$

这说明事件 A 发生的可能性大小会受到 B 与 C 的“联合”影响。

若 $(*)$ 式成立，并且 $P(A|BC) = P(A)$ ，有

$$P(ABC) = P(A|BC)P(BC) = P(A)P(B)P(C)$$

称 A 、 B 、 C 相互独立。

电子科技大学成都学院 杜翔飞 bangfida@163.com

事件的独立性——三个臭皮匠，顶个诸葛亮

例2 三个枪手向一个神枪手比武，他们都独立地向同一目标射击，三个枪手的命中率分别为0.5、0.55、0.60，神枪手的命中率为0.90。问哪一方胜出的可能性大？

解：令 $A_i = \{\text{第 } i \text{ 个枪手命中目标}\}$ ， $i=1,2,3$ 。则有

A_1 、 A_2 、 A_3 相互独立。

于是由加法定理可得

$$p = P(A_1 \cup A_2 \cup A_3)$$

$$= P(A_1) + P(A_2) + P(A_3) - P(A_1 A_2) - P(A_1 A_3)$$

$$- P(A_2 A_3) + P(A_1 A_2 A_3)$$

$$= 0.5 + 0.55 + 0.60 - 0.5 \times 0.55 - 0.5 \times 0.60$$

$$- 0.60 \times 0.55 + 0.5 \times 0.55 \times 0.60$$

$$= 0.91$$

三个枪手胜出的可能性大

电子科技大学成都学院 杜翔飞 bangfida@163.com

思考： 进行决策时，是否三人出主意一定比一人高明？

这必须加上一些必要的假设才行，如：

- 三人出主意是相互独立的（互不影响）
- 一旦有了好主意就能被采纳
-

电子科技大学成都学院 杜翔飞 bangfida@163.com

事件的独立性——有志者事竟成

例3 某人做一次试验获得成功的概率仅为0.2，他持之以恒，不断重复试验，求他做10次试验至少成功一次的概率？做20次又怎样呢？

解：设他做 k 次试验至少成功一次的概率为 p_k ，

$A_k = \{\text{第 } k \text{ 次试验成功}\}$ ， $k=1, 2, \dots$

$$\text{则 } p_{10} = P(A_1 \cup A_2 \cup \dots \cup A_{10})$$

$$= 1 - P(\bar{A}_1) P(\bar{A}_2) \dots P(\bar{A}_{10})$$

$$= 1 - (1 - 0.2)^{10} \approx 0.8926$$

$$p_{20} = P(A_1 \cup A_2 \cup \dots \cup A_{20})$$

$$= 1 - P(\bar{A}_1) P(\bar{A}_2) \dots P(\bar{A}_{20})$$

$$= 1 - (1 - 0.2)^{20} \approx 0.9885$$

电子科技大学成都学院 杜翔飞 bangfida@163.com

事件的独立性

一般，将试验 E 重复进行 k 次，每次试验中 A 出现的概率 p ($0 < p < 1$) 则 A 至少出现一次的概率为

$$p_k = 1 - (1 - p)^k$$


并且

$$\lim_{k \rightarrow \infty} p_k = \lim_{k \rightarrow \infty} [1 - (1 - p)^k] = 1$$

电子科技大学成都学院 杜翔飞 bangfida@163.com

事件的独立性——系统的可靠性设计

例4 (可靠性问题)设有6个元件, 每个元件在单位时间内能正常工作的概率均为0.9, 且各元件能否正常工作是相互独立的, 试求下面系统能正常工作的概率。



解: 设 $A_k = \{\text{第}k\text{个元件能正常工作}\}$, $k=1, 2, \dots, 6$
 $A = \{\text{整个系统能正常工作}\}$
 $= (A_1 \cup A_2)(A_3 \cup A_4)(A_5 \cup A_6)$
 A_1, A_2, \dots, A_6 设相互独立, 可以证明 $A_1 \cup A_2$,
 $A_3 \cup A_4, A_5 \cup A_6$ 也相互独立

电子科技大学数学科学学院 杜娟飞 dujuanfei@sc.cn



事件的独立性

所以有

$$\begin{aligned} P(A) &= P(A_1 \cup A_2)P(A_3 \cup A_4)P(A_5 \cup A_6) \\ &= [1 - P(\overline{A_1} \overline{A_2})][1 - P(\overline{A_3} \overline{A_4})][1 - P(\overline{A_5} \overline{A_6})] \\ &= [1 - P(\overline{A_1})P(\overline{A_2})][1 - P(\overline{A_3})P(\overline{A_4})][1 - P(\overline{A_5})P(\overline{A_6})] \\ &= [1 - (1 - 0.9)^2]^3 = 0.970299 \end{aligned}$$

电子科技大学数学科学学院 杜娟飞 dujuanfei@sc.cn

