

第1章4节 事件的独立性

引例

十七世纪，法国的赌徒常就这样的事件打赌：

掷4次骰子至少出现一个幺点；

掷一对骰子24次至少出现一对幺点。

当时De Mere认为这两件事是等可能的，他推断：

- ◆ 一颗骰子掷一次，有 $1/6$ 的机会得到幺点，故4次有 $4 \times 1/6 = 2/3$ 的机会得到一个幺点
- ◆ 一对骰子掷一次，有 $1/36$ 的机会得到一对幺点，故24次有 $24 \times 1/36 = 2/3$ 的机会得到一对幺点。



电子科技大学成都学院 任翔飞 bangfida@163.com

第1章4节 事件的独立性

但经验表明前者比后者可能性大一点。出现了矛盾，试分析原因。

注1：De Mere 向Pascal请教该问题，Pascal在Fermat帮助下解决了这个问题。

注2：Fermat是法官和议员

De Mere的推导思路（以一颗骰子抛4次为例）：

设第 i 次抛掷出现幺点为 A_i ，掷4次骰子至少出现一个幺点的概率为

$$P\left(\bigcup_{i=1}^4 A_i\right) = \sum_{i=1}^4 P(A_i) = 4 \times \frac{1}{6} = \frac{2}{3}$$

哪里的推导出了问题？

提示： A_i 之间的关系是否符合有限可加性的前提…

电子科技大学成都学院 任翔飞 bangfida@163.com

一、两个事件的独立性

在一般情况下(如例1.3.1), $P(A|B) \neq P(A)$ 。

但若 $P(A|B) = P(A)$ (*)

成立，即事件 A 发生的可能性大小不受事件 B 的影响，则称 A 与 B 是相互独立的。

定义：设 A, B 是试验 E 的两个事件，若满足

$$P(AB) = P(A)P(B) \quad (**)$$

称事件 A 与 B 相互独立。

注：当 $P(B) > 0$ 时公式(*)与(**)是等价的

(*)式常用来判断事件的独立性，

(**)式常在已知独立时用于计算或证明。

电子科技大学成都学院 任翔飞 bangfida@163.com

互不相容与相互独立之间的关系

当 $P(A) > 0$ 且 $P(B) > 0$ 时，

“ A, B 互不相容”与“ A, B 相互独立”不能同时成立

若 A, B 互不相容，则 $P(AB) = P(\Phi) = 0$

若 A, B 相互独立，则 $P(AB) = P(A)P(B) > 0$

A, B 相互独立的例子：抛两枚硬币

设第一枚硬币出现正面为事件 A ，第二枚硬币出现正面为事件 B ，则 AB 相互独立，不是互不相容（可以同时发生）

A, B 互不相容的例子：无放回抽取

盒子内有标号1,2,2三张卡片， A 为第一次取出卡片1， B 为第二次取出卡片1，则 AB 互不相容，不是相互独立（相互影响）

$$P(A) = P(B) = 1/3, \quad P(B|A) = P(\Phi) = 0 \neq P(B)$$

电子科技大学成都学院 任翔飞 bangfida@163.com

定理：若事件 A 和 B 相互独立，则下列三对事件

$$\bar{A}, B; \quad A, \bar{B}; \quad \bar{A}, \bar{B}$$

也相互独立。

证明：仅对第三种情形证明，需证明 $P(\bar{A}\bar{B}) = P(\bar{A})P(\bar{B})$

因为 $P(AB) = P(A)P(B)$

$$\text{所以 } P(\bar{A}\bar{B}) = P(\overline{A \cup B}) = 1 - P(A \cup B)$$

$$= 1 - [P(A) + P(B) - P(AB)]$$

$$= 1 - P(A) - P(B) + P(A)P(B)$$

$$= [1 - P(A)][1 - P(B)]$$

$$= P(\bar{A})P(\bar{B})$$

电子科技大学成都学院 任翔飞 bangfida@163.com

设 A 和 B 是两个随机事件，且

$$0 < P(A), P(B) < 1, \quad P(B|A) = P(B|\bar{A})$$

问： A, B 是否相互独立？

答案：

是



$$\begin{aligned} \text{因为 } P(B|A) &= P(B|\bar{A}) \Rightarrow \frac{P(BA)}{P(A)} = \frac{P(B\bar{A})}{P(\bar{A})} \\ &\Rightarrow P(AB)P(\bar{A}) = P(B\bar{A})P(A) \\ &\Rightarrow P(AB)[1 - P(A)] = [P(B) - P(AB)]P(A) \\ &\Rightarrow P(AB) = P(A)P(B) \end{aligned}$$

此结论也可用来判断两个事件的独立性

电子科技大学成都学院 任翔飞 bangfida@163.com

二、 n 个事件的独立性

在多个事件中，是否存在类似的独立性呢？

例如：⇒ 掷四面体试验

定义：设 A_1, A_2, \dots, A_n 为试验 E 的事件，若对任意的 s ($1 < s \leq n$) 及 $1 \leq i_1 < i_2 < \dots < i_s \leq n$ ，有

$$P(A_{i_1}A_{i_2}\dots A_{i_s}) = P(A_{i_1})P(A_{i_2}) \dots P(A_{i_s}) \quad (*)$$

成立，则称事件组 A_1, A_2, \dots, A_n 相互独立。

若对一切 $1 \leq i_1 < i_2 \leq n$ ，有

$$P(A_{i_1}A_{i_2}) = P(A_{i_1})P(A_{i_2})$$

成立，则称事件组 A_1, A_2, \dots, A_n 两两独立。

注：1) (*) 共包含 $2^n - n - 1$ 个等式。

电子科技大学成都学院 任翔飞 bangfida@163.com

2) 事件组 A_1, A_2, \dots, A_n 相互独立

事件组 A_1, A_2, \dots, A_n 两两独立

定理：若 n 个事件 A_1, A_2, \dots, A_n 相互独立，则将 A_1, A_2, \dots, A_n 中的任意多个事件换成它们的对立事件后，所得到的 n 个事件仍然相互独立。

事件的独立性在实际生活中有着广泛的用途。

“三个臭皮匠，顶个诸葛亮”

例如

“有志者事竟成”

系统的可靠性设计

电子科技大学成都学院 任翔飞 bangfida@163.com



试求 A_1, A_2, \dots, A_n 至少有一个发生的概率，其中 $0 < P(A_i) = p_i < 1$

若 (1) A_1, A_2, \dots, A_n 互不相容
(2) A_1, A_2, \dots, A_n 相互独立

若 A_1, A_2, \dots, A_n 互不相容，由概率的有限可加性

可得 $p = P(A_1) + P(A_2) + \dots + P(A_n)$

$$= p_1 + p_2 + \dots + p_n$$

若 A_1, A_2, \dots, A_n 相互独立，由加法定理可得

$$p = P\{A_1 \cup A_2 \cup \dots \cup A_n\}$$

$$= 1 - P\{\bar{A}_1 \bar{A}_2 \dots \bar{A}_n\}$$

$$= 1 - P(\bar{A}_1) P(\bar{A}_2) \dots P(\bar{A}_n)$$

$$= 1 - (1 - p_1)(1 - p_2) \dots (1 - p_n)$$

电子科技大学成都学院 任翔飞 bangfida@163.com