

核查 | 年轻人心源性猝死更高发？查无实据！

原创 核真录2026 核真录 2025年10月19日 20:00 江苏 6人

第297期

文字 | 南大新传未来编辑部·核真录

朱洛锐 李园园

制图 | 李园园

编辑 | 李若冰 郭思航

排版 | 刘霖鑫



2025年8月14日，一名年仅15岁的高一女生在军训第四天突然晕倒，经现场急救无效不幸离世。根据其母亲周女士提供的院前急救病历，其死因疑似“心源性猝死”。这一诊断结果与大众通常认知形成强烈反差——心源性猝死往往被认为多见于中老年群体，或本身有心脏基础疾病、长期高压劳累的人群。而据家属反映，该女孩身体素质良好，并无心脏病家族史。

上海市青浦区医疗急救中心院前急救病历

患者姓名： 性别： 女 年龄： 15岁 呼救地址：朱家角东方绿洲5号门进医务室

出车时间： 2025/8/14 14:01:10 到达现场时间：2025/8/14 14:09:53

离开现场时间：2025/8/14 14:13:52 送达地点：青浦中山医院 到达时间：2025/8/14 14:30:09

主诉：呼之不应约5分钟（代诉） 供史人：他人

现病史：东方绿洲工作人员代诉：患者约5分钟前被工作人员发现时倒于路边，呼之不应，送往医务室。到达现场时，患者仍呼之无应答，呈昏迷状态，有二便失禁，有抽搐史，呼吸未见明显异常，未见呕吐物，告知现场老师及工作人员患者病情较重，抢救送院。

自救措施：吸氧。

既往史：不详。

体格检查：T: 未测℃ P: 124 次/分 R: 16 次/分 BP: 131 / 117mmHg, (17.47 / 15.60kPa)
神志：昏迷 瞳孔：正常
皮肤：苍白，湿冷 对光反射：迟钝
相关必要体检：头面部：无畸形，无出血及血肿 颈部：软 胸部：对称/无畸形 肺脏：两肺呼吸音清 心脏：心率124次/分 心律齐 腹部：平软 脊柱：未查 四肢：对称，无畸形 神经系统：未查 产科检查：未查
GCS评分：3

心电图印象：窦性心动过速，ST-T改变 复查：窦性心动过缓，ST-T改变（有干扰） 复查：PEA
血糖：9.5 mmol/L 血氧饱和度：100 % 复查：<50 %

初步印象：呼之不应原因待查 心源性猝死？ 病种分类：循环系统

救治现场：搬运*1, 护送*1
病情变化：无；

图1 微博新闻话题

“心源性猝死（SCD）”又称“心脏性猝死”，是猝死的主要类型，指在突发性心脏停止发生后一小时内造成的死亡事件，通常是在无预警情况下或在已知心脏疾病基础上突然发生[1]。

近年来，与年轻人相关的心源性猝死案例频频进入公众视野。2025年3月24日被誉为“世纪婴儿”的千千因心源性猝死离世，年仅25岁。同日，“30-63岁是心源性猝死高发年龄段”作为“千千去世”的关联热点登上微博头条，引发社会各界广泛讨论。



图2 微博新闻话题

一些媒体也在报道中明确提出“年轻人成为心源性猝死的主要发生人群”或“年轻人更危险”，例如，中国科普网发文《世纪婴儿离世，心源性猝死开始盯上年轻人》、搜狐网文章《突发！25岁‘世纪婴儿’猝逝：心源性猝死为何频频盯上年轻人》等；又以“80%猝死为心

源性猝死”“18-39岁人群占比高达43%”等看似精确的数据为核心依据，逐渐形成了"心源性猝死年轻化"的公众印象。

然而，这种印象与权威医学研究数据形成了鲜明对比。北京中医医院院长刘清泉强调，从目前的流行病学来看，没有数据支持“年轻人心血管疾病发生率更高”；已有的数据仅表明：年龄越大，心血管猝死的风险就越高[2]。




图3 刘清泉院长在国家卫健委新闻发布会上介绍有关情况

事实到底如何？这些表述是否准确？心源性猝死的真实年龄分布是否被充分认知？核真录就此展开核查。

核查点一

“年轻人心源性猝死高发”的说法源于何处？
是否可信？

悲剧!网传杭州22岁女孩连续熬夜加班猝死...



2022年7月29日 其中,有43%是18岁~39岁的中青年,猝死者的平均年龄,只有43.8岁。猝死,比想象中离我们还要近。各年龄段猝死发生率 *...

掌上潮

每年心源猝死55万,43%是18-39岁看起来...

2024年2月29日 更令人心痛的是,其中43%是那些看似健康的年轻人,他们正处于人生中最充满活力和朝气的18-39岁年龄段。这些年轻人的猝死往往没有任何先兆,让人措...

搜狐网

年轻人猝死率飙升|你的“血管年龄”可能比...



4月11日 2025年最新统计显示,我国每年心源性猝死人数超54万,其中18-39岁人群占比高达43%。更令人心惊的是,《中国中青年心脑血管...

国盛医学

图 4 报道中的“18-39岁占比超40%”数据引用

首先我们对网络上流行的两个说法进行了核查：

1

小荷医典《猝死的主要原因有哪些，并各占比例多少？》指出：“在所有猝死患者里，心源性猝死比例占80%以上。”

该说法在各类健康科普、日常讨论中被频繁引用，也引发了大众的广泛关注与讨论。为验证该说法的真实性，核真录检索国内五大权威医学数据库[3]展开验证。我们以“猝死”为关键词，搜索并筛选出包含完整尸解数据的文献进行后续核查。这是因为完整尸解是明确真实死因为猝死的黄金标准，它既能通过病理检查排除脑血管意外、急性中毒等非心源性诱因导致的死亡，又能精准界定死亡时间、病理特征。而研究中采用完整尸解数据，核心是为确保纳入分析的案例均符合“猝死”医学定义，避免因死因误判或案例筛选不严谨导致占比统计偏差。

其中2017年发表于《中华医学》期刊的《慢性疲劳应激与青年人心源性猝死》中提到：“我国约80%的白领处于过劳状态，在30岁至50岁英年早逝人群中，95.7%的人死于过度疲劳引起的致命性疾病，其中80%为心源性猝死[4]”。需注意的是，该文献数据仅针对“30-50岁英年早逝人群”这一特定群体，无法直接等同于“所有猝死人群”中心源性猝死的占比。

另一项更具广泛参考价值的研究进一步佐证了网传数据的偏差：《中国医学杂志》2020年发表的《我国5516例尸解猝死病例流行特征分析》，由海南医学院创伤学院、海南医学院第一附属医院与重庆医科大学附属第一医院联合开展。研究团队全面搜索了我国28个省级行政区自1964年至2018年8月期间的相关文献，最终分析了明确为猝死并进行尸体解剖、且数据资料较完整的文献231篇。其统计结果显示：“**5516例尸解中，猝死首要原因是心源性猝死，为3186例，占57.76%。** [5]”这与网传的80%有着较大差距，表明“**猝死中80%是心源性猝死**”的说法并不准确。

2

1. 搜狐新闻《我国每年约 54.4万人经历心源性猝死，青少年占比超40%》提到：“《中国心血管健康与疾病报告2021》数据指出，我国每年心源性猝死人数约54.4万例，其中关于18-39岁青壮年患者占比超40%。”
2. 新浪财经《中国每年约55万人死于心源性猝死，避免暴饮暴食及不运动》指出：“据国家心血管病中心统计，我国每年心源性猝死者高达55万，其中43%的人在40岁以下。”

经核查，《中国心血管健康与疾病报告2021》中相关内容为“2005年7月～2006年6月，一项前瞻性研究对678718人随访，共发生2983例死亡，其中心源性猝死284例（9.5%），**发生率41.8/10万**，男性高于女性（44.6/10万 vs 39.0/10万），**估测中国每年心源性猝死约50万例**” [6]。该数据与“54.4万例”数值差异小、统计量级接近，大概率指向同一基础数据范畴。

核真录进一步核查得知，该数据由国家心血管病中心华伟教授于2010年中国心脏大会透露，源自国家十五科技攻关“ICD”项目研究（2005年7月至2006年6月），其监测了北京、广州、新疆的城市居民和山西的农村居民，人数达67.8万，**得出心源性猝死发生率41.84/10万，按13亿人口估算为54.4万例。** [7]

因此，“我国每年心源性猝死人数约54.4万例”有一定依据，那“18-39岁青壮年患者占比超40%”呢？

我们以“18-39岁”为关键词在《中国心血管健康与疾病报告2021》中查找，发现其没有基于年龄分布的心源性猝死情况描述。那么该说法缘何流出？

通过检索全网文章，我们发现较早提及“18-39岁占比超40%”相关说法的是2017年6月29日北京清华长庚医院官网发布的文章《信报专访我院心脏内科主任张萍：青壮年多发心源性猝死心脏急救抢在4分钟》。文中，清华长庚医院心脏内科主任张萍指出，心源性猝死在中国年龄分布为18至80岁，18至39岁的青年猝死率高达43% [8]，而《中国心血管健康与疾病报告2021》发布的时间是2023年6月9日，两者发布时间相差6年。至此，我们清楚了“我国每年心源性猝死人数约54.4万例”和“其中关于18-39岁青壮年患者占比超40%”是来源于不同时间、不同主体的两篇文章。

但针对文中张萍主任所说“43%”，核真录在多个学术文献库检索其及其他研究者的相关研究中，未发现可支撑该占比数据的公开成果。因此，“18-39岁青壮年患者占比超40%”或“18-39岁占比43%”的表述来源不明，暂不能轻易作为“年轻人心源性猝死发病率高”或“猝死年轻化”等定性结论的支撑数据。

为弄清说法为何被误传，我们对多篇报道进行了详细比对，有以下发现：多篇文章对“我国每年约55万人死于心源性猝死，其中18-39岁群体占比超40%”的来源并没有分开作标注，且数据来源的说明也不统一；这些报道在未核实数据来源的情况下相继引用与转发，继而造成了更深更广泛的“误解”。

表 1关于“18-39岁群体占比40%”报道数据来源比对



核真录

“18—39岁群体占比40%”报道数据来源比对

报道标题	报道媒体	发布时间	数据内容	来源说明	备注
关手机睡吧!熬夜等于熬命，5个心源性猝死者中年轻人占俩	齐鲁晚报	2017年7月10日	中国心源性猝死人群中，18-39岁的青年人占比最高，达到43%	有数据显示	未明确数据出处
不敢看体检报告，真是我们这代人的命吗	澎湃新闻	2019年11月28日	中国心源性猝死人群中，18-39岁的青年人占比达到43%	《齐鲁晚报》2017年的一份报道称，有数据显示	未追溯原始数据来源
猝死夺命心梗盯上中青年	齐鲁晚报	2019年12月1日	中国心源性猝死人群中，18-39岁的青年人占比最高，达到43%	有数据显示	未明确数据出处
越来越多年轻人猝死，提醒：猝死来临前，身体会发出6个信号	网易新闻：医学原创故事会	2024年2月24日	我国每年约55万人死于心源性猝死，其中18-39岁群体占比超40%	《中国心血管健康与疾病报告2019》	《中国心血管健康与疾病报告2019》没有该数据
“世纪婴儿”去世，年仅25岁！这种猝死为什么盯上年轻人？	央广网	2025年3月25日	我国每年心源性猝死者高达55万，其中43%的人在40岁以下	国家心血管病中心	数据来源标注比较模糊，未明确具体报告名称等详细信息

核查点二

年轻人心源性猝死的发病情况究竟如何？

要调查年轻人心源性猝死发病率是高是低，首先需要确定“年轻人”的年龄范畴。核真录检索发现，联合国大会将“青年”定义为“年龄介于15-24岁之间的那些人”[9]，中国国家统计局将青年定义为14-35岁[10]，中国共青团定义为14-28岁[11]，《中长期青年发展规划(2016-2025年)》将青年定义为14-35岁[12]。综合来看，本文将核查对象(即“年轻人”)的年龄范围界定在14-35岁。

其次，需要明确“发病率高”的概念。发病率是指一定期间内，一定范围人群中某新发生病例出现的频率[13]。一般来说，某种疾病在特定人群中的发病率显著高于以往检测数据，或高于其他相似地区或人群的发病率，则可能被认为是发病率高[14]。

为进一步核查心源性猝死风险与年龄之间的详细关系，以及青年人发病率的详细数据，核真录选取了三篇过去十余年间在权威期刊上发表的研究论文，并进行了如下核查。

发表于《美国心脏学会杂志》的一篇关于消防员群体心源性猝死发病率的研究表明，青年发病率显著低于中老年群体[15]。其中显示，15-24岁和25-34岁这两个年龄段的消防员发生心源性猝死的几率都在每十万人10人以内。而年龄一过35岁，各年龄组发病率均超过每十万人10人，最高甚至达到每十万人40人以上。研究还援引了军事人员的分年龄段心源性猝死发病率，亦表现出相同的趋势[15]。类似结果也见于其他权威文章[16]。**可见，青年人发病率明显低于中老年群体是一个相对普遍的现象。**




图5 美国男性消防员与普通人群心源性猝死分年龄段发病率条形图（已翻译），来自引注 [15]

在中国人样本中也存在类似的特征。2020年《中国急救医学》发表的一项涵盖55年数据的荟萃分析显示，**在2099例有年龄和病种相对应的猝死案例中，63岁以上人群是心源性猝死的最高发群体[3]。**

一项发表于医学权威期刊之一《新英格兰医学杂志》的研究，通过对来自澳大利亚的490例心源性猝死的分析，总结了1-35岁群体内与年龄相关的发病率差异。研究结果揭示了**在青年群体内部，心源性猝死的发病率也有很大差异，呈现出随年龄增长快速增加的趋势[17]。**这也说明，从全年龄段来看，心源性猝死发病率整体上是逐渐上升的，**青年人发病率较中老年明显更低，但在青年群体内部，发病风险也随着年龄增长而攀升。**

通过以上对学术研究的调研，对比各年龄段数据，我们可以得出**青年人（14-35岁）不是心源性猝死高发群体的结论。**目前而言，**中老年群体仍是最主要的高风险群体**，社会各界尤其是青年人，面对大量的青年猝死案例与报道，难免会出现对整体发病率的错误估计与过度紧张，但既有的学术研究结果明确表示，青年群体发病率并没有大众认知中如此之高。

不过，这并不意味着青年群体可以因此忽视相关的健康风险。一方面，在年轻人年龄段内部，发病风险同样会随年龄增长不断攀升。另一方面，心源性猝死（无论发生在青年还是中老年群体中）普遍具有“**低概率，高致命**”的特征：由于抢救窗口期短（黄金急救时间5-10分钟），加之公众急救技能普及不足和AED设备配备率低，院外存活率（即医院以外的场

所发生心源性猝死等紧急情况，患者经过现场急救和后续治疗等一系列措施后能够存活下来的比例）甚至不足1%[18]。因此，青年人仍需正视心血管健康问题，积极改善生活方式并掌握基本急救技能，从而有效降低风险、保障自身生命安全。

核查结论

- 1.心源性猝死是猝死主要类型，占比约57.8%，并非网传的80%。
- 2.“我国每年心源性猝死约54.4万例，其中18-39岁群体占比超40%”与《中国心血管健康与疾病报告2021》原文不符，该报告未明确此占比数据。
- 3.“年轻人成为心源性猝死主要人群”的论断，缺乏权威流行病学证据支持。事实上心源性猝死的发生风险随年龄增长显著升高，中老年群体仍是主要风险人群。青年群体如发生无明显心脏结构异常的猝死，常与不良生活方式、长期慢性疲劳、极端情绪波动等诱因有关，但这并不改变其整体风险远低于中老年人的客观事实。

参考资料

[1] 蔡俊昇,范芮鑫.无典型病变心源性猝死的法医病理学在司法实践中的应用研究[J].法制博览,2024,(28):97-99.
[2] <https://m.toutiao.com/is/j5tSXOPk0U/> 年轻心血管病患者猝死风险高?专家:无数据支持!
[3] 中国生物医学文献服务系统 (SinoMed) : <http://www.sinomed.ac.cn/>; 万方医学网: <https://med.wanfangdata.com.cn/>; 中国知网中国医院数字图书馆 (CHKD) : <https://www.cnki.net/>; 国家心血管病中心 (NCCD) : <https://www.nccd.org.cn/>; 中国科学引文数据库 (CSCD) : <http://sciencechina.cn/>
[4] 韩国鑫,李朔朔,朱海燕.慢性疲劳应激与青年人心源性猝死[J].中华急诊医学杂志,2017,26(4):465-467.
[5] 赵智梅,陈晓松,杨仪君,等.我国5516例尸解猝死病例流行特征分析[J].中国急救医学,2020,40(02):158-163.
[6] 《中国心血管健康与疾病报告2021》 <https://www.nccd.org.cn/>
[7] [王伟.ICD(埋藏式心律转复除颤器)的临床应用及心脏性猝死预防[J].中国科技成果,2007(11):1.DOI:10.3772/j.issn.1009-5659.2007.11.024.
[8] 信报专访我院心脏内科主任张萍:青壮年多发心源性猝死 心脏急救抢在4分钟
<https://www.btch.edu.cn/xxdt/mtbd/30031.htm?>

本文内容首发于《核真录》

转载请联系本公众号

欢迎转发到朋友圈

往期回顾

📺 TikTok被卖 | 🌐 大阪世博会 | 📺 旧谣新炒 | 📺 看帅哥 | 📺 女装尺码 |
📺 马拉松 | 📺 雅思 | 📺 女性睡眠时长 | 📺 切尔诺贝利的狗 | 📺 全女空

间 | 美国AI诱导青少年自杀 | 名人谣言 | 熬夜 | 禁烟 | 卫生巾 | 医学生就业 | 代孕 | 夜猫子认知优势 | HPV疫苗 | 艾滋病疫苗 | 两岸情侣在台结婚 | 美国飓风 | ADHD | 未成年人使用社交媒体 | 中国游客换取日本驾照 | 餐饮业 | 日本应届生就业率 | 美军对日氟泄露 | 桶装水 | 朝韩冲突 | 阿塔 | 歌曲 | TBHQ | 马斯克 | 人工辅助生殖 | 心理咨询 | 日本梅毒 | 幼儿园关停 | 伊以冲突 | 过敏性鼻炎



南京大学 | 新闻传播学院
School of Journalism and Communication, Nanjing University

欢迎扫描二维码关注我们!



如果您有关于需要核查的事实线索
或者选题, 请与我们联系, 联系及投稿邮箱fcnjupublic@163.com




— 核真录 —

事实, 在泛着冷光

👍 喜欢作者

阅读 819

广告



拉片、生成、调整、剪辑, LibTV一个平台全搞定!

