

Машинное обучение, ФКН ВШЭ

Семинар №15

1 ЕМ-алгоритм

Напомним некоторые выражения, которые были рассмотрены на лекции. Дивергенцией Кульбака-Лейблера называется функционал:

$$\text{KL}(p\|q) = \int p(t) \log \frac{p(t)}{q(t)} dt. \quad (1.1)$$

Данный функционал имеет смысл «расстояния» между распределениями и обладает следующими свойствами:

- $\text{KL}(p\|q) \geq 0, \forall p, q$;
- $\text{KL}(p\|q) = 0 \iff p = q$.

ЕМ-алгоритм — итерационный метод максимизации правдоподобия выборки. Пусть есть следующая задача:

$$\log p(X|\Theta) \rightarrow \max_{\Theta} \quad (1.2)$$

Пусть в модели существуют скрытые переменные Z , описывающее её внутреннее состояние. Для некоторого распределения $q(Z)$ на скрытых переменных верно:

$$\begin{aligned} \log p(X|\Theta) &= \int q(Z) \log p(X|\Theta) dZ = \int q(Z) \log \frac{p(X, Z|\Theta)}{p(Z|X, \Theta)} dZ = \\ &= \int q(Z) \log \frac{p(X, Z|\Theta)}{p(Z|X, \Theta)} dZ = \int q(Z) \log \frac{p(X, Z|\Theta)q(Z)}{p(Z|X, \Theta)q(Z)} dZ = \\ &= \int q(Z) \log \frac{p(X, Z|\Theta)}{q(Z)} dZ + \int q(Z) \log \frac{q(Z)}{p(Z|X, \Theta)} dZ = \mathcal{L}(q, \Theta) + \text{KL}(q\|p) \end{aligned}$$

Так как $\text{KL}(q\|p) \geq 0$, то $\log p(X|\Theta) \geq \mathcal{L}(q, \Theta)$.

Теперь вместо прямой максимизации логарифма правдоподобия будем максимизировать нижнюю вариационную оценку $\mathcal{L}(q, \Theta)$ поочередно по q и по Θ .

E-step. Максимизируем по q .

Максимизация нижней вариационной оценки эквивалентна минимизации второго слагаемого — дивергенции Кульбака-Лейблера.

$$q^* = \arg \max_q \mathcal{L}(q, \Theta) = \arg \min_q \int q(Z) \log \frac{q(Z)}{p(Z|X, \Theta)} dZ = p(Z|X, \Theta)$$

M-step. Максимизируем по Θ .

$$\begin{aligned}\Theta^* &= \arg \max_{\Theta} \int q(Z) \log \frac{p(X, Z|\Theta)}{q(Z)} dZ = \arg \max_{\Theta} \int q(Z) \log p(X, Z|\Theta) dZ \\ &= \arg \max_{\Theta} \mathbb{E}_Z \log p(X, Z|\Theta)\end{aligned}$$

Задача 1.1. Зачем необходимо приводить исходную оптимизационную задачу 1.2 к оптимизационной задаче на M-шаге?

Решение. Оптимизируемая функция в задаче

$$\log p(X|\Theta) \rightarrow \max_{\Theta} \quad (1.3)$$

часто оказывается невыпуклой. За счёт того, что скрытые переменные Z мы можем ввести произвольным образом, мы можем подобрать их так, чтобы задача

$$\Theta^* = \arg \max_{\Theta} \mathbb{E}_Z \log p(X, Z|\Theta)$$

имела удобный для оптимизации вид, например, чтобы распределение $p(X, Z|\Theta)$ находилось в классе экспоненциальных распределений. ■

2 Разделение смеси распределений Бернулли

Рассмотрим смесь распределений Бернулли:

$$p(x | \mu, \pi) = \sum_{k=1}^K \pi_k p(x | \mu_k),$$

где $x \in \mathbb{R}^d$, $\mu = \{\mu_1, \dots, \mu_K\}$, $\mu_k \in [0, 1]^d$, $\pi = \{\pi_1, \dots, \pi_K\}$, $\sum_{k=1}^K \pi_k = 1$, и

$$\begin{aligned}p(x_i | \mu_k) &= \mu_{ki}^{x_i} (1 - \mu_{ki})^{1-x_i}, \\ p(x | \mu_k) &= \prod_{i=1}^d \mu_{ki}^{x_i} (1 - \mu_{ki})^{1-x_i}.\end{aligned}$$

Иными словами, k -я компонента смеси — это такое распределение на d -мерных бинарных векторах, что i -я координата вектора имеет распределение Бернулли с параметром μ_{ki} .

Введём скрытые переменные

$$p(X, Z | \Theta) = \prod_{i=1}^{\ell} \prod_{k=1}^K \left[\pi_k p(x_i | \mu_k) \right]^{z_{ik}}$$

На E-шаге вычисляется апостериорное распределение на скрытых переменных:

$$p(Z | X, \theta) = \frac{p(X, Z | \theta)}{p(X | \theta)} = \frac{\prod_{i=1}^{\ell} \prod_{k=1}^K [\pi_k p(x_i | \mu_k)]^{z_{ik}}}{\sum_Z \prod_{i=1}^{\ell} \prod_{k=1}^K [\pi_k p(x_i | \mu_k)]^{z_{ik}}}$$

Заметим, что данное распределение факторизуется в произведение распределений, соответствующих отдельным объектам $p(z_i | x_i, \Theta)$:

$$p(Z | X, \theta) = \prod_{i=1}^{\ell} p(z_i | x_i, \theta) = \prod_{i=1}^{\ell} \frac{\prod_{k=1}^K [\pi_k p(x_i | \mu_k)]^{z_{ik}}}{\sum_{k=1}^K \pi_k p(x_i | \mu_k)}$$

Тогда параметры распределения $p(Z | X, \theta)$ вычисляются по следующим формулам:

$$g_{ik} \equiv p(z_{ik} = 1 | x_i, \theta) = \frac{\pi_k p(x_i | \mu_k)}{\sum_{j=1}^K \pi_j p(x_i | \mu_j)}.$$

Вычислим теперь матожидание полного правдоподобия:

$$\begin{aligned} \mathbb{E}_{Z \sim p(Z | X, \theta)} \log p(X, Z | \theta) &= \\ &= \mathbb{E}_{Z \sim p(Z | X, \theta)} \sum_{i=1}^{\ell} \sum_{k=1}^K z_{ik} \left\{ \log \pi_k + \log p(x_i | \mu_k) \right\} = \\ &= \sum_{i=1}^{\ell} \sum_{k=1}^K \mathbb{E}_{Z \sim p(Z | X, \theta)} [z_{ik}] \left\{ \log \pi_k + \log p(x_i | \mu_k) \right\}. \end{aligned}$$

Нам понадобится вспомогательная величина:

$$\mathbb{E}_{Z \sim p(Z | X, \theta)} [z_{ik}] = 1 * p(z_{ik} = 1 | x_i, \theta) + 0 * p(z_{ik} = 0 | x_i, \theta) = g_{ik}.$$

Получаем:

$$\begin{aligned} \mathbb{E}_{Z \sim p(Z | X, \theta)} \log p(X, Z | \theta) &= \sum_{i=1}^{\ell} \sum_{k=1}^K g_{ik} \left\{ \log \pi_k + \log p(x_i | \mu_k) \right\} = \\ &= \sum_{i=1}^{\ell} \sum_{k=1}^K g_{ik} \left\{ \log \pi_k + \sum_{m=1}^d (x_i \log \mu_{km} + (1 - x_i) \log(1 - \mu_{km})) \right\} \end{aligned}$$

Дифференцируя данный функционал, нетрудно получить формулы М-шага:

$$\begin{aligned} \pi_k &= \frac{1}{\ell} \sum_{i=1}^{\ell} g_{ik}; \\ \mu_{km} &= \frac{\sum_i g_{ik} x_i + \sum_i g_{ik} (x_i - 1)}{\sum_i g_{ik} x_i} \end{aligned}$$

3 Разделение смеси нормальных распределений

Рассмотрим смесь нормальных распределений. В таком случае плотность вероятности нашей выборки описывается следующим образом:

$$p(X | \theta) = \prod_{i=1}^{\ell} p(x_i | \theta) = \prod_{i=1}^{\ell} \sum_{k=1}^K \pi_k \mathcal{N}(x_i | \mu_k, \Sigma_k),$$

где i – индекс объекта выборки, k – индекс компоненты смеси, π_1, \dots, π_K – априорные вероятности компонент.

Введём скрытые переменные Z . Переменная z_{ik} имеет смысл принадлежности объекта компоненте смеси: принимает значение 1, если i -ый объект обучающей выборки принадлежит k -ой компоненте смеси, и 0 иначе.

$$p(X, Z | \Theta) = \prod_{i=1}^{\ell} \prod_{k=1}^K \left[\pi_k \mathcal{N}(x_i | \mu_k, \Sigma_k) \right]^{z_{ik}}$$

Задача 3.1. Покажите, что данное выражение действительно является функцией плотности совместного распределения X и Z . То есть покажите, что выполняется нормировка.

На E-шаге вычисляется апостериорное распределение на скрытых переменных:

$$p(Z | X, \theta) = \frac{p(X, Z | \theta)}{p(X | \theta)} = \frac{\prod_{i=1}^{\ell} \prod_{k=1}^K \left[\pi_k \mathcal{N}(x_i | \mu_k, \Sigma_k) \right]^{z_{ik}}}{\sum_Z \prod_{i=1}^{\ell} \prod_{k=1}^K \left[\pi_k \mathcal{N}(x_i | \mu_k, \Sigma_k) \right]^{z_{ik}}}$$

Заметим, что данное распределение факторизуется в произведение распределений, соответствующих отдельным объектам $p(z_i | x_i, \Theta)$:

$$p(Z | X, \theta) = \prod_{i=1}^{\ell} p(z_i | x_i, \theta) = \prod_{i=1}^{\ell} \frac{\prod_{k=1}^K \left[\pi_k \mathcal{N}(x_i | \mu_k, \Sigma_k) \right]^{z_{ik}}}{\sum_{k=1}^K \pi_k \mathcal{N}(x_i | \mu_k, \Sigma_k)}$$

Тогда параметры распределения $p(Z | X, \theta)$ вычисляются по следующим формулам:

$$g_{ik} \equiv p(z_{ik} = 1 | x_i, \theta) = \frac{\pi_k \mathcal{N}(x_i | \mu_k, \Sigma_k)}{\sum_{j=1}^K \pi_j \mathcal{N}(x_i | \mu_j, \Sigma_j)}.$$

Вычислим теперь матожидание полного правдоподобия:

$$\begin{aligned} \mathbb{E}_{Z \sim p(Z | X, \theta)} \log p(X, Z | \theta) &= \\ &= \mathbb{E}_{Z \sim p(Z | X, \theta)} \sum_{i=1}^{\ell} \sum_{k=1}^K z_{ik} \left\{ \log \pi_k + \log \mathcal{N}(x_i | \mu_k, \Sigma_k) \right\} = \\ &= \sum_{i=1}^{\ell} \sum_{k=1}^K \mathbb{E}_{Z \sim p(Z | X, \theta)} [z_{ik}] \left\{ \log \pi_k + \log \mathcal{N}(x_i | \mu_k, \Sigma_k) \right\}. \end{aligned}$$

Нам понадобится вспомогательная величина:

$$\mathbb{E}_{Z \sim p(Z|X, \theta)}[z_{ik}] = 1 * p(z_{ik} = 1 | x_i, \theta) + 0 * p(z_{ik} = 0 | x_i, \theta) = g_{ik}.$$

Получаем:

$$\mathbb{E}_{Z \sim p(Z|X, \theta)} \log p(X, Z | \theta) = \sum_{i=1}^{\ell} \sum_{k=1}^K g_{ik} \left\{ \log \pi_k + \log \mathcal{N}(x_i | \mu_k, \Sigma_k) \right\}.$$

Дифференцируя данный функционал, нетрудно получить формулы М-шага:

$$\pi_k = \frac{1}{\ell} \sum_{i=1}^{\ell} g_{ik};$$

$$\mu_k = \frac{1}{\ell \pi_k} \sum_{i=1}^{\ell} g_{ik} x_i;$$

$$\Sigma_k = \frac{1}{\ell \pi_k} \sum_{i=1}^{\ell} g_{ik} (x_i - \mu_k)(x_i - \mu_k)^T.$$