

高数二期末考试试题

一. 填空题

1. 以 $y_1 = \cos 2x, y_2 = \sin 2x$ 为特解的阶数最低的常系数其次线性微分方程是()

- (A) $y'' + 4y = 0$ (B) $y'' - 4y = 0$
(C) $y'' - 2y' - 4y = 0$ (D) $y'' - 2y' + 3y = 0$

2. zox 坐标面上的直线 $x = z - 1$ 绕 oz 轴旋转而成的圆锥面的方程是()

- (A) $x^2 + y^2 = z - 1$ (B) $x^2 + y^2 = (z - 1)^2$
(C) $z^2 = x^2 + y^2 + 1$ (D) $(x + 1)^2 = y^2 + z^2$

3. 设 $z = x \ln(x + y^2)$, 则 $\frac{\partial z}{\partial x} \Big|_{y=1; x=1} = ()$

- (A) $\frac{1}{2}$ (B) $1 + \ln 2$ (C) $\ln 2$ (D) $\frac{1}{2} + \ln 2$

4. D 为平面区域 $x^2 + y^2 \leq 4$, 利用二重积分的性质, $\iint_D (x^2 + 4y^2 + 9) dx dy$ 的最佳估值区间为()

- (A) $[9\pi, 25\pi]$ (B) $[36\pi, 52\pi]$ (C) $[36\pi, 100\pi]$ (D) $[36\pi, 116\pi]$

5. Ω 为球体: $x^2 + y^2 + z^2 \leq 1$, 则 $\iiint_{\Omega} \sqrt{x^2 + y^2 + z^2} dv = ()$

- (A) $\int_0^{2\pi} d\theta \int_0^{2\pi} d\varphi \int_0^1 r^3 \sin\varphi dr$ (B) $\iiint_{\Omega} dx dy dz$
(C) $\int_0^{2\pi} d\theta \int_0^{\pi} d\varphi \int_0^1 r^3 \sin\theta dr$ (D) $\int_0^{2\pi} d\theta \int_0^{\pi} d\varphi \int_0^1 r^3 \sin\varphi dr$

6. 设曲线 τ 的方程为 $\begin{cases} x^2 + y^2 + z^2 = 9 \\ x + y + z = 0 \end{cases}$, 则 $\int_{\tau} (x^2 + y^2 + z^2) ds = ()$

- (A) 108π (B) 216π (C) 54 (D) 36π

7. L 为平面闭区域 D 的正向边界, 则 $\int_{\tau} (xe^y + x - 2y) dx + (xe^y + x - 2y) dy = ()$

- (A) $\iint_D (e^y - xe^y + 3) dx dy$ (B) $\iint_D (e^y - xe^y + 3) dx dy$
(C) $\iint_D (e^y - xe^y + 2) dx dy$ (D) $\iint_D (xe^y + e^y - 1) dx dy$

8. 在下列级数中, 发散的是()

- (A) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{\sqrt{n^3}}$ (B) $0.01 + \sqrt{0.01} + \sqrt[3]{0.01} + \dots$
(C) $\frac{1}{2} + \frac{1}{4} + \frac{1}{8} + \dots$ (D) $\frac{3}{5} - \left(\frac{3}{5}\right)^2 + \left(\frac{3}{5}\right)^3 - \left(\frac{3}{5}\right)^4 + \dots$

二. 填空题

1. 微分方程 $x'' + 6x' + 5x = e^{2t}$ 的一个待定特解 \tilde{x} 的形式是 $\tilde{x} =$

2. 过点 $(3, 0, -1)$ 且与平面 $3x - 7y + 5z - 12 = 0$ 平行的平面方程为

3. 设 $z = \arctan(x - y)$, 则 $dz|_{(1, 1)} =$

4. $\iint_D x^2 y^2 dx dy =$, 其中 $D = \{0 \leq x \leq 1, 0 \leq y \leq 1\}$.

5. 交换二次积分的积分次序后, $\int_0^2 dy \int_{-2}^{-y} f(x,y) dx =$

6. 曲线积分 $\int_L (xe^{2y} + 1)dx + (x^2e^{2y} - 2x)dy =$, L 为 x 轴上从 0 到 2 的一段.

7. Σ 为圆锥面 $z = 1 - \sqrt{x^2 + y^2}$ 与平面 $z = 0$ 围成区域的标面, 取外出, 则

$$\iint_{\Sigma} (x - yz)dydz + (y + 2z)dzdx + (2z + 1)dxdy =$$

8. 已知 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n} x^n = \ln(1+x), x \in (-1, 1]$, 则 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{n}$ 的和函数是

三. 综合题

1. 求过点 $(1, 1, 2)$, 且与直线 $\begin{cases} x - 2y + 4z - 7 = 0 \\ x + 5y - 2z + 1 = 0 \end{cases}$ 垂直的平面方程.

2. 设 $z = f(x^2 - y^2, e^{xy})$, 且 f 具有一阶连续偏导, 求 $\frac{\partial z}{\partial x}, \frac{\partial z}{\partial y}$.

3. 计算二重积分 $\iint_D \sin(\sqrt{x^2 + y^2})dxdy$, 其中 $D = \{(x, y) | \pi^2 \leq x^2 + y^2 \leq 4\pi^2\}$

4. 试求由圆锥面 $z = \sqrt{x^2 + y^2}$ 及旋转抛物面 $z = x^2 + y^2$ 所围立体的体积.

5. 计算 $\oiint_{\Sigma} x dS$, 其中 Σ 是平面 $x + y + z = 1$.

6. 利用高斯公式计算 $\oiint_{\Sigma} x^3 dydz + y^3 dzdx + z^3 dxdy$, 其中 Σ 是球面 $x^2 + y^2 + z^2 = 1$, 取外侧.

7. 判断级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{2^n}{n(n+1)}$ 的敛散性.

8. 求幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^{2n+1}}{2n+1}$ ($|x| < 1$) 的和函数.

附录(常用公式)

1.偏导数定义

$$\left. \frac{\partial f}{\partial x} \right|_{\substack{x=x_0 \\ y=y_0}} = f_x(x_0, y_0) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + \Delta x, y_0) - f(x_0, y_0)}{\Delta x}$$

$$\left. \frac{\partial f}{\partial y} \right|_{\substack{x=x_0 \\ y=y_0}} = f_y(x_0, y_0) = \lim_{\Delta y \rightarrow 0} \frac{f(x_0, y_0 + \Delta y) - f(x_0, y_0)}{\Delta y}$$

2.二阶偏导数

$$\frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{\partial f}{\partial x} \right) = \frac{\partial^2 f}{\partial x^2} = f_{xx}(x, y)$$

$$\frac{\partial}{\partial y} \left(\frac{\partial f}{\partial x} \right) = \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} = f_{xy}(x, y)$$

$$\frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{\partial f}{\partial y} \right) = \frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x} = f_{yx}(x, y)$$

$$\frac{\partial}{\partial y} \left(\frac{\partial f}{\partial y} \right) = \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} = f_{yy}(x, y)$$

3.全微分

若 $z = f(x, y)$ 在点 (x, y) 可微, 则

$$dz = \frac{\partial z}{\partial x} \Delta x + \frac{\partial z}{\partial y} \Delta y$$

4.多元复合函数求导法则

$$u = \varphi(t), \quad v = \psi(t)$$

$$z = f(u, v) = f[\varphi(t), \psi(t)]$$

若 u, v 在 t 点可导, $z = f(u, v)$ 在对应点处具有连续偏导数, 则

$$\frac{dz}{dt} = \frac{\partial z}{\partial u} \frac{du}{dt} + \frac{\partial z}{\partial v} \frac{dv}{dt}$$

$$u = \varphi(x, y), \quad v = \psi(x, y)$$

$$z = f(u, v) = f[\varphi(x, y), \psi(x, y)]$$

若 u, v 在 (x, y) 具有对 x 及 y 的偏导数, $z = f(u, v)$ 在对应点处具有连续偏导数, 则

$$\frac{dz}{dx} = \frac{\partial z}{\partial u} \frac{du}{dx} + \frac{\partial z}{\partial v} \frac{dv}{dx}$$

$$\frac{dz}{dy} = \frac{\partial z}{\partial u} \frac{du}{dy} + \frac{\partial z}{\partial v} \frac{dv}{dy}$$

5. 隐函数求导公式

$$F(x, y) = 0 \quad \frac{dy}{dx} = -\frac{F_x}{F_y}$$

6. 方向导数与梯度

$$\left. \frac{\partial f}{\partial l} \right|_{x_0, y_0} = f_x(x_0, y_0) \cos \alpha + f_y(x_0, y_0) \cos \beta$$

$$\mathbf{grad} f(x_0, y_0) = \nabla f(x_0, y_0) = f_x(x_0, y_0) \mathbf{i} + f_y(x_0, y_0) \mathbf{j}$$

7. 二重积分的性质

$$m \leq f(x, y) \leq M \Rightarrow \iint_D m \, d\sigma \leq \iint_D f(x, y) \, d\sigma \leq \iint_D M \, d\sigma$$

$$D = D_1 + D_2 \Rightarrow \iint_D f(x, y) \, d\sigma = \iint_{D_1} f(x, y) \, d\sigma + \iint_{D_2} f(x, y) \, d\sigma$$

8. 三重积分

$$\iiint_{\Omega} f(x, y, z) \, dx \, dy \, dz = \int_a^b \left\{ \int_{y_1(x)}^{y_2(x)} \left[\int_{z_1(x, y)}^{z_2(x, y)} f(x, y, z) \, dz \right] dy \right\} dx$$

9. 弧线积分

$$\begin{cases} x = \varphi(t) \\ y = \psi(t) \end{cases}, \quad \alpha \leq t \leq \beta$$

$$\int_L f(x, y) \, ds = \int_{\alpha}^{\beta} f[\varphi(t), \psi(t)] \sqrt{[\varphi'(t)]^2 + [\psi'(t)]^2} \, dt$$

10. 坐标曲线积分

$$\begin{cases} x = \varphi(t) \\ y = \psi(t) \end{cases}, \quad \alpha \leq t \leq \beta$$

$$\int_L P(x, y) \, dx + Q(x, y) \, dy = \int_{\alpha}^{\beta} \{ P[\varphi(t), \psi(t)] \varphi'(t) + Q[\varphi(t), \psi(t)] \psi'(t) \} \, dt$$

11. 格林公式

设闭区域 D 有分段光滑的曲线 L 围成,

若函数 $P(x, y)$ 和 $Q(x, y)$ 在 D 上具有一阶连续偏导数, 则有

$$\iint_D \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} \right) \, dx \, dy = \oint_L P \, dx + Q \, dy$$

其中 L 是 D 的正向边界线

12. 第一类曲面积分

$$\iint_S f(x, y, z) \, dS = \iint_{D_{xy}} f[x, y, z(x, y)] \sqrt{1 + z_x^2 + z_y^2} \, dx \, dy$$

13. 第二类曲面积分

曲面上侧

$$\iint_{\Sigma^+} R(x, y, z) \mathrm{d}x \mathrm{d}y = \iint_{D_{xy}} R[x, y, z(x, y)] \mathrm{d}x \mathrm{d}y$$

曲面下侧

$$\iint_{\Sigma^-} R(x, y, z) \mathrm{d}x \mathrm{d}y = - \iint_{D_{xy}} R[x, y, z(x, y)] \mathrm{d}x \mathrm{d}y$$

14. 高斯公式

设空间闭区域 Ω 是由分片光滑的闭曲面 Σ （外侧）所围成，

函数 $P(x, y, z)$, $Q(x, y, z)$, $R(x, y, z)$ 在 Ω 上具有一阶连续偏导数，则有

$$\iiint_{\Omega} \left(\frac{\partial P}{\partial x} + \frac{\partial Q}{\partial y} + \frac{\partial R}{\partial z} \right) \mathrm{d}v = \oiint_{\Sigma} P \mathrm{d}y \mathrm{d}z + Q \mathrm{d}z \mathrm{d}x + R \mathrm{d}x \mathrm{d}y$$

或

$$\iiint_{\Omega} \left(\frac{\partial P}{\partial x} + \frac{\partial Q}{\partial y} + \frac{\partial R}{\partial z} \right) \mathrm{d}v = \oiint_{\Sigma} (P \cos \alpha + Q \cos \beta + R \cos \gamma) \mathrm{d}S$$