中药基础知识

—— 系统学习资料 · 详解版 ——

面向中医药相关专业学生

2026 年 10 月

使用说明

本资料以中医药院校规划教材《中药学》的体系为框架，分上篇总论、下篇各论两部分。上篇系统阐述中药学的基本理论，下篇按功效分类逐味介绍常用中药，每味药按【性味归经】【功效】【应用】【用法用量】【使用注意】五项分列，并附类内相似药物鉴别与经典歌诀，供系统学习、复习与查阅使用。

编写时参考了历版规划教材与国家药典的通行表述，力求概念准确、条理清晰。涉及用量之处为成人一日常用量，具体应用须结合病情、体质及现行《中国药典》和教材的规定，在医师指导下使用。

学习建议：总论重“理”，要理解四气五味、升降浮沉、归经、配伍七情的逻辑；各论重“药”，要在类内共性的基础上比较个性，做到“同类药求异、异类药求同”。歌诀宜熟读成诵，但不可替代对条文含义的理解。

目录

上篇 总论

第一章 绪论

第二章 中药学发展简史

第三章 中药的产地、采集与炮制

第四章 中药的性能

第五章 中药的配伍

第六章 用药禁忌

第七章 剂量与用法

下篇 各论

第八章 解表药

第九章 清热药

第十章 泻下药

第十一章 祛风湿药

第十二章 化湿药

第十三章 利水渗湿药

第十四章 温里药

第十五章 理气药

第十六章 消食药

第十七章 驱虫药

第十八章 止血药

第十九章 活血化瘀药

第二十章 化痰止咳平喘药

第二十一章 安神药

第二十二章 平肝息风药

第二十三章 开窍药

第二十四章 补虚药

第二十五章 收涩药

第二十六章 涌吐药

第二十七章 攻毒杀虫止痒药

第二十八章 拔毒化腐生肌药

附录 经典歌诀与药物鉴别

上篇 总论

第一章 绪论

1.1 中药、本草与中药学

中药，是指在中医药理论指导下，用于预防、治疗、诊断疾病并具有康复与保健作用的物质。这一概念包含三层含义：其一，必须在中医药理论指导下使用，这是中药区别于天然药物、民间草药的根本标志；其二，具有明确的防治疾病与康复保健作用；其三，来源为天然药物及其加工品，包括植物、动物、矿物及部分加工制品。

本草，是中药的统称。“本草”一词最早见于《汉书·平帝纪》。由于中药中草木类药物占绝大多数，古代记载中药的著作多称“本草”，如《神农本草经》《本草纲目》。近代以来，“中药”一词逐渐取代“本草”而通行。

中药学，是研究中药基本理论和各种中药的来源、采制、性能、功效及临床应用等知识的一门学科。它既研究单味药，也研究药物之间的配伍关系与组方规律，是中医学的重要组成部分。与之相邻的学科还有中药鉴定学（研究品种与质量）、中药炮制学（研究加工方法）、中药药理学（研究作用机制）与方剂学（研究配伍组方）。

1.2 中药的来源与分类

中药的来源十分广泛。植物药占绝大多数，其次是动物药与矿物药，此外还有部分加工制品（如神曲、阿胶）及少数化学制品。据《中华本草》收载，中药资源共 8980 种；《中国药典》一部收载的常用中药材及饮片约六百余种，这些是临床与教学的主体。

中药的分类方法主要有四种：按自然属性分为植物药、动物药、矿物药；按药用部位分为根及根茎类、茎木类、皮类、叶类、花类、果实种子类、全草类等；按化学成分分类多用于研究；按功效分类则是临床与教学中最常用的方法——同类的药物往往性味功效相近，便于比较异同、掌握规律。本资料下篇即按功效分类展开。

1.3 中药的性能与性状

学习中药首先要区分“性能”与“性状”。中药的性能又称药性，是药物作用于人体后所反映出来的性质和功能，包括四气、五味、升降浮沉、归经、毒性等，是中医药理论对药效的高度概括，属于“理论层面”；性状则是药材的形状、大小、颜色、表面特征、气味、质地等外观属性，属于“鉴别层面”，是鉴定药材真伪优劣的依据。二者名称相近而内涵不同，不可混淆。

1.4 学习方法

第一，以功效为纲。功效是联系药性与应用的枢纽：性味归经说明“为什么有此功效”，主治应用说明“功效能治什么病”。抓住功效，就能把性味、归经、应用串成一条线。

第二，善于比较。同类药求异（如麻黄与桂枝同能解表，而麻黄长于宣肺平喘、桂枝长于温通经脉），异类药求同（如黄连、栀子均能清热，但一偏燥湿、一偏除烦）。比较是掌握药物个性的关键。

第三，理论联系实际。结合方剂学习，观察药物在复方中的地位与配伍；结合药典与教材，关注用量用法与安全警戒。

第四，重视安全。对有毒性、药性峻烈的药物，以及十八反、十九畏、妊娠禁忌等内容，必须熟记并理解其临床意义。

第二章 中药学发展简史

中药学的发展，集中体现在历代本草著作的编撰与传承之中。了解本草源流，既能把握学科发展的脉络，也有助于理解药性理论的由来。

2.1 先秦至汉代：本草学的奠基

先秦时期，医药知识散见于《诗经》《山海经》等文献，《周礼》已有“医师掌医之政令，聚毒药以供医事”的记载。1973 年长沙马王堆汉墓出土的《五十二病方》，是现存最早的方书之一，反映了先秦至汉初的用药经验。

东汉成书的《神农本草经》是现存最早的药学专著，全书收载药物 365 种，按上、中、下三品分类：上品养命以应天，中品养性以应人，下品治病以应地。其序例部分系统总结了四气五味、七情配伍、君臣佐使等基本理论，为后世本草学奠定了基础。《神农本草经》所载药物的疗效大多确切，至今仍为临床常用。

2.2 魏晋南北朝：分类体系的创立

南北朝陶弘景在《神农本草经》基础上增补《名医别录》的内容，编成《本草经集注》，收载药物 730 种。该书首创按药物自然属性分类的方法，分为玉石、草木、虫兽、果、菜、米食、有名未用七类，并首次采用朱墨分书以区别《本经》原文与后世增补，对后世本草学影响深远。

2.3 隋唐时期：官修本草的开端

唐代经济文化繁荣，药物交流频繁。显庆四年（公元 659 年），苏敬等人奉敕编成《新修本草》（又称《唐本草》），收载药物 850 种。这是我国第一部由国家组织编修的本草，也是世界上最早的国家药典之一。它首创图文并茂的编撰体例，并记载了外来药物，反映了唐代中外医药交流的盛况。

2.4 宋金元时期：本草学的总结与提高

宋代本草学发达。《开宝本草》《嘉祐本草》相继官修，唐慎微的《证类本草》收载药物 1558 种，附方三千余首、附图九百余幅，集宋以前本草学之大成，文献价值极高。金元时期，医学流派争鸣，药性理论进一步发展，张元素、李东垣等对归经、升降浮沉学说多有阐发。

2.5 明清时期：集大成的《本草纲目》

明代李时珍“搜罗百氏，采访四方”，历时近三十年编成《本草纲目》，收载药物 1892 种，附方 11000 余首，按 16 部 60 类分类，对药物的名称、产地、形态、炮制、性味、主治作了系统考证与论述。该书被誉为“东方医药巨典”，先后被译成多种文字，在世界科学史上占有重要地位。清代赵学敏《本草纲目拾遗》在《本草纲目》基础上补充药物 921 种（新增 716 种），是又一部重要的本草文献。

2.6 近现代：本草学的整理与创新

近现代以来，本草学逐步走向系统整理与科学验证。《中华人民共和国药典》自 1953 年起陆续编纂，对中药的品种、质量、用法用量作出国家规定；《中华本草》收载药物 8980 种，是迄今收载最全的现代本草巨著。与此同时，青蒿素的发现（源于《肘后备急方》的记载）等成果，展现了传统本草经验与现代研究相结合的巨大潜力。

著作	朝代·作者	载药数	主要贡献与地位
《神农本草经》	东汉·佚名	365 种	现存最早的药学专著；上、中、下三品分类；序例提出四气五味、七情、君臣佐使
《本草经集注》	南北朝·陶弘景	730 种	首创按自然属性分类（七类），朱墨分书
《新修本草》	唐·苏敬等	850 种	我国第一部官修本草，世界上最早的国家药典之一
《证类本草》	宋·唐慎微	1558 种	集宋以前本草之大成，附方附图
《本草纲目》	明·李时珍	1892 种	附方 11000 余首，16 部 60 类，“东方医药巨典”
《本草纲目拾遗》	清·赵学敏	921 种	补《纲目》之遗，新增 716 种
《中华本草》	当代（1999）	8980 种	收载最全的现代本草巨著

记忆脉络：理论奠基（《本经》）—自然分类（《集注》）—官修药典（《新修》）—集大成（《证类》）—巨典（《纲目》）—补遗（《拾遗》）—最全（《中华本草》）。

第三章 中药的产地、采集与炮制

中药的质量取决于品种、产地、采收、炮制与贮藏等多个环节。“道地药材”强调产地，“采收有时”强调时机，炮制则是对原药材的加工处理。三者共同决定药物的疗效与安全。

3.1 道地药材

道地药材，是指产于特定区域，与其他地区所产同种药材相比，品质和疗效更好、质量稳定、历史悠久的药材。道地药材的形成，是自然条件（气候、土壤、水质、光照）与栽培、采制技术长期作用的结果，也是历代医家临床经验的总结。

道地药材的意义在于：一是保证疗效的稳定性，二是为药材的质量评价提供传统依据。但道地并非绝对，随着栽培技术与产地引种的发展，部分药材的产区已有所扩展，学习中应以教材所列传统道地产区为主。

产区	代表性道地药材
河南	四大怀药——地黄、山药、牛膝、菊花
浙江	浙八味——浙贝母、白术、延胡索、山茱萸、玄参、杭白芍、杭菊花、杭麦冬
四川	川芎、川贝母、附子、黄连、麦冬（“川药”）
东北	人参、辽五味子、辽细辛、防风（“关药”）
云南	三七、木香
甘肃	当归
宁夏	枸杞子
山东	阿胶
广东	陈皮、砂仁、藿香（“广药”）

3.2 中药的采集

中药的采收时节与药效物质的含量、产量密切相关。采收过早，药物未成熟，有效成分含量低；采收过晚，则可能有效成分分解、药材老化。所谓“采药有时”，即是强调适时采收。

全草类多在植物枝叶茂盛、花朵初开时采收，如益母草、薄荷；叶类多在花蕾将放或花正盛开时采收，如荷叶；花类一般在花正开放时采收，如菊花、金银花，少数需采花蕾（辛夷、槐米）；果实种子类多在成熟时采收，少数需采未成熟果实（乌梅、枳实）；根及根茎类多在秋末春初、植物地上

部分枯萎或未萌芽时采收，如人参、天麻；树皮类多在春夏之交采收，此时树液流动旺盛，易于剥取，如黄柏；根皮类多在秋季采收，如牡丹皮、地骨皮；矿物类全年可采。

动物类药材的采收因品种而异：鹿茸应在清明后 45～60 天（雄鹿当年新角尚未骨化时）采收；蜈蚣宜在春夏捕捉；桑螵蛸多在深秋至次年春天采收。采收时还应注意保护药源，遵循“采大留小、采密留稀”的原则。

3.3 中药的炮制

炮制，是中药在应用前或制成各种剂型前的加工过程，包括对原药材的一般修治和特殊处理。炮制是中医药的一大特色，直接关系药效与用药安全。

3.3.1 炮制的目的

一是降低或消除药物的毒性或副作用。如川乌、草乌、附子经炮制后毒性大减；半夏、天南星生用有毒，制后可供内服。

二是改变或缓和药物的性能。如生地黄清热凉血，熟地黄则滋阴补血；生姜发散风寒，干姜温中回阳，炮姜温经止血，同一药物因炮制不同而性能迥异。

三是增强药物疗效。如蜜炙黄芪增强补气，醋炙延胡索增强止痛，酒炙川芎增强活血行气。

四是改变或增强药物作用的部位和趋向。如酒制上行头目，盐制下行入肾，醋制入肝。

五是便于调剂和制剂。如切制成饮片，便于称量与煎煮。六是洁净药物，保证用药质量。七是利于贮藏，防止霉变虫蛀。八是矫味矫臭，便于服用。

3.3.2 炮制的方法

炮制方法可分为修治、水制、火制、水火共制及其他制法五类。

类别	常用方法	示例
修治	纯净、粉碎、切制	去芦、去皮心，切段、切片
水制	漂洗、浸泡、润、水飞	水飞朱砂、炉甘石
火制	炒（清炒、加辅料炒）、炙、煅、煨、烘焙	清炒王不留行；蜜炙黄芪；煅牡蛎；面裹煨肉豆蔻

类别	常用方法	示例
水火共制	煮、蒸、燀、淬	煮川乌；蒸熟地黄；燀杏仁；煅淬自然铜、代赭石
其他	制霜、发酵、发芽	巴豆霜；神曲；麦芽

其中“炙”法所用辅料不同，作用亦不同：蜜炙补脾益气、润肺止咳；酒炙活血通络、引药上行；醋炙入肝止痛、增强收敛；盐炙引药下行、入肾；姜炙温中止呕、降低毒性。掌握辅料与药性的关系，是理解炮制“减毒增效”原理的关键。

> 炮制与药性：炮制可以改变四气（生熟异治）、改变升降浮沉（酒升盐降）、影响归经（醋入肝、盐入肾），是药性理论在加工环节的具体运用。

第四章 中药的性能

中药的性能，又称药性，是中药作用的基本性质和特征的高度概括，包括四气、五味、升降浮沉、归经与毒性。药性理论是中药学的核心，是解释功效、指导临床用药的理论基础。

4.1 四气

四气，即寒、热、温、凉四种不同的药性。它反映药物影响人体阴阳盛衰、寒热变化的作用倾向，是由药物作用于人体后所表现出的反应概括而来。药物的寒热属性，与所治病证的寒热性质相对而言：

寒凉药具有清热泻火、凉血解毒、滋阴等作用，主要用于热证。温热药具有温里散寒、补火助阳、温经通络、回阳救逆等作用，主要用于寒证。寒与凉、热与温性质相同而程度有别：寒次于凉，热次于温。此外还有“平”性，指药性平和、寒热偏性不明显，但平性药仍有偏凉或偏温之分，故仍归属于四气之中。

四气的临床意义有二：一是据病性选药，“寒者热之，热者寒之”，寒证用温热药，热证用寒凉药；二是注意“寒热错杂”证候的用药配伍，如寒热并用、反佐等。四气还能解释药物的其他作用，如寒凉药多能抗菌消炎（现代研究），温热药多能促进代谢。

4.2 五味

五味，即辛、甘、酸、苦、咸五种最基本的药味，此外还有淡味和涩味。五味最初源于口尝的真实滋味，后来逐渐上升为对药物功效的概括，成为药性理论的重要组成部分。五味的作用可概括为：辛散、甘缓（补）、酸收、苦坚（泄、燥）、咸软。具体如下表。

五味	作用	功效与主治	代表药物
辛	能散、能行	发散表邪、行气行血；用于表证、气滞、血瘀	麻黄、木香、红花
甘	能补、能缓、能和	补益、和中、缓急止痛、调和药性	人参、甘草、饴糖
酸	能收、能涩	收敛固涩；用于自汗盗汗、久泻久痢、遗精遗尿	五味子、乌梅
苦	能泄、能燥、能坚	清泄火热、降泄气逆、通泄大便；燥湿；坚阴	大黄、黄连、黄柏
咸	能软、能下	软坚散结、泻下通便	芒硝、海藻、牡蛎
淡	能渗、能利	渗湿利水；用于水肿、小便不利	茯苓、薏苡仁
涩	能收敛固涩	与酸味相近，用于滑脱诸证	龙骨、莲子

五味的确定，既要参考口尝滋味，更要以临床功效为依据，故有“药味之确定，以功效为主”之说。气味须合参：辛温解表、苦寒清热、甘温补气、咸寒软坚、酸甘化阴等，都是气味配合的典型。同一药物可兼具数味，如五味子酸甘、当归甘辛、白术甘苦，其功效也是多方面的。

还需注意“五味所入”与“五脏苦欲”：酸入肝、苦入心、甘入脾、辛入肺、咸入肾，这是归经理论的雏形之一。淡味附于甘，涩味附于酸，故常言“五味”而统淡、涩。

4.3 升降浮沉

升降浮沉，是指药物对人体作用的不同趋向性。升是上升，降是下降，浮是发散上行，沉是泻利下行。升浮与沉降是相反相成的两种趋向，前者主向上向外，后者主向下向内。

升浮药多具有升阳发表、散寒、涌吐、开窍等作用，其性多辛、甘、温，质地多轻，如花、叶类；沉降药多具有清热、泻下、利水渗湿、降逆、重镇安神、息风潜阳、消积、收敛固涩等作用，其性多酸、苦、咸、寒凉，质地多重，如矿物、贝壳类。少数药物具有双向作用，如川芎既能上行头目，又能下行血海。

影响升降浮沉的因素，首先是炮制：酒炒则升，醋炒则收敛，盐炒则下行，姜汁炒则发散。其次是配伍：少量升浮药在大队沉降药中随之下降，少量沉降药在大队升浮药中随之上升。此外，药物的质地、性味也直接影响升降浮沉。

临床意义在于顺应病位与病势：病位在上在表（如外感表证、头面部病证），宜用升浮药；病位在下在里（如里实便秘、下焦湿热），宜用沉降药。病势上逆者（呕吐、喘咳、肝阳上亢）宜降；病势下陷者（久泻脱肛、子宫脱垂）宜升。

4.4 归经

归经，是指药物对于机体某一部分（脏腑、经络）的选择性作用，即药物主要对某经（脏腑及其经络所属部位）的病变起明显的治疗作用。归经以脏腑经络理论为基础，以药物疗效为依据，是药性理论中的“定位”概念。

归经的确定依据主要有三：一是药物的疗效，这是最根本的依据，如朱砂安神而归心经；二是药物所治病证的脏腑归属；三是药物的形色气味等性状作为辅助参考。

归经的意义在于：指导临床按病位选药，如肺热咳嗽选入肺经的黄芩、桑白皮；解释药物的选择性作用，如黄芩、黄连、黄柏均能清热燥湿，但归经不同而主治部位不同；指导引经报使，如羌活、藁本入太阳经治头项痛，白芷入阳明经治前额痛，柴胡入少阳经治少阳证，吴茱萸入厥阴经治巅顶痛。

必须注意，归经只是说明药物作用的主要部位，并非绝对；一药可归数经，临床应用须结合四气五味、升降浮沉综合判断。

4.5 毒性

毒性，是指药物对机体的损害性。广义的毒性泛指药物的偏性，古人“是药三分毒”即指药物皆有偏性，用之得当可以治病，用之不当则伤人；狭义的毒性指药物对人体的毒副作用或损害，即通常所说的“有毒”。

影响毒性的因素很多：药物品种与产地（同名异物、品种混淆可致中毒）；炮制（川乌、附子、半夏等经炮制减毒）；配伍（相畏、相杀可减毒，相反则增毒）；剂型与煎法（如乌头类先煎减毒）；服法与剂量；患者体质（老人、小儿、孕妇、肝肾功能不全者对毒性更敏感）。

使用有毒药物，应严格遵循《中国药典》的用量规定，注意炮制、配伍、煎服方法，做到“有毒必用，用之有度”，中病即止，不可过量久服。对医疗用毒性药品（如砒石、水银、生川乌、生草乌、生附子、生半夏、生南星、生巴豆、斑蝥、蟾酥、雄黄等），国家实行特殊管理，临床须严格按规定使用。

第五章 中药的配伍

配伍，是指根据病情、药性和治疗要求，有选择地将两种以上药物配合应用。药物配伍后，彼此之间发生相互作用，或增强疗效，或降低毒副作用，或产生新的不良反应。研究配伍规律，是安全有效用药的关键。

5.1 配伍七情

《神农本草经》将药物之间的配伍关系归纳为七种，称为“七情”：单行、相须、相使、相畏、相杀、相恶、相反。除单行外，其余六种都是两药配伍的关系。

七情	含义	举例	临床意义
单行	单用一味药治疗疾病	独参汤治元气虚脱	简便，适用于病情单纯者
相须	性能功效相类似的药物配合应用，增强原有疗效	石膏配知母清热泻火	协同增效，充分利用

七情	含义	举例	临床意义
相使	性能功效有某种共性的药物，以一药为主、另一药为辅，辅药提高主药疗效	黄芪配茯苓补气利水	协同增效，主辅分明
相畏	一种药物的毒性或副作用被另一种药物减轻或消除	半夏畏生姜	减毒，宜于同用
相杀	一种药物能减轻或消除另一种药物的毒性或副作用	生姜杀半夏	减毒，宜于同用
相恶	一种药物能使另一种药物原有功效降低或消失	人参恶莱菔子	减效，原则上避免
相反	两种药物合用能产生或增强毒性反应或副作用	十八反诸药	增毒，原则上禁用

七情之中，相须、相使属“增效”配伍，是组方最常用的关系；相畏、相杀属“减毒”配伍，二者是同一配伍关系的两种表述角度：相畏是从被减毒药物的角度说（半夏畏生姜），相杀是从减毒药物的角度说（生姜杀半夏）。相恶属“减效”，相反属“增毒”，原则上应避免或禁止。

需要强调，七情中的“相畏”与“十九畏”的“畏”含义不同：前者指毒性被减轻，后者是配伍禁忌，指两药合用可能产生不良反应。学习时切勿混淆。

5.2 君臣佐使

君臣佐使是方剂组成的基本原则，也是药物配伍的层次关系。君药针对主病或主证起主要治疗作用，是方中核心，药力居首，用量相对较大；臣药协助君药加强治疗作用，或针对兼病、兼证起主要治疗作用；佐药包括佐助药（协助君臣药治疗次要症状，或直接治疗次要症状）、佐制药（制约君臣药的毒性或峻烈之性）、反佐药（与君药性味相反但能起相成作用的药物）；使药包括引经药（引诸药直达病所）和调和药（调和诸药，如甘草）。

以麻黄汤为例：麻黄发汗解表、宣肺平喘为君；桂枝解肌发表、温通经脉，助麻黄发汗为臣；杏仁降利肺气，与麻黄一宣一降为佐；甘草调和诸药为使。通过君臣佐使的分析，可以理解药物在复方中的地位与相互关系。

5.3 配伍的原则

配伍应以增强疗效、降低毒副作用为目的。具体而言：性能功效相近者相须相使，取协同之效；有毒药物配以相畏相杀之品，取减毒之效；避免相恶、相反配伍。同时注意气味配伍规律，如辛甘化阳、酸甘化阴、苦辛通降、寒热并用等，这都是历代组方经验的总结。

第六章 用药禁忌

用药禁忌是保证用药安全的重要内容，主要包括配伍禁忌、妊娠用药禁忌、证候禁忌和服药时的饮食禁忌。

6.1 配伍禁忌

配伍禁忌主要包括“十八反”和“十九畏”，是临床配伍用药必须遵循的传统禁忌。

6.1.1 十八反

歌诀：“本草明言十八反，半蒌贝蔹及攻乌，藻戟遂芫俱战草，诸参辛芍叛藜芦。”具体为三组：

（1）乌头（川乌、草乌、附子）反半夏、瓜蒌（全瓜蒌、瓜蒌皮、瓜蒌仁、天花粉）、贝母（川贝母、浙贝母、平贝母、伊贝母、湖北贝母）、白蔹、白及；

（2）甘草反海藻、京大戟、甘遂、芫花；

（3）藜芦反人参、沙参、丹参、玄参、苦参、细辛、芍药（白芍、赤芍）。

6.1.2 十九畏

歌诀：“硫黄原是火中精，朴硝一见便相争；水银莫与砒霜见，狼毒最怕密陀僧；巴豆性烈最为上，偏与牵牛不顺情；丁香莫与郁金见，牙硝难合京三棱；川乌草乌不顺犀，人参最怕五灵脂；官桂善能调冷气，若逢石脂便相欺。”

即：硫黄畏朴硝，水银畏砒霜，狼毒畏密陀僧，巴豆畏牵牛子，丁香畏郁金，川乌、草乌畏犀角，牙硝畏三棱，官桂畏赤石脂，人参畏五灵脂。

> 十九畏的“畏”与七情中的“相畏”含义不同：七情之相畏指毒性被另一药减轻；十九畏则是配伍禁忌，指合用可能产生不良反应。

现代研究对十八反、十九畏的认识尚不完全一致，部分配伍的毒理机制仍待阐明；但作为传统配伍禁忌，临床上仍应谨慎遵循，除非有充分的理论依据和丰富的临床经验，否则不宜轻易配伍使用。涉及十八反、十九畏的经典方剂（如甘遂半夏汤、感应丸）虽有应用，亦须在医师指导下审慎对待。

6.2 妊娠用药禁忌

妊娠禁忌药，是指妇女妊娠期间应禁用或慎用的药物。因某些药物可能损害胎儿或导致流产，故须特别注意。禁用药多为毒性较强或药性峻猛之品，如斑蝥、雄黄、砒霜、川乌、草乌、藜芦、胆矾、瓜蒂、巴豆、甘遂、京大戟、芫花、牵牛子、商陆、麝香、三棱、莪术、水蛭、虻虫等；慎用药多为活血化瘀、行气、攻下、温里及滑利之品，如桃仁、红花、牛膝、大黄、枳实、附子、肉桂、干姜、木香、冬葵子、瞿麦等。

妊娠禁忌的原则是：禁用药绝对不用；慎用药根据病情权衡利弊，可用可不用的尽量不用；必须使用时严格掌握剂量与疗程，并密切观察。妊娠禁忌歌诀（《珍珠囊补遗药性赋》）可帮助记忆，见附录。

6.3 证候禁忌

证候禁忌是指某种病证不宜使用某些药物。如体虚多汗者忌用发汗力强的麻黄；脾胃虚寒者忌用苦寒伤胃之品；阴虚火旺者忌用温热燥烈之药；湿热内盛者忌用滋腻碍胃之品；表证未解者不宜过早使用滋补药，以免“闭门留寇”。临床用药必须“辨证论治”，有是证用是药，无是证则避其药。

6.4 服药时的饮食禁忌

饮食禁忌，俗称“忌口”，指服药期间对某些食物的禁忌。传统记载如：常山忌葱；地黄、何首乌忌葱、蒜、萝卜；薄荷忌鳖肉；茯苓忌醋；鳖甲忌苋菜；蜂蜜忌生葱；土茯苓忌茶等。一般而言，服药期间宜忌生冷、油腻、辛辣、腥膻及不易消化之物，以免影响药效或加重病情。

第七章 剂量与用法

7.1 中药的剂量

剂量，即药物的用量，一般指单味药一日用量，也包括方剂中各药的相对用量和制剂中的用量。剂量是否恰当，直接影响疗效与安全：量小力不及，难以取效；量大则易伤正或中毒。

确定剂量主要依据五个方面：一是药物性质，有毒无毒、质地轻重、气味厚薄、作用强弱不同，用量各异，质轻的花叶类用量宜小，质重的矿物贝壳类用量宜大；二是剂型与配伍，入汤剂用量一般大于丸散剂，单味使用大于复方；三是病情轻重与病程长短，急重病用量可适当加大，慢性病宜缓图；四是患者年龄、体质、性别，老人、小儿、体弱者用量宜减；五是季节、地域，“用温远温，用热远热”等。

一般药物常用量为 3～10 g。具体用量应以现行《中国药典》和各版教材的规定为准，处方时还须结合具体病情灵活掌握。

传统有“细辛不过钱”（一钱约 3 g）之说，《中国药典》规定细辛用量为 1～3 g，散剂每次服 0.5～1 g，可作为理解“剂量安全”的典型例子。历代度量衡也有变化：汉代一两约合今 13.9 g，宋金元一两约 41 g 而一钱约 4.1 g，明清一钱约 3.7 g，现代一钱按 3 g 计。阅读古方时须注意折算。

7.2 煎药方法

煎药器具以砂锅、瓦罐为佳，忌用铁器、铝器，以免与药物发生化学反应。煎药前用冷水将药物浸泡约 30 分钟，水量以漫过药面 2～3 cm 为宜。一般先用武火（大火）煮沸，再改用文火（小火）保持微沸，煎煮 20～30 分钟；解表药宜武火急煎，补益药宜文火久煎。一剂药通常煎煮两次，合并药液后分次服用，以充分利用药效。

7.2.1 特殊煎法

煎法	适用药物	说明
先煎	矿物、贝壳类（石决明、牡蛎、龙骨、磁石）；毒性药（附子、川乌、草乌）	矿物贝壳先煎 20～30 分钟；毒性药先煎 30～60 分钟，至口尝无麻辣感为度

煎法	适用药物	说明
后下	气味芳香药（薄荷、砂仁、白豆蔻）；久煎易破坏有效成分者（大黄、钩藤、番泻叶）	在其他药将煎好前 5～10 分钟放入
包煎	黏液质多、有绒毛、细小粉末及易使药液浑浊者（车前子、旋覆花、蒲黄、滑石、辛夷）	用纱布袋包好后再煎
另煎	贵重药（人参、西洋参、鹿茸）	单独煎煮，药液兑入其他药液中服
烊化	胶类药（阿胶、鹿角胶、龟甲胶）	用开水或黄酒溶化，或兑入煎好的药液中
冲服	粉末、汁液及贵重细料（三七粉、羚羊角粉、琥珀粉、芒硝）	研末或取汁，用药液或温开水冲服
煎汤代水	灶心土等	先煎取上清液，再以其代水煎其他药

7.3 服药方法

服药时间：补益药宜饭前服；对胃肠有刺激的药物宜饭后服；驱虫药宜空腹服；安神药宜睡前服；截疟药宜在疟疾发作前两小时服；急性病不拘时间，可频服。

服药温度：一般宜温服；解表药宜热服，服后加盖衣被以助发汗；寒证用热药宜热服；热证用寒药可温服或凉服；真热假寒证用寒药宜热服，真寒假热证用热药宜凉服（反佐服法）。

服药次数：一般一剂药煎两次，分 2～3 次服用，每日一剂；病情急重者可一日数剂，或遵医嘱。服药期间应注意观察反应，出现不良反应及时处理。

下篇 各论

第八章 解表药

凡以发散表邪、解除表证为主要功效的药物，称为解表药。解表药多味辛，主入肺、膀胱经；辛能发散，故能发汗解表。适用于外感六淫之邪侵袭肌表所致的表证，症见恶寒发热、头身疼痛、无汗或少汗、脉浮等。部分解表药还兼有宣肺止咳、利水消肿、透疹、祛风湿、止痛等作用。

解表药按药性分为辛温解表药与辛凉解表药两类：辛温解表药发散风寒，主治风寒表证；辛凉解表药疏散风热，主治风热表证。使用解表药应注意：表虚自汗、阴虚盗汗、疮疡日久、失血者慎用；夏季多汗、冬季严寒，用量宜相应增减；解表药多辛散，不宜久煎。

一、辛温解表药

麻黄（《神农本草经》）

【性味归经】辛、微苦，温。归肺、膀胱经。

【功效】发汗解表，宣肺平喘，利水消肿。

【应用】风寒感冒（表实证）；咳嗽气喘；风水水肿。

【用法用量】煎服，2～10 g。

【使用注意】发汗宣肺力强，表虚自汗、阴虚盗汗及肾不纳气之喘咳者忌用。

桂枝（《名医别录》）

【性味归经】辛、甘，温。归心、肺、膀胱经。

【功效】发汗解肌，温通经脉，助阳化气，平冲降逆。

【应用】风寒感冒（表实、表虚皆宜）；寒凝血滞之脘腹冷痛、痛经、痹痛；痰饮、蓄水证；心悸；奔豚。

【用法用量】煎服，3～10 g。

【使用注意】热病高热、阴虚火旺、血热妄行者忌用；孕妇慎用。

紫苏叶（《名医别录》）

【性味归经】辛，温。归肺、脾经。

【功效】解表散寒，行气和胃，解鱼蟹毒。

【应用】风寒感冒；脾胃气滞、胸闷呕吐；妊娠呕吐；鱼蟹中毒。

【用法用量】煎服，5～10 g，不宜久煎。

【使用注意】气虚表虚者慎用。

生姜（《名医别录》）

【性味归经】辛，微温。归肺、脾、胃经。

【功效】解表散寒，温中止呕，化痰止咳，解鱼蟹毒。

【应用】风寒感冒轻证；胃寒呕吐（“呕家圣药”）；寒痰咳嗽；鱼蟹中毒。

【用法用量】煎服，3～10 g。

【使用注意】阴虚内热及热盛者忌用。

荆芥（《神农本草经》）

【性味归经】辛，微温。归肺、肝经。

【功效】解表散风，透疹，消疮，止血。

【应用】外感表证（风寒、风热皆可）；麻疹不透、风疹瘙痒；疮疡初起兼表证；吐衄下血（荆芥炭）。

【用法用量】煎服，5～10 g，不宜久煎。

【使用注意】表虚自汗、阴虚头痛者忌用。

防风（《神农本草经》）

【性味归经】辛、甘，微温。归膀胱、肝、脾经。

【功效】祛风解表，胜湿止痛，止痉。

【应用】外感表证；风湿痹痛；风疹瘙痒；破伤风。

【用法用量】煎服，5～10 g。

【使用注意】阴血亏虚、热病动风者不宜。

羌活（《神农本草经》）

【性味归经】辛、苦，温。归膀胱、肾经。

【功效】解表散寒，祛风除湿，止痛。

【应用】风寒感冒，头痛身痛；风寒湿痹（上半身痹痛尤宜）。

【用法用量】煎服，3～10 g。

【使用注意】阴血亏虚者慎用；用量过多易致呕吐。

白芷（《神农本草经》）

【性味归经】辛，温。归胃、大肠、肺经。

【功效】解表散寒，祛风止痛，通鼻窍，燥湿止带，消肿排脓。

【应用】风寒感冒，头痛、眉棱骨痛；鼻塞流涕、鼻渊；带下；疮痈肿毒。

【用法用量】煎服，3～10 g。

【使用注意】阴虚血热者忌用。

辛温解表药鉴别：麻黄与桂枝均能发汗解表，麻黄发汗力强，长于宣肺平喘、利水消肿，主治风寒表实证；桂枝发汗力缓，善温通经脉、助阳化气，表实表虚皆宜。荆芥与防风均能祛风解表，荆芥长于透疹、止血，防风长于胜湿止痛、止痉。羌活与白芷均能祛风止痛，羌活善治上半身及太阳经头痛，白芷善治阳明经前额头痛、鼻渊。

二、辛凉解表药

薄荷（《新修本草》）

【性味归经】辛，凉。归肺、肝经。

【功效】疏散风热，清利头目，利咽，透疹，疏肝行气。

【应用】风热感冒、温病初起；头痛目赤、咽喉肿痛；麻疹不透、风疹瘙痒；肝郁气滞、胸闷胁痛。

【用法用量】煎服，3～6 g，后下。

【使用注意】体虚多汗者不宜。

牛蒡子（《名医别录》）

【性味归经】辛、苦，寒。归肺、胃经。

【功效】疏散风热，宣肺透疹，解毒利咽，滑肠通便。

【应用】风热感冒、咳嗽痰多；麻疹不透、风疹瘙痒；咽喉肿痛、疖腮、丹毒；热毒疮肿兼便秘。

【用法用量】煎服，6～12 g。

【使用注意】性寒滑肠，气虚便溏者慎用。

桑叶（《神农本草经》）

【性味归经】甘、苦，寒。归肺、肝经。

【功效】疏散风热，清肺润燥，清肝明目，平抑肝阳。

【应用】风热感冒、温病初起；肺热燥咳；目赤昏花；肝阳上亢之头晕目眩。

【用法用量】煎服，5～10 g。

【使用注意】脾胃虚寒者慎用。

菊花（《神农本草经》）

【性味归经】甘、苦，微寒。归肺、肝经。

【功效】疏散风热，平抑肝阳，清肝明目，清热解毒。

【应用】风热感冒；肝阳眩晕；目赤肿痛、目暗昏花；疮痈肿毒。

【用法用量】煎服，5～10 g。

【使用注意】气虚胃寒、食少泄泻者慎用。

柴胡（《神农本草经》）

【性味归经】辛、苦，微寒。归肝、胆、肺经。

【功效】疏散退热，疏肝解郁，升举阳气。

【应用】感冒发热、寒热往来；肝郁气滞、胸胁胀痛、月经不调；中气不足、气虚下陷之久泻脱肛、子宫脱垂。

【用法用量】煎服，3～10 g。

【使用注意】真阴亏损、肝阳上亢者慎用。

葛根（《神农本草经》）

【性味归经】甘、辛，凉。归脾、胃、肺经。

【功效】解肌退热，生津止渴，透疹，升阳止泻，通经活络，解酒毒。

【应用】外感发热、项背强痛；热病口渴、消渴；麻疹不透；热泻热痢、脾虚泄泻；中风偏瘫、胸痹心痛；酒毒伤中。

【用法用量】煎服，10～15 g。

【使用注意】脾胃虚寒者慎用。

辛凉解表药鉴别：薄荷、桑叶、菊花均能疏散风热、清利头目，薄荷凉散力强、兼能透疹疏肝；桑叶、菊花偏入肝经，桑叶长于清肺润燥，菊花长于平肝明目。柴胡与葛根均能解表退热，柴胡善治寒热往来、疏肝升阳，葛根善解肌项背强痛、生津止泻。

> 解表药小结：辛温解表药发散风寒，麻黄、桂枝为要；辛凉解表药疏散风热，薄荷、桑叶、菊花、柴胡、葛根常用。使用解表药以“微汗为度”，不可过汗伤阴。

第九章 清热药

凡以清解里热为主要功效的药物，称为清热药。清热药药性寒凉，主入肺、胃、心、肝经，具有清热泻火、清热燥湿、清热凉血、清热解毒、清虚热等作用。适用于外感热病高热、脏腑火热证、湿热证、血热证、热毒证及阴虚内热证等。

清热药按功效可分为五类：清热泻火药（清气分热）、清热燥湿药（清利湿热）、清热解毒药（清解热毒）、清热凉血药（清血分热）、清虚热药（退虚热）。使用清热药应辨明热证部位与性质，避免寒凉太过伤阳败胃；脾胃虚寒、阳虚者慎用；热盛伤阴者宜配养阴药。

一、清热泻火药

石膏（《神农本草经》）

【性味归经】甘、辛，大寒。归肺、胃经。

【功效】生用：清热泻火，除烦止渴；煅用：收湿，生肌，敛疮，止血。

【应用】气分实热证（高热烦渴）；肺热咳嗽；胃火牙痛、头痛；疮疡不敛、湿疮、烧伤（煅用外用）。

【用法用量】生用煎服 15～60 g，先煎；煅用适量外用。

【使用注意】脾胃虚寒及阴虚内热者忌用。

知母（《神农本草经》）

【性味归经】苦、甘，寒。归肺、胃、肾经。

【功效】清热泻火，滋阴润燥。

【应用】气分实热证；肺热燥咳；骨蒸潮热；内热消渴；肠燥便秘。

【用法用量】煎服，6～12 g。

【使用注意】性寒质润，脾虚便溏者慎用。

栀子（《神农本草经》）

【性味归经】苦，寒。归心、肺、三焦经。

【功效】泻火除烦，清热利湿，凉血解毒；外用消肿止痛。

【应用】热病心烦；湿热黄疸、淋证；血热吐衄；目赤肿痛；火毒疮疡；扭伤肿痛（外用）。

【用法用量】煎服，6～10 g；外用适量。

【使用注意】苦寒伤胃，脾虚便溏者不宜。

夏枯草（《神农本草经》）

【性味归经】辛、苦，寒。归肝、胆经。

【功效】清肝泻火，明目，散结消肿。

【应用】目赤肿痛、头痛眩晕；瘰疬、瘿瘤、乳痈肿痛；高血压属肝火者。

【用法用量】煎服，9～15 g。

【使用注意】脾胃虚寒者慎用。

清热泻火药鉴别：石膏与知母均能清气分实热、除烦止渴，石膏大寒，清泻力强，为清泻肺胃实火之要药；知母苦甘性寒，兼能滋阴润燥。栀子苦寒，善清心除烦、利湿退黄，并能凉血止血。夏枯草善清肝火、散郁结，为治瘰疬、瘿瘤、乳痈常用之品。

二、清热燥湿药

黄芩（《神农本草经》）

【性味归经】苦，寒。归肺、胆、脾、大肠、小肠经。

【功效】清热燥湿，泻火解毒，止血，安胎。

【应用】湿温、暑湿、湿热痞满、泻痢、黄疸；肺热咳嗽；血热吐衄；痈肿疮毒；胎动不安。

【用法用量】煎服，3～10 g。

【使用注意】苦寒伤胃，脾胃虚寒者不宜。

黄连（《神农本草经》）

【性味归经】苦，寒。归心、脾、胃、肝、胆、大肠经。

【功效】清热燥湿，泻火解毒。

【应用】湿热痞满、呕吐吞酸、泻痢；心火亢盛、心烦不寐、血热吐衄；胃火牙痛、消谷善饥；痈肿疔疮；湿疹、湿疮、耳道流脓（外用）。

【用法用量】煎服，2～5 g；外用适量。

【使用注意】苦寒败胃，脾胃虚寒者忌用；阴虚津伤者慎用。

黄柏（《神农本草经》）

【性味归经】苦，寒。归肾、膀胱经。

【功效】清热燥湿，泻火除蒸，解毒疗疮。

【应用】湿热泻痢、黄疸、带下、热淋、脚气；骨蒸劳热、盗汗遗精；疮疡肿毒、湿疹瘙痒。

【用法用量】煎服，3～12 g；外用适量。

【使用注意】脾胃虚寒者忌用。

龙胆（《神农本草经》）

【性味归经】苦，寒。归肝、胆经。

【功效】清热燥湿，泻肝胆火。

【应用】湿热黄疸、阴肿阴痒、带下、湿疹；肝火头痛、目赤耳聋、胁痛口苦；惊风抽搐。

【用法用量】煎服，3～6 g。

【使用注意】脾胃虚寒者忌用；不宜过服久服。

清热燥湿药鉴别：黄芩、黄连、黄柏均能清热燥湿、泻火解毒，合称“三黄”。黄芩善清肺热、并能安胎；黄连善清心胃之火，为治湿热泻痢、呕吐之要药；黄柏善清下焦湿热、退虚热。龙胆苦寒，专泻肝胆实火、清下焦湿热。

三、清热解毒药

金银花（《新修本草》）

【性味归经】甘，寒。归肺、心、胃经。

【功效】清热解毒，疏散风热。

【应用】痈肿疔疮；外感风热、温病初起；热毒血痢；咽喉肿痛。

【用法用量】煎服，6～15 g。

【使用注意】脾胃虚寒及气虚疮疡脓清者忌用。

连翘（《神农本草经》）

【性味归经】苦，微寒。归肺、心、小肠经。

【功效】清热解毒，消肿散结，疏散风热。

【应用】痈疽、瘰疬、乳痈、丹毒；风热感冒、温病初起；热淋涩痛。

【用法用量】煎服，6～15 g。

【使用注意】脾胃虚寒者慎用。

蒲公英（《新修本草》）

【性味归经】苦、甘，寒。归肝、胃经。

【功效】清热解毒，消肿散结，利湿通淋。

【应用】痈肿疔毒、乳痈；热淋涩痛、湿热黄疸；目赤肿痛。

【用法用量】煎服，10～15 g；外用适量。

【使用注意】用量过大可致缓泻。

板蓝根（《新修本草》）

【性味归经】苦，寒。归心、胃经。

【功效】清热解毒，凉血利咽。

【应用】外感发热、温病初起、咽喉肿痛；大头瘟疫、丹毒、痄腮。

【用法用量】煎服，9～15 g。

【使用注意】体虚而无实火热毒者忌用；脾胃虚寒者慎用。

鱼腥草（《名医别录》）

【性味归经】辛，微寒。归肺经。

【功效】清热解毒，消痈排脓，利尿通淋。

【应用】肺痈吐脓、肺热咳嗽；热毒疮痈；热淋。

【用法用量】煎服，15～25 g，不宜久煎；外用适量。

【使用注意】虚寒证及阴性疮疡者忌用。

清热解毒药鉴别：金银花、连翘常相须为用，金银花善治内痈外痈，连翘素有“疮家圣药”之称，兼能散结、透热转气。蒲公英善治乳痈；板蓝根善治大头瘟疫、咽喉肿痛；鱼腥草为治肺痈之要药。

四、清热凉血药

生地黄（《神农本草经》）

【性味归经】甘，寒。归心、肝、肾经。

【功效】清热凉血，养阴生津。

【应用】热入营血、温毒发斑、血热吐衄；阴虚内热、骨蒸劳热；津伤口渴、内热消渴、肠燥便秘。

【用法用量】煎服，10～15 g。

【使用注意】脾虚湿滞、腹满便溏者不宜。

玄参（《神农本草经》）

【性味归经】甘、苦、咸，微寒。归肺、胃、肾经。

【功效】清热凉血，滋阴降火，解毒散结。

【应用】温邪入营、内陷心包、温毒发斑；热病伤阴、舌绛烦渴、津伤便秘、骨蒸劳嗽；目赤咽痛、瘰疬、痈肿疮毒。

【用法用量】煎服，9～15 g。

【使用注意】脾胃虚寒、食少便溏者不宜；不宜与藜芦同用。

牡丹皮（《神农本草经》）

【性味归经】苦、辛，微寒。归心、肝、肾经。

【功效】清热凉血，活血化瘀。

【应用】热入营血、温毒发斑、血热吐衄；温病伤阴、阴虚发热、夜热早凉、无汗骨蒸；血滞经闭、痛经、跌打伤痛；痈肿疮毒。

【用法用量】煎服，6～12 g。

【使用注意】血虚有寒、月经过多及孕妇不宜。

赤芍（《神农本草经》）

【性味归经】苦，微寒。归肝经。

【功效】清热凉血，散瘀止痛。

【应用】热入营血、温毒发斑、血热吐衄；肝郁胁痛、经闭痛经、癥瘕腹痛、跌打损伤；痈肿疮疡、目赤肿痛。

【用法用量】煎服，6～12 g。

【使用注意】血寒经闭不宜；不宜与藜芦同用。

清热凉血药鉴别：生地黄与玄参均能清热凉血、养阴生津，生地黄凉血力强、兼能止血，玄参长于解毒散结、利咽。牡丹皮与赤芍均能凉血活血、化瘀，牡丹皮善退虚热、治无汗骨蒸，赤芍善散瘀止痛、清肝。

五、清虚热药

青蒿（《神农本草经》）

【性味归经】苦、辛，寒。归肝、胆经。

【功效】清虚热，除骨蒸，解暑热，截疟，退黄。

【应用】温邪伤阴、夜热早凉；阴虚发热、骨蒸劳热；暑邪发热、口渴胸闷；疟疾寒热；湿热黄疸。

【用法用量】煎服，6～12 g，后下。

【使用注意】脾胃虚弱、肠滑泄泻者忌用。

地骨皮（《神农本草经》）

【性味归经】甘，寒。归肺、肝、肾经。

【功效】凉血除蒸，清肺降火。

【应用】阴虚发热、骨蒸盗汗；肺热咳嗽；血热吐衄；内热消渴。

【用法用量】煎服，9～15 g。

【使用注意】外感风寒发热及脾虚便溏者不宜。

清虚热药鉴别：青蒿与地骨皮均能退虚热、除骨蒸，青蒿兼解暑热、截疟，地骨皮兼清肺降火、凉血。

清热药小结：清热泻火药清气分热，石膏、知母为代表；清热燥湿药主湿热证，三黄为代表；清热解毒药主热毒证，金银花、连翘为代表；清热凉血药主血热证，生地黄、牡丹皮为代表；清虚热药主阴虚内热，青蒿、地骨皮为代表。

第十章 泻下药

凡能引起腹泻，或润滑大肠、促进排便的药物，称为泻下药。泻下药主要用于大便秘结、胃肠积滞、实热内结及水肿停饮等里实证。

泻下药按作用强弱分为三类：攻下药（苦寒，泻下力强，如大黄、芒硝）、润下药（甘平，润肠通便，如火的仁）、峻下逐水药（多有毒，泻下峻猛，如甘遂、巴豆）。使用泻下药应注意：里实兼表者先解表后攻里；里实正虚者攻补兼施；孕妇、月经期、哺乳期慎用或禁用；峻下药有毒，须严格掌握剂量与炮制。

大黄（《神农本草经》）

【性味归经】苦，寒。归脾、胃、大肠、肝、心包经。

【功效】泻下攻积，清热泻火，凉血解毒，逐瘀通经，利湿退黄。

【应用】实热积滞便秘；血热吐衄、目赤咽痛、痈肿疔疮；瘀血经闭、产后瘀阻、跌打损伤；湿热痢疾、黄疸、淋证；烧烫伤（外用）。

【用法用量】煎服，3～15 g；用于泻下不宜久煎，宜后下或开水泡服；外用适量。

【使用注意】孕妇、月经期、哺乳期慎用；脾胃虚弱者慎用。

芒硝（《名医别录》）

【性味归经】咸、苦，寒。归胃、大肠经。

【功效】泻下通便，润燥软坚，清火消肿。

【应用】实热积滞、大便燥结；咽痛、口疮、目赤、痈肿疮毒（外用）。

【用法用量】内服 6～12 g，冲入药汁内或开水溶化后服；外用适量。

【使用注意】孕妇及哺乳期妇女忌用或慎用；脾胃虚寒者忌用。

火麻仁（《神农本草经》）

【性味归经】甘，平。归脾、胃、大肠经。

【功效】润肠通便。

【应用】血虚津亏、肠燥便秘。

【用法用量】煎服，10～15 g。

【使用注意】不可过量，大量服用可致中毒（恶心、呕吐、腹泻等）。

甘遂（《神农本草经》）

【性味归经】苦，寒；有毒。归肺、肾、大肠经。

【功效】泻水逐饮，消肿散结。

【应用】水肿胀满、胸腹积水、痰饮积聚、气逆喘咳；风痰癫痫；疮痈肿毒（外用）。

【用法用量】入丸散服，每次 0.5～1.5 g；外用适量。

【使用注意】孕妇禁用；不宜与甘草同用；体虚者忌用。

巴豆（《神农本草经》）

【性味归经】辛，热；有大毒。归胃、大肠经。

【功效】峻下冷积，逐水退肿，豁痰利咽；外用蚀疮。

【应用】寒积便秘；腹水臌胀；喉痹痰阻；痈肿脓成未溃、疥癣恶疮（外用）。

【用法用量】入丸散服，每次 0.1～0.3 g，多制成巴豆霜用；外用适量。

【使用注意】孕妇禁用；不宜与牵牛子同用；服后泻下不止者，应及时处理。

泻下药鉴别：大黄与芒硝均能泻下攻积、清热，常相须为用，大黄苦寒，泻下力强，兼能逐瘀、利湿退黄；芒硝咸寒，软坚泻下，为治燥屎坚结之要药。火麻仁甘平质润，为润下之品；甘遂、巴豆峻猛有毒，只用于水饮、寒积之实证。

第十一章 祛风湿药

凡以祛除风寒湿邪、解除痹痛为主要作用的药物，称为祛风湿药。本类药物多味辛、苦，性温或凉，主入肝、肾经。适用于风寒湿痹所致的肢体关节疼痛、麻木重着、筋脉拘挛、屈伸不利等。

祛风湿药多兼有舒筋活络、补肝肾、强筋骨、止痛等作用。根据药性可分为祛风寒湿药、祛风湿热药、祛风湿强筋骨药。使用本类药物应注意：痹证多虚实夹杂，宜配合补益药；阴血亏虚者慎用辛温燥烈之品；部分药物有毒，用量宜慎。

独活（《神农本草经》）

【性味归经】辛、苦，微温。归肾、膀胱经。

【功效】祛风除湿，通痹止痛，解表。

【应用】风寒湿痹（腰膝、腿足关节疼痛属下部尤宜）；风寒挟湿表证；少阴头痛。

【用法用量】煎服，3～10 g。

【使用注意】阴虚血燥者慎用。

威灵仙（《新修本草》）

【性味归经】辛、咸，温。归膀胱经。

【功效】祛风湿，通经络，止痛，消骨鲠。

【应用】风湿痹痛、肢体麻木、筋脉拘挛、屈伸不利；骨鲠咽喉。

【用法用量】煎服，6～10 g。

【使用注意】气血虚弱者慎用。

木瓜（《名医别录》）

【性味归经】酸，温。归肝、脾经。

【功效】舒筋活络，和胃化湿。

【应用】风湿痹痛、筋脉拘挛；脚气肿痛；吐泻转筋。

【用法用量】煎服，6～9 g。

【使用注意】内有郁热、小便短赤者忌用。

秦艽（《神农本草经》）

【性味归经】辛、苦，平。归胃、肝、胆经。

【功效】祛风湿，清湿热，止痹痛，退虚热。

【应用】风湿痹痛、筋脉拘挛、骨节酸痛；中风半身不遂；湿热黄疸；骨蒸潮热。

【用法用量】煎服，3～10 g。

【使用注意】久痛虚羸、溲多、便溏者慎用。

防己（《神农本草经》）

【性味归经】苦，寒。归膀胱、肺经。

【功效】祛风止痛，利水消肿。

【应用】风湿痹痛；水肿、小便不利、脚气肿痛。

【用法用量】煎服，5～10 g。

【使用注意】胃气虚弱及阴虚无湿热者慎用。

桑寄生（《神农本草经》）

【性味归经】苦、甘，平。归肝、肾经。

【功效】祛风湿，补肝肾，强筋骨，安胎。

【应用】风湿痹痛、腰膝酸软、筋骨无力；崩漏经多、妊娠漏血、胎动不安；高血压。

【用法用量】煎服，9～15 g。

祛风湿药鉴别：独活与羌活均能祛风湿、止痛，羌活偏上行，治上半身痹痛、太阳头痛，独活偏下行，治下半身痹痛、少阴头痛。桑寄生既能祛风湿，又能补肝肾、强筋骨、安胎，为虚实兼顾之品。威灵仙性善走窜，为治骨鲠之要药；木瓜酸温，善舒筋活络、化湿和胃。

第十二章 化湿药

凡以化湿运脾为主要作用，气味芳香，性偏温燥的药物，称为化湿药，又称芳香化湿药。本类药物多入脾、胃经，具有促进脾胃运化、消除湿浊的作用。适用于湿浊中阻所致的脘腹痞满、呕吐泛酸、大便溏薄、食少体倦、口甘多涎、舌苔白腻等。

使用化湿药应注意：湿有寒湿、湿热之别，宜随证配伍温里或清热药；阴虚血燥及气虚者慎用；本类药物气味芳香，多含挥发油，入汤剂不宜久煎。

藿香（《名医别录》）

【性味归经】辛，微温。归脾、胃、肺经。

【功效】芳香化浊，和中止呕，发表解暑。

【应用】湿浊中阻、脘痞呕吐；暑湿表证、湿温初起；寒湿闭暑、腹痛吐泻。

【用法用量】煎服，3～10 g，不宜久煎。

【使用注意】阴虚血燥者不宜。

佩兰（《神农本草经》）

【性味归经】辛，平。归脾、胃、肺经。

【功效】芳香化湿，醒脾开胃，发表解暑。

【应用】湿浊中阻、脘痞呕恶；口中甜腻、口臭、多涎；暑湿表证、湿温初起。

【用法用量】煎服，3～10 g，不宜久煎。

【使用注意】阴虚血燥者慎用。

苍术（《神农本草经》）

【性味归经】辛、苦，温。归脾、胃、肝经。

【功效】燥湿健脾，祛风散寒，明目。

【应用】湿阻中焦、脘腹胀满、泄泻、水肿、脚气；风湿痹痛；风寒挟湿表证；夜盲、眼目昏涩。

【用法用量】煎服，3～9 g。

【使用注意】阴虚内热、气虚多汗者忌用。

厚朴（《神农本草经》）

【性味归经】苦、辛，温。归脾、胃、肺、大肠经。

【功效】燥湿消痰，下气除满。

【应用】湿滞伤中、脘痞吐泻、食积气滞、腹胀便秘；痰饮喘咳；梅核气。

【用法用量】煎服，3～10 g。

【使用注意】气虚津亏者及孕妇慎用。

砂仁（《药性论》）

【性味归经】辛，温。归脾、胃、肾经。

【功效】化湿开胃，温脾止泻，理气安胎。

【应用】湿浊中阻、脘痞不饥、脾胃虚寒、呕吐泄泻；妊娠恶阻、胎动不安。

【用法用量】煎服，3～6 g，后下。

【使用注意】阴虚血燥者慎用。

化湿药鉴别：藿香与佩兰均能芳香化湿、解暑，藿香长于止呕，佩兰长于醒脾、去口中甜腻。苍术与厚朴均能燥湿，苍术健脾燥湿、兼能明目，厚朴下气除满、兼能消痰。砂仁化湿行气、温中止泻、安胎，为脾胃虚寒、妊娠恶阻常用之品。

第十三章 利水渗湿药

凡以通利水道、渗泄水湿为主要作用的药物，称为利水渗湿药。本类药物多味甘、淡，性平或偏寒凉，主入膀胱、肾经。适用于小便不利、水肿、淋证、痰饮、黄疸、湿疮等水湿内停之证。

利水渗湿药按作用特点分为利水消肿药（甘淡平，渗湿利水）、利尿通淋药（甘淡寒，清利湿热、通淋）与利湿退黄药（清利湿热、利胆退黄）。使用本类药物应注意：阴津亏虚者慎用；久用可伤阴，宜适当配伍养阴药；孕妇慎用滑利之品。

茯苓（《神农本草经》）

【性味归经】甘、淡，平。归心、肺、脾、肾经。

【功效】利水渗湿，健脾，宁心。

【应用】水肿尿少；痰饮眩悸；脾虚食少、便溏泄泻；心神不安、惊悸失眠。

【用法用量】煎服，10～15 g。

【使用注意】阴虚而无湿热、虚寒滑精、气虚下陷者慎用。

猪苓（《神农本草经》）

【性味归经】甘、淡，平。归肾、膀胱经。

【功效】利水渗湿。

【应用】小便不利、水肿、泄泻、淋浊、带下。

【用法用量】煎服，6～12 g。

【使用注意】阴虚津伤者慎用。

泽泻（《神农本草经》）

【性味归经】甘、淡，寒。归肾、膀胱经。

【功效】利水渗湿，泄热，化浊降脂。

【应用】小便不利、水肿、泄泻、痰饮眩晕；热淋涩痛、遗精；高脂血症。

【用法用量】煎服，6～10 g。

【使用注意】肾虚精滑者慎用。

薏苡仁（《神农本草经》）

【性味归经】甘、淡，凉。归脾、胃、肺经。

【功效】利水渗湿，健脾止泻，除痹，排脓，解毒散结。

【应用】水肿、脚气、小便不利；脾虚泄泻；湿痹拘挛；肺痈、肠痈；赘疣。

【用法用量】煎服，9～30 g。清利湿热宜生用，健脾止泻宜炒用。

【使用注意】孕妇慎用。

车前子（《神农本草经》）

【性味归经】甘，寒。归肝、肾、肺、小肠经。

【功效】清热利尿通淋，渗湿止泻，明目，祛痰。

【应用】热淋涩痛、水肿胀满、小便不利；暑湿泄泻；目赤肿痛、目暗昏花；痰热咳嗽。

【用法用量】煎服，9～15 g，包煎。

【使用注意】内伤劳倦、肾虚精滑及内无湿热者慎用。

滑石（《神农本草经》）

【性味归经】甘、淡，寒。归膀胱、肺、胃经。

【功效】利尿通淋，清热解暑；外用祛湿敛疮。

【应用】热淋、石淋、尿热涩痛；暑湿烦渴、湿温初起；湿热水泻；湿疹、湿疮、痱子（外用）。

【用法用量】煎服，10～20 g，包煎；外用适量。

【使用注意】脾虚、热病伤津者及孕妇忌用。

茵陈（《神农本草经》）

【性味归经】苦、辛，微寒。归脾、胃、肝、胆经。

【功效】清利湿热，利胆退黄。

【应用】黄疸尿少、湿温暑湿、湿疮瘙痒。

【用法用量】煎服，6～15 g。

【使用注意】蓄血发黄及血虚萎黄者慎用。

金钱草（《本草纲目拾遗》）

【性味归经】甘、咸，微寒。归肝、胆、肾、膀胱经。

【功效】利湿退黄，利尿通淋，解毒消肿。

【应用】湿热黄疸、胆胀胁痛；石淋、热淋、小便涩痛；痈肿疔疮、蛇虫咬伤。

【用法用量】煎服，15～60 g；外用适量。

【使用注意】脾胃虚寒者慎用。

利水渗湿药鉴别：茯苓、猪苓、泽泻均能利水渗湿，茯苓兼能健脾、宁心，猪苓利水作用较强而无补性，泽泻兼能泄热、化浊降脂。车前子与滑石均能清热利尿通淋，车前子兼能明目、祛痰、止泻，滑石兼能解暑、外用敛疮。茵陈为治黄疸之要药，金钱草善治石淋。

第十四章 温里药

凡以温里散寒、治疗里寒证为主要作用的药物，称为温里药，又称祛寒药。本类药物多味辛，性温热，主入脾、胃、肾、心经。适用于中焦寒证（脘腹冷痛、呕吐泄泻）、亡阳证（四肢厥冷、脉微欲绝）、肾阳不足及寒凝经脉诸证。

温里药性多辛热燥烈，易伤阴动火，故热证、阴虚火旺者忌用；真热假寒者不可误用；孕妇慎用。使用时应辨清寒证部位，随证配伍补阳、健脾、行气药。

附子（《神农本草经》）

【性味归经】辛、甘，大热；有毒。归心、肾、脾经。

【功效】回阳救逆，补火助阳，散寒止痛。

【应用】亡阳虚脱、肢冷脉微；肾阳不足、阳痿宫冷；心阳虚衰、胸痹心痛；脾肾阳虚、脘腹冷痛、泄泻；寒湿痹痛。

【用法用量】煎服，3～15 g，先煎 30～60 分钟至口尝无麻辣感。

【使用注意】孕妇慎用；不宜与半夏、瓜蒌、贝母、白蔹、白及同用；不可过量久服。

干姜（《神农本草经》）

【性味归经】辛，热。归脾、胃、肾、心、肺经。

【功效】温中散寒，回阳通脉，温肺化饮。

【应用】脘腹冷痛、呕吐泄泻；亡阳证；寒饮喘咳。

【用法用量】煎服，3～10 g。

【使用注意】阴虚内热、血热妄行者忌用；孕妇慎用。

肉桂（《神农本草经》）

【性味归经】辛、甘，大热。归肾、脾、心、肝经。

【功效】补火助阳，引火归元，散寒止痛，温通经脉。

【应用】阳痿宫冷、腰膝冷痛、虚阳上浮；心腹冷痛、寒疝作痛；寒凝血瘀之痛经、闭经；虚寒吐泻。

【用法用量】煎服，1～5 g，宜后下或冲服。

【使用注意】阴虚火旺、里有实热、血热妄行及孕妇忌用；不宜与赤石脂同用。

吴茱萸（《神农本草经》）

【性味归经】辛、苦，热；有小毒。归肝、脾、胃、肾经。

【功效】散寒止痛，降逆止呕，助阳止泻。

【应用】厥阴头痛、寒疝腹痛、经行腹痛；脘腹胀痛、呕吐吞酸；虚寒泄泻；口疮（外用）。

【用法用量】煎服，2～5 g；外用适量。

【使用注意】辛热燥烈，不宜多用久服；阴虚有热者忌用；孕妇慎用。

丁香（《药性论》）

【性味归经】辛，温。归脾、胃、肺、肾经。

【功效】温中降逆，补肾助阳，散寒止痛。

【应用】脾胃虚寒之呃逆、呕吐、食少吐泻；肾虚阳痿、宫冷；脘腹冷痛。

【用法用量】煎服，1～3 g。

【使用注意】热证及阴虚内热者忌用；不宜与郁金同用。

温里药鉴别：附子与干姜均能回阳救逆，附子大热，回阳力强，兼补火助阳、散寒止痛，为“回阳救逆第一品药”；干姜温中散寒、温肺化饮，为温暖中焦之主药。肉桂与桂枝同出一物，肉桂长于补火助阳、引火归元，桂枝长于解表、温通经脉。吴茱萸善散厥阴肝经之寒、降逆止呕，丁香善温中降逆止呃。

第十五章 理气药

凡以疏理气机、治疗气滞或气逆证为主要作用的药物，称为理气药，又称行气药。本类药物多味辛、苦，性温，主入脾、胃、肝、肺经。适用于脾胃气滞（脘腹胀痛、嗳气、恶心呕吐）、肝气郁滞（胁肋胀痛、月经不调、疝气）及肺气壅滞（胸闷喘咳）等证。

理气药性多辛温香燥，易耗气伤阴，气虚、阴虚者慎用；孕妇慎用。使用时应辨别气滞部位与兼证，随证配伍消食、活血、清热、补气药。

陈皮（《神农本草经》）

【性味归经】苦、辛，温。归肺、脾经。

【功效】理气健脾，燥湿化痰。

【应用】脾胃气滞、脘腹胀满、食少吐泻；湿痰寒痰咳嗽；呕吐、呃逆。

【用法用量】煎服，3～10 g。

【使用注意】气虚、阴虚燥咳及吐血者慎用。

青皮（《本草图经》）

【性味归经】苦、辛，温。归肝、胆、胃经。

【功效】疏肝破气，消积化滞。

【应用】肝郁气滞之胸胁胀痛、疝气疼痛、乳癖乳痈；食积气滞、脘腹胀痛；癥瘕积聚、久疟痞块。

【用法用量】煎服，3～10 g。

【使用注意】性烈耗气，气虚者慎用；孕妇慎用。

枳实（《神农本草经》）

【性味归经】苦、辛、酸，微寒。归脾、胃经。

【功效】破气消积，化痰散痞。

【应用】积滞内停、痞满胀痛、泻痢后重、大便不通；痰滞气阻之胸痹、结胸；脏器下垂（配补气药）。

【用法用量】煎服，3～10 g。

【使用注意】脾胃虚弱者及孕妇慎用。

木香（《神农本草经》）

【性味归经】辛、苦，温。归脾、胃、大肠、三焦、胆经。

【功效】行气止痛，健脾消食。

【应用】脾胃气滞、脘腹胀痛、泻痢后重；食积不消、不思饮食；胸胁胀痛、黄疸；疝气疼痛。

【用法用量】煎服，3～6 g。

【使用注意】阴虚津亏者慎用。

香附（《名医别录》）

【性味归经】辛、微苦、微甘，平。归肝、脾、三焦经。

【功效】疏肝解郁，理气宽中，调经止痛。

【应用】肝郁气滞之胸胁、脘腹胀痛；月经不调、痛经、乳房胀痛；脾胃气滞、脘腹痞满。

【用法用量】煎服，6～10 g。

【使用注意】气虚无滞、阴虚血热者慎用。

川楝子（《神农本草经》）

【性味归经】苦，寒；有小毒。归肝、小肠、膀胱经。

【功效】疏肝泄热，行气止痛，杀虫。

【应用】肝郁化火之胸胁、脘腹胀痛、疝气疼痛；虫积腹痛。

【用法用量】煎服，5～10 g；外用适量。

【使用注意】有小毒，不宜过量或持续服用；脾胃虚寒者慎用。

薤白（《神农本草经》）

【性味归经】辛、苦，温。归心、肺、胃、大肠经。

【功效】通阳散结，行气导滞。

【应用】胸痹心痛；脘腹痞满胀痛、泻痢后重。

【用法用量】煎服，5～10 g。

【使用注意】气虚者慎用；不耐蒜味者慎用。

理气药鉴别：陈皮与青皮同出橘皮，陈皮性缓，理气健脾、燥湿化痰，适用于脾胃气滞；青皮性烈，疏肝破气、消积化滞，适用于肝郁气滞、食积。枳实破气消积力强，配补气药可治脏器下垂。木

香行气止痛，善治泻痢后重；香附疏肝解郁、调经止痛，为“气病之总司、女科之主帅”；川楝子疏肝泄热，善治肝郁化火之痛证；薤白通阳散结，为治胸痹之要药。

第十六章 消食药

凡以消化食积、促进脾胃运化功能为主要作用的药物，称为消食药，又称助消化药。本类药物多味甘，性平或偏温，主入脾、胃经。适用于饮食积滞所致的脘腹胀满、嗳腐吞酸、恶心呕吐、不思饮食、大便失常等。

使用消食药应根据食积的性质（肉食、面食、谷食）与兼证（气滞、脾虚、湿热）配伍相应药物；脾胃虚弱者宜配伍健脾益气药；消食药多属渐消缓散之品，病情急重者不宜单用。

山楂（《本草衍义补遗》）

【性味归经】酸、甘，微温。归脾、胃、肝经。

【功效】消食健胃，行气散瘀，化浊降脂。

【应用】肉食积滞、胃脘胀满；泻痢腹痛、疝气疼痛；瘀血经闭、产后瘀阻、心腹刺痛；高脂血症。

【用法用量】煎服，9～12 g。

【使用注意】脾胃虚弱而无积滞者慎用。

神曲（《药性论》）

【性味归经】甘、辛，温。归脾、胃经。

【功效】消食和胃。

【应用】饮食积滞、脘腹胀满、食少纳呆、肠鸣腹泻；丸剂中含金石、贝壳类药物难消化者，可糊丸助消化。

【用法用量】煎服，6～15 g。

【使用注意】胃阴不足者慎用。

麦芽（《药性论》）

【性味归经】甘，平。归脾、胃经。

【功效】行气消食，健脾开胃，回乳消胀。

【应用】食积不消、脘腹胀满、脾虚食少；乳汁郁积、乳房胀痛、妇人断乳；肝郁气滞、胸胁胀痛。

【用法用量】煎服，10～15 g；回乳炒用 60 g。

【使用注意】哺乳期妇女不宜使用。

鸡内金（《神农本草经》）

【性味归经】甘，平。归脾、胃、小肠、膀胱经。

【功效】健胃消食，涩精止遗，通淋化石。

【应用】食积不消、呕吐泻痢、小儿疳积；遗精、遗尿；石淋涩痛、胆胀胁痛。

【用法用量】煎服，3～10 g；研末服，每次 1.5～3 g，效果优于煎剂。

【使用注意】脾虚无积滞者慎用。

消食药鉴别：山楂善消肉食积滞，兼能行气散瘀；麦芽善消米面食积，兼能回乳、疏肝；神曲善消谷食积滞，兼能和中；鸡内金消食力强，兼能涩精止遗、通淋化石，研末服效果更佳。

第十七章 驱虫药

凡以驱除或杀灭人体寄生虫为主要作用的药物，称为驱虫药。本类药物多入脾、胃、大肠经，部分药物有毒。适用于蛔虫、蛲虫、绦虫、钩虫等肠道寄生虫病，症见腹痛时作、不思饮食、或多食而瘦、面色萎黄、小儿疳积等。

使用驱虫药宜在空腹或半空腹时服，以便药物与虫体充分接触；应根据寄生虫种类选药；体虚者宜先补后攻或攻补兼施；孕妇、小儿用量宜慎；服药后注意观察排虫情况，必要时复查。

使君子（《开宝本草》）

【性味归经】甘，温。归脾、胃经。

【功效】杀虫消积。

【应用】蛔虫病、蛲虫病、虫积腹痛、小儿疳积。

【用法用量】使君子 9～12 g，去壳取仁嚼服，或入丸散；小儿每岁 1～1.5 粒，一日不超过 20 粒，空腹服，连服 3 日。

【使用注意】大量服用可致呃逆、呕吐、腹痛等；忌与热茶同服。

苦楝皮（《名医别录》）

【性味归经】苦，寒；有毒。归肝、脾、胃经。

【功效】杀虫，疗癣。

【应用】蛔虫病、蛲虫病、钩虫病；头癣、疥癣（外用）。

【用法用量】煎服，3～6 g（鲜品 15～30 g）；外用适量。

【使用注意】有毒，不宜过量或持续服用；肝肾功能不全者及孕妇忌用。

槟榔（《名医别录》）

【性味归经】苦、辛，温。归胃、大肠经。

【功效】杀虫，消积，行气，利水，截疟。

【应用】绦虫病、蛔虫病、姜片虫病、虫积腹痛；食积气滞、泻痢后重；水肿、脚气；疟疾。

【用法用量】煎服，3～10 g；驱绦虫 30～60 g。

【使用注意】脾虚便溏及气虚下陷者忌用；孕妇慎用。

驱虫药鉴别：使君子味甘，善驱蛔虫、蛲虫，为小儿驱虫要药；苦楝皮苦寒有毒，驱虫力强，兼能疗癣；槟榔杀虫谱广，尤善驱绦虫，兼能行气、利水、截疟。

第十八章 止血药

凡以制止体内外出血为主要作用的药物，称为止血药。本类药物多入心、肝、脾经，适用于咯血、吐血、衄血、便血、尿血、崩漏、外伤出血等各种出血证。

止血药按药性分为凉血止血药、化瘀止血药、收敛止血药与温经止血药四类。使用止血药应辨证求因：血热妄行者宜凉血止血，瘀血阻络者宜化瘀止血，虚寒出血者宜温经止血，滑脱不禁者宜收敛止血。出血兼瘀者不可纯用收涩，以免留瘀；出血量多势急者应及时采取综合救治措施。

大蓟（《名医别录》）

【性味归经】甘、苦，凉。归心、肝经。

【功效】凉血止血，散瘀消肿。

【应用】血热吐衄、尿血、便血、崩漏、外伤出血；痈肿疮毒。

【用法用量】煎服，9～15 g；外用适量。

【使用注意】脾胃虚寒者不宜。

小蓟（《名医别录》）

【性味归经】甘、苦，凉。归心、肝经。

【功效】凉血止血，散瘀解毒消痈。

【应用】血热吐血、衄血、尿血、血淋、便血、崩漏、外伤出血；痈肿疮毒。

【用法用量】煎服，5～12 g；外用适量。

【使用注意】脾胃虚寒者不宜。

地榆（《神农本草经》）

【性味归经】苦、酸、涩，微寒。归肝、大肠经。

【功效】凉血止血，解毒敛疮。

【应用】血热便血、痔血、血痢、崩漏；水火烫伤、湿疹、皮肤溃烂、痈肿疮毒。

【用法用量】煎服，9～15 g；外用适量。

【使用注意】大面积烧伤不宜使用地榆制剂外涂，以防鞣质吸收中毒。

槐花（《本草拾遗》）

【性味归经】苦，微寒。归肝、大肠经。

【功效】凉血止血，清肝泻火。

【应用】血热便血、痔血、血痢、崩漏、吐血、衄血；肝热目赤、头痛眩晕。

【用法用量】煎服，5～10 g。

【使用注意】脾胃虚寒及阴虚发热而无实火者慎用。

白茅根（《神农本草经》）

【性味归经】甘，寒。归肺、胃、膀胱经。

【功效】凉血止血，清热利尿。

【应用】血热吐衄、尿血、血淋；热病烦渴、肺热咳嗽；湿热黄疸、水肿尿少；热淋涩痛。

【用法用量】煎服，15～30 g。

【使用注意】脾胃虚寒、溲多不渴者忌用。

三七（《本草纲目》）

【性味归经】甘、微苦，温。归肝、胃经。

【功效】散瘀止血，消肿定痛。

【应用】咯血、吐血、衄血、便血、尿血、崩漏、外伤出血；跌打损伤、瘀血肿痛；胸腹刺痛。

【用法用量】煎服，3～9 g；研粉吞服，每次 1～3 g；外用适量。

【使用注意】孕妇慎用。

艾叶（《名医别录》）

【性味归经】辛、苦，温；有小毒。归肝、脾、肾经。

【功效】温经止血，散寒止痛；外用祛湿止痒。

【应用】虚寒性吐血、衄血、崩漏、月经过多；少腹冷痛、经寒不调、宫冷不孕；湿疹瘙痒（外用）；艾灸。

【用法用量】煎服，3～9 g；外用适量。

【使用注意】阴虚血热者慎用。

止血药鉴别：大蓟与小蓟均能凉血止血、散瘀消痈，大蓟兼能降压，小蓟兼能利尿通淋，善治尿血、血淋。地榆与槐花均善治下部出血，地榆兼能敛疮，槐花兼能清肝泻火。三七化瘀止血、活血定痛，止血而不留瘀，为伤科要药；艾叶温经止血、散寒止痛，为妇科虚寒出血常用之品。

第十九章 活血化瘀药

凡以通利血脉、促进血行、消散瘀血为主要作用的药物，称为活血化瘀药，又称活血祛瘀药。本类药物多味辛、苦，性温或平，主入肝、心经。适用于血行不畅、瘀血阻滞所致的经闭、痛经、产后瘀阻、癥瘕积聚、胸痹心痛、跌打损伤、痈肿疮疡及风湿痹痛等。

活血化瘀药按作用强弱分为活血行气药、活血调经药、活血疗伤药与破血消癥药。使用本类药物应注意：孕妇忌用或慎用；月经过多、出血倾向者慎用；气虚血瘀者宜配补气药；血瘀兼寒或兼热者应随证配伍温经或清热药。

川芎（《神农本草经》）

【性味归经】辛，温。归肝、胆、心包经。

【功效】活血行气，祛风止痛。

【应用】胸痹心痛、胸胁刺痛、跌扑肿痛、月经不调、经闭痛经、癥瘕腹痛；头痛、风湿痹痛。

【用法用量】煎服，3～10 g。

【使用注意】阴虚火旺、月经过多及出血性疾病者慎用；孕妇慎用。

延胡索（《本草拾遗》）

【性味归经】辛、苦，温。归肝、脾经。

【功效】活血，行气，止痛。

【应用】气血瘀滞之胸胁、脘腹疼痛，胸痹心痛，经闭痛经，产后瘀阻，跌扑肿痛。

【用法用量】煎服，3～10 g；研粉吞服，每次 1.5～3 g。

【使用注意】孕妇慎用。

郁金（《唐本草》）

【性味归经】辛、苦，寒。归肝、心、肺经。

【功效】活血止痛，行气解郁，清心凉血，利胆退黄。

【应用】气滞血瘀之胸胁刺痛、胸痹心痛、经闭痛经、乳房胀痛；热病神昏、癫痫发狂；血热吐衄、倒经；湿热黄疸、胆胀胁痛。

【用法用量】煎服，3～10 g。

【使用注意】不宜与丁香、母丁香同用。

丹参（《神农本草经》）

【性味归经】苦，微寒。归心、肝经。

【功效】活血祛瘀，通经止痛，清心除烦，凉血消痈。

【应用】月经不调、经闭痛经、产后瘀阻；胸痹心痛、脘腹胁痛、癥瘕积聚、热痹疼痛；心烦不眠；疮疡肿痛。

【用法用量】煎服，10～15 g。

【使用注意】不宜与藜芦同用；孕妇慎用。

红花（《本草图经》）

【性味归经】辛，温。归心、肝经。

【功效】活血通经，散瘀止痛。

【应用】经闭、痛经、产后瘀阻腹痛、恶露不行；癥瘕痞块、胸痹心痛、瘀滞腹痛、胸胁刺痛、跌扑损伤、疮疡肿痛；热郁血瘀之斑疹色暗。

【用法用量】煎服，3～10 g。

【使用注意】孕妇忌用；有出血倾向者慎用。

桃仁（《神农本草经》）

【性味归经】苦、甘，平。归心、肝、大肠经。

【功效】活血祛瘀，润肠通便，止咳平喘。

【应用】经闭痛经、产后瘀阻、癥瘕痞块、跌扑损伤；肺痈、肠痈；肠燥便秘；咳嗽气喘。

【用法用量】煎服，5～10 g。

【使用注意】孕妇忌用；便溏者慎用；不可过量（含苦杏仁苷）。

益母草（《神农本草经》）

【性味归经】苦、辛，微寒。归肝、心包、膀胱经。

【功效】活血调经，利尿消肿，清热解毒。

【应用】月经不调、经闭痛经、产后瘀阻、恶露不尽；水肿尿少、急性肾炎水肿；疮疡肿毒、皮肤瘙痒。

【用法用量】煎服，9～30 g；外用适量。

【使用注意】孕妇忌用；阴虚血少者忌用。

牛膝（《神农本草经》）

【性味归经】苦、甘、酸，平。归肝、肾经。

【功效】逐瘀通经，补肝肾，强筋骨，利尿通淋，引血下行。

【应用】经闭、痛经、胞衣不下、跌扑损伤；腰膝酸痛、筋骨无力；淋证、水肿、小便不利；头痛、眩晕、齿痛、口舌生疮、吐血、衄血。

【用法用量】煎服，5～12 g。

【使用注意】孕妇及月经过多者忌用。

莪术（《药性论》）

【性味归经】辛、苦，温。归肝、脾经。

【功效】行气破血，消积止痛。

【应用】癥瘕痞块、瘀血经闭、胸痹心痛、食积胀痛。

【用法用量】煎服，6～9 g。

【使用注意】孕妇禁用；月经过多者慎用。

活血化瘀药鉴别：川芎与延胡索均能活血行气止痛，川芎辛温香窜，善治头痛、风湿痹痛，为“血中之气药”；延胡索止痛力强，为“止痛之要药”。丹参活血凉血、清心除烦，善治心胸瘀滞；红花与桃仁常相须为用，红花长于通经、桃仁长于破瘀兼润肠。莪术破血消积力猛，用于癥瘕积聚。

第二十章 化痰止咳平喘药

凡以祛痰或消痰为主要作用，或能制止咳嗽、平息气喘的药物，称为化痰止咳平喘药。本类药物多入肺经，部分入脾经。适用于咳嗽、气喘、痰多等肺系病证。

本类药物按功效分为化痰药（温化寒痰、清化热痰）与止咳平喘药。使用时应辨明痰的寒热燥湿：寒痰宜温化，热痰宜清化，燥痰宜润，湿痰宜燥。咳嗽有外感、内伤之别，须结合病因配伍解表、补虚等药。部分化痰药有毒，用量宜慎；咳嗽兼咯血者，不宜用强烈温燥化痰药。

半夏（《神农本草经》）

【性味归经】辛，温；有毒。归脾、胃、肺经。

【功效】燥湿化痰，降逆止呕，消痞散结；外用消肿止痛。

【应用】湿痰寒痰、咳喘痰多；痰饮眩悸、风痰眩晕、痰厥头痛；呕吐反胃；胸脘痞闷、梅核气；瘿瘤痰核、痈疽肿毒（外用）。

【用法用量】内服一般制用，煎服 3～9 g；外用适量。

【使用注意】不宜与川乌、草乌、附子同用；阴虚燥咳、血证、热痰、燥痰者慎用；生半夏毒性大，内服须炮制。

天南星（《神农本草经》）

【性味归经】苦、辛，温；有毒。归肺、肝、脾经。

【功效】燥湿化痰，祛风止痉；外用散结消肿。

【应用】湿痰寒痰、顽痰咳嗽；风痰眩晕、中风痰壅、口眼㖞斜、半身不遂、癫痫、破伤风；痈肿、蛇虫咬伤（外用）。

【用法用量】内服制用，煎服 3～9 g；外用适量。

【使用注意】孕妇慎用；生品内服宜慎；阴虚燥痰者忌用。

芥子（《名医别录》）

【性味归经】辛，温。归肺经。

【功效】温肺豁痰利气，散结通络止痛。

【应用】寒痰咳嗽、胸胁胀痛；痰滞经络之关节疼痛、麻木；痰湿流注、阴疽肿毒。

【用法用量】煎服，3～9 g；外用适量。

【使用注意】肺虚咳嗽及阴虚火旺者忌用；外敷有发泡作用，皮肤过敏者慎用。

桔梗（《神农本草经》）

【性味归经】苦、辛，平。归肺经。

【功效】宣肺，利咽，祛痰，排脓。

【应用】咳嗽痰多、胸闷不畅；咽喉肿痛、失音；肺痈吐脓。

【用法用量】煎服，3～10 g。

【使用注意】气机上逆、呕吐、呛咳、眩晕、阴虚火旺咳血者不宜；胃溃疡者慎用；用量过大易致恶心呕吐。

川贝母（《神农本草经》）

【性味归经】苦、甘，微寒。归肺、心经。

【功效】清热润肺，化痰止咳，散结消痈。

【应用】肺热燥咳、干咳少痰、阴虚劳嗽、痰中带血；瘰疬、乳痈、肺痈。

【用法用量】煎服，3～10 g；研粉冲服，每次 1～2 g。

【使用注意】不宜与川乌、草乌、附子同用；脾胃虚寒及有湿痰者不宜。

浙贝母（《本草纲目拾遗》）

【性味归经】苦，寒。归肺、心经。

【功效】清热化痰止咳，解毒散结消痈。

【应用】风热咳嗽、痰火咳嗽；瘰疬、瘿瘤、乳痈疮毒、肺痈。

【用法用量】煎服，5～10 g。

【使用注意】不宜与川乌、草乌、附子同用；脾胃虚寒者慎用。

瓜蒌（《名医别录》）

【性味归经】甘、微苦，寒。归肺、胃、大肠经。

【功效】清热涤痰，宽胸散结，润燥滑肠。

【应用】肺热咳嗽、痰浊黄稠；胸痹心痛、结胸痞满；乳痈、肺痈、肠痈；肠燥便秘。

【用法用量】煎服，9～15 g。

【使用注意】不宜与川乌、草乌、附子同用；脾虚便溏及寒痰、湿痰者忌用。

苦杏仁（《神农本草经》）

【性味归经】苦，微温；有小毒。归肺、大肠经。

【功效】降气止咳平喘，润肠通便。

【应用】咳嗽气喘、胸满痰多；肠燥便秘。

【用法用量】煎服，5～10 g，生品入煎剂宜后下。

【使用注意】内服不宜过量，以免中毒；婴儿慎用；阴虚咳嗽及大便溏泄者忌用。

紫苏子（《本草经集注》）

【性味归经】辛，温。归肺经。

【功效】降气化痰，止咳平喘，润肠通便。

【应用】痰壅气逆、咳嗽气喘；肠燥便秘。

【用法用量】煎服，3～10 g。

【使用注意】阴虚喘咳及脾虚便溏者慎用。

葶苈子（《神农本草经》）

【性味归经】辛、苦，大寒。归肺、膀胱经。

【功效】泻肺平喘，行水消肿。

【应用】痰涎壅肺、喘咳痰多、胸胁胀满、不得平卧；水肿、小便不利、胸腹积水。

【用法用量】煎服，3～10 g，包煎。

【使用注意】肺虚喘咳、脾虚肿满者忌用。

化痰止咳平喘药鉴别：半夏与天南星均能燥湿化痰，半夏兼能降逆止呕、消痞散结，为治湿痰、呕吐之要药；天南星兼能祛风止痉，善治风痰、顽痰。川贝母与浙贝母均能清热化痰、散结，川贝母偏于润肺止咳，浙贝母偏于清火散结。桔梗宣肺利咽、引药上行，为“舟楫之剂”；瓜蒌清热化痰、宽胸散结、润肠，为治胸痹、结胸常用之品。

第二十一章 安神药

凡以安定神志为主要作用的药物，称为安神药。本类药物多入心、肝经。适用于心神不宁、心悸怔忡、失眠多梦、健忘、惊风、癫痫、狂躁等证。安神药分为重镇安神药（矿物、贝壳类，质重沉降）与养心安神药（植物类，滋养心肝）两类。

使用安神药应注意：重镇安神药多属矿石类，易伤胃气，脾胃虚弱者慎用，且不宜久服；部分药物有毒（如朱砂），须严格掌握剂量；失眠多因情志所伤，应配合心理调摄；实热、痰火扰心者当以清热化痰为主。

朱砂（《神农本草经》）

【性味归经】甘，微寒；有毒。归心经。

【功效】清心镇惊，安神，明目，解毒。

【应用】心神不宁、心悸易惊、失眠多梦、癫痫发狂；小儿惊风；视物昏花；口疮、喉痹、疮疡肿毒（外用）。

【用法用量】内服只宜入丸散，每次 0.1～0.5 g，不宜入煎剂；外用适量。

【使用注意】有毒，不宜大量服用，也不宜少量久服；孕妇及肝肾功能不全者禁用。

磁石（《神农本草经》）

【性味归经】咸，寒。归肝、心、肾经。

【功效】镇惊安神，平肝潜阳，聪耳明目，纳气平喘。

【应用】心神不宁、惊悸失眠、癫痫；肝阳上亢之头晕目眩；耳鸣耳聋、视物昏花；肾虚气喘。

【用法用量】煎服，9～30 g，先煎。

【使用注意】脾胃虚弱者慎用。

酸枣仁（《神农本草经》）

【性味归经】甘、酸，平。归肝、胆、心经。

【功效】养心补肝，宁心安神，敛汗，生津。

【应用】虚烦不眠、惊悸多梦；体虚多汗；津伤口渴。

【用法用量】煎服，10～15 g。

【使用注意】内有实邪郁火者慎服。

柏子仁（《神农本草经》）

【性味归经】甘，平。归心、肾、大肠经。

【功效】养心安神，润肠通便，止汗。

【应用】阴血不足、虚烦失眠、心悸怔忡；肠燥便秘；阴虚盗汗。

【用法用量】煎服，3～10 g。

【使用注意】便溏及多痰者慎用。

远志（《神农本草经》）

【性味归经】苦、辛，温。归心、肾、肺经。

【功效】安神益智，交通心肾，祛痰，消肿。

【应用】心肾不交之失眠多梦、健忘惊悸；痰阻心窍之癫痫抽搐、惊风发狂；咳痰不爽；疮疡肿毒、乳房肿痛。

【用法用量】煎服，3～10 g。

【使用注意】胃溃疡及胃炎者慎用；用量不宜过大。

安神药鉴别：朱砂与磁石均为重镇安神之品，朱砂清心镇惊、有毒不宜久服，磁石兼能平肝潜阳、聪耳明目、纳气平喘。酸枣仁与柏子仁均能养心安神，酸枣仁兼能敛汗、生津，柏子仁兼能润肠通便。远志安神益智、祛痰开窍，善治心肾不交、痰阻心窍。

第二十二章 平肝息风药

凡以平肝潜阳、息风止痉为主要作用的药物，称为平肝息风药。本类药物多入肝经。适用于肝阳上亢之头晕目眩、头痛、耳鸣，以及肝风内动之痉挛抽搐、癫痫、破伤风、中风等证。本类药物分为平抑肝阳药与息风止痉药两类。

使用平肝息风药应辨别肝阳上亢与肝风内动的标本缓急：肝阳上亢者宜平肝潜阳，肝风内动者宜息风止痉；阴虚阳亢者应配伍滋阴药；脾虚慢惊者不宜用寒凉之品。部分药物有毒（如全蝎），用量宜慎。

石决明（《名医别录》）

【性味归经】咸，寒。归肝经。

【功效】平肝潜阳，清肝明目。

【应用】肝阳上亢之头痛眩晕；目赤翳障、视物昏花、青盲雀目。

【用法用量】煎服，6～20 g，先煎。

【使用注意】脾胃虚寒者慎用。

牡蛎（《神农本草经》）

【性味归经】咸，微寒。归肝、胆、肾经。

【功效】潜阳补阴，重镇安神，软坚散结，收敛固涩，制酸止痛。

【应用】肝阳上亢之眩晕耳鸣；惊悸失眠；瘰疬痰核、癥瘕痞块；自汗盗汗、遗精滑精、崩漏带下；胃痛泛酸。

【用法用量】煎服，9～30 g，先煎。

【使用注意】不宜多服久服，以免碍胃。

代赭石（《神农本草经》）

【性味归经】苦，寒。归肝、心、肺、胃经。

【功效】平肝潜阳，重镇降逆，凉血止血。

【应用】肝阳上亢之头晕目眩；呕吐、呃逆、噫气；气逆喘息；血热吐衄、崩漏。

【用法用量】煎服，9～30 g，先煎。

【使用注意】孕妇慎用；含微量砷，不宜长期服用。

羚羊角（《神农本草经》）

【性味归经】咸，寒。归肝、心经。

【功效】平肝息风，清肝明目，散血解毒。

【应用】肝风内动、惊痫抽搐；肝阳上亢之头晕目眩；肝火炽盛之目赤头痛；温热病壮热神昏、热毒发斑。

【用法用量】煎服，1～3 g，宜另煎 2 小时以上取汁服；也可锉末冲服，每次 0.3～0.6 g。

【使用注意】脾胃虚寒者慎用。

牛黄（《神农本草经》）

【性味归经】甘，凉。归心、肝经。

【功效】清心豁痰，开窍醒神，凉肝息风，清热解毒。

【应用】热病神昏、中风痰迷、惊痫抽搐、癫痫发狂；咽喉肿痛、口舌生疮、痈肿疔疮（外用）。

【用法用量】内服入丸散，每次 0.15～0.35 g；外用适量。

【使用注意】孕妇慎用。

钩藤（《名医别录》）

【性味归经】甘，凉。归肝、心包经。

【功效】息风定惊，清热平肝。

【应用】肝风内动之惊痫抽搐；肝阳上亢之头痛眩晕；小儿惊风。

【用法用量】煎服，3～12 g，后下。

【使用注意】脾胃虚寒者慎用。

天麻（《雷公炮炙论》）

【性味归经】甘，平。归肝经。

【功效】息风止痉，平抑肝阳，祛风通络。

【应用】小儿惊风、癫痫抽搐、破伤风；肝阳上亢之头痛眩晕；中风手足不遂、风湿痹痛。

【用法用量】煎服，3～10 g；研粉吞服，每次 1～1.5 g。

【使用注意】津液衰少、血虚、阴虚者慎用。

全蝎（《蜀本草》）

【性味归经】辛，平；有毒。归肝经。

【功效】息风镇痉，通络止痛，攻毒散结。

【应用】肝风内动之痉挛抽搐、小儿惊风、癫痫、破伤风；风湿顽痹、偏正头痛；疮疡、瘰疬、蛇虫咬伤。

【用法用量】煎服，3～6 g；外用适量。

【使用注意】有毒，用量不宜过大；孕妇禁用；血虚生风者慎用。

平肝息风药鉴别：石决明与牡蛎均能平肝潜阳，石决明兼能清肝明目，牡蛎兼能软坚散结、收敛固涩。羚羊角与钩藤均能息风止痉、清热，羚羊角清肝力强、兼能解毒，钩藤兼能清热平肝、后下为宜。天麻甘平，息风止痉、平抑肝阳，为治眩晕之要药，且兼能祛风通络；全蝎、蜈蚣搜风通络、攻毒散结，善治顽固性抽搐、顽痹。

第二十三章 开窍药

凡以开窍醒神为主要作用的药物，称为开窍药，又称芳香开窍药。本类药物多味辛，性温或凉，气味芳香，主入心经。适用于热陷心包或痰蒙心窍所致的神昏谵语、中风痰厥、气郁暴厥、中恶昏迷及惊痫等闭证。

开窍药只适用于闭证，脱证（大汗淋漓、肢冷脉微）忌用；本类药物辛香走窜，易耗气伤阴，不宜久服；孕妇慎用或禁用；多入丸散，不入煎剂或不宜久煎。临床应辨明闭证的寒热属性：热闭宜凉开（如牛黄、冰片），寒闭宜温开（如麝香、苏合香）。

麝香（《神农本草经》）

【性味归经】辛，温。归心、脾经。

【功效】开窍醒神，活血通经，消肿止痛。

【应用】热病神昏、中风痰厥、气郁暴厥、中恶昏迷；经闭、癥瘕、难产死胎、胸痹心痛、心腹暴痛、跌扑伤痛、痹痛麻木；痈肿瘰疬、咽喉肿痛。

【用法用量】内服入丸散，每次 0.03～0.1 g；外用适量。

【使用注意】孕妇禁用；不入煎剂。

冰片（《新修本草》）

【性味归经】辛、苦，微寒。归心、脾、肺经。

【功效】开窍醒神，清热止痛。

【应用】热病神昏、惊厥、中风痰厥、气郁暴厥、中恶昏迷；胸痹心痛；目赤肿痛、口舌生疮、咽喉肿痛（外用）。

【用法用量】内服入丸散，每次 0.15～0.3 g；外用适量。

【使用注意】孕妇慎用；不入煎剂。

石菖蒲（《神农本草经》）

【性味归经】辛、苦，温。归心、胃经。

【功效】开窍豁痰，醒神益智，化湿开胃。

【应用】痰蒙清窍之神昏癫痫；健忘失眠、耳鸣耳聋；湿阻中焦、脘痞不饥、噤口下痢。

【用法用量】煎服，3～10 g。

【使用注意】阴虚阳亢、烦躁汗多、咳嗽吐血、精滑者慎用。

开窍药鉴别：麝香辛温走窜，开窍醒神力最强，为温开之要药，兼能活血通经、消肿止痛；冰片微寒，开窍醒神、清热止痛，为凉开之品，善治热闭及五官科热证；石菖蒲开窍豁痰、醒神益智，兼能化湿和胃，善治痰蒙清窍、健忘耳鸣。

第二十四章 补虚药

凡以补益人体气血阴阳之不足、增强体质、提高抗病能力为主要作用的药物，称为补虚药，又称补益药。本类药物适用于气虚、血虚、阴虚、阳虚诸证，按功效分为补气药、补血药、补阴药、补阳药四类。

补虚药的应用原则是“虚则补之”，但须辨明虚证的性质与脏腑归属，不可滥补：邪气未解者不宜过早补益，以免“闭门留寇”；虚不受补者宜先调理脾胃；补气与补血、补阴与补阳常相互为用。补虚药多滋腻，脾虚湿盛者慎用，宜配伍理气健脾之品。

一、补气药

人参（《神农本草经》）

【性味归经】甘、微苦，微温。归脾、肺、心、肾经。

【功效】大补元气，复脉固脱，补脾益肺，生津养血，安神益智。

【应用】体虚欲脱、肢冷脉微；脾虚食少、肺虚喘咳；津伤口渴、内热消渴；气血亏虚、久病虚羸、惊悸失眠、阳痿宫冷。

【用法用量】煎服，3～9 g，宜文火另煎兑服；研粉吞服，每次 2 g。

【使用注意】不宜与藜芦、五灵脂同用；实热、湿热及正气不虚者忌用。

党参（《本草从新》）

【性味归经】甘，平。归脾、肺经。

【功效】健脾益肺，养血生津。

【应用】脾胃虚弱、食少倦怠、气血两虚、面色萎黄、心悸气短；肺气亏虚、咳嗽虚喘；津伤口渴、内热消渴。

【用法用量】煎服，9～30 g。

【使用注意】不宜与藜芦同用；实热证不宜。

黄芪（《神农本草经》）

【性味归经】甘，微温。归肺、脾经。

【功效】补气升阳，固表止汗，利水消肿，生津养血，行滞通痹，托毒排脓，敛疮生肌。

【应用】气虚乏力、食少便溏、中气下陷、久泻脱肛、便血崩漏；表虚自汗；气虚水肿；内热消渴；血虚萎黄；半身不遂、痹痛麻木；痈疽难溃、久溃不敛。

【用法用量】煎服，9～30 g。

【使用注意】表实邪盛、气滞湿阻、食积内停、阴虚阳亢、疮疡初起或溃后热毒尚盛者均不宜用。

白术（《神农本草经》）

【性味归经】苦、甘，温。归脾、胃经。

【功效】健脾益气，燥湿利水，止汗，安胎。

【应用】脾虚食少、腹胀泄泻、痰饮眩悸、水肿、自汗、胎动不安。

【用法用量】煎服，6～12 g。

【使用注意】阴虚燥渴、气滞胀闷者忌用。

甘草（《神农本草经》）

【性味归经】甘，平。归心、肺、脾、胃经。

【功效】补脾益气，清热解毒，祛痰止咳，缓急止痛，调和诸药。

【应用】脾胃虚弱、倦怠乏力、心悸气短；热毒疮疡、咽喉肿痛、药食中毒；咳嗽痰多；脘腹及四肢挛急疼痛；调和药性。

【用法用量】煎服，2～10 g。

【使用注意】不宜与海藻、京大戟、甘遂、芫花同用；湿盛胀满、水肿者不宜；大量久服可致水钠潴留、血压升高等。

补气药鉴别：人参大补元气、复脉固脱，为治元气虚脱之要药；党参性平力缓，功似人参而力弱，为脾肺气虚常用之品；黄芪补气升阳、固表止汗、利水消肿，善治中气下陷、表虚自汗；白术健脾燥湿、安胎；甘草补脾益气、调和诸药，为“国老”。

二、补血药

当归（《神农本草经》）

【性味归经】甘、辛，温。归肝、心、脾经。

【功效】补血活血，调经止痛，润肠通便。

【应用】血虚萎黄、眩晕心悸、月经不调、经闭痛经、虚寒腹痛；风湿痹痛、跌扑损伤、痈疽疮疡；肠燥便秘。

【用法用量】煎服，6～12 g。

【使用注意】湿盛中满、大便溏泻者忌用。

熟地黄（《本草图经》）

【性味归经】甘，微温。归肝、肾经。

【功效】补血滋阴，益精填髓。

【应用】血虚萎黄、心悸怔忡、月经不调、崩漏下血；肝肾阴虚、腰膝酸软、盗汗遗精、内热消渴、眩晕耳鸣、须发早白。

【用法用量】煎服，9～15 g。

【使用注意】黏腻碍胃，脾虚痰多、腹满便溏者慎用。

白芍（《神农本草经》）

【性味归经】苦、酸，微寒。归肝、脾经。

【功效】养血调经，敛阴止汗，柔肝止痛，平抑肝阳。

【应用】血虚萎黄、月经不调、崩漏；自汗盗汗；胁痛、腹痛、四肢挛痛；头痛眩晕。

【用法用量】煎服，6～15 g。

【使用注意】不宜与藜芦同用；虚寒腹痛泄泻者慎用。

阿胶（《神农本草经》）

【性味归经】甘，平。归肺、肝、肾经。

【功效】补血滋阴，润燥，止血。

【应用】血虚萎黄、眩晕心悸、肌瘘无力；阴虚燥咳、劳嗽咯血；吐血尿血、便血崩漏、妊娠胎漏。

【用法用量】烊化兑服，3～9 g。

【使用注意】黏腻碍胃，脾胃虚弱者慎用。

补血药鉴别：当归补血活血、调经止痛，为“妇科调经要药”，兼能润肠；熟地黄补血滋阴、益精填髓，为“补血之要药”，但滋腻碍胃；白芍养血敛阴、柔肝止痛，兼能平抑肝阳；阿胶补血滋阴、润燥止血，为胶类补血之佳品，须烊化。

三、补阳药

鹿茸（《神农本草经》）

【性味归经】甘、咸，温。归肾、肝经。

【功效】壮肾阳，益精血，强筋骨，调冲任，托疮毒。

【应用】肾阳不足、精血亏虚之阳痿滑精、宫冷不孕、羸瘦、神疲、畏寒、眩晕、耳鸣耳聋、腰脊冷痛；筋骨痿软；崩漏带下；阴疽不敛。

【用法用量】研末冲服，1～2 g。

【使用注意】服用宜从小量开始，缓缓增加；阴虚阳亢、血分有热、胃火炽盛、肺有痰热及外感热病者忌用。

淫羊藿（《神农本草经》）

【性味归经】辛、甘，温。归肝、肾经。

【功效】补肾阳，强筋骨，祛风湿。

【应用】肾阳虚之阳痿遗精、筋骨痿软；风寒湿痹、麻木拘挛；更年期高血压。

【用法用量】煎服，6～10 g。

【使用注意】阴虚火旺者忌用。

杜仲（《神农本草经》）

【性味归经】甘，温。归肝、肾经。

【功效】补肝肾，强筋骨，安胎。

【应用】肝肾不足之腰膝酸痛、筋骨无力、头晕目眩；肾虚阳痿、尿频；妊娠漏血、胎动不安；高血压。

【用法用量】煎服，6～10 g。

【使用注意】阴虚火旺者慎用。

枸杞子（《神农本草经》）

【性味归经】甘，平。归肝、肾经。

【功效】滋补肝肾，益精明目。

【应用】肝肾阴虚之腰膝酸软、阳痿遗精、虚劳精亏、眩晕耳鸣、目昏不明、内热消渴、血虚萎黄。

【用法用量】煎服，6～12 g。

【使用注意】外邪实热、脾虚有湿及泄泻者忌用。

补阳药鉴别：鹿茸为血肉有情之品，壮肾阳、益精血、强筋骨，力峻而贵；淫羊藿补肾阳、强筋骨、祛风湿，善治阳虚痹痛；杜仲补肝肾、强筋骨、安胎，善治腰痛、胎动；枸杞子滋补肝肾、益精明目，为平补肝肾之良药。

四、补阴药

麦冬（《神农本草经》）

【性味归经】甘、微苦，微寒。归心、肺、胃经。

【功效】养阴生津，润肺清心。

【应用】肺燥干咳、阴虚劳嗽、喉痹咽痛；胃阴不足之口渴咽干、大便干结；心阴不足之心悸失眠、内热消渴。

【用法用量】煎服，6～12 g。

【使用注意】脾胃虚寒泄泻、胃有痰饮湿浊及风寒咳嗽者忌用。

石斛（《神农本草经》）

【性味归经】甘，微寒。归胃、肾经。

【功效】益胃生津，滋阴清热。

【应用】热病津伤、口干烦渴、胃阴不足、食少干呕、病后虚热不退；肾阴亏虚、目暗不明、筋骨痿软；阴虚火旺、骨蒸劳热。

【用法用量】煎服，6～12 g，鲜品 15～30 g。

【使用注意】温热病早期阴未伤者、湿温病未化燥者、脾胃虚寒者忌用。

鳖甲（《神农本草经》）

【性味归经】咸，微寒。归肝、肾经。

【功效】滋阴潜阳，退热除蒸，软坚散结。

【应用】阴虚发热、骨蒸劳热、阴虚阳亢之头晕目眩、虚风内动；癥瘕经闭、久疟疟母。

【用法用量】煎服，9～24 g，先煎。

【使用注意】脾胃虚寒者忌用；孕妇慎用。

补阴药鉴别：麦冬养阴生津、润肺清心，善治肺胃阴虚；石斛益胃生津、滋阴清热，善治胃阴不足、口干烦渴；鳖甲滋阴潜阳、软坚散结，善治阴虚发热、癥瘕疟母，且须先煎。

> 补虚药小结：补气药以人参、黄芪为代表，补血药以当归、熟地黄为代表，补阳药以鹿茸、淫羊藿为代表，补阴药以麦冬、石斛、鳖甲为代表。补虚须辨气血阴阳，忌盲目进补。

第二十五章 收涩药

凡以收敛固涩为主要作用的药物，称为收涩药，又称固涩药。本类药物多味酸、涩，性温或平，主入肺、脾、肾、大肠经。适用于久病体虚、正气不固所致的自汗盗汗、久咳虚喘、久泻久痢、遗精滑精、遗尿尿频、崩漏带下等滑脱证。

收涩药只能治标，不能治本，临床应用须与补益药配伍，标本兼顾。凡外邪未解、湿热未清者不宜使用，以免“闭门留寇”。

五味子（《神农本草经》）

【性味归经】酸、甘，温。归肺、心、肾经。

【功效】收敛固涩，益气生津，补肾宁心。

【应用】久咳虚喘；自汗盗汗；遗精滑精、久泻不止；津伤口渴、内热消渴；心悸失眠、多梦。

【用法用量】煎服，2～6 g。

【使用注意】凡表邪未解、内有实热、咳嗽初起、麻疹初期者均不宜用。

乌梅（《神农本草经》）

【性味归经】酸、涩，平。归肝、脾、肺、大肠经。

【功效】敛肺止咳，涩肠止泻，生津止渴，安蛔止痛。

【应用】肺虚久咳；久泻久痢；虚热消渴；蛔厥腹痛、呕吐。

【用法用量】煎服，6～12 g。

【使用注意】外有表邪、内有实热积滞者不宜。

肉豆蔻（《药性论》）

【性味归经】辛，温。归脾、胃、大肠经。

【功效】温中行气，涩肠止泻。

【应用】脾胃虚寒之泄泻不止、脘腹胀痛、食少呕吐；久泻久痢。

【用法用量】煎服，3～10 g；入丸散，每次 1.5～3 g；内服须煨制去油。

【使用注意】湿热泻痢者忌用。

山茱萸（《神农本草经》）

【性味归经】酸、涩，微温。归肝、肾经。

【功效】补益肝肾，收涩固脱。

【应用】肝肾亏虚之眩晕耳鸣、腰膝酸痛、阳痿遗精；遗尿尿频；崩漏带下；大汗虚脱、元气欲脱。

【用法用量】煎服，6～12 g；急救固脱可用 20～30 g。

【使用注意】命门火炽、素有湿热、小便淋涩者不宜。

莲子（《本草经集注》）

【性味归经】甘、涩，平。归脾、肾、心经。

【功效】补脾止泻，止带，益肾涩精，养心安神。

【应用】脾虚久泻、纳呆腹胀；肾虚遗精、滑精、带下；心肾不交之虚烦失眠、心悸。

【用法用量】煎服，6～15 g，去心用。

【使用注意】大便燥结者慎用。

桑螵蛸（《神农本草经》）

【性味归经】甘、咸，平。归肝、肾经。

【功效】固精缩尿，补肾助阳。

【应用】肾虚遗精滑精、遗尿尿频、小便白浊；肾虚阳痿。

【用法用量】煎服，5～10 g。

【使用注意】阴虚火旺或膀胱湿热所致的遗精、尿频者忌用。

收涩药鉴别：五味子与乌梅均能敛肺涩肠、生津，五味子兼能补肾宁心，乌梅兼能安蛔；山茱萸补益肝肾、收涩固脱，为治大汗虚脱之要药；莲子补脾止泻、益肾涩精、养心，为平补之品；桑螵蛸固精缩尿、补肾助阳，善治小儿遗尿、肾虚尿频。

第二十六章 涌吐药

凡以促使呕吐为主要作用的药物，称为涌吐药，又称催吐药。适用于误食毒物尚在胃中、宿食停滞胃脘、痰涎壅盛阻塞气道及癫痫发狂等需吐出者。

涌吐药作用峻猛而有毒，现代临床已少用。使用时须注意：只适用于体质壮实、邪在上焦者；老人、小儿、孕妇、体虚者及高血压、心脏病患者忌用；服药后应观察呕吐情况，吐后宜调养脾胃；中病即止，不可过服。

常山（《神农本草经》）

【性味归经】苦、辛，寒；有毒。归肺、肝、心经。

【功效】涌吐痰涎，截疟。

【应用】痰饮停聚、胸膈痞塞、欲吐不能者；疟疾。

【用法用量】煎服，5～10 g；涌吐宜生用，截疟宜酒制用。

【使用注意】有毒，用量不宜过大；孕妇及体虚者忌用。

瓜蒂（《神农本草经》）

【性味归经】苦，寒；有毒。归胃经。

【功效】涌吐痰食，祛湿退黄。

【应用】痰涎壅盛、宿食停滞胃脘；湿热黄疸（研末吹鼻）。

【用法用量】煎服，2.5～5 g；入丸散，每次 0.3～1 g；外用适量。

【使用注意】有毒，体虚、失血及上部无实邪者忌用；孕妇忌用。

涌吐药鉴别：常山善涌吐痰涎，又能截疟，为治疟疾之要药；瓜蒂涌吐痰食，兼能祛湿退黄，可研末吹鼻治黄疸。

第二十七章 攻毒杀虫止痒药

凡以攻毒疗疮、杀虫止痒为主要作用的药物，称为攻毒杀虫止痒药。本类药物多有毒，以外用为主，部分可内服。适用于痈肿疔疮、疥癣、湿疹瘙痒、蛇虫咬伤及虫积腹痛等。

本类药物毒性较大，使用时应严格掌握剂量与用法：外用适量，不可大面积、长期使用；内服多入丸散，须控制剂量；孕妇禁用或慎用；用药期间注意观察，防止中毒。

雄黄（《神农本草经》）

【性味归经】辛，温；有毒。归肝、大肠经。

【功效】解毒杀虫，燥湿祛痰，截疟。

【应用】痈肿疔疮、蛇虫咬伤、虫积腹痛；惊痫、疟疾。

【用法用量】外用适量，研末撒敷或调敷；内服入丸散，每次 0.05～0.1 g。

【使用注意】有毒，内服宜慎，不可久用；孕妇禁用；切忌火煅；外用不宜大面积涂擦及长期使用。

硫黄（《神农本草经》）

【性味归经】酸，温；有毒。归肾、大肠经。

【功效】外用解毒杀虫疗疮；内服补火助阳通便。

【应用】疥癣、秃疮、阴疽恶疮（外用）；阳痿足冷、虚喘冷哮、虚寒便秘（内服）。

【用法用量】外用适量，研末油调涂敷；内服炮制后入丸散，1.5～3 g。

【使用注意】孕妇慎用；不宜与芒硝、玄明粉同用。

白矾（《神农本草经》）

【性味归经】酸、涩，寒。归肺、脾、肝、大肠经。

【功效】外用解毒杀虫，燥湿止痒；内服止血止泻，祛除风痰。

【应用】湿疹瘙痒、疥癣、脱肛、痔疮（外用）；久泻不止、便血、崩漏；癫痫发狂。

【用法用量】内服 0.6～1.5 g，入丸散；外用适量。

【使用注意】阴虚胃弱、无湿热者忌用；内服过量可致呕吐、腹泻。

蛇床子（《神农本草经》）

【性味归经】辛、苦，温；有小毒。归肾经。

【功效】燥湿祛风，杀虫止痒，温肾壮阳。

【应用】阴部湿痒、湿疹、疥癣（外用）；寒湿带下、湿痹腰痛；肾虚阳痿、宫冷不孕。

【用法用量】外用适量，煎汤熏洗或研末调敷；内服 3～10 g。

【使用注意】阴虚火旺或下焦有湿热者不宜内服。

攻毒杀虫止痒药鉴别：雄黄与硫黄均能杀虫止痒，雄黄善治疔疮、蛇伤，切忌火煅；硫黄善治疥癣，内服能补火助阳通便。白矾外用燥湿止痒、内服止血止泻；蛇床子善治阴部湿痒，兼能温肾壮阳。

第二十八章 拔毒化腐生肌药

凡以拔毒化腐、生肌敛疮为主要作用的药物，称为拔毒化腐生肌药。本类药物多有毒，以外用为主。适用于痈疽疮疡溃后脓出不畅、腐肉不去、新肉难生及疮口不敛等。

本类药物多含重金属或砷化物，毒性大，一般不作内服，外用亦应严格控制剂量与面积，孕妇忌用或慎用。

升药（《外科大成》）

【性味归经】辛，热；有大毒。归肺、脾经。

【功效】拔毒，去腐，生肌。

【应用】痈疽溃后、脓出不畅、腐肉不去、新肉难生（外用）。

【用法用量】外用适量，研末撒敷或调敷，不宜大面积长期使用。

【使用注意】有大毒，不可内服；孕妇及体弱者忌用。

轻粉（《本草拾遗》）

【性味归经】辛，寒；有大毒。归大肠、小肠经。

【功效】外用杀虫攻毒，敛疮；内服祛痰消积，逐水通便。

【应用】疥癣、梅毒、疮疡溃烂（外用）；痰涎积滞、水肿鼓胀、二便不利（内服）。

【用法用量】外用适量，研末撒敷或调敷；内服入丸散，每次 0.1～0.2 g。

【使用注意】有毒，不可过量或久服；孕妇禁用。

炉甘石（《本草纲目》）

【性味归经】甘，平。归肝、脾经。

【功效】解毒明目退翳，收湿止痒敛疮。

【应用】目赤肿痛、眼缘赤烂、翳膜胬肉（外用点眼）；溃疡不敛、脓水淋漓、湿疮、皮肤瘙痒（外用）。

【用法用量】外用适量，研末撒布或调敷；水飞点眼。

【使用注意】不作内服。

拔毒化腐生肌药鉴别：升药拔毒去腐力强，专用于痈疽溃后脓腐不去，只可外用；轻粉外用杀虫攻毒敛疮，内服祛痰逐水；炉甘石收湿止痒敛疮、退翳明目，为眼科、皮肤科外用常用药。

附录 经典歌诀与药物鉴别

一、十八反歌诀

本草明言十八反，半蒌贝蔹及攻乌，

藻戟遂芫俱战草，诸参辛芍叛藜芦。

二、十九畏歌诀

硫黄原是火中精，朴硝一见便相争；

水银莫与砒霜见，狼毒最怕密陀僧；

巴豆性烈最为上，偏与牵牛不顺情；

丁香莫与郁金见，牙硝难合京三棱；

川乌草乌不顺犀，人参最怕五灵脂；

官桂善能调冷气，若逢石脂便相欺。

三、妊娠禁忌歌诀（《珍珠囊补遗药性赋》）

蚖斑水蛭及虻虫，乌头附子配天雄，

野葛水银并巴豆，牛膝薏苡与蜈蚣，

三棱芫花代赭麝，大戟蝉蜕黄雌雄，

牙硝芒硝牡丹桂，槐花牵牛皂角同，

半夏南星与通草，瞿麦干姜桃仁通，

硇砂干漆蟹爪甲，地胆茅根都失中。

四、六陈歌

枳壳陈皮半夏齐，麻黄狼毒及茱萸，

六般之药宜陈久，入药方知奏效奇。

五、常用相似药物鉴别表

药物	共同点	不同点
麻黄—桂枝	发汗解表	麻黄发汗力强、宣肺平喘、利水消肿，主治风寒表实证；桂枝发汗力缓、温通经脉、助阳化气，表实表虚皆宜
荆芥—防风	祛风解表	荆芥长于透疹、止血，风寒风热皆可；防风长于胜湿止痛、止痉
桑叶—菊花	疏散风热、平肝明目	桑叶长于清肺润燥；菊花长于平肝明目、清热解毒
黄芩—黄连—黄柏	清热燥湿、泻火解毒	黄芩善清肺热、安胎；黄连善清心胃火、治湿热泻痢；黄柏善清下焦湿热、退虚热
生地黄—玄参	清热凉血、养阴	生地黄凉血力强、兼止血；玄参长于解毒散结、利咽
大黄—芒硝	泻下攻积	大黄苦寒，泻下力强，兼逐瘀、退黄；芒硝咸寒，软坚泻下，为治燥屎坚结要药
茯苓—猪苓—泽泻	利水渗湿	茯苓兼健脾、宁心；猪苓利水强而无补；泽泻兼泄热、化浊降脂
附子—干姜	回阳救逆	附子大热，回阳力强，兼补火助阳、散寒止痛；干姜温中散寒、温肺化饮
陈皮—青皮	理气	陈皮性缓，理气健脾、燥湿化痰；青皮性烈，疏肝破气、消积化滞
山楂—麦芽—神曲	消食	山楂消肉食、兼散瘀；麦芽消米面食、兼回乳；神曲消谷食、兼和中
三七—艾叶	止血	三七散瘀止血、消肿定痛，止血不留瘀；艾叶温经止血、散寒止痛，用于虚寒出血
川芎—延胡索	活血行气止痛	川芎辛温香窜、上行头目，为血中气药；延胡索止痛力强，为止痛要药

药物	共同点	不同点
川贝母—浙贝母	清热化痰、散结	川贝母偏润肺止咳，治虚劳燥咳；浙贝母偏清火散结，治风热痰火、瘰疬
酸枣仁—柏子仁	养心安神	酸枣仁兼敛汗、生津；柏子仁兼润肠通便
人参—党参—黄芪	补气	人参大补元气、复脉固脱；党参性平力缓，补脾肺气；黄芪补气升阳、固表利水
当归—熟地黄	补血	当归补血活血、调经止痛、润肠；熟地黄补血滋阴、益精填髓，滋腻碍胃
麦冬—石斛	养阴生津	麦冬润肺清心，善治肺胃阴虚；石斛益胃生津、滋阴清热，善治胃阴不足

说明：本资料为学习参考，药物的具体用量、用法及禁忌以现行《中国药典》、规划教材及临床规范为准；处方用药须在医师指导下进行。