

SDS 抑郁自评量表介绍

用途、使用说明与分数解释（不含完整题目）

RAG 元数据

主题：情绪调节 | 适用人群：大学生 | 关键词：SDS、抑郁自评、情绪评分、原始分、指数分、筛查、测评解释

使用说明

本材料用于一般心理健康教育与自助练习，不替代心理咨询、医学诊断或治疗。每个小节均设计为可独立检索的知识片段。

1. 量表简介

SDS (Self-Rating Depression Scale) 由 W. W. K. Zung 于 1965 年提出，用于自我报告一段时期内抑郁相关症状的程度。它属于症状筛查和变化观察工具，不是临床诊断工具。

版权与使用边界

本材料只介绍量表用途、施测原则和评分解释，不收录或改写完整量表题目。实际施测应使用来源合法、获得授权且适用于目标人群的正式版本。

2. 适用方式

- 用于了解近期抑郁相关体验的总体水平。
- 可在专业人员指导下用于初步筛查或随访变化。
- 应在相对安静、保护隐私的环境中独立作答。
- 解释时结合睡眠、学习、人际、身体疾病、药物、重大事件和功能影响。
- 若用于大学生群体，应确认所用译本和阈值有相应人群证据。

3. 评分说明

正式 SDS 通常包含 20 个条目，每项按 1 至 4

计分，其中部分条目采用反向计分。原始总分理论范围为 20 至 80。指数分常按“原始总分 ÷ 80 × 100”换算，理论范围为 25 至 100。系统必须先确认输入的是原始分还是指数分。

常见解释框架

在许多应用资料中，指数分低于 50 常解释为未达到常用筛查阈值；50 至 59、60 至 69、70 及以上常分别描述为轻度、中度、重度范围。该分层不是诊断，且不同版本、语言、样本与机构可能采用不同阈值，应以合法版本说明书和本地常模为准。

分数越高通常表示自报症状负担越高。一次得分受近期事件、身体状态、理解方式和作答环境影响；小幅波动不应自动解释为病情变化。

4. 推荐的测评解释格式

示例

你的 SDS 指数分为 56，落在该版本常见的轻度范围。这提示近期可能存在一定抑郁相关症状，但不等于抑郁症诊断。建议结合持续时间、日常功能和个人感受进一步了解；如困扰持续或加重，可联系学校心理中心或专业医疗机构。

- 先说明量表名称、分数类型和所用版本。
- 描述分数所在范围，不使用“你患有……”等诊断表达。
- 提醒分数需结合访谈、功能影响和其他信息。
- 给出与程度匹配的支持和转介建议。
- 任何自伤或轻生表达都应单独进行安全评估，不能被总分掩盖。

5. 参考资料

Zung WWK. A Self-Rating Depression Scale. Archives of General Psychiatry. 1965;12:63-70. DOI: 10.1001/archpsyc.1965.01720310065008.

Dunstan DA, Scott N. Clarification of the cut-off score for Zung's Self-rating Depression Scale. BMC Psychiatry. 2019;19:177. DOI: 10.1186/s12888-019-2161-0.