

Задача 5.5

Условие:

Вывод методов Адамса-Башфорта основан на аппроксимации интеграла:

$$\int_{t_i}^{t_{i+1}} f(t, y(t)) dt$$

квадратурой, полученной путем аппроксимации $f(t, y(t))$ интерполянт Лагранжа:

$$f(t, y(t)) = L_{p-1}(t) + \frac{f^{(p)}(\xi_i, y(\xi_i))}{p!} \prod_{i=1}^p (t - t_{i-j+1}),$$

где $t_{i+1-p}, t_{i+2-p}, \dots, t_{i-1}, t_i$ являются равномерно распределенными узлами с шагом h . Требуется доказать, что соответствующая квадратура с остаточным членом имеет вид:

$$\int_{t_i}^{t_{i+1}} f(t, y(t)) dt = h \sum_{j=1}^p a_j f(t_{i-j+1}, y(t_{i-j+1})) + \frac{h^{p+1}}{p!} f^{(p)}(\mu, y(\mu)) \int_0^1 \prod_{j=1}^p (s + j - 1) ds,$$

где $\mu \in (t_{i+1-p}; t_i)$ и $a_j = \int_0^1 \prod_{j \neq k} \frac{s+k-1}{k-j} ds, j = 1, \dots, p$.

Решение:

Получим квадратуру используя интерполянт Лагранжа:

$$f(t, y(t)) = L_{p-1}(t) + \frac{f^{(p)}(\xi_i, y(\xi_i))}{p!} \prod_{i=1}^p (t - t_{i-j+1}), \text{ где } \xi_i = \xi_i(t) \in (t_{i+1-p}; t_i)$$

Выполняем разложение $L_{p-1}(t)$:

$$L_{p-1}(t) = \sum_{j=1}^p l_i(t) * f(t_{i-j+1}, y(t_{i-j+1})) = \sum_{j=1}^p \left(\prod_{k \neq j} \left(\frac{t - t_{i-k+1}}{t_{i-j+1} - t_{i-k+1}} \right) * f(t_{i-j+1}, y(t_{i-j+1})) \right)$$

Тогда интеграл примет вид:

$$\begin{aligned} & \int_{t_i}^{t_{i+1}} f(t, y(t)) dt \\ &= \int_{t_i}^{t_{i+1}} \left(\sum_{j=1}^p \left(\prod_{k \neq j} \left(\frac{t - t_{i-k+1}}{t_{i-j+1} - t_{i-k+1}} \right) * f(t_{i-j+1}, y(t_{i-j+1})) \right) \right) dt \\ &+ \int_{t_i}^{t_{i+1}} \left(\frac{f^{(p)}(\xi_i, y(\xi_i))}{p!} \prod_{i=1}^p (t - t_{i-j+1}) \right) dt \\ &= \sum_{j=1}^p f(t_{i-j+1}, y(t_{i-j+1})) \int_{t_i}^{t_{i+1}} \sum_{j=1}^p \left(\prod_{k \neq j} \left(\frac{t - t_{i-k+1}}{t_{i-j+1} - t_{i-k+1}} \right) \right) dt \\ &+ \int_{t_i}^{t_{i+1}} \left(\frac{f^{(p)}(\xi_i, y(\xi_i))}{p!} \prod_{i=1}^p (t - t_{i-j+1}) \right) dt, \end{aligned}$$

$$\text{где } \xi_i = \xi_i(t) \in (t_{i+1-p}; t_i), \quad (1)$$

Введем замену $t = t_i + s * h$

- Упростим первый интеграл в сумме:

$$\int_{t_i}^{t_{i+1}} \sum_{j=1}^p \left(\prod_{k \neq j} \left(\frac{t_i + s * h - (t_i + (-k + 1)h)}{(t_i + (-j + 1)h) - (t_i + (-k + 1)h)} \right) \right) dt = \int_{t_i}^{t_{i+1}} \sum_{j=1}^p \left(\prod_{k \neq j} \left(\frac{s + k - 1}{k - j} \right) \right) dt$$

Выполним замену переменной в интеграле с t на s :

$$\int_{t_i}^{t_{i+1}} \sum_{j=1}^p \left(\prod_{k \neq j} \left(\frac{s + k - 1}{k - j} \right) \right) dt \rightarrow h \int_0^1 \sum_{j=1}^p \left(\prod_{k \neq j} \left(\frac{s + k - 1}{k - j} \right) \right) ds, \quad (2)$$

- Упростим второй интеграл:

$$\int_{t_i}^{t_{i+1}} \left(\frac{f^{(p)}(\xi_i, y(\xi_i))}{p!} \prod_{i=1}^p (t_i + s * h - (t_i + (-j + 1)h)) \right) dt = h^p \int_{t_i}^{t_{i+1}} \left(\frac{f^{(p)}(\xi_i, y(\xi_i))}{p!} \prod_{i=1}^p (s + j - 1) \right) dt$$

Выполним замену переменной в интеграле с t на s :

$$\frac{h^{p+1}}{p!} \int_0^1 \left(f^{(p)}(\xi_i, y(\xi_i)) \prod_{i=1}^p (s + j - 1) \right) ds$$

Можно применить теорему о среднем значении, т.к. функция непрерывна и не меняет свой знак при $s \in [0; 1], \mu_i \in (t_i; t_{i+1})$:

$$h^{p+1} \int_0^1 \left(\frac{f^{(p)}(\xi_i, y(\xi_i))}{p!} \prod_{i=1}^p (s + j - 1) \right) ds = \frac{h^{p+1}}{p!} f^{(p)}(\mu_i, y(\mu_i)) \int_0^1 \left(\prod_{i=1}^p (s + j - 1) \right) ds, \quad (3)$$

Подставим все (2) и (3) в (1):

$$\begin{aligned} & \int_{t_i}^{t_{i+1}} f(t, y(t)) dt \\ &= h \sum_{j=1}^p \left(\int_0^1 \sum_{j=1}^p \left(\prod_{k \neq j} \left(\frac{s + k - 1}{k - j} \right) \right) ds * f(t_{i-j+1}, y(t_{i-j+1})) \right) \\ &+ \frac{h^{p+1}}{p!} f^{(p)}(\mu_i, y(\mu_i)) \int_0^1 \left(\prod_{i=1}^p (s + j - 1) \right) ds \end{aligned}$$

Введем замену $a_j = \int_0^1 \sum_{j=1}^p \left(\prod_{k \neq j} \left(\frac{s + k - 1}{k - j} \right) \right) ds$:

$$\int_{t_i}^{t_{i+1}} f(t, y(t)) dt = h \sum_{j=1}^p \left(a_j * f(t_{i-j+1}, y(t_{i-j+1})) \right) + \frac{h^{p+1}}{p!} f^{(p)}(\mu_i, y(\mu_i)) \int_0^1 \left(\prod_{i=1}^p (s + j - 1) \right) ds,$$

где $a_j = \int_0^1 \sum_{j=1}^p \left(\prod_{k \neq j} \left(\frac{s + k - 1}{k - j} \right) \right) ds, j = 1, \dots, p$

Ч.т.д.