
Section-level adjusted RNA-program contrasts
Positive = higher in PGAM5-high; not a measured functional activity
MHC-II antigen presentation +0.06 +0.35 +0.08 +0.14 +0.09 -0.24 +0.05 -0.33 +0.02 -0.10 +0.35 -0.25 +0.17 -0.25 +0.22 +0.35
Inflammatory myeloid RNA +0.17 -0.02 +0.05 +0.03 +0.03 -0.03 +0.22 -0.08 -0.10 +0.07 -0.44 +0.02 -0.48 -0.15 +0.32 -0.23
CCL / CXCL8 chemokines +0.04 +0.58 -0.24 -0.06 -0.23 -0.46 +0.44 +0.37 -0.20 -0.15 +0.67 +0.25 -0.46 -0.55 +0.02 -0.09
CXCR3 ligands +0.17 -0.03 +0.07 +0.15 -0.14 -0.60 +0.22 -0.18 +0.42 +0.07 -0.30 -0.31 +0.13 +0.07 -0.12 -0.03
Checkpoint ligands +0.13 +0.04 -0.12 -0.07 +0.03 +0.74 +0.37 -0.05 -0.23 -0.12 +0.21 +0.07 +0.12 +0.31 +0.27 +0.05
IL10 / TGFB1 / LGALS9 -0.06 +0.13 +0.21 -0.005 -0.03 +0.32 -0.15 +0.29 +0.22 -0.05 +0.55 -0.25 -0.33 -0.04 +0.07 -0.19
Costimulation ligands -0.02 +0.54 -0.15 +0.10 -0.26 -0.46 +0.12 -0.35 -0.21 +0.23 +0.23 -0.45 -0.24 -0.30 +0.07 +0.27
Scavenger / LPL state -0.11 -0.18 -0.24 +0.06 +0.12 -0.04 +0.09 +0.22 -0.003 -0.18 -0.78 -0.25 -0.25 -0.05 -0.80 +0.36
C1Q complement (gate overlap) +0.43 -0.26 -0.23 +0.01 +0.01 -0.17 -0.17 -0.40 -0.09 +0.11 -0.39 -0.10 +0.07 +0.12 +0.05 +0.19
Uptake proxy (gate overlap) +0.06 +0.49 +0.36 +0.22 -0.25 -0.37 -0.02 +0.59 -0.43 -0.22 +0.28 +0.32 -0.06 +0.32 -0.14 +0.02
SPP1 / MMP12 remodeling -0.11 +0.30 -0.58 +0.14 +0.09 +0.20 -0.02 -0.15 -0.27 -0.007 -0.14 -0.40 +0.18 -0.44 -0.21 +0.18
Hypoxia response -0.07 +0.33 -0.26 +0.005 -0.03 -0.38 +0.52 +0.10 -0.72 +0.27 +0.35 -0.65 -0.23 -0.78 +0.45 -0.11
Cycling -0.02 -0.29 +0.14 +0.14 +0.17 +0.10 +0.06 -0.17 -0.04 -0.09 +0.12 +0.44 +0.25 +0.54 -0.17 -0.35
A009T1
A009T2
A009T3
A009T4
A009T5
B0013T1
B0013T2
B0013T3
B0013T4
B013T5
C004T1P
C004T1R
C008T1
C008T2
C008T3
C008T4
1.00
0.75
0.50
0.25
0.00
−0.25
−0.50
−0.75
−1.00
Adjusted coefficient / within-section outcome SD