
Unadjusted vs adjusted contrasts (equal-section patient medians)
Adjustment includes depth, MT, spatial tiles and mixing RNA proxies
MHC-II antigen presentation +0.13 +0.09 -0.23 -0.10 -0.38 +0.05 +0.19 +0.19
Inflammatory myeloid RNA +0.05 +0.03 -0.07 -0.03 -0.41 -0.21 -0.15 -0.19
CCL / CXCL8 chemokines -0.08 -0.06 -0.18 -0.15 +0.19 +0.46 -0.24 -0.27
CXCR3 ligands +0.08 +0.07 +0.04 +0.07 -0.27 -0.30 -0.04 +0.02
Checkpoint ligands -0.09 +0.03 -0.13 -0.05 +0.24 +0.14 -0.02 +0.19
IL10 / TGFB1 / LGALS9 +0.03 -0.005 -0.09 +0.22 +0.13 +0.15 -0.10 -0.12
Costimulation ligands -0.04 -0.02 -0.21 -0.21 +0.11 -0.11 -0.12 -0.08
Scavenger / LPL state -0.003 -0.11 -0.29 -0.003 -0.46 -0.52 -0.14 -0.15
C1Q complement (gate overlap) -0.03 +0.01 +0.10 -0.17 +0.06 -0.25 +0.31 +0.10
Uptake proxy (gate overlap) +0.21 +0.22 -0.36 -0.22 +0.31 +0.30 +0.12 -0.02
SPP1 / MMP12 remodeling +0.09 +0.09 -0.26 -0.02 -0.14 -0.27 +0.11 -0.01
Hypoxia response -0.06 -0.03 -0.06 +0.10 +0.02 -0.15 -0.21 -0.17
Cycling +0.08 +0.14 -0.18 -0.04 +0.14 +0.28 +0.13 +0.04
A009 unadjusted
A009 adjusted
B013 unadjusted
B013 adjusted
C004 unadjusted
C004 adjusted
C008 unadjusted
C008 adjusted
1.00
0.75
0.50
0.25
0.00
−0.25
−0.50
−0.75
−1.00
Adjusted coefficient / within-section outcome SD