

$$1 \quad m = \lfloor \lg(n) \rfloor, l = n - 2^m = n - 2^{\lfloor \lg(n) \rfloor}$$

2 (1) 如果规定 $x = n.5$ 时向上取整, 那么距离实数 x 最近的整数为 $\lfloor x + 0.5 \rfloor$

(2) 如果规定 $x = n.5$ 时向下取整, 那么距离实数 x 最近的整数为 $\lceil x - 0.5 \rceil$

$$\begin{aligned} 3 \quad & \left\lfloor \frac{\lfloor m\alpha \rfloor n}{\alpha} \right\rfloor \\ &= \left\lfloor \frac{(m\alpha - \{m\alpha\})n}{\alpha} \right\rfloor \\ &= \left\lfloor mn - \frac{\{m\alpha\}n}{\alpha} \right\rfloor = mn - 1 \end{aligned}$$

其中 $0 < \{m\alpha\} < 1$

4 不清楚

5 将 $x = \lfloor x \rfloor + \{x\}$ 代入:

$$\text{右侧} = \lfloor n \lfloor x \rfloor + n \{x\} \rfloor = n \lfloor x \rfloor + \lfloor n \{x\} \rfloor$$

$$\text{左侧} = n \lfloor \lfloor x \rfloor + \{x\} \rfloor = n \lfloor x \rfloor$$

所以 $\lfloor n \{x\} \rfloor = 0$, 所以 $\{x\} < \frac{1}{n}$

$$6 \quad \lfloor f(x) \rfloor = \lfloor f(\lceil x \rceil) \rfloor$$

$$\lceil f(x) \rceil = \lceil f(\lfloor x \rfloor) \rceil$$

$$7 \quad n \% m + \lfloor \frac{n}{m} \rfloor$$

8 (1) 假设都小于 $\lfloor \frac{n}{m} \rfloor$, 那么有 $n \leq (\lfloor \frac{n}{m} \rfloor - 1)m$, 即 $\frac{n}{m} + 1 \leq \lfloor \frac{n}{m} \rfloor$, 恒不成立。

(2) 假设都大于 $\lfloor \frac{n}{m} \rfloor$, 那么有 $n \geq (\lfloor \frac{n}{m} \rfloor + 1)m$, 即 $\frac{n}{m} - 1 \geq \lfloor \frac{n}{m} \rfloor$, 恒不成立。

9 如果 $n \% m = 0$, 则显然成立。

否则, 令 $n = m(q-1) + t, 0 < t < m$, 那么有 $\frac{m}{n} - \frac{1}{q} = \frac{m-t}{nq}$, 可以看到分子严格减少 1。

10 令 $0 \leq p < 1$. 分两种情况考虑:

(1) $x = 2k + 1 + p$, 此时可以得到: 如果 $p < 0.5$, 那么答案为 $2k + 1$, 否则为 $2k + 2$

(2) $x = 2k + p$, 此时可以得到: 如果 $p \leq 0.5$, 那么答案为 $2k$, 否则为 $2k + 1$

综上所述: 如果 $x \in (2k + 0.5, 2k + 1.5)$, 答案为 $2k + 1$, 否则 $x \in [2k - 0.5, 2k + 0.5]$, 答案为 $2k$

11 当 $\alpha = \beta =$ 整数时不成立。

12 令 $n = km + t, 0 \leq t < m$, 当 $t = 0$ 时显然成立。否则 $\lceil \frac{n}{m} \rceil = k + 1, \lfloor \frac{n+m-1}{m} \rfloor = k + \lfloor \frac{t+m-1}{m} \rfloor = k + 1$

13(1) 由后面向前证明比较简单, 即若 $\frac{1}{\alpha} + \frac{1}{\beta} = 1$ 且都为无理数, 那么构成一个划分。

(2) 由前向后证明: 先讨论 $\frac{n+1}{\alpha} + \frac{n+1}{\beta} - \left\{ \frac{n+1}{\alpha} \right\} - \left\{ \frac{n+1}{\beta} \right\} = n$ 是否在 $\frac{1}{\alpha} + \frac{1}{\beta} \neq 1$ 的时候成立。

假设 $\frac{1}{\alpha} + \frac{1}{\beta} = 0.999$, 那么当 n 足够大比如 $n = 100000$, 这个等式必然不成立;

假设 $\frac{1}{\alpha} + \frac{1}{\beta} = 1.001$, 那么当 n 足够大比如 $n = 100000$, 这个等式必然也不成立。

所以假设失败。

假设 α, β 为有理数是必然是不行的, 因为那样的话必然会存在两个整数 n_1, n_2 使得 $n_1\alpha = n_2\beta$. 如果一个是有理数一个是无理数, 那么不能满足 $\frac{1}{\alpha} + \frac{1}{\beta} = 1$

14 首先, 如果 $ny = 0$ 时显然成立。

$$\text{否则, } ((x) \bmod (ny)) \bmod (y) = (x - ny \lfloor \frac{x}{ny} \rfloor) \bmod (y) = (x) \bmod (y)$$

所以恒成立。

$$15 \quad \lceil mx \rceil = \sum_{i=0}^{m-1} \lceil x - \frac{i}{m} \rceil$$

16 根据 $n \% 3$ 等于 0, 1, 2 列三个方程然后计算出 a, b, c 的值, $a = 1, b = \frac{w-1}{3}, c = -\frac{w+2}{3}$

$$\begin{aligned} 17 \quad & \sum_{0 \leq k < m} \lfloor x + \frac{k}{m} \rfloor \\ &= \sum_{j,k} [0 \leq k < m] [1 \leq j \leq x + \frac{k}{m}] \\ &= \sum_{j,k} [0 \leq k < m] [1 \leq j \leq \lceil x \rceil] - \sum_k [0 \leq k < m(\lceil x \rceil - x)] \\ &= m \lceil x \rceil - \lceil m(\lceil x \rceil - x) \rceil \\ &= \lfloor mx \rfloor \end{aligned}$$

18 不清楚

19 首先若 b 不是整数, 那么等式在 $x = b$ 时一定不成立。若 b 为整数, 则 $\log_b(x)$ 取整数时必定有 x 为整数。那么根据公式 3.10, 恒成立。

$$20 \ x \sum_k k \left\lceil \frac{\alpha}{x} \right\rceil \leq k \leq \left\lfloor \frac{\beta}{x} \right\rfloor = \frac{x(p+q)(q-p+1)}{2}$$

其中 $p = \left\lceil \frac{\alpha}{x} \right\rceil, q = \left\lfloor \frac{\beta}{x} \right\rfloor$

21 如果 $10^n \leq 2^M < 10^{n+1}$, 那么有 $n+1$ 个 m 满足要求。假设 $n = 4, M = 15$, 那么满足要求的有 $2^0 = 1 \in [10^0, 10^1 - 1], 2^4 = 16 \in [10^1, 10^2 - 1], 2^7 = 128 \in [10^2, 10^3 - 1], 2^{10} = 1024 \in [10^3, 10^4 - 1], 2^{14} = 16384 \in [10^4, 10^5 - 1]$. 所以答案为 $1 + \lfloor M \log_{10}^2 \rfloor$

22 假设 $n = 2^{t-1}q, t \geq 1$, 其中 q 为奇数。

- 那么当 $k = t$ 时, $\lfloor \frac{n}{2^t} + \frac{1}{2} \rfloor = \frac{q+1}{2}, \lfloor \frac{n-1}{2^t} + \frac{1}{2} \rfloor = \frac{q-1}{2}$
- 如果 $k \neq t$, $\lfloor \frac{n}{2^k} + \frac{1}{2} \rfloor = \lfloor \frac{n-1}{2^k} + \frac{1}{2} \rfloor$ (下面会证明这个)

所以 $S_n = S_{n-1} + 1$ (这里 S_{n-1} 是 $k \neq t$ 的部分, 1 是 $k = t$ 的部分), 所以 $S_n = n$.

所以 $T_n = T_{n-1} + 2^t((\frac{q+1}{2})^2 - (\frac{q-1}{2})^2) = T_{n-1} + 2n$, 所以 $T_n = n(n+1)$.

下面正面上面 $k \neq t$ 的部分。

- (1) $1 \leq k \leq t-1$: 那么, $\lfloor \frac{n}{2^k} + \frac{1}{2} \rfloor = 2^{t-1-k}q, \lfloor \frac{n-1}{2^k} + \frac{1}{2} \rfloor = 2^{t-1-k}q + \lfloor -\frac{1}{2^k} + \frac{1}{2} \rfloor = 2^{t-1-k}q$
- (2) $k \geq t+1$: $\lfloor \frac{n}{2^k} + \frac{1}{2} \rfloor = \lfloor \frac{q}{2^{k-t+1}} + \frac{1}{2} \rfloor, \lfloor \frac{n-1}{2^k} + \frac{1}{2} \rfloor = \lfloor \frac{q}{2^{k-t+1}} - \frac{1}{2^k} + \frac{1}{2} \rfloor$. 不妨令 $1 \leq q < 2^{k-t+1}$. 因为大于的部分可以作为整数单独拿出来。此时分两种情况。第一种 $0 < \frac{q}{2^{k-t+1}} < \frac{1}{2}$, 那么两边都等于 0. 第二种, $\frac{1}{2} \leq \frac{q}{2^{k-t+1}} < 1$, 那么只需要证明 $\frac{q}{2^{k-t+1}} - \frac{1}{2} \geq \frac{1}{2^k}$. 因为 q 是奇数, 所以可以 $q \geq 2^{k-t} + 1$. 所以 $\frac{q}{2^{k-t+1}} - \frac{1}{2} \geq \frac{1}{2^{k-t+1}} \geq \frac{1}{2^k}$. 此时两边都等于 1

23 假设第 n 个数字是 t , 那么 $[1, t-1]$ 一共有 $\frac{t(t-1)}{2}$ 个数字, 所以 $\frac{t(t-1)}{2} < n \leq \frac{t(t+1)}{2} \Leftrightarrow t^2 - t < 2n \leq t^2 + t$, 进而得到 $t^2 - t + \frac{1}{4} < 2n < t^2 + t + \frac{1}{4} \Leftrightarrow t - \frac{1}{2} < \sqrt{2n} < t + \frac{1}{2} \Leftrightarrow \sqrt{2n} - \frac{1}{2} < t < \sqrt{2n} + \frac{1}{2} \Rightarrow t = \lfloor \sqrt{2n} + \frac{1}{2} \rfloor$

24 $N(\alpha, n) = \left\lceil \frac{n+1}{\alpha} \right\rceil - 1$
 $N(\frac{\alpha}{\alpha+1}, n) = \left\lceil \frac{(n+1)(\alpha+1)}{\alpha} \right\rceil - 1 = (n+1) + \left\lceil \frac{n+1}{\alpha} \right\rceil - 1 = N(\alpha, n) + n + 1$
 所以数字 m , 其在 $\text{Spec}(\frac{\alpha}{\alpha+1})$ 出现的次数比在 $\text{Spec}(\alpha)$ 出现的次数多 1.

25 数学归纳法: 对所有 $n, K_0 \geq n+1$, 对于 $n = 3p+1, K_n \geq n+2$, 首先对 $n = 0, 1, 2, 3, 4, 5$ 都满足

假设 $[0, n-1]$ 都满足, 现在证明 K_n . 按照 n 模 6 的余数分六种情况

n	$2K_{\lfloor \frac{n}{2} \rfloor}$	$3K_{\lfloor \frac{n}{3} \rfloor}$	\min	$\min + 1$	target	compare
$6p$	$6p+2$	$6p+3$	$6p+2$	$6p+3$	$6p+1$	ok
$6p+1$	$6p+2$	$6p+3$	$6p+2$	$6p+3$	$6p+3$	ok
$6p+2$	$6p+6$	$6p+3$	$6p+3$	$6p+4$	$6p+3$	ok
$6p+3$	$6p+6$	$6p+6$	$6p+6$	$6p+7$	$6p+4$	ok
$6p+4$	$6p+6$	$6p+6$	$6p+6$	$6p+7$	$6p+6$	ok
$6p+5$	$6p+6$	$6p+6$	$6p+6$	$6p+7$	$6p+6$	ok

26 前半部分很明显成立: $(\frac{q}{q-1})^n \leq D_n^q$

对于后半部分, 由于 $(q-1)((\frac{q}{q-1})^{n+1} - 1) = \frac{q^{n+1}}{(q-1)^n} - (q-1) < \frac{q^{n+1}}{(q-1)^n} = q(\frac{q}{q-1})^n$

所以现在证明 $D_n^q \leq (q-1)((\frac{q}{q-1})^{n+1} - 1)$

当 $n = 0, 1$ 时成立, 假设对于 $[0, n-1]$ 均成立

$$\begin{aligned} \text{那么 } D_n^q &= \left\lceil \frac{q}{q-1} D_{n-1}^q \right\rceil \leq \left\lceil \frac{q}{q-1} (q-1)((\frac{q}{q-1})^n - 1) \right\rceil \\ &= \left\lceil \frac{q^{n+1}}{(q-1)^n} \right\rceil - q < \frac{q^{n+1}}{(q-1)^n} + 1 - q \\ &= (q-1)((\frac{q}{q-1})^{n+1} - 1) \end{aligned}$$

27 首先若第 n 项为偶数, 即 $D_n^3 = 2^t q$, q 为奇数, 那么 $D_{n+t}^3 = 3^t q$ 为奇数;

若第 n 项为奇数, 设为 $D_n^3 = 2^m q - 1$, q 为奇数. 那么 $D_{n+1}^3 = D_n^3 + \left\lceil \frac{D_n^3}{2} \right\rceil = 2^m q - 1 + 2^{m-1} q = 2^{m-1} * 3q - 1$, 所以 $D_{n+m}^3 = 3^m q - 1$ 为偶数。

28 $a_n = m^2 \rightarrow a_{n+2k+1} = (m+k)^2 + m - k, a_{n+2k+2} = (m+k)^2 + 2m, 0 \leq k \leq m$

$$\rightarrow a_{n+2m+1} = (2m)^2$$

29 不清楚

30 可以用数学归纳法证明: $X_n = \alpha^{2^n} + \frac{1}{\alpha^{2^n}}$. 而 $\frac{1}{\alpha^{2^n}} < 1$, 同时 X_n 是整数, 所以 $X_n = \lceil \alpha^{2^n} \rceil$

$$31 \lfloor x \rfloor + \lfloor y \rfloor + \lfloor x+y \rfloor = \lfloor x + \lfloor y \rfloor \rfloor + \lfloor x+y \rfloor$$

(1) $\lfloor y \rfloor \leq \frac{1}{2} \lfloor 2y \rfloor$, 可以分别假设 y 是整数, y 是小数且小数部分小于 0.5 以及小数部分大于等于 0.5 三种情况讨论, 可以得到这个式子总是成立;

(2) $y \leq \frac{1}{2} \lfloor 2y \rfloor + \frac{1}{2}$ 这个的证明也可以像上面一样分三种情况讨论

$$\text{所以 } \lfloor x + \lfloor y \rfloor \rfloor + \lfloor x+y \rfloor \leq \lfloor x + \frac{1}{2} \lfloor 2y \rfloor \rfloor + \lfloor x + \frac{1}{2} \lfloor 2y \rfloor + \frac{1}{2} \rfloor$$

此时, 令 $p = \lfloor 2y \rfloor$. 可以看出, 不管 p 是奇数还是偶数, 都有 $\lfloor x + \frac{1}{2} \lfloor 2y \rfloor \rfloor + \lfloor x + \frac{1}{2} \lfloor 2y \rfloor + \frac{1}{2} \rfloor = \lfloor x \rfloor + \lfloor x + \frac{1}{2} \rfloor + \lfloor 2y \rfloor$

最后可以发现, 同样将 x 像上面一样分三种情况讨论有 $\lfloor x \rfloor + \lfloor x + \frac{1}{2} \rfloor = \lfloor 2x \rfloor$

所以结论是给出的关系恒成立

32 设 $f(x) = \sum_k 2^k \|\frac{x}{2^k}\|^2$, 那么有 $f(x) = f(-x)$, 所以只需要考虑 $x \geq 0$ 的部分。

$$\text{设 } l(x) = \sum_{k \leq 0} 2^k \|\frac{x}{2^k}\|^2, r(x) = \sum_{k > 0} 2^k \|\frac{x}{2^k}\|^2$$

对于 $l(x)$ 来说, 由于 $\frac{1}{2^k}$ 是整数, 所以 $l(x+1) = l(x)$, 由于 $\|x\| \leq \frac{1}{2}$, 所以 $l(x) \leq \frac{1}{2} (\sum_{k \leq 0} 2^k) = 1$

对于 $r(x)$ 来说, 假设 $0 \leq x < 1, r(x) = \sum_{k > 0} \frac{x^2}{2^k} = x^2, r(x+1) = \frac{(x+1)^2}{2} + \sum_{k > 1} \frac{(x+1)^2}{2^k} = x^2 + 1 = f(x) + 1$

所以对于 $0 \leq x < 1$, 来说, 有 $f(x+1) = f(x) + 1$. 接下去可以证明, 对于所有的 n 都有 $f(x+n) = f(x) + n$

下面考虑 x 是任意的非负数的情况。

$$\text{首先有一个性质, } f(2x) = \sum_k 2^k \|\frac{2x}{2^k}\|^2 = 2 \sum_k 2^{k-1} \|\frac{x}{2^{k-1}}\|^2 = 2f(x)$$

所以 $f(x) = 2^{-m} f(2^m x)$. 然后利用上面的性质 $f(x+n) = f(x) + n$, 有 $f(x) = 2^{-m} f(2^m x) = 2^{-m} (\lfloor 2^m x \rfloor + f(\{2^m x\}))$

$$\text{而 } f(\{2^m x\}) = l(\{2^m x\}) + r(\{2^m x\}) \leq 1 + 1 = 2$$

$$\text{所以 } |f(x) - x| \leq |2^{-m} \lfloor 2^m x \rfloor - x| + 2^{-m} * 2 = 2^{-m} |\lfloor 2^m x \rfloor - 2^m x| + 2^{-m} * 2 \leq 2^{-m} * 3$$

这个式子对于所有的整数 m 成立, 所以 $f(x) = x$