


Calcul Intégral IV

STEP, MINES ParisTech*

25 septembre 2019 (#78eca1a)

Table des matières

TODO – Mesure de Lebesgue dans \mathbb{R}^n	3
Mesure extérieure de Lebesgue	3
Paradoxe de Banach-Tarski	4
Mesure extérieure	5
Ensemble mesurable	5
Tribu	6
Mesure	6
Mesure associée à une mesure extérieure	6
Mesure de Lebesgue	6
Mesure de Lebesgue et intégrale de Henstock-Kurzweil	7
Mesure et intégrale	7
Tribu engendrée par une collection	7
Tribu de Borel	8
Mesure	8
Fonction mesurable	8
Conventions	8
TODO : limite simple de fonctions mesurable est mesurable . . .	9
Mesurable ou mesurable ?	9
TODO : mesurabilité des fonctions prenant la valeur $+\infty$ ou . .	9
TODO: composition de fcts mesurables	9
Fonction étagée	9
Fonction mesurable	9
Intégrale d’une fonction étagée	10
Intégrale d’une fonction positive	10
TODO	10

*Ce document est un des produits du projet  **boisgera/CDIS**, initié par la collaboration de (S)ébastien Boisgérault (CAOR), (T)homas Romary et (E)milie Chautru (GEOSCIENCES), (P)auline Bernard (CAS), avec la contribution de Gabriel Stoltz (Ecole des Ponts ParisTech, CERMICS). Il est mis à disposition selon les termes de la licence Creative Commons “attribution – pas d’utilisation commerciale – partage dans les mêmes conditions” 4.0 internationale.

Intégrale d'une fonction positive II	10
Intégrale d'une fonction à valeurs réelles	11
TODO	11
TODO	11
TODO	11
TODO	11
Propriétés de l'intégrale	11
TODO – Linéarité	11
TODO – Positivité	12
Théorème de convergence monotone	12
Théorème de convergence dominée	13
Produit de mesures	13
Tribu produit	13
Mesure produit	14
Intégrale dans un espace produit	14
TODO – Mesure σ -finie (plus tôt ? Bof.)	14
TODO – remark	14
Théorème de Fubini	14
TODO – Complétion	15
TODO – remarque	15
Exercices	15
Anagramme	15
Approximation par des ensembles mesurables	15
Mesure intérieure	15
Mesure image	16
Complétion d'une tribu	16
TODO – Prolongement de la mesure et définition de l'intégrale associée ?	16
TODO – Fonctions mesurables	17
TODO – Mesures de Hausdorff	17
TODO – Extension	17
TODO – Mesure produit	17
Question 1	17
Question 2	17
TODO – Intégrale itérée	17
TODO	18
Solutions	18
Anagramme	18
Approximation par des ensembles mesurables	18
TODO – Mesure intérieure	19
Mesure image	20
Complétion d'une tribu	22

TODO – Mesure de Lebesgue dans \mathbb{R}^n

Dans les volets précédents du “Calcul Intégral”, nous avons défini le volume d’un pavé compact de \mathbb{R}^n

$$P = [a_1, b_1] \times \cdots \times [a_n, b_n]$$

au moyen de la formule

$$v(P) := (b_1 - a_1) \times \cdots \times (b_n - a_n).$$

L’intégrable de Henstock-Kurzweil nous permet de prolonger la fonction v en une fonction définie pour tous les ensembles mesurables A de \mathbb{R}^n , par la relation

$$v(A) = \int 1_A(x) dx$$

si 1_A est intégrable et $v(A) = +\infty$ sinon. Mais cette approche n’est pas totalement satisfaisante intellectuellement. D’une part on peut considérer l’usage de l’intégrale comme un chemin tortueux pour étendre v . D’autre part on peut avoir l’impression que cette approche – qui ne permet pas de mesurer le volume de tout ensemble de \mathbb{R}^n – n’atteint pas totalement son objectif ; cette limitation pourrait être un artefact de la méthode choisie plutôt qu’une limitation intrinsèque. Dans cette section, nous allons donner une autre méthode, plus directe, due à Lebesgue et Carathéodory¹, qui nous permettra de définir la mesure du volume de tout ensemble de \mathbb{R}^n . Elle nous donnera également la raison pour laquelle notre construction initiale du volume se limite à la collection des ensembles qualifiés de “mesurables”.

Pour calculer le volume d’un sous-ensemble de \mathbb{R}^n , nous généralisons la méthode utilisée pour définir les ensembles négligeables (de volume nul) : nous considérons l’ensemble des collections dénombrables de pavés recouvrant ce sous-ensemble et nous utilisons chacun de ces recouvrements pour produire une estimation (supérieure) du volume de l’ensemble. Formellement :

Mesure extérieure de Lebesgue

On appelle *mesure extérieure de Lebesgue* dans \mathbb{R}^n la fonction

$$v^* : \mathcal{P}(\mathbb{R}^n) \rightarrow [0, +\infty],$$

1. Henri Lebesgue (1875-1941) était un mathématicien français et Constantin Carathéodory (1873-1950) un mathématicien grec entretenant des liens étroits avec l’Allemagne. Ils font partie des fondateurs de la théorie abstraite de la mesure qui conduit à un renouveau de la théorie de l’intégration au début du XXème siècle.

qui a tout ensemble A de \mathbb{R}^n associe le nombre réel étendu positif défini par

$$v^*(A) = \inf \left\{ \sum_{k=0}^{+\infty} v(P_k) \mid P_k \text{ pavé compact de } \mathbb{R}^n, A \subset \bigcup_{k=0}^{+\infty} P_k \right\},$$

Cette définition “raisonnable” ne satisfait toutefois pas les propriétés que nous attendons (implicitement) d’un volume. Ce décalage est mise en évidence par un résultat paradoxal de la théorie des ensembles dans \mathbb{R}^3 :

Paradoxe de Banach-Tarski

Il est possible de partitionner une sphère de rayon un de \mathbb{R}^3 en un nombre fini d’ensembles, qui, après rotations et translations, forment une partition de deux sphères disjointes de rayon un.

Si le résultat est qualifié de paradoxe, c’est qu’il nous semble intuitivement que le volume devrait être préservé par les opérations subies par la sphère initiale. Or, le volume d’une sphère de rayon un et de deux sphères disjointes de même rayon diffère d’un facteur 2 . . . Pour dépasser ce paradoxe, nous allons devoir examiner un par un les résultats qui nous semblent évidents dans ce raisonnement.

Soient A_1, \dots, A_p des ensembles disjoints et non vides de \mathbb{R}^3 dont la réunion forme la sphère initiale $S_0 = A_1 \cup \dots \cup A_p$, et tels que des ensembles disjoints B_1, \dots, B_p qui s’en déduisent par rotation et translation, vérifient $S_1 \cup S_2 = B_1 \cup \dots \cup B_p$ où S_1 et S_2 sont les deux sphères finales.

Tout d’abord, on a bien

$$v^*(S) = \frac{4\pi}{3} \text{ et } v^*(S_1 \cup S_2) = 2 \times \frac{4\pi}{3},$$

car les ensembles S_0 , S_1 et S_2 considérés sont intégrables (au sens de l’intégrale de Henstock-Kurzweil) et nous verrons ultérieurement que dans ce cas, la mesure extérieure v^* coïncide avec celle de v qui exploite l’intégrable de Henstock-Kurzweil. Un simple calcul intégral fournit alors le résultat.

On peut croire que le point critique dans notre définition est la préservation de la valeur de $v^*(A)$ par translation et rotation ; s’il est facile d’établir que lorsque B se déduit de A par une translation, alors $v^*(A) = v^*(B)$, on peut douter du résultat pour les rotations. Après tout, la définition de $v^*(A)$ fait appel à des rectangles qui sont parallèles aux axes, une propriété qui n’est pas conservée par rotation. Mais si le résultat n’est pas évident, il s’avère pourtant que la mesure v^* est bien invariante par rotation (cf. (Hunter 2011, sec. 2.8)).

La propriété qui nous fait défaut est plus fondamentale : la fonction v^* n'est pas additive ! Même si les ensembles A_1, \dots, A_p sont disjoints, il est possible que

$$v^*(A_1 \cup \dots \cup A_p) \neq v^*(A_1) + \dots + v^*(A_p).$$

On peut par contre établir avec la définition de v^* qu'elle est sous-additive : pour tous les ensembles A_1, \dots, A_p (disjoints ou non), on a

$$v^*(A_1 \cup \dots \cup A_p) \leq v^*(A_1) + \dots + v^*(A_p).$$

Elle est même σ -sous-additive : si $A_k, k \in \mathbb{N}$ sont des sous-ensembles de \mathbb{R}^n ,

$$v^*\left(\bigcup_{k=0}^{+\infty} A_k\right) = \sum_{k=0}^n v^*(A_k).$$

Cette propriété est caractéristique des mesures extérieures :

Mesure extérieure

On appelle *mesure extérieure* sur l'ensemble X toute application

$$v^* : \mathcal{P}(X) \rightarrow [0, +\infty]$$

telle que $\mu(\emptyset) = 0$ et qui soit σ -subadditive : pour tout $A \subset X$ et $A_k \subset X, k \in \mathbb{N}$,

$$\text{si } A \subset \bigcup_{k=0}^{+\infty} A_k, \text{ alors } \mu^*(A) \leq \sum_{k=0}^{+\infty} \mu^*(A_k).$$

Il existe un procédé général permettant de déduire d'une mesure extérieure une application qui soit additive – à condition d'accepter de réduire son domaine de définition ; la fonction qui en résulte est non seulement additive, mais même σ -additive.

Ensemble mesurable

Soit μ^* une mesure extérieure sur l'ensemble X ; un ensemble $A \subset X$ est dit μ^* -mesurable (au sens de Carathéodory) si pour tout $B \subset X$, on a

$$\mu^*(B) = \mu^*(B \cap A) + \mu^*(B \setminus A).$$

Une façon alternative de voir les choses : si l'on note $\mu^*|_A$ la trace de μ^* sur un ensemble A de X , définie pour tout sous-ensemble B de X par

$$\mu^*|_A(B) = \mu^*(B \cap A),$$

alors l'ensemble A est μ^* mesurable si et seulement si

$$\mu^* = \mu^*|_A + \mu^*|_{A^c}.$$

Tribu

Une *tribu* ou σ -*algèbre* \mathcal{A} sur un ensemble X est une collection d'ensembles de X contenant l'ensemble vide et stable par passage au complémentaire et à l'union dénombrable :

1. $\emptyset \in \mathcal{A}$.
2. Si $A \in \mathcal{A}$, $A^c = X \setminus A \in \mathcal{A}$.
3. Si pour tout $k \in \mathbb{N}$, $A_k \in \mathcal{A}$, alors $\bigcup_{k=0}^{+\infty} A_k \in \mathcal{A}$.

Un ensemble de \mathcal{A} est dit *mesurable* ; l'ensemble X muni de \mathcal{A} est un *espace mesurable*.

Mesure

Une *mesure* μ sur un espace mesurable (X, \mathcal{A}) est une fonction

$$\mu : \mathcal{A} \rightarrow [0, +\infty]$$

telle que $\mu(\emptyset) = 0$ et telle que pour toute famille dénombrable $\{A_k\}$ d'ensembles de \mathcal{A} disjoints deux à deux, on ait

$$\mu\left(\bigcup_k A_k\right) = \sum_k \mu(A_k);$$

on dit que μ est σ -*additive*. L'ensemble X muni de \mathcal{A} et μ est un *espace mesuré*.

Mesure associée à une mesure extérieure

Soit X un ensemble et μ^* une mesure extérieure sur X . La collection \mathcal{A} des ensembles μ^* -mesurables de X est une tribu sur X , et la restriction μ de μ^* à \mathcal{A} est une mesure sur X .

Démonstration Cf. (Hunter 2011, théorème 2.9, pp. 15-17). ■

La spécialisation de ce procédé au cas de la mesure extérieure de Lebesgue, produit la mesure de Lebesgue.

Mesure de Lebesgue

La “mesure extérieure de Lebesgue” $v^* : \mathcal{P}(\mathbb{R}^n) \rightarrow [0, +\infty]$ précédemment définie est bien une mesure extérieure sur \mathbb{R}^n . On appelle *tribu de Lebesgue* et on note $\mathcal{L}(\mathbb{R}^n)$ la collection des ensembles v^* -mesurables (au sens de Caratheodory) ; la

mesure $v : \mathcal{L}(\mathbb{R}^n) \rightarrow [0, +\infty]$ qui lui est associée est appelée *mesure de Lebesgue sur \mathbb{R}^n* . La notation “ v ” pour cette mesure est dépourvue d’ambiguïté car elle prolonge la fonction v initialement définie sur les pavés compacts.

Démonstration Il est évident que v^* satisfait $v^*(\emptyset) = 0$ (car le pavé $[0, 0]^n$ recouvre \emptyset par exemple). Si $A \subset \mathbb{R}^n$ et $A_k \subset \mathbb{R}^n$, pour tout $\varepsilon > 0$, il existe des pavés compacts P_{jk} tels que

$$A_k \subset \bigcup_{j=0}^{+\infty} P_{jk} \text{ et } \sum_{j=0}^{+\infty} v(P_{jk}) - \frac{\varepsilon}{2^{k+1}} \leq v^*(A_k) \leq \sum_{j=0}^{+\infty} v(P_{jk}).$$

Comme la famille des $\{P_{jk}\}_{jk}$ recouvre A , on a donc

$$v^*(A) \leq \sum_{k=0}^{+\infty} \sum_{j=0}^{+\infty} v(P_{jk}) \leq \sum_{k=0}^{+\infty} \left(v^*(A_k) + \frac{\varepsilon}{2^k} \right) = \left(\sum_{k=0}^{+\infty} v^*(A_k) \right) + \varepsilon.$$

Le réel positif ε étant arbitrairement petit, on en déduit que v^* est bien σ -subadditive.

Nous renvoyons le lecteur intéressé par la preuve que la mesure de Lebesgue prolonge bien la mesure de volume des pavés compacts à (Hunter 2011, sec. 2.2). ■

On admettra sans preuve le résultat suivant :

Mesure de Lebesgue et intégrale de Henstock-Kurzweil

La tribu $\mathcal{L}(\mathbb{R}^n)$ coïncide avec la tribu des ensembles mesurables définis au moyen de l’intégrale de Henstock-Kurzweil. La mesure de Lebesgue $v : \mathcal{L}(\mathbb{R}^n) \rightarrow [0, +\infty]$ vérifie

$$v(A) = \int 1_A(x) dx$$

si 1_A est intégrable au sens de Henstock-Kurzweil et $v(A) = +\infty$ sinon.

Mesure et intégrale

Tribu engendrée par une collection

Dans un ensemble X , on appelle *tribu engendrée* par une collection \mathcal{C} d’ensembles de X la plus petite tribu (au sens de l’inclusion) $\mathcal{A} = \sigma(\mathcal{C})$ de X contenant \mathcal{C} .

Démonstration de l'existence de la tribu engendrée Désignons par \mathfrak{S} la (meta-)collection des tribus de X incluant \mathcal{C} (contenant \mathcal{C} comme sous-ensemble).

$$\mathfrak{S} = \{\mathcal{B} \text{ tribu de } X \mid \mathcal{C} \subset \mathcal{B}\}$$

Elle n'est pas vide : elle contient la collection $\mathcal{P}(X)$ des ensembles de X (qui de toute évidence est un sur-ensemble de \mathcal{C} et une tribu de X). Montrons que la plus petite tribu $\sigma(\mathcal{C})$ de X contenant \mathcal{C} est l'intersection de \mathfrak{S}

$$\sigma(\mathcal{C}) := \bigcap \mathfrak{S} = \bigcap_{\mathcal{A} \in \mathfrak{S}} \mathcal{A},$$

ou encore $\sigma(\mathcal{C}) = \{A \subset X \mid A \in \mathcal{A} \text{ pour tout } \mathcal{A} \in \mathfrak{S}\}$. Il est clair que si \mathcal{A} est une tribu de X contenant \mathcal{C} , alors $\mathfrak{S} \subset \mathcal{A}$, car alors $\mathcal{A} \in \mathfrak{S}$. Il nous suffit donc de montrer que $\bigcap \mathfrak{S}$ est une tribu de X pour conclure ; on vérifiera aisément que comme chaque élément de \mathfrak{S} est une tribu, cette intersection en est également une. ■

Tribu de Borel

On appelle *tribu de Borel* d'un espace topologique X la plus petite tribu contenant tous les fermés (ou tous les ouverts) de X .

Mesure

Une *mesure (positive)* μ sur un espace mesurable (X, \mathcal{A}) est une fonction de \mathcal{A} dans $[0, +\infty]$ telle que $\mu(\emptyset) = 0$ et pour toute collection dénombrable $\{A_k\}$ d'ensembles de \mathcal{A} disjoints deux à deux, on ait

$$\mu\left(\bigcup_k A_k\right) = \sum_k \mu(A_k);$$

on dit que μ est σ -additive. L'ensemble X muni de \mathcal{A} et μ est un *espace mesuré*.

Fonction mesurable

Une fonction $f : X \rightarrow Y$ associée aux espaces mesurables (X, \mathcal{A}) et (Y, \mathcal{B}) est *mesurable* si l'image réciproque $A = f^{-1}(B)$ de tout ensemble B de \mathcal{B} par f appartient à \mathcal{A} .

Conventions

Lorsque Y a une structure topologique, on supposera par défaut que la tribu associée est la tribu de Borel, et lorsque $X = \mathbb{R}^n$ que la tribu associée est la

tribu de Lebesgue. Lorsque l'on souhaitera munir également X de la tribu de Borel, on parlera de fonctions *borélienne* (tribu de Borel au départ et à l'arrivée). Il existe une bonne raison pour adopter cette convention :

TODO : limite simple de fonctions mesurable est mesurable

Mesurable ou mesurable ?

Une fonction $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ est mesurable au sens du chapitre III, c'est-à-dire limite simple de fonctions intégrables au sens de Henstock-Kurzweil, si et seulement si elle est mesurable au sens de ce chapitre quand l'espace de départ \mathbb{R}^n est muni de la tribu de Lebesgue et l'espace d'arrivée \mathbb{R}^m de la tribu de Borel.

TODO – Démonstration ■

TODO : mesurabilité des fonctions prenant la valeur $+\infty$ ou

$-\infty$.

TODO: composition de fcts mesurables

Intérêt de fcts boréliennes dans ce schéma, lien avec Calcul Intégral III (généralisation résultats composition)

Fonction étagée

On appelle *fonction étagée* toute fonction $f : X \rightarrow Y$ telle que l'image réciproque de Y par f soit finie (telle que f ne prenne qu'un nombre fini de valeurs).

Fonction mesurable

Une fonction $f : X \rightarrow \mathbb{R}$ associée aux espaces mesurables (X, \mathcal{A}) et $(\mathbb{R}, \mathcal{B}(\mathbb{R}))$ est *mesurable* si et seulement si f est la limite simple de fonctions étagées $X \rightarrow \mathbb{R}$ mesurables.

TODO – Démonstration ■

Intégrale d'une fonction étagée

Soit (X, \mathcal{A}, μ) un espace mesuré et $f : X \mapsto [0, +\infty[$ une fonction étagée positive et mesurable. Soit $Y = f(X)$ l'ensemble des valeurs prises par f . On appelle *intégrale de Lebesgue de f relativement à la mesure μ* la grandeur positive finie

$$\int_X f \mu := \int_X f(x) \mu(dx) := \sum_{y \in Y} y \times \mu(f^{-1}(\{y\})).$$

Intégrale d'une fonction positive

Soit (X, \mathcal{A}, μ) un espace mesuré et $f : X \mapsto [0, +\infty]$ une fonction mesurable. Soit $\mathcal{F}(f)$ la collection des fonctions étagées positives et mesurables inférieures à f . On appelle *intégrale de Lebesgue de f relativement à la mesure μ* la grandeur positive (finie ou infinie)

$$\int_X f \mu := \int_X f(x) \mu(dx) := \sup_{g \in \mathcal{F}(f)} \int_X g \mu.$$

TODO

Passer du sup à la limite des intégrales d'une suite croissante de fonctions simples et mesurables. D'autant plus nécessaire que dans la définition avec le sup, on ne voit pas très bien pourquoi il faut supposer que la fonction f elle-même est mesurable. Rq qqpart plus bas que si l'on veut que le procédé marche pour toute suite ε_k , alors il est *nécessaire* que f soit mesurable.

Intégrale d'une fonction positive II

Soit (X, \mathcal{A}, μ) un espace mesuré et $f : X \mapsto [0, +\infty]$ une fonction mesurable. Soit $\varepsilon_k \geq 0$ une suite de valeurs telles que

$$\lim_{k \rightarrow +\infty} \varepsilon_k = 0 \text{ et } \sum_{k=0}^{+\infty} \varepsilon_k = +\infty.$$

La suite des fonctions f_k définies par $f_0 = 0$, puis

$$f_{k+1} = f_k + \varepsilon_k 1_{E_k} \text{ où } E_k = \{x \in X \mid f(x) \geq f_k(x) + \varepsilon_k\}$$

est une suite croissante de fonction étagées positives et mesurables, convergeant simplement vers f et

$$\int f(x) \mu(dx) = \lim_{k \rightarrow +\infty} \int f_k(x) \mu(dx).$$

TODO – Démonstration ■

Intégrale d'une fonction à valeurs réelles

Soit (X, \mathcal{A}, μ) un espace mesuré et $f : X \mapsto [-\infty, +\infty]$ une fonction mesurable. On dit que la fonction f est *intégrable au sens de Lebesgue relativement à la mesure μ* si elle est mesurable et que les intégrales des fonctions positives $f_+ = \max(f, 0)$ et $f_- = -\min(f, 0)$ sont finies. *L'intégrale de Lebesgue de f relativement à la mesure μ* est alors la grandeur réelle (finie)

$$\int_X f \mu := \int_X f(x) \mu(dx) := \int_X f_+ \mu - \int_X f_- \mu.$$

TODO

Noter intégrale de fcts positives “plus souple” et fct pas considérée intégrable (même si on peut donner une valeur à son intégrale !) si l'intégrale est infinie; mais on est obligé d'être plus restrictif pour les fonctions signées, en raison du risque de $+\infty - \infty$. Evoquer certains auteurs qui tolèrent l'une ou l'autre des valeurs

TODO

Noter intégrale de Lebesgue absolue par construction.

TODO

aller vers la mesure de longueur. Par les mesures extérieures ? Yes. Mmmm, oui, mais-pas-que. On a déjà ℓ et les ensembles mesurables associés via la théorie HK (ou v dans \mathbb{R}^n), on ne vas pas la jeter si ? Non !

TODO

“Equivalence” intégrabilité Lebesgue et HK absolue (modulo gestion des valeurs infinies.)

Propriétés de l'intégrale

TODO – Linéarité

TODO – Démonstration ■

TODO – Positivité

TODO – Démonstration ■

Théorème de convergence monotone

Soit (X, \mathcal{A}, μ) un espace mesuré et $f_k : X \rightarrow [0, +\infty]$, $k \in \mathbb{N}$ une suite croissante de fonctions mesurables et positives ; pour tout $x \in X$,

$$0 \leq f_0(x) \leq \cdots \leq f_k(x) \leq f_{k+1}(x) \leq \cdots$$

La limite simple $f : X \rightarrow [0, +\infty]$ des f_k , telle que pour tout $x \in X$,

$$f_k(x) \rightarrow f(x) \text{ quand } k \rightarrow +\infty,$$

est mesurable et

$$\lim_{k \rightarrow +\infty} \int f_k(x) \mu(dx) = \int f(x) \mu(dx).$$

Démonstration La fonction f est mesurable comme limite simple de fonctions mesurables. La positivité de l'intégrale entraîne

$$\int f_0 \mu \leq \cdots \leq \int f_k \mu \leq \cdots \leq \int f_{k+1} \mu \leq \int f \mu.$$

et donc

$$\lim_{k \rightarrow +\infty} \int f_k \mu \leq \int f \mu.$$

Soit $g : X \rightarrow [0, +\infty[$ une fonction étagée mesurable, donc de la forme

$$g(x) = \sum_{j=0}^p c_j 1_{E_j}$$

avec $c_k \in [0, +\infty[$ et E_k mesurable. Soit $t \in [0, 1[$. Comme la suite des f_k est croissante et converge simplement vers f , les ensembles $A_k = \{x \in X \mid f_k(x) \geq tg(x)\}$ vérifient

$$A_0 \subset \cdots \subset A_k \subset \cdots \text{ et } \bigcup_{k=0}^{+\infty} A_k = X.$$

Les f_k et g étant mesurables, les ensembles A_k sont mesurables. On a

$$\int f_k \mu \geq \int g 1_{A_k} = t \sum_{j=0}^p c_j \mu(A_k \cap E_j).$$

et comme $\cup_{k=0}^{+\infty} A_k \cap E_j = E_j$, par σ -additivité de μ ,

$$\lim_{k \rightarrow +\infty} \int f_k \mu \geq t \lim_{k \rightarrow +\infty} \sum_{j=0}^p c_k \mu(A_k \cap E_j) = t \left(\sum_{j=0}^p c_k \mu(E_j) \right) = t \int g \mu.$$

Cette inégalité étant valable pour tout $t \in [0, 1[$ et pour toute fonction positive étagée et mesurable g , on en déduit

$$\lim_{k \rightarrow +\infty} \int f_k \mu \geq \sup_{g \in \mathcal{F}(f)} \int g \mu = \int f \mu.$$

■

Théorème de convergence dominée

Soit (X, \mathcal{A}, μ) un espace mesuré et $f_k : X \rightarrow [-\infty, +\infty]$, $k \in \mathbb{N}$, une suite de fonctions mesurables, dominées par la fonction intégrable $g : X \rightarrow [-\infty, +\infty]$ c'est-à-dire telles que pour tout $k \in \mathbb{N}$ et tout $x \in X$,

$$|f_k(x)| \leq g(x) \quad \text{et} \quad \int g(x) \mu(dx) < +\infty.$$

Si la suite des f_k à une limite simple $f : X \rightarrow [0, +\infty]$ c'est-à-dire si pour tout $x \in X$,

$$f_k(x) \rightarrow f(x) \quad \text{quand} \quad k \rightarrow +\infty,$$

alors

$$\lim_{k \rightarrow +\infty} \int f_k(x) \mu(dx) = \int f(x) \mu(dx).$$

TODO – Démonstration ■

Produit de mesures

Tribu produit

Soit (X, \mathcal{A}) et (Y, \mathcal{B}) deux espaces mesurables. On appelle *tribu produit* de \mathcal{A} et \mathcal{B} et l'on note $\mathcal{A} \otimes \mathcal{B}$ la tribu sur le produit cartésien $X \times Y$ engendrée par les ensembles de la forme $A \times B$ où $A \in \mathcal{A}$ et $B \in \mathcal{B}$.

$$\mathcal{A} \otimes \mathcal{B} := \sigma(\{A \times B \mid A \in \mathcal{A}, B \in \mathcal{B}\}).$$

Mesure produit

Soient (X, \mathcal{A}, μ) et (Y, \mathcal{B}, ν) deux espace mesurés. On appelle *mesure produit* de μ et ν et l'on note $\mu \otimes \nu$ la fonction définie sur $\mathcal{A} \otimes \mathcal{B}$ par

$$(\mu \otimes \nu)(C) = \inf \left\{ \sum_{k=0}^{+\infty} \mu(A_k) \nu(B_k) \mid A_k \in \mathcal{A}, B_k \in \mathcal{B}, C \subset \bigcup_{k=0}^{+\infty} A_k \times B_k \right\}$$

TODO – Démonstration : la “mesure produit” est une mesure

- introduire $(\mu \otimes \nu)^*(C)$ pour tout C , montrer qu'on a affaire à une mesure extérieure.
- montrer que tout ensemble de $\mathcal{A} \otimes \mathcal{B}$ et $(\mu \otimes \nu)^*$ -mesurable (suffit de montrer que $A \times B$ est $(\mu \otimes \nu)^*$ -mesurable).

■

Intégrale dans un espace produit

Soient (X, \mathcal{A}, μ) et (Y, \mathcal{B}, ν) deux espace mesurés. Pour toute fonction $\mu \otimes \nu$ -mesurable $f : X \times Y \rightarrow [0, +\infty]$ ou toute fonction intégrable $f : X \times Y \rightarrow \mathbb{R}$, on notera

$$\int f(x, y) \mu(dx) \nu(dy) := \int f(\mu \otimes \nu).$$

TODO – Mesure σ -finie (plus tôt ? Bof.)

TODO – remark

Gérer la subtilité que la première intégrale est définie uniquement presque partout, ce qui suffit à montrer que la seconde est définie (à détailler aussi en amont).

Théorème de Fubini

Soit (X, \mathcal{A}, μ) et (Y, \mathcal{B}, ν) deux espaces mesurés σ -finis. Une fonction mesurable $f : X \times Y \rightarrow \mathbb{R}$ est intégrable si et seulement l'intégrale itérée

$$\int_Y \left(\int_X |f(x, y)| \mu(dx) \right) \nu(dy)$$

est finie. Dans ce cas,

$$\int_{X \times Y} f(\mu \otimes \nu) = \int_{X \times Y} f(x, y) \mu(dx) \nu(dy) = \int_Y \left(\int_X |f(x, y)| \mu(dx) \right) \nu(dy).$$

TODO – Complétion

Etudier <https://www.math.fsu.edu/~roberlin/maa5616.f15/homework9sln.pdf>

Aussi, <https://terrytao.wordpress.com/2010/10/30/245a-notes-6-outer-measures-pre-measures-and-product-measures/>

TODO – remarque

remarque évidente sur l'autre intégrale itérée.

Démonstration ■

Exercices

Anagramme

Quel est l'anagramme de “Banach-Tarski” ? (?)

Approximation par des ensembles mesurables

Soit A un sous-ensemble de \mathbb{R}^n .

Question 1 Montrer qu'il existe un ensemble v^* -mesurable B contenant A et tel que $v^*(A) = v^*(B)$. (?)

Question 2 À quelle condition portant sur $v^*(B \setminus A)$ l'ensemble A est-il v^* -mesurable ? (?)

Mesure intérieure

Soit A un ensemble borné de \mathbb{R}^n et P un pavé compact de \mathbb{R}^n contenant A . On appelle *mesure intérieure de A* la grandeur

$$v_*(A) = v^*(P) - v^*(P \setminus A).$$

Question 1 Montrer que la définition de $v_*(A)$ ne dépend pas du choix du pavé P . (?)

Question 2 Montrer que $v_*(A) \leq v^*(A)$, avec égalité si A est v^* -mesurable. (?)

Question 3 Montrer la réciproque de la question précédente : si $A \subset \mathbb{R}^n$ est borné et $v_*(A) = v^*(A)$, alors A est v^* -mesurable. (?)

Mesure image

Soit (X, \mathcal{A}, μ) un espace mesuré et $h : X \rightarrow Y$ une application. On définit la collection

$$\mathcal{B} = \{B \subset Y \mid h^{-1}(B) \in \mathcal{A}\}$$

et la fonction $\mu \circ h^{-1} : \mathcal{B} \rightarrow [0, +\infty]$ par

$$\mu \circ h^{-1}(B) = \mu(h^{-1}(B)).$$

Question 1 Montrer que \mathcal{B} est une tribu. (?)

Question 2 Montrer que $\mu \circ h^{-1}$ est une mesure sur \mathcal{B} ; on l'appelle la *mesure image de μ par h* . (?)

Question 3 Montrer que la fonction $f : Y \rightarrow \mathbb{R}$ est $\mu \circ h^{-1}$ -intégrable si et seulement si $f \circ h$ est μ -intégrable et qu'alors,

$$\int_Y f(\mu \circ h^{-1})(dx) = \int_X (f \circ h)\mu(dx).$$

(?)

Complétion d'une tribu

TODO – Prolongement de la mesure et définition de l'intégrale associée ?

Soit (X, \mathcal{A}, μ) un espace mesuré. On note $A \Delta B$ la différence symétrique de deux sous-ensembles A et B de X l'ensemble défini par

$$A \Delta B = (A \setminus B) \cup (B \setminus A) = (A \cap B^c) \cup (A^c \cap B).$$

Caractériser au moyen de la différence symétrique la tribu engendrée par l'union entre \mathcal{A} et la collection \mathcal{N} des ensembles négligeables pour μ :

$$\mathcal{N} = \{N \subset X \mid \text{il existe } A \in \mathcal{A} \text{ tel que } N \subset A \text{ et } \mu(A) = 0\}.$$

(?)

TODO – Fonctions mesurables

(pour des mesures “exotiques” ... mesure de comptage, densité uniforme, sur $[0, 1]$, mesure de dirac en 0 ?)

TODO – Mesures de Hausdorff

Que faire ? Définir le volume, la surface et la longueur dans \mathbb{R}^3 , montrer que l’on a affaire à des mesures extérieures ?

Travailler sur une mesure de Hausdorff “rectangulaire” plutôt que sur la “vraie” ?

Ou mesure de Hausdorff de dimension $1/2$ dans \mathbb{R} , telle que présentée dans <https://terrytao.wordpress.com/2009/05/19/245c-notes-5-hausdorff-dimension-optional/> ?

TODO – Extension

Tribu générée à partir d’un anneau (e.g. ens. des intervalles $[a, b[$), extension d’une pré mesure ? Problématique de non-unicité ? Unicité sous caractère σ -fini ? cf <https://mpaldridge.github.io/teaching/ma40042-notes-06.pdf>

TODO – Mesure produit

Question 1

Montrer que $\mathcal{B}(\mathbb{R}^{m+n}) = \mathcal{B}(\mathbb{R}^m) \otimes \mathcal{B}(\mathbb{R}^n)$.

Question 2

Est-ce que $\mathcal{L}(\mathbb{R}^{m+n}) = \mathcal{L}(\mathbb{R}^m) \otimes \mathcal{L}(\mathbb{R}^n)$?

TODO – Intégrale itérée

Exemple classique (e.g. https://en.wikipedia.org/wiki/Fubini's_theorem#Failure_of_Fubini's_theorem_for_non-integrable_functions) de calcul et comparaison de

$$\int_0^1 \left(\int_0^1 \frac{x^2 - y^2}{(x^2 + y^2)^2} dy \right) dx$$

et

$$\int_0^1 \left(\int_0^1 \frac{x^2 - y^2}{(x^2 + y^2)^2} dx \right) dy.$$

TODO

check / version conditionnellement continue de Fubini. Pourquoi ça ne marche pas ?

Solutions

Anagramme

“Banach-Tarski Banach-Tarski”.

Approximation par des ensembles mesurables

Question 1 Par définition de $v^*(A)$, pour tout $j \in \mathbb{N}$, il existe une collection dénombrable de pavés P_k^j tels que

$$v^*(A) \leq \sum_{k=0}^{+\infty} v(P_k^j) \leq v^*(A) + 2^{-j}.$$

Les ensembles $B_j = \cup_k P_k^j$ sont v^* -mesurables comme unions dénombrables d'ensembles mesurables. De plus, comme $A \subset B_j$, et par σ -subadditivité de v^*

$$v^*(A) \leq v^*(B_j) \leq \sum_{k=0}^{+\infty} v^*(P_k^j) \leq \sum_{k=0}^{+\infty} v(P_k^j) \leq v^*(A) + 2^{-j}.$$

L'intersection $B = \cap_j B_j$ est un ensemble mesurable qui recouvre A et est contenu dans chaque B_j ; par conséquent pour tout $j \in \mathbb{N}$,

$$v^*(A) \leq v(B) \leq v(B_j) \leq v^*(A) + 2^{-j}.$$

On en déduit donc que $A \subset B$ et $v^*(A) = v^*(B)$ avec B mesurable.

Question 2 Notons au préalable que si $v^*(A) = +\infty$, alors A est automatiquement mesurable. Dans le cas contraire ($v^*(A) < +\infty$) l'ensemble A est v^* -mesurable si et seulement si $v^*(B \setminus A) = 0$. En effet, si A est v^* -mesurable et de mesure finie, comme $A \subset B$, on a

$$v^*(B) = v^*(A \cap B) + v^*(A^c \cap B) = v^*(A) + v^*(B \setminus A) = v^*(B) + v^*(B \setminus A).$$

Comme la mesure $v^*(A)$ est finie, $v^*(B \setminus A) = 0$. Réciproquement, si $v^*(B \setminus A) = 0$, alors $B \setminus A$ (et donc A) est mesurable. En effet, pour tout ensemble C de \mathbb{R}^n , on a d'une part

$$v^*(C) \leq v^*((B \setminus A) \cap C) + v^*((B \setminus A)^c \cap C)$$

par subadditivité de v^* . D'autre part, comme $(B \setminus A) \cap C \subset B \setminus A$, $v^*((B \setminus A) \cap C) \leq v^*(B \setminus A) = 0$. Par ailleurs, $C \supset (B \setminus A)^c \cap C$, donc

$$v^*(C) \geq v^*((B \setminus A)^c \cap C) = v^*((B \setminus A) \cap C) + v^*((B \setminus A)^c \cap C).$$

On a donc l'égalité $v^*(C) = v^*((B \setminus A) \cap C) + v^*((B \setminus A)^c \cap C)$; l'ensemble $B \setminus A$ est donc mesurable, ainsi que $A = B \setminus (B \setminus A)$.

TODO – Mesure intérieure

Question 1 Pour montrer que la définition de $v_*(A)$ ne dépend pas du choix du pavé P contenant A , il suffit de prouver qu'on peut remplacer P par un pavé compact P' contenant P sans changer la valeur de $v_*(A)$ (pour toute paire de pavés compacts on peut en effet trouver un pavé compact les contenant).

Comme les pavés compacts P et P' sont mesurables (au sens de Carathéodory, pour la mesure extérieure v^*), l'ensemble $P' \setminus P$ l'est également ; on a donc

$$v^*(P') = v^*(P' \setminus P) + v^*(P)$$

et

$$v^*(P' \setminus A) = v^*(P' \setminus P) + v^*(P \setminus A),$$

ce qui établit

$$v^*(P') - v^*(P' \setminus A) = v^*(P) - v^*(P \setminus A).$$

Question 2 La fonction v^* étant subadditive, on a

$$v^*(P) \leq v^*(A) + v^*(P \setminus A)$$

et donc $v_*(A) \leq v^*(A)$. Si A est mesurable, l'inégalité initiale devient une égalité et donc $v_*(A) = v^*(A)$.

Question 3 Montrons que la réciproque est également vraie. Soit A un ensemble borné de \mathbb{R}^n tel que $v_*(A) = v^*(A)$, et soit B un ensemble quelconque de \mathbb{R}^n . Nous cherchons à établir que $v^*(B) = v^*(A \cap B) + v^*(A^c \cap B)$. Remarquons tout d'abord que si le pavé compact P – qui est mesurable – contient A , on a

$$v^*(B) = v^*(P \cap B) + v^*(P^c \cap B) ;$$

si nous réussissons à établir que

$$v^*(P \cap B) = v^*(A \cap (P \cap B)) + v^*(A^c \cap (P \cap B)),$$

on pourra alors conclure que

$$\begin{aligned} v^*(B) &= v^*(P \cap B) + v^*(P^c \cap B) \\ &= v^*(A \cap (P \cap B)) + v^*(A^c \cap (P \cap B)) + v^*(P^c \cap B) \\ &= v^*(A \cap B) + v^*(P \cap (A^c \cap B)) + v^*(P^c \cap (A^c \cap B)) \\ &= v^*(A \cap B) + v^*(A^c \cap B). \end{aligned}$$

Autrement dit, il nous suffit d'établir le résultat cherché quand B est un ensemble de \mathbb{R}^n contenu dans le pavé compact P .

Pour cela, nous exploitons les résultats de l'exercice "Approximation par des ensembles mesurables". A l'ensemble A on peut associer un sur-ensemble v^* -mesurable B tel que $v^*(A) = v^*(B)$; quitte à remplacer B par $P \cap B$, on peut également supposer que $B \subset P$. On a

$$v^*(P) = v^*(A) + v^*(P \setminus A) = v^*(B) + v^*(P \setminus B)$$

et donc $v^*(P \setminus A) = v^*(P \setminus B)$. D'autre part

$$\begin{aligned} v^*(P) &= v^*(B) + v^*(P \setminus B) \\ &= v^*(A) + v^*(B \setminus A) + v^*(P \setminus B) \\ &= v^*(A) + v^*(B \setminus A) + v^*(P \setminus A) \end{aligned}$$

et donc $v^*(B \setminus A) = 0$. Par les résultats de l'exercice "Approximation par des ensembles mesurables", on en déduit que A est mesurable.

Mesure image

Question 1 L'ensemble \mathcal{B} est une tribu ; en effet :

- $\emptyset \in \mathcal{A}$ et $\emptyset = h^{-1}(\emptyset)$, donc $\emptyset \in \mathcal{B}$.
- Si $B \in \mathcal{B}$, l'ensemble $A = h^{-1}(B)$ appartient à \mathcal{A} . Le complémentaire $Y \setminus B$ de B dans Y vérifie $h^{-1}(Y \setminus B) = X \setminus h^{-1}(B) = X \setminus A$ et appartient donc à \mathcal{A} . L'ensemble $Y \setminus B$ appartient donc à \mathcal{B} .
- Si les ensembles B_k , $k \in N$ appartiennent à \mathcal{B} , comme $h^{-1}(\cup_k B_k) = \cup_k h^{-1}(B_k)$, cet ensemble appartient à \mathcal{A} . L'union dénombrable $\cup_k B_k$ appartient donc à \mathcal{B} .

Question 2 Montrons que $\mu \circ h^{-1}$ est une mesure sur \mathcal{B} .

- On a $\mu \circ h^{-1}(\emptyset) = \mu(h^{-1}(\emptyset)) = \mu(\emptyset) = 0$.

- Si les ensembles B_k , $k \in \mathbb{N}$, appartiennent à \mathcal{B} et sont disjoints, alors les ensembles $h^{-1}(B_k)$ appartiennent à \mathcal{A} , et sont disjoints. Comme $h^{-1}(\cup_k B_k) = \cup_k h^{-1}(B_k)$, on a

$$\begin{aligned}
\mu \circ h^{-1} \left(\bigcup_k B_k \right) &= \mu \left(h^{-1} \left(\bigcup_k B_k \right) \right) \\
&= \mu \left(\bigcup_k h^{-1}(B_k) \right) \\
&= \sum_k \mu(h^{-1}(B_k)) \\
&= \sum_k \mu \circ h^{-1}(B_k)
\end{aligned}$$

Question 3 Montrons tout d'abord que la fonction $f : Y \rightarrow \mathbb{R}$ est mesurable si et seulement si $f \circ h$ est mesurable. Par définition, f est mesurable si pour tout ensemble borélien B de \mathbb{R} , l'ensemble $f^{-1}(B)$ appartient à \mathcal{B} , c'est-à-dire si et seulement si

$$h^{-1}(f^{-1}(B)) = (f \circ h)^{-1}(B) \in \mathcal{A},$$

c'est-à-dire si et seulement si $f \circ h$ est mesurable.

Comme $(f \circ h)_+ = f_+ \circ h$ et $(f \circ h)_- = f_- \circ h$, il nous suffit de montrer que pour toute fonction mesurable $f : Y \rightarrow [0, +\infty]$, on a

$$\int (f \circ h) \mu = \int f(\mu \circ h^{-1})$$

pour pouvoir conclure que $f : Y \rightarrow \mathbb{R}$ est $\mu \circ h^{-1}$ -intégrable si et seulement si $f \circ h$ est μ -intégrable et que l'égalité ci-dessus est valable.

Or pour une telle fonction f , il existe une suite croissante de fonctions f_k simples, positives et mesurables convergeant simplement vers f , et l'on a

$$\int f(\mu \circ h^{-1}) = \lim_{k \rightarrow +\infty} \int f_k(\mu \circ h^{-1}).$$

Comme

$$\begin{aligned}
\int f_k(\mu \circ h^{-1}) &= \sum_{y \in f_k(Y)} y \times (\mu \circ h^{-1})(f_k^{-1}(\{y\})) \\
&= \sum_{y \in f_k(Y)} y \times \mu(h^{-1}(f_k^{-1}(\{y\}))) \\
&= \sum_{y \in f_k(Y)} y \times \mu((f_k \circ h)^{-1}(\{y\}))
\end{aligned}$$

si $y \in f_k(Y)$, mais $y \notin f_k(h(X))$, alors $\mu((f_k \circ h)^{-1}(\{y\})) = 0$. Par conséquent,

$$\begin{aligned} \int f_k(\mu \circ h^{-1}) &= \sum_{y \in (f_k \circ h)(X)} y \times \mu((f_k \circ h)^{-1}(\{y\})) \\ &= \int (f_k \circ h)\mu. \end{aligned}$$

Les fonctions $f_k \circ h$ sont simples, positives et mesurables, leur suite est croissante et converge simplement vers $f \circ h$. Par le théorème de convergence monotone, on a donc

$$\int f(\mu \circ h^{-1}) = \int (f \circ h)\mu.$$

Complétion d'une tribu

Nous allons établir que la tribu engendrée par $\mathcal{A} \cup \mathcal{N}$ est l'ensemble

$$\mathcal{B} = \{A \Delta N \mid A \in \mathcal{A}, N \in \mathcal{N}\}.$$

Tout d'abord, comme tout $A \in \mathcal{A}$ et $N \in \mathcal{N}$ appartiennent à cette tribu engendrée, A^c et N^c également et donc $(A \cap N^c) \cup (A^c \cap N) = A \Delta N$ également. L'ensemble \mathcal{B} est donc inclus dans la tribu engendrée par \mathcal{A} et \mathcal{N} . Il suffit donc de montrer qu'il s'agit bien d'une tribu pour pouvoir conclure qu'elle est la tribu engendrée recherchée.

Il est clair que \emptyset appartient à \mathcal{B} , comme différence symétrique entre \emptyset et \emptyset . Si $B = A \Delta N$ appartient à \mathcal{B} , alors

$$B^c = ((A \cap N^c) \cup (A^c \cap N))^c = (A^c \cup N) \cap (A \cup N^c).$$

Comme $B^c = X \cap B^c = (A \cup A^c) \cap B^c$, par distributivité on a

$$\begin{aligned} B^c &= (A \cap (A^c \cup N) \cap (A \cup N^c)) \cup (A^c \cap (A^c \cup N) \cap (A \cup N^c)) \\ &= (A \cap N) \cup (A^c \cap N^c) \\ &= ((A^c) \cap N^c) \cup ((A^c)^c \cap N) \\ &= A^c \Delta N \end{aligned}$$

et par conséquent $B^c \in \mathcal{B}$.

Si les A_k , $k \in \mathbb{N}$, appartiennent à \mathcal{A} et les N_k , $k \in \mathbb{N}$, appartiennent à \mathcal{N} , alors on pourra se convaincre que

$$(\cup_k A_k) \setminus (\cup_k N_k) \subset \cup_k (A_k \Delta N_k) \subset (\cup_k A_k) \cup (\cup_k N_k),$$

ce qui prouve que

$$\cup_k (A_k \Delta N_k) = (\cup_k A_k) \Delta M \text{ avec } M \subset N := \cup_k N_k.$$

Comme $N_k \subset B_k \in \mathcal{A}$ avec $\mu(B_k) = 0$,

$$N = \cup_k N_k \subset \cup_k B_k \in \mathcal{A},$$

avec $\mu(\cup_k B_k) = 0$ par σ -additivité de μ . L'ensemble N (et donc l'ensemble M) appartient donc à \mathcal{N} . Comme $\cup_k A_k \in \mathcal{A}$, on en déduit que \mathcal{B} est stable par union dénombrable. Cette collection contient l'ensemble vide, est stable par passage au complémentaire et par union dénombrable ; c'est donc une tribu.

Références

Hunter, John K. 2011. *Measure Theory*. Department of Mathematics, University of California at Davis. https://www.math.ucdavis.edu/~hunter/measure_theory/measure_theory.html.