중앙 입술 거상술로 한국인이 선호하는 "매력적이고 건강해 보이는 입술" 비율에 다가가기

원제 Achieving attractive and healthy-looking lips through a central lip lift **저자** Min-Gi Seo, Yong Sakong, Dong Eun Lee, Jun-Ho Lee (영남대학교 의과대학 성형외과, 리즈성형외과) **발표** Archives of Aesthetic Plastic Surgery 2023;29(2):109–114 · DOI 10.14730/aaps.2022.00759 **라이선스** CC BY-NC 4.0 (원문에 명시 확인). 비영리 이용을 허용하므로 전문번역을 두었습니다.

> **한 줄**: 인중을 줄이고 윗입술 붉은 부분을 드러내는 수술 전후로 입술 비율 세 가지를 쟀더니 **수술 후 한국인 선호 비율(LTW 0.4, ULR 0.8, VUL 0.5)에 가까워졌다.** 이 **선호 비율 숫자는 이 논문이 조사한 것이 아니라 Hwang 외(2019)의 설문 결과를 인용한 것**이다.

무엇을 물었나

Hwang 외(2019, J Craniofac Surg)는 한국 여성 258명·남성 72명에게 입술 비율을 평가하게 해 **한국인이 가장 선호하는 "매력적이고 건강해 보이는 입술" 비율**을 보고했다. 이 연구는 그 기준을 빌려, **중앙 입술 거상술(central lip lift)**만으로(필러·보톡스 없이) 그 비율에 도달할 수 있는지 확인했다. 수술이 코와 입술 사이 각도(비주-입술 각, CLA)를 망치지 않는지도 봤다.

어떻게


- 한 개인 병원에서 2015–2019년 수술받은 한국인 **87명**(남 10, 여 77, 평균 35.6세, 19–67세). 후향적 차트 검토
- 수술 전과 **6개월 후** 정면·측면 사진(같은 거리 1.5 m, 같은 카메라 설정) → Photoshop으로 픽셀 수를 세어 길이·비율 계산

비율의 정의 (그림 1의 기호) — A 윗입술 높이(비하점–구열점), B 입술 높이(인중능선–아랫입술 아래 경계), C 입술 너비(양 입꼬리 사이), D 윗입술 붉은 부분 두께(인중능선–구열점), E 아랫입술 붉은 부분 두께(구열점–아랫입술 아래 경계)

비율	정의	한국인 선호값 (Hwang 외 2019에서 인용)
LTW 입술 높이 : 너비	B / C	**0.4**
ULR 윗입술 : 아랫입술 두께	D / E	**0.8**
VUL 윗입술 붉은 부분 : 윗입술 높이	D / A	**0.5**

(역자 주: 원문 표 1은 LTW의 분모를 "lip width (D)"로 적었지만 그림 1의 입술 너비 기호는 C다.)

결과



비율	수술 전 평균	수술 후 평균	선호값
LTW	0.34	**0.39**	0.4
ULR	0.76	**0.84**	0.8
VUL	0.30	**0.39**	0.5
CLA	101.59°	95.04°	(여러 연구의 이상 범위 90–120° 등)

- 네 값 모두 유의하게 변했다(대응표본 t검정, 원문 표기 P < 0.00).
- 수술 후 LTW·ULR은 선호값에 거의 닿았고, **VUL은 0.39로 0.5에는 못 미쳤다.** (원문 고찰에는 수술 후 VUL이 "0.94"로 적혀 있는데, 초록·표 3·그림 4는 0.39/0.393이다 — 오기로 보인다.)
- 수술 전 분포(표 2): VUL이 0.33 미만인 사람이 87명 중 61명이었다 → 수술 후 13명. 즉 **윗입술 붉은 부분이 윗입술 높이에 비해 얇은 사람이 대부분**이었다.
- CLA는 줄었지만 저자들은 다른 연구가 말하는 이상 범위 안이라고 본다.
- 합병증: 경미한 상처 벌어짐 12명(보존 치료로 회복), 윗니가 일부 드러나게 된 사람 25명.

한계 (저자 명시 + 읽으며 본 것)

- **선호 비율은 이 논문이 조사한 것이 아니다.** 모든 판단이 Hwang 외(2019)의 값에 기대고 있고, 저자들도 "Hwang 외 말고는 한국인의 이상적 입술 비율 기준으로 쓸 연구가 거의 없다"고 썼다. **선호도 설문의 방법·연령 분포는 이 논문에서 확인할 수 없다** — Hwang 2019 원문을 봐야 한다.
- 사진에서 잰 값이라 실제 길이와 오차가 있을 수 있다(저자 명시). 남성은 10명뿐.
- 대상은 **수술을 원한 환자**(평균 35.6세)로, 일반 20대와 다르다.
- 수술 후 얼굴이 더 매력적으로 **평가받았는지**는 재지 않았다. 비율이 목표에 가까워졌는지만 봤다.
- 원문에 오기가 여러 곳 있다(LTW 분모 기호, VUL 0.94, 표 2의 "< 0.80", LTW를 height/thickness 두 이름으로 섞어 씀).

우리 프로젝트에 주는 것

1. 입술 모양 개인화의 "목표 비율" 후보. 세 비율은 모두 **정면 사진의 랜드마크 거리 비율**이라, MediaPipe 478점에서 바로 계산할 수 있다(입꼬리 61/291, 윗입술 윗경계 중앙 0, 입술 사이 13/14, 아랫입술 아래 경계 17, 비하점 2 부근 — 실제 인덱스는 구현 때 확인). 비율이라 **홍채 기준 mm 환산 없이도** 된다. - **ULR 0.8** (윗입술이 아랫입술의 0.8배): 립 라인을 그릴 때 윗입술을 얼마나 오버/언더할지 판단하는 기준 - **LTW 0.4**: 입술 전체가 너비에 비해 얇은지·두꺼운지 - **VUL 0.5**: 인중에 비해 윗입술 붉은 부분이 얇은지. 이 논문의 환자는 대부분 0.33 미만이었다 — 화장으로는 **윗입술 오버라인**이 이 비율을 올리는 방법이다

2. 하지만 출처를 정확히 말해야 한다. 발표·앱 설명에서 "한국인 선호 입술 비율(Hwang 외, 2019; Seo 외 2023에서 인용)"로 적는다. **Hwang 2019 원문은 아직 확인하지 않았다** — 그 연구의 설문 대상 연령, 제시 방법, 네 번째 비율이 무엇인지(이 논문은 "네 가지 비율"이라 하고 세 개만 제시)를 확인하기 전에는 채점 기준값으로 확정하지 말 것.

3. 수술 결과가 화장 목표가 되는 건 조심. 이 비율은 수술로 도달한 값이다. 화장으로는 윗입술 경계를 1–2 mm 정도 넘기는 것이 현실적인 범위이므로, 채점은 "0.8에 도달했나"보다 **"맨얼굴보다 목표 쪽으로 움직였나"**로 보는 편이 맞다.

4. 20대 한국 여성과의 거리. 비율 기준(Hwang)은 한국인 설문이라 가깝지만, 이 논문의 측정 대상은 평균 35세 수술 환자다. 우리 사용자의 **맨얼굴 평균 비율은 따로 모아야** 한다(대한성형외과학회지 2005의 한국 청년 구순 계측 참고).