
Node-dS distribution by class (genomes weighted equally; height normalised per class)
black bar left = share of identical / dS = 0 nodes (x6); area excludes nodes without a usable dS
Ascomycota
Basidiomycota
Mucoromycota
Glomeromycota
Mortierellomycota
Kickxellomycota
Chytridiomycota
Microsporidia
yn00 saturation zone
(no position claim)
Pezizomycetes (n=121)
Lipomycetes (n=35)
Dipodascomycetes (n=210)
Saccharomycetes (n=365)
Pichiomycetes (n=665)
Leotiomycetes (n=236)
Orbiliomycetes (n=30)
Lecanoromycetes (n=406)
Eurotiomycetes (n=744)
Sordariomycetes (n=1614)
Ascomycota (unassigned) (n=27)
Dothideomycetes (n=612)
Agaricomycetes (n=1172)
Pucciniomycetes (n=28)
Microbotryomycetes (n=77)
Exobasidiomycetes (n=37)
Cystobasidiomycetes (n=21)
Tremellomycetes (n=220)
Ustilaginomycetes (n=54)
Malasseziomycetes (n=22)
Mucoromycetes (n=106)
Mortierellomycetes (n=55)
Glomeromycetes (n=28)
Kickxellomycetes (n=141)
Chytridiomycetes (n=58)
Microsporidia (unassigned) (n=91)
0.01
0.05
0.1
0.3
0.5
1
1.5
2
node dS (yn00, log scale)