ONEMA-POP-018 — Versão institucional 1.0

Status: Aprovado pelo RT · Vigência: 09/11/2026 · Responsável técnico: Enf. Marcos Roberto Alves, COREN-SP 983558

1

ONEMA-POP-018 — Seleção Segura de Coberturas para Feridas em

Granulação ou Epitelização

1. Identificação institucional, código, título, versão e RT

ONEMA SAÚDE | ONEMA-POP-018 | Seleção Segura de Coberturas para Feridas em Granulação ou Epitelização |

2. Objetivo e abrangência

Selecionar cobertura para ferida em granulação ou epitelização com base no leito, exsudato, pele e objetivos de cicatrização.

3. Competência, indicações e contraindicações

Enfermeiro habilitado, com treinamento e atuação dentro das competências profissionais. Feridas previamente avaliadas,

sem sinais de urgência ou necessidade de desbridamento; não usar um produto único para todas as lesões.

4. Materiais, equipamentos e responsável pelo fornecimento

Paciente: cobertura primária/secundária prescrita ou pactuada, solução de limpeza, fixação; enfermeiro: EPI, material de avaliação, régua e descarte. Fornecimento pactuado no pedido e confirmado antes da visita.

5. Avaliação clínica e preparação

Avaliar etiologia, perfusão, localização, profundidade, tecido viável, exsudato, odor após limpeza, dor, bordas, pele adjacente e risco de maceração.

6. Execução técnica numerada e verificável

1. Confirmar paciente, plano de cuidados, alergias e indicação da cobertura disponível.

2. Higienizar mãos, preparar campo limpo/asséptico conforme complexidade e remover cobertura anterior sem trauma.

3. Observar saturação e características do exsudato e documentar intervalo real de troca.

4. Limpar ferida com solução indicada e técnica atraumática; proteger pele adjacente.

5. Para leito em granulação, escolher cobertura que mantenha ambiente úmido equilibrado e controle exsudato, evitando

aderência e maceração.

6. Para epitelização, priorizar proteção contra fricção e remoção traumática, com cobertura não aderente quando

indicada.

7. Ajustar capacidade absorvente e cobertura secundária ao volume de exsudato e às instruções do fabricante; não

preencher cavidades sem avaliação especializada.

8. Fixar sem compressão excessiva, verificar conforto e perfusão distal quando aplicável.

9. Registrar produto, dimensões, quantidade, frequência de troca, resposta e critérios de reavaliação.

7. Interrupção, intercorrências e encaminhamento

Aumento abrupto de dor, necrose, exposição profunda, perfusão inadequada, sinais de infecção progressiva ou

sangramento: suspender escolha rotineira e reavaliar.

8. Cuidados posteriores e orientações

Ensinar proteção do curativo, sinais de saturação e quando solicitar troca antecipada; controlar pressão/edema conforme

etiologia e plano.

9. Registros obrigatórios na Carteira Digital ONEMA

Identificação e consentimento; avaliação inicial e sinais vitais quando indicados; descrição objetiva, classificação/medidas,

intervenção, insumos, resposta, intercorrências, orientações, comunicação e plano de seguimento; assinatura profissional

e trilha de auditoria.

10. Referências técnicas específicas e rastreáveis

2

NICE — Pressure ulcers: prevention and management CG179 — https://www.nice.org.uk/guidance/cg179

IWGDF — Guidelines 2023 — https://iwgdfguidelines.org/guidelines-2023/