ONEMA-POP-058 — Versão institucional 1.0

Status: Aprovado pelo RT · Vigência: 09/11/2026 · Responsável técnico: Enf. Marcos Roberto Alves, COREN-SP 983558

Segurança no Uso de Hipodermóclise em Domicílio

1. Identificação institucional

2. Objetivo e abrangência

Padronizar avaliação, decisão, execução e comunicação no contexto de segurança no uso de hipodermóclise em domicílio,

em atendimento domiciliar presencial ou remoto conforme aplicabilidade. Não substitui prescrição, avaliação médica nem

instruções do fabricante.

3. Competência, indicações e contraindicações

Enfermeiro habilitado e capacitado; executar intervenções apenas no âmbito legal, da prescrição e do protocolo institucional.

Não realizar manipulação invasiva quando não houver indicação, treinamento, material adequado ou estabilidade clínica.

4. Materiais e fornecimento

Prescrição, solução/medicação compatível, equipo e cateter apropriados, EPIs, antisséptico e curativo. Equipamentos profissionais/EPIs: enfermeiro ONEMA; consumíveis específicos: paciente/responsável, salvo ajuste contratual. Em visita presencial, equipamentos de avaliação clínica conforme indicação.

5. Avaliação e preparo

Avaliar indicação, perfusão/edema, integridade cutânea, risco de sobrecarga e plano de monitoramento. Confirmar identificação, consentimento, alergias, medicamentos, ambiente, suporte disponível e condições para encaminhamento.

6. Execução técnica numerada

01. Confirmar prescrição completa: solução, volume, velocidade, medicamento e compatibilidade com via subcutânea.

02. Avaliar contraindicações e risco de sobrecarga, incluindo edema generalizado ou instabilidade.

03. Selecionar local íntegro e adequado conforme protocolo institucional e características do paciente.

04. Realizar higiene das mãos, técnica asséptica, antissepsia e inserção com dispositivo apropriado conforme capacitação.

05. Fixar e identificar data, local e solução; iniciar apenas na velocidade prescrita.

06. Monitorar dor, edema, vazamento, eritema, perfusão e resposta clínica em intervalos definidos no plano.

07. Suspender se dor importante, edema progressivo, sinais de infecção ou suspeita de sobrecarga; comunicar equipe.

08. Registrar local, dispositivo, solução, volume, velocidade, intercorrências e resposta.

7. Interrupção, intercorrências e encaminhamento

Sobrecarga, dispneia, celulite, extravasamento relevante: suspender e avaliar urgentemente. Na emergência, acionar SAMU

192 e registrar o horário. Não insistir em procedimento inseguro.

8. Cuidados posteriores e orientações

Orientar inspeção do local e proibição de alterar velocidade pelo cuidador.

9. Carteira Digital ONEMA

Registrar data/hora, modalidade, identificação e consentimento, achados positivos e negativos, sinais vitais se pertinentes,

intervenção passo a passo, materiais/dispositivo quando aplicável, intercorrências, comunicação, encaminhamento,

orientações, plano de seguimento e identificação profissional.

10. Referências técnicas rastreáveis

NICE NG31 seção 1.4; NICE CG174 Intravenous fluid therapy (não valida diretamente técnica SC); protocolo institucional de

hipodermóclise a validar | Conferir aplicação integral ao cenário brasileiro e IFU específico antes de liberação assistencial.

aplicativo.