ONEMA-POP-011 — Versão institucional 1.0

Status: Aprovado pelo RT · Vigência: 09/11/2026 · Responsável técnico: Enf. Marcos Roberto Alves, COREN-SP 983558

Página 1

ONEMA-POP-011 — Monitoramento e Segurança de Cistostomia no

Domicílio

1. Identificação institucional, código, título, versão e RT

ONEMA SAÚDE | ONEMA-POP-011 | Monitoramento e Segurança de Cistostomia no Domicílio | Versão proposta 2.0

2. Objetivo e abrangência

Monitorar cistostomia suprapúbica no domicílio, manter drenagem segura e reconhecer precocemente complicações.

3. Competência profissional, indicações e contraindicações

Enfermeiro habilitado, com treinamento no dispositivo/condição e atuação nos limites de sua competência; prescrições e

decisões terapêuticas de outros profissionais devem ser respeitadas. Casos graves: SAMU 192. Indicações e limites:

Paciente com cateter suprapúbico já instalado, em seguimento, com necessidade de avaliação de sítio, fixação e

drenagem. Não inclui punção ou criação de trajeto; troca de cateter exige indicação, treinamento, avaliação do trajeto e

protocolo específico.

4. Materiais e equipamentos específicos e fornecimento

Paciente/responsável: bolsa coletora compatível, fixador, itens de higiene e insumos acordados. Enfermeiro: EPI, material

para higiene, aferição de sinais vitais, descarte e registro; não improvisar material de substituição.

5. Avaliação clínica e preparação

Confirmar data de inserção e última troca, calibre/tipo, motivo da cistostomia, maturidade conhecida do trajeto, fluxo,

diurese, sintomas urinários, febre, dor, espasmos, sangramento, secreção no óstio e histórico de obstruções.

6. Execução técnica numerada

1. Confirmar identidade, consentimento e plano urológico; higienizar mãos e usar precauções padrão.

2. Inspecionar local de inserção quanto a eritema, edema, dor, secreção, sangramento, hipergranulação e integridade da

fixação.

3. Verificar se o tubo está dobrado, comprimido ou sob tração e se a bolsa permanece abaixo da bexiga e fora do chão.

4. Verificar integridade do circuito fechado e conexões; evitar desconexões desnecessárias.

5. Avaliar volume, aspecto e continuidade da drenagem, correlacionando com ingestão hídrica e sintomas; não atribuir

bacteriúria isolada a infecção.

6. Realizar higiene externa suave do óstio e pele adjacente conforme plano assistencial, sem antissépticos rotineiros

desnecessários ou tração.

7. Se ausência de fluxo, conferir primeiro causas externas simples: dobras, altura da bolsa, enchimento e posição; não

irrigar ou trocar empiricamente.

8. Se cateter exteriorizado, obstrução persistente, sangramento significativo ou dor intensa, suspender manipulação e

encaminhar imediatamente; trajeto pode fechar rapidamente.

9. Orientar cuidador sobre circuito fechado, higiene, posição da bolsa, sinais de alarme e contato assistencial; documentar

e programar reavaliação.

7. Interrupção, intercorrências e encaminhamento

Cateter suprapúbico exteriorizado: urgência imediata, sem tentativa não autorizada de reinserção; trajeto recente é especialmente vulnerável. Febre com mal-estar, calafrios, dor suprapúbica importante, anúria/obstrução persistente, hematúria franca ou sinais de sepse: avaliação urgente e SAMU 192 quando instabilidade.

8. Cuidados posteriores e orientações

Página 2

Manter fixação sem tração, sistema fechado, bolsa abaixo da bexiga e esvaziamento higiênico. Não estabelecer trocas por calendário universal; seguir indicação clínica, fabricante e plano urológico.

9. Registros na Carteira Digital ONEMA

Data e tipo de cateter, tempo desde inserção/troca, aspecto do óstio, drenagem/diurese, sintomas e sinais vitais quando indicados, integridade do circuito, medidas realizadas, orientação, contatos, encaminhamento e retorno.

10. Referências técnicas específicas

CDC — Summary of Recommendations: CAUTI:

https://www.cdc.gov/infection-control/hcp/cauti/summary-of-recommendations.html

Royal National Orthopaedic Hospital NHS — Going home with a Suprapubic Catheter:

https://www.rnoh.nhs.uk/patients-and-visitors/patient-information-guides/going-home-suprapubic-catheter-patients-guide