ONEMA-POP-024 — Versão institucional 1.0

Status: Aprovado pelo RT · Vigência: 09/11/2026 · Responsável técnico: Enf. Marcos Roberto Alves, COREN-SP 983558

ONEMA-POP-024 — Cuidados Gerais com o Recém-Nascido —
Coto Umbilical e Triagem de Icterícia

1. Identificação institucional

REVISÃO TÉCNICA DO RT

2. Objetivo e abrangência

Padronizar a abordagem de cuidados gerais com o recém-nascido — coto umbilical e triagem de icterícia em atendimento domiciliar ou digital, conforme a pertinência. Não substitui avaliação médica ou atendimento de emergência.

3. Competência, indicações e contraindicações

Enfermeiro habilitado e treinado. Recém-nascidos em seguimento domiciliar: higiene do coto, observação de sinais de infecção e triagem de icterícia. Contraindicado manter cuidado eletivo quando presentes sinais de emergência ou quando o procedimento exceder a competência/estrutura disponível.

4. Materiais e fornecimento

Enfermeiro: termômetro, luvas quando indicado, instrumento de avaliação e bilirrubinômetro apenas se disponível e habilitado; família: fraldas e material de higiene.

5. Avaliação e preparo

Idade em horas/dias, prematuridade, tipo de alimentação, diurese, evacuação, peso, coloração cutânea, coto e temperatura.

6. Execução técnica numerada

1. Confirmar idade pós-natal em horas, histórico de alta, exames e fatores de risco.

2. Examinar em iluminação adequada a pele e escleras, sem estimar bilirrubina apenas pela cor.

3. Perguntar por dificuldade de alimentação, sonolência, redução de diurese, fezes claras ou urina escura.

4. Inspecionar coto quanto a odor, secreção purulenta, eritema que se expande e sangramento persistente.

5. Orientar manter coto limpo e seco, dobrar fralda abaixo dele e seguir recomendação local sobre limpeza.

6. Não aplicar substâncias caseiras nem remover o coto à força.

7. Se icterícia suspeita, articular dosagem objetiva de bilirrubina e avaliação pediátrica segundo idade em horas e

fatores de risco.

8. Registrar sinais, alimentação, eliminações, orientações e encaminhamentos.

7. Interrupção, intercorrências e encaminhamento

Febre ≥38 °C, hipotermia, recusa alimentar, letargia, gemência, convulsão ou sinais de onfalite: emergência pediátrica.

8. Cuidados posteriores e orientações

Explicar sinais de alerta e manter acompanhamento neonatal e vacinação conforme calendário.

9. Registros na Carteira Digital ONEMA

Identificação, data/hora e modalidade, consentimento, queixa e histórico, avaliação e sinais vitais pertinentes, achados objetivos, cada etapa executada e resposta, orientações, escalonamento/contatos, plano de retorno, identificação e assinatura do enfermeiro. Fotos somente com consentimento específico.

10. Referências rastreáveis

 AAP 2022 — Hyperbilirubinemia in newborns ≥35 weeks — https://publications.aap.org/pediatrics/article/150/3/e2022058859/188726/Clinical-Practice-Guideline-Revision-Management

 CDC — Jaundice and Breastfeeding (2025) — https://www.cdc.gov/breastfeeding-special-circumstances/hcp/illnesses-conditions/jaundice.html

NOTA DE CONTROLE: referências identificadas e parcialmente conferidas; adequação à legislação brasileira, protocolos locais e instruções de fabricante deve ser analisada pelo RT.