HagaZiekenhuis

Kolven

In deze folder vindt u informatie over (elektrisch) kolven, de werkwijze hiervan en het bewaren van moedermelk. Kolven is het op gang brengen en/of in stand houden van de melkproductie door middel van een kolfapparaat of met de hand. Het is goed om bij het lezen van de folder te weten dat de situatie voor ieder persoonlijk anders kan zijn. Indien u na het lezen nog vragen heeft, kunt u deze gerust stellen aan een van de verpleegkundigen of kraamverzorgenden.

Redenen om te kolven

- Uw baby kan of mag niet direct aan de borst drinken.
- Uw baby kan niet voldoende zelf drinken aan de borst.
- U bent langer dan 3 uur gescheiden van uw baby.
- U gebruikt een tepelhoedje waarbij het nodig is om de melkproductie extra te stimuleren tot het op gang is.
- U gebruikt tijdelijk medicijnen die schadelijk zijn voor uw baby.
- Soms zijn er nog andere redenen waarom u gaat kolven.

Aandachtspunten

- Als uw baby niet aan de borst kan drinken, start zo snel mogelijk met kolven en maximaal binnen 6 uur (na de geboorte van een prematuur indien mogelijk eerder).
- Kolf minimaal 8x per 24 uur.
- Kolf de eerste twee weken minimaal 1x tussen 1.00 en 5.00 uur ’s nachts, de prolactinespiegel is dan het hoogst.
- Ga flexibel om met de kolftijden, na 1-2 uur is het grootste deel van de melk al weer aangemaakt.
- Probeer minimaal 2x per dag te rusten.
- Streef er naar om minimaal 2-2,5 liter per dag te drinken.

Algemeen

- Neem voor het kolven wat te drinken.
- Zorg voor een lege blaas voor het kolven.
- Zorg voor een schone omgeving. Dat wil zeggen: uw handen wassen, schone kolfbenodigdheden en een schoon werkblad. Leg zo nodig schone zoogkompressen klaar voor na het kolven. Daarna draait u de flesjes op de kolfschilden en sluit u de slangen aan op de kolfschilden en op het kolfapparaat.
- Kolf in een warme omgeving waar u zich prettig voelt.
- Zorg voor een foto of iets tastbaars wat u aan uw baby doet denken, dit kan helpen om de toeschietreflex op te wekken.

- Probeer in een voor u zo prettig mogelijke houding te kolven.
- Als u wat meer achter over leunt of ligt kunt u de flesjes langs uw lichaam houden zodat de melk alsnog in het flesje kan lopen.

Borstmassage om de toeschietreflex te bevorderen

- U kunt de borsten en tepels zacht strelen als voorbereiding op het kolven.
- Masseer altijd zachtjes.
- Begin met masseren van de bovenkant van de borst, maak draaiende bewegingen met de vingers.
- Verplaats na een paar seconden de vingers naar het stukje borst ernaast. Masseer zo de hele borst, spiraalsgewijs, in de richting van de tepelhof.
- Strijk zacht met de hand over de borst vanaf de bovenrand van de borst tot aan de tepel, zacht trommelend met de vingers. Ga zo de hele borst rond.
- Buig voorover en schud de borst voorzichtig heen en weer.
- Masseer met vlakke hand, beide tepels tegelijk, met een zacht draaiende beweging.
- Plaats de handen op de borst, ieder aan een kant, en beweeg de handen zachtjes heen en weer.
- Strijk met de rug van de vingers zachtjes van de basis van de borst richting
- de rand van de tepel en tepelhof.

Manieren van kolven

Er zijn verschillende manieren om te kolven. U kunt met uw handen of met een apparaat kolven.

Met de hand kolven

Voordelen van kolven met de eigen handen

- Vooral in de eerste dagen na de geboorte is met de handen vaak makkelijker colostrum af te kolven dan met de machine.
- In combinatie met elektrisch kolven is er vaak eerder en meer melk.

Werkwijze kolven met de hand

- Was de handen met warm water.
- Leun wat voorover zodat de tepel schuin naar beneden wijst.
- Gebruik een schone lepel om de melk op te vangen.
- Masseer de borst zachtjes gedurende twee minuten van de klieren in de oksel naar de tepel.
- Laat de borst in de hand rusten, vingers eronder, duim er bovenop, aan de rand van de tepelhof.
- Duw de borst naar de ribben toe.
- Duw uw duim en wijsvinger naar elkaar toe; de vingers moeten op dezelfde plaats op de huid blijven. Melk nu richting de tepel. De vingers moeten niet over de huid glijden. Herhaal deze beweging in een ritme.
- Voorkom dat u in de borst knijpt of aan de tepel trekt.

- Verplaats de hand regelmatig rond de borst.
- Het kan even duren voor er wat druppels melk komen of voor de voeding begint te lopen.
- Als de melk niet meer gemakkelijk komt, pauzeer dan even, drink iets, masseer wederom zachtjes de andere borst en begin aan die kant met kolven
- Wissel een aantal keren van borst.
- Droog af en toe handen en borsten af.
- Stop als er niets meer komt, het is beter om op een later moment nog een keer te kolven
- Via onderstaande QR code kunt u zien hoe u dit kunt doen. Deze QR code is alleen voor u persoonlijk en mag niet gedeeld worden

Kolven met een dubbelzijdig elektrisch kolfapparaat

Met een dubbelzijdige kolf, kolf je beide borsten tegelijkertijd. Het voordeel is dat u dan in ongeveer 15-20 minuten klaar bent en de opbrengst is vaak hoger.

De ziekenhuis kolf bevat 2 programma's, het INITIATE-programma en het MAINTAIN-programma. Voor beide programma's geldt: Kolven mag geen pijn doen! Als het kolven pijn doet laat dit dan beoordelen door een verpleegkundige/lactatiekundige.

Hoewel er de eerste keren dat u kolft mogelijk geen of slechts enkele druppels colostrum uit de borsten komt, zorgt het kolven ervoor dat uw melkproductie opgang komt en de melkklieren aangezet worden tot het produceren van melk.

INITIATE-programma

Vlak na de geboorte van uw baby start u met het INITIATE-programma. Dit programma bootst het zuigen van een pasgeboren baby na en zorgt daarmee voor het snel op gang komen van de melkproductie.

- Zet alle benodigde spullen klaar.
- Was de handen met warm water.
- Masseer zachtjes de borsten (zie QR-code hierboven)
- Leg een katoenen luier onder de borsten om eventueel gelekte melk op te vangen.
- Kolf evt. een paar minuten voor met de hand (zie QR-code hierboven).
- Plaats de kolfschilden op uw borst, zorg dat de tepel precies in het midden komt en zich vrij in de tunnel van het schild kan bewegen.

- Zorg ervoor dat de kolfschilden goed aansluiten, zodat er een vacuüm wordt gecreëerd. Pas hierbij op voor het dichtdrukken van de melkkanaaltjes.
- Schakel daarna het kolfapparaat in door op de linker knop te drukken. Druk binnen 10 seconden op de druppeltoets; de display toont: "INITIATE loopt"
- Stel vervolgens het comfortabele vacuüm in; draai de knop naar rechts tot de zuigkracht niet meer prettig aanvoelt, daarna één tot twee bolletjes terugdraaien.
- Plaats vervolgens het andere kolfschild.
- Het kan dan nodig zijn om het vacuüm opnieuw in te stellen.
- Doorloop het INITIATE-programma met stimulatie- en afkolffases en pauzes. Een akoestisch signaal geeft na 15 minuten het einde van het programma aan; display toont: "Programma gedaan". Het kolfapparaat schakelt automatisch uit.

Dag 2 tot en met dag 5:
15 minuten kolven in INITIATE en daarna nog 5 minuten nakolven in MAINTAIN.

Wanneer gaat u over van het INITIATE programma naar het MAINTAIN programma:

- Als u in 1 kolfsessie tenminste 20ml uit beide borsten bij elkaar opgeteld heeft afgekolfd.
- Bij volle borsten langer dan 24 uur zonder zichtbare melkproductie.
- Indien u in de 5 minuten nakolven in MAINTAIN in één keer 50ml kolft of meer.
- Vanaf dag 6 na de bevalling altijd overschakelen.

MAINTAIN-programma

- Schakel het kolfapparaat in door op de linker knop te drukken; het programma start in de stimulatiefase. Stel vervolgens het comfortabele vacuüm in; draai de knop naar rechts tot de zuigkracht niet meer prettig aanvoelt, daarna één tot twee druppels terugdraaien.
- Plaats het andere kolfschild.
- De kolf gaat automatisch na 2 minuten over op de afkolffase.
- U kunt ook tijdens het kolven het vacuüm aanpassen.
- Druk als de melk is toegeschoten op de druppelknop; het programma gaat over op de afkolffase. Doe dit pas **na** 10 seconde, omdat anders het Initiate programma weer start.
- Stel indien nodig de zuigkracht nog een keer bij.
- Kolf maximaal 15-20 minuten in de afkolffase tot de borsten soepel aanvoelen. **Let op: dit programma stopt niet vanzelf.**
- Als de melkstroom afneemt, kunt u door op de druppelknop te drukken, eventueel nog een keer terug naar de stimulatiefase om een nieuwe toeschietreflex op te wekken.

Hygiëne rond het kolfapparaat en de kolfsets

- Haal de kolfset uit elkaar en spoel de onderdelen af met water van ongeveer 20 graden (lauw) om achtergebleven melkresten te verwijderen.
- Was daarna met warm water en vloeibaar afwasmiddel, spoel daarna de onderdelen opnieuw 15 tot 20 seconden af met water van ongeveer 20 graden.
- Droog de onderdelen goed af met een papieren handdoekje en leg ze in de kolfemmer
- Als u het kolfapparaat deelt met andere moeders reinig dan het apparaat na gebruik met de daarvoor bestemde schoonmaakbenodigdheden
- Gebruikt u een eigen kolfset dan reinigt u deze één keer per 24 uur door de set zoals hierboven schoon te maken en daarna de set te steriliseren op 1 van de onderstaande methodes:

Sterilisatie methodes

Koken
Plaats de kolfonderdelen in een grote pan en zet ze onder water. Breng de pan met water aan de kook en laat hem minstens vijf minuten doorkoken, terwijl je ervoor zorgt dat alle onderdelen ondergedompeld blijven.

Magnetron
Plaats de kolfonderdelen in een voor de magnetron geschikte desinfectiezak of magnetronsterilisator en volg de gebruiksaanwijzingen van de fabrikant op.

Stomen
Gebruik een elektrische stoomsterilisator en plaats flessen, borstschilden en spenen daarin met de opening naar beneden.

Bewaren van moedermelk

		Ziekenhuis	Thuis
Soort	**Plaats**	**Maximaal**	**Maximaal**
Colostrum	Kamertemperatuur	1 uur	12 uur
Colostrum	koelkast	48 uur	Tot 8 dagen
Verse moedermelk	Kamertemperatuur	1 uur	Tot 8 uur
Verse moedermelk	Koelkast (niet in de deur)	48 uur	Tot 8 dagen
Moedermelk	Vriesvak koelkast	nvt	Tot 2 weken

Moedermelk	Vrieskist max. -18 ºC	6 maanden	12 maanden
Ontdooide moedermelk	Koelkast (niet in de deur)	24 uur	24 uur
Ontdooide moedermelk	Kamertemperatuur	1 uur	Zo snel mogelijk gebruiken

Invriezen van de moedermelk

- Laat vóór het invriezen de melk in de koelkast afkoelen.
- Afgekoelde moedermelk moet **zo snel mogelijk** in de diepvries. Maximaal binnen 24 uur.

Ingevroren moedermelk mag u na ontdooien nooit opnieuw invriezen!

Het vervoer van moedermelk

Kolft u thuis? zorgt u dat de afgekolfde moedermelk gekoeld naar de afdeling vervoerd wordt. Indien u bevroren moedermelk meeneemt zorgt u ervoor dat tijdens het vervoer de moedermelk niet ontdooit. U kunt de moedermelk het beste vervoeren in een koelbox of tas met koelelementen.
Zorg ervoor dat de naam van uw baby, datum van kolven en tijd vermeld staat op het spuitje/flesje of laat dit door de verpleegkundige doen als de melk in de melkkeuken bewaard moet worden.

Tot slot

Na ongeveer 2 weken is het de bedoeling dat uw melkproductie optimaal opgang is gekomen. Dat houdt in dat u per 24 uur rond de 750 ml of meer melk produceert. Bent u bezorgd dat dit niet gaat lukken, vraag dan om advies aan de verpleegkundige, indien nodig kan er een lactatiekundige in consult geroepen worden.

Verhuur kolfapparaten

- Thuiszorgwinkels
- Lactatiekundige praktijken
- MyPump

Extra informatie over borstvoeding

- Borstvoedingorganisatie La Leche Leage: www.lalecheleague.nl
- Nederlandse Vereniging van Lactatiekundigen: www.nvlborstvoeding.nl
- www.borstvoeding.com

Wat vindt u van deze patiënteninformatie?

Wij horen graag uw mening over deze folder. Wilt u na het lezen enkele vragen beantwoorden? U vindt de vragen via deze link: https://folders.hagaziekenhuis.nl/2228. Dank u wel.

Spreekt u geen of slecht Nederlands?

De informatie in deze folder is belangrijk voor u. Als u moeite heeft met de Nederlandse taal, zorg dan dat u deze folder samen met iemand leest die de informatie voor u vertaalt of uitlegt.

Do you speak Dutch poorly or not at all?

This brochure contains information that is important for you. If you have difficulty understanding Dutch, please read this brochure with someone who can translate or explain the information to you.

Czy Państwa znajomość języka niderlandzkiego jest żadna lub słaba?

Informacje zawarte w tym folderze są ważne dla Państwa. Jeśli język niderlandzki sprawia Państwu trudność, postarajcie się przeczytać informacje zawarte w tym folderze z kimś, kto może Państwu je przetłumaczyć lub objaśnić.

Hollandaca dilini hiç konuşamıyor musunuz veya kötü mü konuşuyorsunuz?

Bu broşürdeki bilgi sizin için önemlidir. Hollandaca dilinde zorlanıyorsanız, bu broşürü, size tercüme edecek ya da açıklayacak biriyle birlikte okuyun.

إذا كنتم لا تتحدثون اللغة الهولندية أو تتحدثونها بشكل سيء إن المعلومات الموجودة في هذا المنشور مهمة بالنسبة لكم. إذا كانت لديكم صعوبة في اللغة الهولندية، فاحرصوا عندئذ على قراءة هذا المنشور مع شخص يترجم المعلومات أو يشرحها لكم.

146310022026