HagaZiekenhuis

Injectietherapie - Bij erectiestoornissen

Erectiestoornissen vormen een veel voorkomend probleem. Wij spreken van een erectiestoornis als het voor een man niet mogelijk is een erectie te krijgen of wanneer zeer snel weer verslapping optreedt. Er zijn verschillende oorzaken mogelijk. Psychische spanningen kunnen een rol spelen, maar ook een te weinig bloedinstroom of te snelle bloeduitstroom uit de zwellichamen van de penis. Ook kan beschadiging van zenuwen naar de penis impotentie veroorzaken.

In overleg met uw uroloog krijgt u een behandeling voor erectiestoornissen. De behandeling bestaat uit het inspuiten van een medicijn direct in de penis. Hierna treedt een erectie op. Dit wordt ook wel auto-injectie genoemd. De injecties kunnen gebruikt worden als behandeling. De uroloog kan de injecties ook gebruiken om de oorzaak van erectiestoornissen te onderzoeken.

Voordat u thuis auto-injectie gaat doen, leert de verpleegkundige u eerst de techniek daarvoor. De uroloog bepaalt voor de instructieperiode de dosis waarmee u start en hoe u de dosis zo nodig kunt ophogen. In deze folder geven wij u informatie over de behandeling en de mogelijke bijwerkingen.

voorbereiding

Voordat u zelf de techniek van auto-injectie thuis gaat toepassen, wordt de techniek u aangeleerd, onder leiding van de gespecialiseerd verpleegkundige. Ook wordt hierbij de dosis bepaald waarmee het voor u mogelijk is een erectie te verkrijgen. De dosering is afhankelijk van de oorzaak en is u verteld door uw arts. Deze dosis staat ook vermeld op het etiket.

Als voorbereiding op de afspraak kunt u op de site www.sickandseks.nl ook lezen hoe de injectietherapie werkt.

Hoe lang houdt de erectie aan?

Na injectie wordt de penis na enkele tot maximaal 15 minuten stijf, zelfs zonder seksuele opwinding. De erectie houdt meestal ongeveer 20 - 60 minuten aan, maar kan soms langer duren. De duur van de erectie hangt af van de dosering van het medicijn en de oorzaak van de erectiestoornis.



Locatie tussen 1-2 uur of 10-11 uur

Gereed maken van injectiespuit

Op de polikliniek zal met u geoefend worden hoe het spuitje gevuld moet worden, waarmee het medicament in het zwellichaam ingespoten wordt. Het medicament wordt aangeleverd in ampullen en de voorgeschreven hoeveelheid medicament moet in de injectiespuit opgezogen worden.

Het toedienen van de injectie
De penis pakt u tussen duim en wijsvinger achter de eikel vast. De naald van de injectiespuit plaatst u op de huid aan het begin van de penis (buikzijde)onder een hoek van ongeveer 45° van boven. Dan drukt u de naald in de penis en spuit de inhoud van de injectiespuit langzaam in het zwellichaam. Dit moet zonder weerstand gaan. Verwijder daarna de naald en druk de injectieplek twee minuten af met uw duim.

Indien een injectie niet tot het gewenste resultaat leidt, mag u de injectie niet direct herhalen en moet u minimaal 24 uur wachten.

Ruim de naalden veilig op. Zorg dat een ander zich er niet aan kan prikken!

Hoe bewaart u Androskat ®

Androskat ® bewaart u in het doosje op een donkere plek en op kamertemperatuur.

Let op! Injecteer niet door een bloedvat of onder de huid. Hierdoor kan een bloeduitstorting ontstaan. Als een injectie niet tot het gewenste resultaat leidt, mag de injectie niet direct herhaald worden. U moet dan minimaal zes uur wachten.

U mag niet zonder overleg met de uroloog afwijken van de geadviseerde dosering. De kans op bijwerkingen, zoals een aanhoudende erectie (ook wel priapisme genoemd) neemt dan toe.

Wat kunnen de bijwerkingen zijn?

Een licht branderig gevoel tijdens het injecteren is normaal. Als u tijdens de injectie pijn voelt, moet u stoppen met injecteren.

De volgende bijwerkingen kunnen optreden:

- een bloeduitstorting;
- een verdoofd gevoel in de penis;
- roodheid op de plek van de injectie;
- een voorbijgaande pijn;
- zwelling van de voorhuid;
- duizeligheid; dit kan invloed hebben op de rijvaardigheid en het bedienen van machines.

Wat moet u doen als de erectie langer duurt?

Een injectie kan in enkele gevallen leiden tot een erectie die langer duurt dan u zou willen. Als de erectie langer duurt dan vijf uur, koel de penis dan met een koud washandje of een cold-pack in een handdoek.

Let op! Vermijd direct contact tussen een bevroren cold-pack en de huid.

Als de erectie na het koelen niet binnen een half uur minder wordt, neem dan direct contact op met het ziekenhuis, ook ‘s nachts. De penis moet dan slap gemaakt worden. Dit kan door een injectie met een medicijn of het leegzuigen van de penis met een injectiespuit. Dit is nodig om schade aan het weefsel van het zwellichaam te voorkomen.

Als de penis te lang stijf blijft, kan er een zuurstoftekort in de penis ontstaan. Daardoor kan onherstelbare schade aan de zwellichamen optreden en geen goede erectie meer mogelijk zijn in de toekomst.

Wat moet u doen bij littekenvorming?

Bij regelmatig injecteren tijdens een langere periode kan plaatselijke littekenvorming in de penis ontstaan. Deze littekenvorming kan tijdens een erectie pijnlijk zijn. Ook kan een kromstand van de penis tijdens erectie voorkomen. De littekenvorming verdwijnt meestal vanzelf na het stoppen met de injecties. Om de kans op littekenvorming kleiner te maken, kunt u afwisselend links en rechts in de penis injecteren en niet meer dan twee keer per week. Druk altijd goed af na het injecteren. Dit maakt de kans op bloeduitstortingen en littekenvorming minder.

Kunt u tijdens injectietherapie andere medicijnen gebruiken?

U kunt Androskat ® veilig gebruiken in combinatie met andere medicijnen. Androskat ® kan wel invloed hebben op de werking van medicijnen die de bloeddruk verlagen. Als u bloedverdunners gebruikt, moet u de plek van de injectie drie minuten dicht drukken.

Wees voorzichtig als:

- u een verhoogde oogboldruk heeft (glaucoom);
- u een aandoening heeft waarbij bloeddrukdaling **niet** gewenst is, bijvoorbeeld als u verlaagde bloeddruk heeft.

Drink **geen** alcohol. Dit kan de werking van Androskat ® versterken. De kans op een te lang durende erectie neemt dan toe.

Wanneer mag u geen Androskat ® gebruiken?

U mag Androskat ® **niet** gebruiken als u:

- een aandoening van de penis heeft, zoals kromstand, ontstekingen of plaatselijke verhardingen;
- een ernstige hartziekte heeft;
- sikkelcel-anemie heeft;
- ernstige lever- of nierziekten heeft;
- overgevoelig bent voor Androskat®.

Bij twijfel kunt u overleggen met uw uroloog.

Vergoedt de zorgverzekeraar de behandeling?

Zorgverzekeraars vergoeden de auto-injectie therapie met Androskat® **niet**.

De kosten bedragen ongeveer € 70 per vijf ampullen en andere benodigdheden, zoals injectiespuiten en -naalden. In dit bedrag is de vergoeding die u aan de apotheek moet betalen voor de aflevering van

de medicijnen niet opgenomen.

Contactgegevens

Mocht u nog vragen hebben kunt contact opnemen met de polikliniek urologie. De polikliniek is bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 8.00-16.30 uur via:

- Locatie Den Haag: (070)210
- Locatie Zoetermeer: (079) 3462860
- De spoedeisende hulp kunt u bereiken via het algemene telefoonnummer van het ziekenhuis (079) 3462626

Wat vindt u van deze patiënteninformatie?

Wij horen graag uw mening over deze folder. Wilt u na het lezen enkele vragen beantwoorden? U vindt de vragen via deze link: https://folders.hagaziekenhuis.nl/2228. Dank u wel.

Spreekt u geen of slecht Nederlands?

De informatie in deze folder is belangrijk voor u. Als u moeite heeft met de Nederlandse taal, zorg dan dat u deze folder samen met iemand leest die de informatie voor u vertaalt of uitlegt.

Do you speak Dutch poorly or not at all?

This brochure contains information that is important for you. If you have difficulty understanding Dutch, please read this brochure with someone who can translate or explain the information to you.

Czy Państwa znajomość języka niderlandzkiego jest żadna lub słaba?

Informacje zawarte w tym folderze są ważne dla Państwa. Jeśli język niderlandzki sprawia Państwu trudność, postarajcie się przeczytać informacje zawarte w tym folderze z kimś, kto może Państwu je przetłumaczyć lub objaśnić.

Hollandaca dilini hiç konuşamıyor musunuz veya kötü mü konuşuyorsunuz?

Bu broşürdeki bilgi sizin için önemlidir. Hollandaca dilinde zorlanıyorsanız, bu broşürü, size tercüme edecek ya da açıklayacak biriyle birlikte okuyun.

إذا كنتم لا تتحدثون اللغة الهولندية أو تتحدثونها بشكل سيء إن المعلومات الموجودة في هذا المنشور مهمة بالنسبة لكم. إذا كانت لديكم صعوبة في اللغة الهولندية، فاحرصوا عندئذ على قراءة هذا المنشور مع شخص يترجم المعلومات أو يشرحها لكم.

230519032025