HagaZiekenhuis

Te stoppen longmedicatie (Bijlagen A + B)

Binnenkort krijgt u een longfunctieonderzoek. In deze patiënteninformatie staat met welke medicijnen u vóór dit onderzoek moet stoppen. Dit kan een aantal uren zijn of een aantal dagen. Leest u deze informatie daarom goed door.

Bijlage A: Te stoppen longmedicatie

6 uur voor het onderzoek stoppen	
Merknaam:	**Werkzame stof:**
Airomir	Salbutamol
Bricanyl	Terbutaline
Ventolin	Salbutamol

12 uur voor het onderzoek stoppen	
Merknaam:	**Werkzame stof:**
Atrovent	Ipratropium
Combivent	Salbutamol + Ipratropium
Berodual	Fenoterol + Ipratropium

36 uur voor het onderzoek stoppen	
Merknaam:	**Werkzame stof:**
AirFluSal / Forspiro	Salmeterol + Fluticason
Aerivo	Salmeterol + Fluticason
Atimos	Formoterol
Bufoler / Easyhaler	Formoterol + Budesonide
Busalair	Salmeterol + Budesonide
Duaklir / Genuair	Aclidinium + Formoterol
Duoresp / Spiromax	Formoterol + Budesonide
Elpenhaler	Salmetrol + Fluticason
Eklira / Genuair	Aclidinium
Flutiform	Formoterol + Fluticason
Foradil	Formoterol
Foster	Formoterol + Beclomethason
Oxis	Formoterol

Serevent	Salmeterol
Symbicort	Formoterol + Budesonide
Singulair	Montelukast
Semprex	Acrivastine

48 uur voor het onderzoek stoppen	
Merknaam:	**Werkzame stof:**
Daxas	Roflumilast
Onbrez	Indacaterol
Relvar Ellipta	Fluticasonfuroaat/Vilanterol
Striverdi	Olodaterol
Theolair Retard	Theofylline
Unilair	Theofylline

168 uur (één week) voor het onderzoek stoppen

Anoro	Umeclidinium/ Vilanterol
Incruse / Ellipta	Umeclidinium
Seebri	Glycopyrronium
Spiriva	Tiotropium
Spiolto	Tiotropium / Olodaterol
Tiotrus / Zonda	Tiotropium
Xoterna	Indacaterol / Glycopyrronium
Ultibro	Indacaterol / Glycopyrronium
Trimbow	Beclometasondipropionaat/ formoterolfumaraatdihydraat / glycopyrronium
Trelegy / Ellipta	Fluticason/ Vilanterol / Umeclidinium

Het is NIET nodig om te stoppen	
Merknaam:	**Werkzame stof:**
Qvar	Beclometason
Flixotide	Fluticasonpropionaat
Pulmicort	Budesonide
Ivesco	Ciclesonide

Bijlage B: Te stoppen longmedicatie

Extra stakingsregels voorafgaand aan de histamine bronchiale hyperreactiviteitstest:

72 uur (3 dagen) van te voren staken	
Merknaam:	**Werkzame stof:**
Aerius / Neoclarityn	Desloratadine
Allerfe / Claritine	Loratadine
Hydroxyzine	Hydroxyzine
Cinnarizine	Cinnarizine
Cyclizine	Cyclizine
Emesafene	Meclozine / Pyridoxine
Fenistil	Dimetindeenwaterstofmaleaat

Kestine	Ebastine
Ketotifen / Zaditen	Ketotifen
Promethazine	Promethazine
Reactine / Zyrtec / Prevalin allerstop	Cetirizine
Semprex	Acrivastine
Suprimal	Meclozine
Tavegyl	Clemastine
Telfast	Fexofenadine
Xyzal	Levocetirizine
Nedeltran	Alimenazine

Wat vindt u van deze patiënteninformatie?

Wij horen graag uw mening over deze folder. Wilt u na het lezen enkele vragen beantwoorden? U vindt de vragen via deze link: https://folders.hagaziekenhuis.nl/2228. Dank u wel.

Spreekt u geen of slecht Nederlands?

De informatie in deze folder is belangrijk voor u. Als u moeite heeft met de Nederlandse taal, zorg dan dat u deze folder samen met iemand leest die de informatie voor u vertaalt of uitlegt.

Do you speak Dutch poorly or not at all?

This brochure contains information that is important for you. If you have difficulty understanding Dutch, please read this brochure with someone who can translate or explain the information to you.

Czy Państwa znajomość języka niderlandzkiego jest żadna lub słaba?

Informacje zawarte w tym folderze są ważne dla Państwa. Jeśli język niderlandzki sprawia Państwu trudność, postarajcie się przeczytać informacje zawarte w tym folderze z kimś, kto może Państwu je przetłumaczyć lub objaśnić.

Hollandaca dilini hiç konuşamıyor musunuz veya kötü mü konuşuyorsunuz?

Bu broşürdeki bilgi sizin için önemlidir. Hollandaca dilinde zorlanıyorsanız, bu broşürü, size tercüme edecek ya da açıklayacak biriyle birlikte okuyun.

إذا كنتم لا تتحدثون اللغة الهولندية أو تتحدثونها بشكل سيء إن المعلومات الموجودة في هذا المنشور مهمة بالنسبة لكم. إذا كانت لديكم صعوبة في اللغة الهولندية، فاحرصوا عندئذ على قراءة هذا المنشور مع شخص يترجم المعلومات أو يشرحها لكم.

243902092025