HagaZiekenhuis

CT Enterografie

U heeft binnenkort een afspraak voor een CT onderzoek van de dunne darm. Dit onderzoek maakt het mogelijk om afwijkingen in de dunne darm af te beelden.

Deze folder bevat informatie over de uitvoering van het CT onderzoek. Ook leest u hoe u zich dient voor te bereiden. Het is belangrijk dat u de folder nauwkeurig leest ten behoeve van een kwalitatief goed en veilig onderzoek.

Lees ook de folder Jodiumhoudende contrastmiddelen

Indien u zwanger kunt zijn, geeft u dit dan aan bij de afdeling Radiologie

Voorbereiding

U moet voor het onderzoek **nuchter** zijn. U moet nuchter zijn omdat er gebruikt wordt gemaakt van jodiumhoudend contrastmiddel. Lees onder aan deze folder de informatie over jodiumhoudend contrastmiddel goed door.

U dient 1 uur voor het onderzoek aanwezig te zijn. U krijgt dan contrastvloeistof (Mannitol) te drinken om de dunne darm te vullen.

Medicatie

Mannitol

Voorafgaand aan het onderzoek krijgt u een oplossing te drinken. Deze bestaat uit Mannitol en water. Deze oplossing verhindert dat vocht door de darm wordt opgenomen. Hierdoor ontplooit de dunne darm zich. Omdat de vloeistof in de dunne darm blijft, kunt u diarree krijgen. Als u de anticonceptiepil gebruikt kan deze als gevolg van de diarree minder betrouwbaar zijn in de lopende cyclus. Het wordt u aangeraden om een andere vorm van anticonceptie te kiezen in deze maand.

Buscopan

Ook krijgt u tijdens het onderzoek Buscopan toegediend. Dit middel kan er voor zorgen dat u tijdelijk wazig gaat zien. **U mag om deze reden één uur na toediening van Buscopan geen voertuig besturen. U kunt na het onderzoek dus niet zelf naar huis rijden.**

U wordt verzocht om de vragenlijst voor Buscopan in te vullen. Deze is toegevoegd aan deze folder. Neemt u de ingevulde vragenlijst mee naar de afdeling radiologie op de dag van het onderzoek.

Medicijnen

- Indien u medicijnen gebruikt, dan kunt u deze op het gebruikelijke tijdstip innemen.
- Mocht er tussen het maken van de afspraak voor het onderzoek en het onderzoek iets veranderd zijn in uw medicijngebruik, meldt u dit dan aan de afdeling Radiologie.
- Omdat u een jodiumhoudend contrastmiddel krijgt, kunt u sommige pijnstillers niet gebruiken.

- In de 24 uur voor en de dag van het onderzoek wordt afgeraden vrij verkrijgbare medicijnen tegen pijn en ontstekingen te gebruiken, zoals: Diclofenac, Ibuprofen en Naproxen. U kunt Paracetamol als alternatief gebruiken.
- De dunne darm moet voor het onderzoek leeg zijn. De dunne darm wordt gevuld met de Mannitol oplossing.
- De avond voorafgaand aan het onderzoek mag u vanaf 24.00 uur niets meer eten, drinken en roken. Als het onderzoek na 13.00 uur gepland staat, moet u ook nuchter zijn. U kunt dan om 8.00 uur een beschuitje zonder boter met jam of 20+ kaas eten met een kopje thee. Daarna niets meer eten, drinken of roken.

Verloop van het onderzoek

U dient een uur voor het onderzoek aanwezig te zijn op de afdeling Radiologie. U krijgt in de wachtkamer 1,5 liter Mannitol oplossing te drinken.

Als de vloeistof is opgedronken, wordt u door de laborant meegenomen naar het kleedkamertje. Hier kunt u nog gebruik maken van het toilet. Tijdens het onderzoek kunt u een shirt of hemd aanhouden, de onderbroek en de sokken. Andere kleding en spullen kunt u achter laten in het kleedkamertje.

Voor de toediening van het jodiumhoudende contrastmiddel en Buscopan krijgt u een infuus ingebracht in de elleboogsplooi. Deze middelen worden vlak voor de scan toegediend.

Voor het onderzoek neemt u plaats op de onderzoekstafel. Deze schuift tijdens het scannen door de opening van de CT-scan. Binnen in de scanner draait meetapparatuur rond. Alle meetgegevens worden door de computer verwerkt tot beelden.

Duur van het onderzoek

Het onderzoek duurt in totaal circa 15 minuten. U bent ongeveer 75 minuten op de afdeling Radiologie aanwezig.

Wat gebeurt er na het onderzoek

Nadat u van de laborant te horen heeft gekregen dat het onderzoek klaar is, wordt het infuusslangetje verwijderd.

U kunt naar het kleedkamertje en zo nodig van het toilet gebruik maken.

De Mannitol oplossing zal via de ontlasting weer uit het lichaam verdwijnen. Het is aan te raden om het eerste half uur in het ziekenhuis te blijven vanwege de kortdurende diarree. Houdt u rekening met de verminderde werking van de anticonceptiepil.

Het jodiumhoudende contrastmiddel die via het infuus is toegediend, wordt via de nieren verwerkt en verdwijnt met de urine uit het lichaam.

Als u borstvoeding geeft mag u 24 uur na het onderzoek geen moedermelk geven. Het beste kunt u de moedermelk die dag wel afkolven, maar u mag deze dan niet gebruiken.

De radioloog beoordeelt het onderzoek en geeft de bevindingen in een schriftelijk verslag door aan uw arts. U dient een afspraak te maken met de aanvragend arts om de uitslag van het onderzoek te vernemen.

Tot slot

Mocht u na het lezen van deze folder nog vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met de afdeling Radiologie.

De afdeling Radiologie is bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 16.30 uur via telefoonnummer: **(079) 3462520** .

Vragenlijst in verband met de toediening van Buscopan

Omdat u voor een onderzoek komt waarbij er bij u Buscopan toegediend wordt, is het van belang dat u voorafgaand aan het onderzoek deze vragenlijst invult om te controleren of u geen contra-indicatie(s) heeft voor de toediening van Buscopan.

Naam	
Geboortedatum	

Wilt u de onderstaande vragen beantwoorden door een kruisje te zetten in het vakje dat van toepassing is.

	Ja	Nee
Heeft u een verhoogde oogboldruk (glaucoom)?		
Heeft u hartritmestoornissen?		
Een vraag alleen voor mannen: Heeft u problemen met uw prostaat (prostatisme) of moeite met uitplassen?		
Geeft u borstvoeding?		
Bent u overgevoelig voor Buscopan?		

Als u alle bovenstaande vragen met nee heeft beantwoord krijgt u voor het onderzoek Buscopan toegediend via een infuusslangetje in de plooi van de elleboog. Dit medicijn zorgt ervoor dat uw darmen ontspannen. Dit middel kan er voor zorgen dat u tijdelijk wazig gaat zien.

U mag om die reden tot één uur na de toediening van Buscopan geen voertuig besturen. U kunt direct na het onderzoek dus niet zelf naar huis rijden.

Wat vindt u van deze patiënteninformatie?

Wij horen graag uw mening over deze folder. Wilt u na het lezen enkele vragen beantwoorden? U vindt de vragen via deze link: https://folders.hagaziekenhuis.nl/2228. Dank u wel.

Spreekt u geen of slecht Nederlands?

De informatie in deze folder is belangrijk voor u. Als u moeite heeft met de Nederlandse taal, zorg dan dat u deze folder samen met iemand leest die de informatie voor u vertaalt of uitlegt.

Do you speak Dutch poorly or not at all?

This brochure contains information that is important for you. If you have difficulty understanding Dutch, please read this brochure with someone who can translate or explain the information to you.

Czy Państwa znajomość języka niderlandzkiego jest żadna lub słaba?

Informacje zawarte w tym folderze są ważne dla Państwa. Jeśli język niderlandzki sprawia Państwu trudność, postarajcie się przeczytać informacje zawarte w tym folderze z kimś, kto może Państwu je przetłumaczyć lub objaśnić.

Hollandaca dilini hiç konuşamıyor musunuz veya kötü mü konuşuyorsunuz?

Bu broşürdeki bilgi sizin için önemlidir. Hollandaca dilinde zorlanıyorsanız, bu broşürü, size tercüme edecek ya da açıklayacak biriyle birlikte okuyun.

إذا كنتم لا تتحدثون اللغة الهولندية أو تتحدثونها بشكل سيء إن المعلومات الموجودة في هذا المنشور مهمة بالنسبة لكم. إذا كانت لديكم صعوبة في اللغة الهولندية، فاحرصوا عندئذ على قراءة هذا المنشور مع شخص يترجم المعلومات أو يشرحها لكم.

510616032026