
1121 天氣學與天氣分析(下) --- 作業四

姓名:林群賀系級:大氣四學號:109601003

執行程式碼


\$ python3 main.py


(一) 求出每個波的 power spectral 並作圖,比較三種數值 方法之結果差異 與使用上的優缺點



method Pressure Temperature

Leoticks





- 1. 梯形法在計算時沒有資料點數量的限制,而辛普森法和 Leo Ticks 方法需要資料點為 0 到 2N 中奇數個,且區間為偶數個。
- 2. 梯形法相較於後兩者有較大的誤差,而辛普森法和 Leo Ticks 方法的誤差相近。
- 3. 在計算相位時,如果結果為正值,會減去 2pi 以避免出現負數的日期。
- 4. 辛普森法對於曲線變化較大的函數有更好的逼近能力和較高的精確度,特別對於凹凸型的函數,在某些情況下需要更小的子區間才能達到相同的準確度,而梯形法可能需要更多子區間。
- 5. 梯形法較為簡單易懂、實作容易,適用於一般函數;而辛普森法則更適用於平滑且具有較高次導數的函數。

(二) 計算 power 最大的前五個主波之振幅、相位與日期

溫度

Trapezoida

項目 / 波數	震幅	相位	日期
1	7.27	-0.45	27
5	0.75	-0.3	1
2	0.74	-0.05	1
4	0.58	-5.42	20
41	0.57	-0.63	1

Simpson

項目 / 波數	震幅	相位	日期
1	7.18	-0.45	27
5	0.75	-0.04	1
2	0.75	-0.26	1
4	0.59	-5.39	20

項目 / 波數	震幅	相位	日期
41	0.58	-0.64	1

Leo Ticks

項目/波數	震幅	相位	日期
1	7.19	-0.45	27
5	0.75	-0.04	1
2	0.75	-0.27	1
4	0.59	-5.39	20
41	0.58	-0.64	1

壓力

Trapezoida

項目 / 波數	震幅	相位	日期
1	7.51	-0.2	12
28	1.12	-1.12	1
4	1.08	-0.32	2
7	0.98	-0.35	1
21	0.93	-5.56	1

Simpson

項目 / 波數	震幅	相位	日期
1	7.48	-0.2	12
28	1.11	-1.15	1
4	1.05	-0.32	2
7	0.97	-0.34	1
21	0.94	-1.01	1

Leo Ticks

項目/波數	震幅	相位	日期
1	7.49	-0.2	12

	項目 / 波數	震幅	相位	日期
	28	1.11	-1.14	1
	4	1.06	-0.32	2
	7	0.97	-0.35	1
•	21	0.93	-1.01	1

(三) 繪出年週期與半年周期的圖形

method **Pressure Temperature** trapezoidal method for pressure period 1015 1010 1005 temperature (C) (E) 1000 Trapezoidal 995 990 Half year simpson method for pressure period Simpson Original 1015 1010 1005 g 1000 Leoticks 990 100 600

透過傅立葉還原:

method Pressure Temperature

