

Análise matemática

Pedro Henrique de Almeida Konzen

20 de março de 2018

Licença

Este trabalho está licenciado sob a Licença Atribuição-CompartilhaIgual 4.0 Internacional Creative Commons. Para visualizar uma cópia desta licença, visite <http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/> ou mande uma carta para Creative Commons, PO Box 1866, Mountain View, CA 94042, USA.

Prefácio

Sumário

Capa	i
Licença	ii
Prefácio	iii
Sumário	iv
I Análise de funções de uma variável real	1
1 Introdução	3
2 Fundamentos da análise	4
2.1 Funções	4
2.1.1 Definição de função	4
2.1.2 Classificações elementares	5
2.1.3 Operações elementares	7
3 Limites	9
3.1 Noções de topologia	9
3.1.1 Exercícios	11
Referências Bibliográficas	12
Índice Remissivo	13

Parte I

Análise de funções de uma variável real

Capítulo 1

Introdução

Em construção ...

Capítulo 2

Fundamentos da análise

2.1 Funções

2.1.1 Definição de função

Definição 2.1.1. (Função) Uma **função** $f : D \rightarrow Y$ é uma relação que associa cada elemento de um dado conjunto D com um único elemento de um dado conjunto Y . O conjunto D é chamado de **domínio** da função e o conjunto Y é chamado de **contradomínio** da função.

Comumente, uma dada função $f : D \rightarrow Y$ é acompanhada de sua **lei de correspondência**, a qual muitas vezes é denotada por $y = f(x)$. Neste caso, temos que a função f associa $x \in D$ ao elemento $y \in Y$. Neste contexto, x é chamada de **variável independente** e y de **variável dependente**. Ainda, muitas vezes uma função é descrita apenas por sua lei de correspondência e, neste caso, os conjuntos domínio e imagem são inferidos no contexto em questão.

Observação 2.1.1. Neste livro, quando não especificado ao contrário, assumiremos que o domínio e o contradomínio das funções consideradas são subconjuntos dos números reais,

Exemplo 2.1.1. Vejamos os seguintes casos:

- a) A relação $f : \{1,2,3\} \rightarrow \mathbb{R}$, $y = f(x) := x^2 + 1$, define uma função.
- b) A relação $g : D = \{0,1,2,3,4\} \rightarrow \mathbb{Z}$, $x^2 + y^2 = 9$ com $x \in D$ e $y \in Y$, não é uma função. Com efeito, $0 \in D$ e relaciona-se com $3 \in Y$ e $-3 \in Y$ no seu contradomínio.
- c) Da equação $y = \sqrt{x}$ pode-se inferir a função $h : x \in D \rightarrow y \in \mathbb{R}$, onde o domínio D é conjunto dos reais não negativos.

Definição 2.1.2. (Imagem de uma função) A **imagem** I_f de uma dada função $f : D \rightarrow Y$ é o conjunto de todos os elementos de Y que se relacionam com algum elemento de D , i.e.:

$$I_f := \{y \in Y; \exists x \in D \text{ tal que } y = f(x)\}. \quad (2.1)$$

Exemplo 2.1.2. Vejamos os seguintes casos:

- a) A função $f : \{1,2,3\} \rightarrow \mathbb{R}$, $y = f(x) := x^2 + 1$, tem imagem $I_f = \{1,4,9\}$.
- b) A imagem da função $f : \{0\} \cup \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{R}$, $y = 2x + 1$, é conjunto dos números ímpares.
- c) A imagem da função $\text{sen} : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $y = \text{sen } x$, é $I_{\text{sen}} = [-1, 1]$.

Observação 2.1.2. Dada uma função $f : D \rightarrow Y$ e um conjunto $A \subset D$, definimos a imagem de A pela função f por

$$f(A) := \{y \in Y; \exists x \in A \text{ tal que } y = f(x)\}. \quad (2.2)$$

Por exemplo, dada a função $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $y = \sqrt{x}$, temos

$$f(\{0,1,4,9\}) = \{0,1,2,3\}. \quad (2.3)$$

Definição 2.1.3. (Gráfico) O **gráfico** de uma função $f : D \rightarrow Y$, $y = f(x)$, é o conjunto de todos os pares ordenados (x,y) tal que $x \in D$ e $y = f(x)$, i.e.

$$G_f := \{(x,y) \in D \times Y; y = f(x)\}. \quad (2.4)$$

Exemplo 2.1.3. O gráfico da função $f : \{1,2,3\} \rightarrow \mathbb{R}$, $y = f(x) := x^2 + 1$, é

$$G_f = \{(1,2), (2,5), (3,10)\}. \quad (2.5)$$

2.1.2 Classificações elementares

Definição 2.1.4. (Função limitada) Seja dada uma função $f : D \rightarrow \mathbb{R}$, $y = f(x)$. Dizemos que f é uma **função limitada inferiormente** (ou **limitada à esquerda**) quando existe $m \in \mathbb{R}$ tal que $m \leq f(x)$ para todo $x \in D$. Analogamente, dizemos que f é uma **função limitada superiormente** (ou **limitada à direita**) quando existe $M \in \mathbb{R}$ tal que $f(x) \leq M$ para todo $x \in D$. Ainda, f é dita ser **limitada** quando é limitada inferiormente e superiormente.

Exemplo 2.1.4. Vejamos os seguintes casos:

- a) A função $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $y = x^2 + 1$, é limitada inferiormente. De fato, para cada $x \in \mathbb{R}$ temos $x^2 \geq 0$ e, portanto, $y = x^2 + 1 \geq 1$.

b) A função seno é uma função limitada. Isto segue imediatamente da definição da função seno no círculo unitário (círculo trigonométrico).

Definição 2.1.5. Restrição/extensão de uma função Uma função $g : A \rightarrow Y$, $y = g(x)$, é dita ser uma **restrição** da dada função $f : D \rightarrow Y$ quando $A \subset D$ e $g(x) = f(x)$ para todo $x \in A$. Analogamente, f é uma **extensão** da função g .

Exemplo 2.1.5. A função $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $y = x + 1$, é uma extensão da função $g : \mathbb{R} \setminus \{1\} \rightarrow \mathbb{R}$, $y = \frac{x^2 - 1}{x - 1}$.

Definição 2.1.6. (Função injetiva) Uma função $f : D \rightarrow Y$, $y = f(x)$, é dita ser **injetiva** (**injetora** ou **invertível**) quando para todo $x_1, x_2 \in D$ com $x_1 \neq x_2$ temos $f(x_1) \neq f(x_2)$.

Observação 2.1.3. Uma função $f : D \rightarrow \mathbb{R}$, $y = f(x)$, é injetiva se, e somente se, para todo $x_1, x_2 \in D$ tal que $f(x_1) = f(x_2)$ temos $x_1 = x_2$.

Exemplo 2.1.6. Vejamos os seguintes casos:

- a) A função $f(x) = x^2$ não é injetiva, pois tomando $x_1 = -1$ e $x_2 = 1$ temos $x_1 \neq x_2$, mas $f(x_1) = f(x_2)$.
- b) A função $f(x) = \sqrt{x+1}$ é injetiva. De fato, dados $x_1, x_2 \in \mathbb{D}$ tal que $f(x_1) = f(x_2)$, então $\sqrt{x_1+1} = \sqrt{x_2+1}$. Agora, tomando o quadrado dos dois lados, temos $x_1 = x_2$.

Definição 2.1.7. (Função sobrejetiva) Uma função $f : D \rightarrow Y$, $y = f(x)$, é **sobrejetiva** quando $f(D) = Y$ (ou, equivalentemente, $I_f = Y$).

Exemplo 2.1.7. A função $f : (0, \infty) \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x) = \ln(x)$, é sobrejetiva. De fato, dado qualquer $y \in \mathbb{R}$ basta escolhermos $x = e^y$ para termos $f(x) = y$.

Observação 2.1.4. Uma função injetiva e sobrejetiva é dita ser **bijetiva**.

Definição 2.1.8. (Função inversa) Dada uma função invertível (i.e. injetora) $f : D \rightarrow Y$, $y = f(x)$, definimos sua **inversa** por $f^{-1} : f(D) \rightarrow D$ que associa cada elemento $y \in f(D)$ com $x \in D$ tal que $f(x) = y$.

Exemplo 2.1.8. Vejamos os seguintes casos:

- a) A inversa da função $f : (0, \infty) \rightarrow \mathbb{R}$, $y = \ln(x)$, é a função $f^{-1} : \mathbb{R} \rightarrow (0, \infty)$, $y = e^x$.
- b) A inversa da função $f : [-1, \infty) \rightarrow [0, \infty)$, $y = \sqrt{x+1}$, é a função $f^{-1} : [0, \infty) \rightarrow [-1, \infty]$, $y = x^2 - 1$. De fato, f é sobrejetiva e dado $x \in [-1, \infty]$ temos $f(x) = y = \sqrt{x+1}$ e, então $y^2 = x+1$, logo $x = y^2 - 1$.

Definição 2.1.9. (Função monótona) Seja dada uma função $f : D \rightarrow Y$. Dizemos que f é **crescente** quando para todo $x_1, x_2 \in D$ com $x_1 < x_2$, temos $f(x_1) < f(x_2)$. Agora, quando para todo $x_1, x_2 \in D$ com $x_1 < x_2$ temos $f(x_1) \leq f(x_2)$, dizemos que f é uma **função não-decrescente**. Analogamente, quando para todo $x_1, x_2 \in D$ com $x_1 < x_2$ temos $f(x_1) > f(x_2)$ dizemos que f é uma função **decrescente**. Por fim, quando para todo $x_1, x_2 \in D$ com $x_1 < x_2$ temos $f(x_1) \geq f(x_2)$ dizemos que f é uma função **não-crescente**.

Exemplo 2.1.9. Vejamos os seguintes casos:

- a) $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, y = x^3$, é uma função crescente.
- b) $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, y = e^{-x}$ é uma função decrescente.

Definição 2.1.10. (Paridade de uma função) Uma função $f : D \rightarrow Y, y = f(x)$, é dita ser **par** quando para todo $x \in D$, temos $f(x) = f(-x)$. Agora, quando para todo $x \in D$, temos $f(x) = -f(-x)$, então dizemos se tratar de uma função **ímpar**.

Exemplo 2.1.10. Vejamos os seguintes casos:

- a) A função $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, y = |x|$, é uma função par.
- b) A função $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, y = x^3$, é uma função ímpar.

2.1.3 Operações elementares

Operações elementares envolvendo funções são comumente definidas tomando o cuidado de restringir o domínio das funções operadas para um conjunto apropriado. Por exemplo, dadas as funções $f : A \rightarrow \mathbb{R}, y = f(x)$, e $g : B \rightarrow \mathbb{R}, y = g(x)$, definimos a função soma de f com g por $(f + g) : A \cap B \rightarrow \mathbb{R}, (f + g)(x) := f(x) + g(x)$. Agora, para estas mesmas função, definimos a função quociente de f com g por $(f/g) : A \cap B \setminus \{0\} \rightarrow \mathbb{R}, (f/g)(x) := f(x)/g(x)$.

Exemplo 2.1.11. A função $f : [0, \infty] \rightarrow \mathbb{R}, y = \sqrt{x} - |x|$, é a subtração da função $f_1 : [0, \infty] \rightarrow \mathbb{R}, y = \sqrt{x}$, com a função $f_2 : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, y = |x|$, i.e. $f(x) = (f_1 - f_2)(x) := f_1(x) - f_2(x)$.

Definição 2.1.11. (Composição de funções) Sejam dadas as funções $f : D_f \rightarrow Y_f, y = f(x)$, e $g : D_g \rightarrow Y_g, y = g(x)$, com $I_g \subset D_f$. Definimos a **função composta** de f com g por $(f \circ g) : D_g \rightarrow Y_f$ com $(f \circ g)(x) = f(g(x))$.

Exemplo 2.1.12. A função $f : [0, \infty] \rightarrow \mathbb{R}, y = \sqrt{x^2 + 1}$, é a composição da função $f_1 : [0, \infty] \rightarrow \mathbb{R}, y = \sqrt{x}$, com a função $f_2 : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, y = x^2 + 1$.

Exercícios

E 2.1.1. Sejam $f : D \rightarrow Y$, $y = f(x)$, e $A, B \subset D$. Mostre que $f(A \cup B) = f(A) \cup f(B)$.

E 2.1.2. Construa uma função crescente, limitada superiormente e com domínio igual ao conjunto dos números reais.

E 2.1.3. Mostre que $f : [1, \infty) \rightarrow \mathbb{R}$, $y = \sqrt{x^3 - 1}$, é injetora e construa sua inversa.

E 2.1.4. Mostre que se $f : D \rightarrow Y$ é injetora, então f não é par.

E 2.1.5. Mostre que uma dada função $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $y = f(x)$, é limitada quando existe $c \in \mathbb{R}$ tal que $|f(x)| < c$, $\forall x \in \mathbb{R}$.

Capítulo 3

Limites

3.1 Noções de topologia

Definição 3.1.1. (Ponto interior) Diz-se que x é um **ponto interior** de um dado conjunto C quando existe um intervalo (a, b) que contém x e está contido em C , i.e. $x \in (a, b) \subset C$. O conjunto de todos os pontos interiores de C é chamado de seu **interior**.

Exemplo 3.1.1. a) Todo elemento de um intervalo aberto (a, b) é ponto interior deste.

b) O interior de um dado intervalo fechado $[a, b]$ é o intervalo aberto (a, b) .

Definição 3.1.2. (Conjunto aberto) Diz se que C é **conjunto aberto** quando todos seus elementos são pontos interiores.

Exemplo 3.1.2. Vejamos os seguintes casos:

- a) O intervalo $(a, b) := \{x \in \mathbb{R}; a < x < b\}$ é um conjunto aberto. De fato, dado $x \in (a, b)$ podemos tomar $0 < \epsilon < \min\{x - a, b - x\}$ de forma que $x \in (x - \epsilon, x + \epsilon) \subset (a, b)$.
- b) O intervalo $(a, b]$ não é aberto, pois $b \in (a, b]$ não é ponto interior.
- c) O conjunto vazio \emptyset é um conjunto aberto. Com efeito, se o conjunto \emptyset não é aberto, então existe um elemento $x \in \emptyset$ que não é ponto interior de \emptyset , o que é um absurdo pois \emptyset não contém elementos por definição.
- d) O conjunto dos números racionais \mathbb{Q} não é aberto.

Definição 3.1.3. (Vizinhança) Uma **vizinhança** de um dado ponto x é qualquer conjunto V que contenha x como ponto interior. Também, a **vizinhança simétrica** de um ponto $x \in \mathbb{R}$ é todo intervalo $V_\epsilon(x) := (x - \epsilon, x + \epsilon)$ com $\epsilon > 0$. Mais estrito, a **vizinhança perfurada** de $x \in \mathbb{R}$ é uma vizinhança de x que não contém x . Aproveitamos para fixar a notação:

$$V'_\epsilon(x) := V_\epsilon(x) \setminus \{x\} = \{y \in \mathbb{R}; 0 < |x - y| < \epsilon\}.$$

Exemplo 3.1.3. Podemos reescrever o Exemplo 3.1.2 da seguinte forma. Um intervalo (a, b) é um conjunto aberto, pois para cada $x \in (a, b)$ podemos escolher $0 < \epsilon < \min\{x - a, b - x\}$ tal que $V_\epsilon(x) \subset (a, b)$.

Definição 3.1.4. (Ponto de acumulação) Um ponto x é chamado de **ponto de acumulação** de um dado conjunto C quando toda vizinhança de x contém infinitos pontos de C .

Exemplo 3.1.4. Vejamos os seguintes casos:

- a) O número a é ponto de acumulação do intervalo $(a, b]$ não degenerado. De fato, dado $\epsilon > 0$, temos $(a, a + \epsilon) \subset V_\epsilon(a)$ e $(a, a + \epsilon) \cap (a, b]$ é um conjunto infinito.
- b) Zero é o único ponto de acumulação do conjunto $\{1, 1/2, 1/3, \dots, 1/n, \dots\}$.

Definição 3.1.5. (Ponto isolado) Diz-se que x é **ponto isolado** de um dado conjunto C quando $x \in C$ não é ponto de acumulação de C . Diz-se que um conjunto é **discreto** quando todos seus elementos são pontos discretos.

Exemplo 3.1.5. Vejamos os seguintes casos:

- a) O conjunto dos números naturais \mathbb{N} é discreto.
- b) O conjunto dos números racionais \mathbb{Q} não é discreto.
- c) O conjunto $\{1, 1/2, 1/3, \dots, 1/n, \dots\}$ é discreto.

Definição 3.1.6. (Ponto aderente) Dizemos que x é **ponto aderente** de um dado conjunto C quando toda vizinhança de x contém algum ponto de C . O conjunto de todos os pontos aderentes de C é chamado de **fecho** (ou, conjunto de aderência) de C , o qual denotamos por \overline{C} .

Observação 3.1.1. Observe que todo ponto de um conjunto é aderente ao mesmo, bem como, todos os seus pontos de acumulação.

Exemplo 3.1.6. Vejamos os seguintes casos:

- a) O fecho de $(a, b]$ é o intervalo fechado $[a, b]$.

- b) O conjunto dos números reais \mathbb{R} é o fecho do conjunto dos números racionais \mathbb{Q} , i.e. $\overline{\mathbb{Q}} = \mathbb{R}$.

Definição 3.1.7. Conjunto fechado Dizemos que um conjunto C é **fechado** quando é igual ao seu fecho, i.e. $C = \overline{C}$.

Exemplo 3.1.7. Vejamos os seguintes casos:

- a) O intervalo $[a, b]$ é um conjunto fechado.
- b) O conjunto vazio \emptyset é fechado. Por quê?
- c) O conjunto dos números reais \mathbb{R} é fechado.
- d) O conjunto dos números racionais \mathbb{Q} não é fechado.

Definição 3.1.8. (Conjunto denso) Dizemos que um conjunto A é **denso** no conjunto B , quando todo ponto aderente de $\overline{A} \subset B$.

Exemplo 3.1.8. O conjunto dos números racionais \mathbb{Q} é denso no conjunto dos números reais \mathbb{R} .

3.1.1 Exercícios

E 3.1.1. Seja dado um conjunto C . Mostre que x é ponto de acumulação de C se, e somente se, toda vizinhança de x contém pelo menos um elemento de C diferente de x .

E 3.1.2. Seja dado um conjunto C . Mostre que x é ponto isolado de C se, e somente se, existe uma vizinhança de x tal que $(V(x) \setminus \{x\}) \cap C = \emptyset$.

Referências Bibliográficas

- [1] R.G. Bartle and D.R. Sherbert. *Introduction to real analysis*. John Wiley & Sons, 3. ed. edition, 2000.
- [2] C.I. Doering. *Introdução à análise matemática na reta*. SBM, 1. ed. edition, 2015.
- [3] E.L. Lima. *Análise real*. IMPA, 12. ed. edition, 2017.
- [4] G. Ávila. *Análise matemática para licenciatura*. Blucher, 3. ed. edition, 2006.

Índice Remissivo

- conjunto
 - discreto, 10
 - fechado, 11
 - interior, 9
- conjunto aberto, 9
- conjunto de
 - aderência, 10
- contradomínio, 4
- definição de
 - função, 4
- denso, 11
- domínio, 4
- extensão
 - de uma função, 6
- fecho, 10
- função, 4
 - ímpar, 7
 - bijetiva, 6
 - composta, 7
 - crescente, 7
 - decrecente, 7
 - injetiva, 6
 - inversa, 6
 - não-decrecente, 7
- função limitada, 5
 - à direita, 5
 - à esquerda, 5
 - inferiormente, 5
 - superiormente, 5
- função par, 7
- função sobrejetiva, 6
- fundamentos da análise, 4
- gráfico, 5
- imagem de
 - uma função, 5
- lei de correspondência, 4
- limites
 - de funções, 9
- ponto
 - isolado, 10
- ponto aderente, 10
- ponto de acumulação, 10
- ponto interior, 9
- restrição
 - de uma função, 6
- variável
 - dependente, 4
 - independente, 4
- vizinhança, 10
 - perfurada, 10
 - simétrica, 10