EDN · RÉVISION MÉDICALE

Infectiologie

Révision médicale complète · 20 chapitres · 66 illustrations

EDN

Informations

EDN — Infectiologie

© 2026 EDN. Tous droits réservés.

Document de révision destiné à l'usage personnel des étudiants en médecine. Ce document n'est pas un avis médical et ne remplace aucun enseignement universitaire ni le référentiel officiel.

Source : documentation de révision EDN mise à disposition publiquement.

Langue : français. Format : EPUB 3.

Les tableaux de la source ont été convertis en texte : le libellé de chaque ligne est repris tel quel, et chaque colonne est nommée. Aucune donnée n'a été ajoutée, supprimée ni réordonnée.

Navigation : la table des matières de la liseuse donne accès à chaque chapitre. Les sections encadrées sont repliables d'un toucher.

Sommaire

Références

1 Fièvre aiguë (147)

2 Vaccination (146)

3 Risques émergents (178)

4 Médicaments anti-infectieux (177)

5 Zoonoses (173)

6 Voyage en pays tropical (175)

7 Pathologie infectieuse chez le migrant (174)

8 Exposition accidentelle aux liquides biologiques (366)

PARTIE 1 — VIRUS

9 Infections à VIH (169)

10 Herpès virus (168)

11 Grippe (166)

12 Oreillons (165)

PARTIE 2 — BACTÉRIES

13 Tuberculose (159)

14 Tétanos (160)

15 Coqueluche (163)

16 Septicémie (157)

PARTIE 3 — PARASITOLOGIE

17 Gale et pédiculose (171)

18 Paludisme (170)

19 Parasitoses digestives (172)

Références

PILLY Etudiant

Fièvre aiguë (147)

www.infectiologie.com www.ce-mir.fr (fièvre chez l'immunodéprimé)

Prise de température

Adulte

Prise idealement distance des repas, après 20 minutes de repos :

- Voies axillaire ou buccale habituellement utilisées : T° mesurée doit être majorée de **+0,5°C** pour obtenir la T° centrale
- Voie tympanique : peut être mise en défaut si obstruction du conduit auditif externe (**bouchon de cérumen**)
- Prise rectale n'est plus utilisée ❌ (risque d'ulcération thermométrique)

Enfant

Enfant normalement couvert, dans une température ambiante tempérée, en l'absence d'activité physique intense :

- Thermomètre électronique par voie rectale = méthode de référence
- Voie buccale ou axillaire : temps de prise plus long, et sous-estimation fréquente (ajouter **+0,4°C** si buccale, **+0,5°C** si axillaire)
- Thermomètre à infrarouges par voie auriculaire et frontale : temps de prise rapide, mais manque parfois de précision

T° normale

Température centrale considérée comme normale est ≤ 37,5°C le matin et ≤ 37,8°C le soir

Il existe en effet de variations physiologiques en lien avec l'âge, le sexe, le rythme nycthéméral et l'activité physique

Fébricule. Terme « fébricule », imprécis, désigne habituellement une température entre **> 37,5-38°C**

Fièvre

Hausse de la température centrale au-dessus des variations normales circadiennes, définition non consensuelle :

- Température corporelle **≥ 38°C** le matin ou **≥ 38,3°C** le soir

Aiguë. Fièvre aiguë date de **< 5 jours**, les étiologies sont le plus souvent infectieuses

Fièvre prolongée

Fièvre prolongée sur un sujet sans terrain particulier, est définie par 3 critères :

- T° ≥ 38,3 °C à plusieurs reprises : au repos, à distance des repas, par voie axillaire ou buccale en ajoutant +0,5°C
- Dure depuis ≥ 3 semaines
- Sans cause identifiée, malgré investigations appropriées (pas de liste pré-établie de ces investigations) :
  - Soit après **3 consultations**
  - Soit durant **3 jours d'hospitalisation**